Fonction de x	Dérivée
$\alpha\, f(x) + \beta\, g(x) \;\; (\alpha, \beta \in \mathbb{R})$	$\alpha\, f'(x) + \beta\, g'(x)$
$f(x) \cdot g(x)$	$f'(x)g(x) + f(x)g'(x)$
$\frac{f(x)}{g(x)}$	$\frac{f'(x)g(x) - f(x)g'(x)}{g^2(x)}$
$g(f(x))$	$g'(f(x))\, f'(x)$
$f^{-1}(x)$	$\frac{1}{f'(f^{-1}(x))}$
$\frac{1}{f(x)}$	$-\frac{f'(x)}{f^2(x)}$
$c \in \mathbb{R}$	0
$x^\alpha \;\; (\alpha \in \mathbb{R})$	$\alpha\, x^{\alpha-1}$
$\sin x$	$\cos x$
$\cos x$	$-\sin x$
$\tan x$	$\frac{1}{\cos^2 x} = 1 + \tan^2 x$
$\cot x$	$-\frac{1}{\sin^2 x} = -1 - \cot^2 x$
$\arcsin x$	$\frac{1}{\sqrt{1-x^2}}$
$\arccos x$	$-\frac{1}{\sqrt{1-x^2}}$
$\arctan x$	$\frac{1}{1+x^2}$
$\operatorname{arccot} x$	$-\frac{1}{1+x^2}$
e^x	e^x
$a^x \;\; (a > 0)$	$a^x \, \ln a$
$\ln x$	$\frac{1}{x}$
$\log_a(x) \;\; (a > 0\,,\; a \neq 1)$	$\frac{1}{x \ln a}$

Fonction de x	Primitive
$\alpha\, f(x) + \beta\, g(x) \;\; (\alpha, \beta \in \mathbb{R})$	$\alpha\, F(x) + \beta\, G(x)$
$f(g(x)) \cdot g'(x)$	$F(g(x))$
$f^\alpha(x) \cdot f'(x) \;\; (\alpha \neq -1)$	$\frac{1}{\alpha+1} f^{\alpha+1}(x)$
$\frac{f'(x)}{f(x)}$	$\ln \lvert f(x) \rvert$
$c \in \mathbb{R}$	cx
$x^\alpha \;\; (\alpha \neq -1)$	$\frac{1}{\alpha+1}\, x^{\alpha+1}$
$\frac{1}{x}$	$\ln \lvert x \rvert$
$\sin x$	$-\cos x$
$\cos x$	$\sin x$
$\tan x$	$-\ln \lvert \cos x \rvert$
$\cot x$	$\ln \lvert \sin x \rvert$
$1 + \tan^2 x = \frac{1}{\cos^2 x}$	$\tan x$
$1 + \cot^2 x = \frac{1}{\sin^2 x}$	$-\cot x$
e^x	e^x
$a^x \;\; (a > 0,\, a \neq 1)$	$\frac{a^x}{\ln a}$
$\frac{1}{x^2+a^2} \;\; (a \neq 0)$	$\frac{1}{a} \arctan \frac{x}{a}$
$\frac{1}{\sqrt{a^2-x^2}} \;\; (a \neq 0)$	$\arcsin \frac{x}{\lvert a \rvert}$
$\frac{1}{x^2-a^2} \;\; (a \neq 0)$	$\frac{1}{2a} \ln \left\lvert \frac{x-a}{x+a} \right\rvert$

Expression dans l'intégrale	Substitution standard	
$\sqrt{a^2 - x^2} \;\; (a > 0)$	$x = a \sin t$	
$\frac{P(\sin x, \cos x)}{Q(\sin x, \cos x)}$, avec P, Q polynômes en $\sin x$ et/ou $\cos x$	$t = \tan x, \;\; \sin x = \frac{t}{\sqrt{1+t^2}}, \;\; \cos x = \frac{1}{\sqrt{1+t^2}}, \;\; dx = \frac{1}{1+t^2} dt$	si les racines disparaissent
	$t = \tan \frac{x}{2}, \;\; \sin x = \frac{2t}{1+t^2}, \;\; \cos x = \frac{1-t^2}{1+t^2}, \;\; dx = \frac{2}{1+t^2} dt$	sinon