α	0	$\pi/6$	$\pi/4$	$\pi/3$	$\pi/2$
	$0°$	$30°$	$45°$	$60°$	$90°$
$\sin\alpha$	0	$1/2$	$\sqrt{2}/2$	$\sqrt{3}/2$	1
$\cos\alpha$	1	$\sqrt{3}/2$	$\sqrt{2}/2$	$1/2$	0
$\tan\alpha$	0	$\sqrt{3}/3$	1	$\sqrt{3}$	—

$$\cos^2\alpha + \sin^2\alpha = 1 \qquad \frac{1}{\cos^2\alpha} = 1 + \tan^2\alpha \qquad \frac{1}{\sin^2\alpha} = 1 + \cot^2\alpha$$

$$\sin(\alpha+\beta) = \sin\alpha\,\cos\beta + \cos\alpha\,\sin\beta \qquad \sin(\alpha-\beta) = \sin\alpha\,\cos\beta - \cos\alpha\,\sin\beta$$
$$\cos(\alpha+\beta) = \cos\alpha\,\cos\beta - \sin\alpha\,\sin\beta \qquad \cos(\alpha-\beta) = \cos\alpha\,\cos\beta + \sin\alpha\,\sin\beta$$
$$\tan(\alpha+\beta) = \frac{\tan\alpha + \tan\beta}{1 - \tan\alpha\,\tan\beta} \qquad \tan(\alpha-\beta) = \frac{\tan\alpha - \tan\beta}{1 + \tan\alpha\,\tan\beta}$$

$$\sin(2\alpha) = 2\sin\alpha\,\cos\alpha \qquad \cos(2\alpha) = \cos^2\alpha - \sin^2\alpha \qquad \tan(2\alpha) = \frac{2\tan\alpha}{1 - \tan^2\alpha}$$

$$2\sin\alpha\,\sin\beta = \cos(\alpha-\beta) - \cos(\alpha+\beta)$$
$$2\sin\alpha\,\cos\beta = \sin(\alpha-\beta) + \sin(\alpha+\beta)$$
$$2\cos\alpha\,\cos\beta = \cos(\alpha-\beta) + \cos(\alpha+\beta)$$

$$\sin\alpha + \sin\beta = 2\sin\tfrac{\alpha+\beta}{2}\,\cos\tfrac{\alpha-\beta}{2} \qquad \cos\alpha + \cos\beta = 2\cos\tfrac{\alpha+\beta}{2}\,\cos\tfrac{\alpha-\beta}{2}$$
$$\sin\alpha - \sin\beta = 2\sin\tfrac{\alpha-\beta}{2}\,\cos\tfrac{\alpha+\beta}{2} \qquad \cos\alpha - \cos\beta = -2\sin\tfrac{\alpha+\beta}{2}\,\sin\tfrac{\alpha-\beta}{2}$$

$$2\sin^2(\tfrac{\alpha}{2}) = 1 - \cos\alpha \qquad 2\cos^2(\tfrac{\alpha}{2}) = 1 + \cos\alpha$$

Théorème du sinus / Sinussatz $\qquad \dfrac{\sin\alpha}{a} = \dfrac{\sin\beta}{b} = \dfrac{\sin\gamma}{c}$

Théorème du cosinus / Kosinussatz $\qquad a^2 = b^2 + c^2 - 2bc\,\cos\alpha$