

TUBERCULOSE

1. Définition de cas suspect

Toux > 15 jours avec ou sans : hémoptysie, fièvre, amaigrissement, transpiration, anorexie, asthénie

2. Définition de cas tuberculose pulmonaire Confirmé

- BK retrouvés par microscopie directe dans un des trois échantillons d'expectorations donnés par le malade ;
- Culture sur milieu de Loewenstein Jansen positive.

3. Dépistage

Faire trois examens de crachats chez un malade suspect ;

Si un examen positif mettre sous traitement antituberculeux

Si trois examens négatifs donner Amoxicilline 500 mg pendant deux semaines

Si amélioré arrêter le traitement

Si non amélioré, refaire trois examens de crachats

Si un examen positif mettre sous traitement antituberculeux

Si trois examens négatifs, référer

4. Prise en charge des cas de tuberculose pulmonaire Confirmé

- **Traitement Directement Observé (TDO) :** les médicaments prescrits pour le traitement d'une tuberculose seront pris en une seule prise, de préférence le matin à jeun, sous la supervision directe d'un membre du personnel soignant.

- **Définition des cas thérapeutiques de tuberculose pulmonaire positif:**

Nouveau cas : patient qui n'a jamais reçu de traitement antituberculeux ou qui a pris des médicaments antituberculeux pendant moins de quatre semaines.

Echec : malade qui Continue de donner des frottis positifs au 5^{ème} mois de traitement, on applique le schéma de retraitement (8mois)

Rechute : malade dont l'examen de crachats est positif après avoir été déclaré « guéri » ou « traitement terminé » à l'issue d'un traitement complet.

Retour après abandon : patient ayant abandonné son traitement pendant plus de 2 mois consécutifs et qui retourne au CDS. IL faut refaire les examens de crachat et si c'est positif, on applique le schéma de retraitement (8 mois).

Schémas thérapeutiques :

Catégories de traitement	Classification du Malade TB	Schémas thérapeutiques		Durée totale du traitement (en mois)
		Phase initiale	Phase de Continuation	
I.	Nouveau Cas TPM+	2 RHZE	4 RH	6
II.	Retraitement (rechute, échec, reprise de traitement après abandon)	2 RHZES 1 RHZE	5 HRE	8

[R : rifampicine, H : isoniazide, Z : pyrazinamide, E : éthambutol, S : streptomycine ; le chiffre avant les lettres donne le nombre de mois.

Guéri : malade qui a reçu un traitement complet et qui a des contrôles bactériologiques négatifs au 5^{ème} et/ou au 6^{ème} mois

Traitement terminé : malade qui a reçu un traitement complet mais n'a pas subi de contrôles bactériologiques à la fin du traitement.

- **Examens de Contrôle de crachats** : au 2^{ème}, 5^{ème}, 6^{ème} mois et en cas de retraitement 8^{ème} mois. Si l'examen n'est pas possible envoyer l'échantillon de crachat au CDT le plus proche. **Si le C 2 est positif**, il faut prolonger la phase initiale d'1 mois de traitement ; faire C3 et quel que soit le résultat entamer la 2ème phase.