

## POSOLOGIES ENFANTS

Cette fiche donne les doses des médicaments utilisés pour les enfants. Les doses sont rapportées au poids de l'enfant, qui doit donc être systématiquement pesé à toute consultation

Médicament	Forme et dosage	Dose/kg/j	Doses journalières				
			2-4 kg	4-8 kg	8-12 kg	12-15 kg	15-19 kg
<b>AAS - Acide acétylsalicylique (enfant &gt;15 ans)</b>	cp 500 mg	50 mg/kg/j	non	non	non	non	½ cp x 3
<b>Amoxicilline</b>	sirop 125 mg	50 mg/kg/j	½ càc x 2	1 càc x 2	non	non	non
	sirop 250 mg	50 mg/kg/j	non	½ càc x 2	1 càc x 2	non	non
	Cp / gél 250 mg	50 mg/kg/j	non	½ cp x 2	1 cp x 2	1 cp x 3	non
	Cp / gél 500 mg	50 mg/kg/j	non	non	non	non	1 cp x 2
<b>Ampicilline</b>	sirop 125 mg/5ml	50 mg/kg/j	½ càc x 2	1 càc x 2	non	non	non
	sirop 250 mg/5ml	50 mg/kg/j	non	½ càc x 2	1 càc x 2	non	non
	Cp 250mg	50 mg/kg/j	non	½ cp x 2	1 cp x 2	1 cp x 3	non
	Gélule 500 mg	50 mg/kg/j	non	non	non	non	1gel x 2
<b>Albendazole</b>	Sirop 4% 10 ml	Prise unique	non	non	5 ml	10 ml	10 ml
	Cp 400 mg	Prise unique	non	non	½ cp	1cp	1cp
<b>Clindamycine (pour le traitement du paludisme)</b>	Gélule 75 mg ou 150 mg	10 mg/kg/j	non	non	1 gél 75 mg	1 gél 75mg	1 gél 150 mg
<b>Ciprofloxacine (enfant de &gt;6 ans)</b>	Cp 250 mg	15 mg/kg/j	non	non	non	½ cp	½ cp x2
	Cp 500 mg	15 mg/kg/j					¼ cp x2
<b>Cotrimoxazole (SMX/TMT)</b>	cp 400/80 mg	40 mg/kg/j	non	¼ cp x 2	½ cp x 2	½ cp x 3	1 cp x 2

Médicament	Forme et dosage	Dose/kg/j	Doses journalières				
			2-4 kg	4-8 kg	8-12 kg	12-15 kg	15-19 kg
<b>Dexaméthazone</b>	Amp 4 mg/1ml	0,2-0,4 mg/kg/j	non	non	non	1/2 ampx2	1 amp x2
<b>Diazépam</b>	Amp 10mg/2ml	0,5 mg/kg	1 mg	1 mg	2 mg	5 mg	5 mg
<b>Doxycycline (enfants &gt; 8 ans)</b>	Cp 100 mg	4 mg/kg/j	non	non	non	non	1cp
<b>Furosémide</b>	Cp 40 mg	1-2mg/kg/j	non	non	¼ cp	½ cp	1/2 cpx2
<b>Furosémide [IM]</b>	Amp 20 mg/2ml	0,5-1 mg/kg/inj	0,2 ml	0,3 ml	0,75 ml	1 ml	1,5 ml
<b>Gentamicine</b>	amp 10mg/1 ml	3 mg/kg/j	1 ml x 2	1.5 ml x 2	non	non	non
	amp 40mg/2 ml	3 mg/kg/j	non	non	1 ml x 2	1,5ml x 2	2 ml x 2
<b>Griséofulvine</b>	Cp 250 mg	10 mg/kg/j	non	non	non	non	½ cp x2
	Cp 500 mg	10 mg/kg/j	non	non	non	non	¼ cp x2
<b>Hydrocortisone hemisuccinate</b>	Poudre p. inj. 100 mg	5mg/kg à renouveler à la demande	10-20 mg	20-40 mg	40-60 mg	60-75 mg	75-95 mg
<b>Hydroxide d'aluminium</b>	Cp 500 mg		non	non	non	non	1 cp x 3
<b>Hyoscine</b>	Cp 10 mg	1 à 2 cp/j	non	non	non	non	10mg (à renouveler si nécessaire)
	Amp inj 20 mg	10 à 20 mg/j	non	non	non	½ ml	1 ml
<b>Mé bendazole</b>	Cp 100 mg		non	non	1cp x2	1cp x2	1cp x2
<b>Métoclopramide</b>	Amp 10 mg		non	non	non	5 mg IM à renouveler	5 mg IM à renouveler
<b>Métronidazole</b>	cp 250 mg	50 mg/kg/j	non	¼ cp x 3	½ cp x 3	½ cp x 3	1 cp x 2
<b>Nystatine</b>	Cp 500.000 U		non	non	½ cp x3/j	½ cp x3/j	1 cpx3/jr
	Suspension 100.000U/ml		1 càc x3/j	2 càc x3/j	non	non	non

Médicament	Forme et dosage	Dose/kg/j	Doses journalières				
			2-4 kg	4-8 kg	8-12 kg	12-15 kg	15-19 kg
<b>Paracétamol</b>	sirop 125 mg	60 mg/kg/j	½ càc x 2	½ càc x 3	½ càc x 4	1 càc x 3	non
	cp 500 mg	30 mg/kg/j	¼ cp x 2	¼ cp x 2	¼ cp x 3	½ cp x 2	½ cp x 3
<b>Pénicilline V</b>	cp 250 mg	50-100.000 UI/kg/j	½ cp x 3	½ cp x 4	1 cp x 3	1 cp x 3	1cp ½ x3
<b>Phénobarbital</b>	Cp 50mg	5 mg/kg/j	non	non	½ cp x 2	½ cp x 2	1 cp x 2
	Cp 100 mg	5 mg/kg/j	non	non	¼ cp x 2	¼ cp x 2	½ cp x 2
<b>Praziquantel</b>	Cp 600 mg	40 mg/kg dose unique	non	non	non	non	1 cp
<b>Prométhazine</b>	Cp 25 mg	1-2 mg/kg/j	non	non	½cp x 2/j	½cp x 3/j	½cp x 3/j
<b>Procaïne pénicilline</b>	1 million UI	50.000 UI/kg	100.000 UI x2/j	150.000 UI x2/j	250.000 UI x2/j	350.000 UI x2/j	500.000 UI x2/j
<b>Quinine</b>	Cp 100 mg	30 mg/kg	Non	½ cpx3	1cp x3/j	1 cpx3/j	2 cpx3/j
	Cp 300 mg	30 mg/kg	non	non	½ cpx3/j	½ cp x3/j	2/3 cp x3/j
	Cp 500 mg	30 mg/kg	non	non	non	¼ cp x3/j	1/3 cp x 3
	Amp 250 mg/2ml	30 mg/kg	non	150 mg/j	300 mg/j	400 mg/j	600 mg/j
	Amp 300 mg/2ml	30 mg/kg	non	150 mg /j	300 mg/j	400 mg/j	600 mg/j
	Amp 500 mg:2ml	30 mg/kg	non	150 mg/j	300 mg/j	400 mg/j	600 mg/j
	Amp 600 mg/2ml	30 mg/kg	non	150 mg/j	300 mg/j	400 mg/j	600 mg/j
<b>Salbutamol</b>	amp 0,5mg/1ml	0,1 mg/kg/j	non	non	non	¼ amp	½ amp x2
	cp 2 mg	0,1mg/kg/j	non	non	½ cp x 2	½ cp x 2	½ cpx 3
<b>Sel ferreux</b>	sirop 100 mg	20 mg/kg/j	non	½ càc x 2	½ càc x 3	1 càc x 2	1 càc x 3
	cp 200 mg	20 mg/kg/j	non	non	1 cp	1 cp	1 cp x 2

Médicament	Forme et dosage	Dose/kg/j	Doses journalières				
			2-4 kg	4-8 kg	8-12 kg	12-15 kg	15-19 kg
Sel ferreux / acide folique	cp 200 / 0,25 mg	20mg/kg/j	non	non	1 cp	1 cp	1cp x2
SRO	Selon PLAN (A, B ou C du FT Réhydratation / Choléra)						

Médicament	Forme et dosage	Durée du traitement	Doses journalières			
Artéméther- Amodiaquine (AS+AQ)		3 jours	4,5-8 kg (2-11 mois)	9-17 kg (1-5 ans)	18-35 kg (6-13 ans)	>35 kg (>14 ans)
	cp 25mg/67,5 mg		2 x 1cp	(2x 2cp)	(2x 4cp)	(2x 8cp)
	cp 50mg/135 mg		-	2 x 1cp	(2x 2cp)	(2x 4cp)
	cp 100mg/270 mg		-	-	2 x 1cp	2 x 2cp