שיעור 2
בסיסים אורתוגונליים

2.1 בסיסים אורתוגונליים

הגדרה 2.1 קבוצת ווקטורים אורתוגונלית

נתון המרחב מכפלה פנימית V ונתונה הקבוצה של ווקטורים

$$\{u_1, u_2, \ldots, u_k\} \ .$$

הקבוצה נקראת **אורתוגונלית** אם כל שני ווקטורים שלה אורתוגונליים. כלומר:

$$\langle u_i, u_j \rangle = 0 \ , \qquad i \neq j \ .$$

הגדרה 2.2 קבוצת ווקטורים ואורתונורמלית

נתון המרחב מכפלה פנימית V ונתונה הקבוצה של ווקטורים

$$\{u_1, u_2, \ldots, u_k\} \ .$$

הקבוצה נקראת **אורתונורמלית** אם:

א) כל שני ווקטורים שלה אורתוגונליים, כלומר

$$\langle u_i, u_j \rangle = 0 \ , \qquad i \neq j \ ,$$

ב) כל ווקטור הוא ווקטור יחידה, כלומר

$$\|u_i\| = 1 \ .$$

דוגמה 2.1

נתון הבסיס הסטנדרטי $\{e_1, \ldots, e_n\}$ של $\mathbb{R}^n$ עם המכפלה הסקלרית. בדקו אם הקבוצה אורתונורמלית.

פתרון:

תזכורת: נתונים שני ווקטורים $u = \begin{pmatrix} x_1 \\ \vdots \\ x_n \end{pmatrix}, \mathrm{v} = \begin{pmatrix} y_1 \\ \vdots \\ y_n \end{pmatrix} \in \mathbb{R}^n$, המכפלה הסקלרית מוגדרת

$$(u, \mathrm{v}) = \sum_{i=1}^{n} x_i y_i = x_1 y_1 + \ldots + x_n y_n \ .$$

נרשום את הבסיס הסטנדרטי של $\mathbb{R}^n$:

$$\left\{ e_1 = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ \vdots \\ 0 \end{pmatrix}, e_2 = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ \vdots \\ 0 \end{pmatrix}, , \ldots, e_n = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ \vdots \\ 1 \end{pmatrix} \right\}$$

א)

$$(e_i, e_j) = \begin{cases} 0 & i \neq j \\ 1 & i = j \end{cases},$$

כלומר כל שני ווקטורים אורתוגונליים.

ב)

$$\|e_i\| = \sqrt{(e_i, e_i)} = 1 \ ,$$

כלומר כל ווקטור בקבוצה הוא ווקטור יחידה.

לכן הבסיס הסטנדרטי של $\mathbb{R}^n$ הוא קבוצה אורתונורמלי.

דוגמה 2.2

נתונה הקבוצה

$$\left\{ u_1 = \begin{pmatrix} 1+i \\ -1 \\ 1 \end{pmatrix}, u_2 = \begin{pmatrix} i \\ 1 \\ -i \end{pmatrix}, u_3 = \begin{pmatrix} 3+i \\ 4+3i \\ 5i \end{pmatrix} \right\}$$

של ווקטורים ב- $\mathbb{C}^3$ עם המ"פ הסטנדרטית.

א) הוכיחו שהקבוצה אורתוגונלית.

ב) מצאו את הקבוצה האורתנורומלית המתאימה לקבוצה זו.

פתרון:

א)

$$\langle u_1, u_2 \rangle = (1+i)\bar{i} - 1 \cdot 1 + 1(-\bar{i}) = (1+i)(-i) - 1 + 1(i) = -i + 1 - 1 + i = 0 \ \Rightarrow \ u_1 \perp u_2 \ .$$

$$\langle u_1, u_3 \rangle = (1+i)(3-i) - 1(4-3i) + 1(-5i) = 4 + 2i - 4 + 3i - 5i = 0 \ \Rightarrow \ u_1 \perp u_3 \ .$$

$$\langle u_2, u_3 \rangle = i(3-i) + 1(4-3i) - i(-5i) = 1 + 3i + 4 - 3i - 5 = 0 \ \Rightarrow \ u_2 \perp u_3 \ .$$

לכן הקבוצה אורתוגונלית.

ב)

$$\|u_1\|^2 = \langle u_1, u_1 \rangle = (1+i)(1-i) + (-1)(-1) + 1 \cdot 1 = 4$$

$$\|u_2\|^2 = \langle u_2, u_2 \rangle = i(-i) + 1 \cdot 1 + (-i) \cdot i = 3 \ .$$

$$\|u_3\|^2 = \langle u_3, u_3 \rangle = (3+i)(3-i) + (4+3i)(4-3i) + 5i(-5i) = 10 + 25 + 25 = 60 \ .$$

לכן קבוצת הווקטורים

$$\left\{ \frac{1}{2} u_1 \ , \frac{1}{\sqrt{3}} u_2, \frac{1}{\sqrt{60}} u_3 \right\}$$

היא קבוצה אורתונורמלית.

משפט 2.1 קבוצת אורתוגונלית בת"ל

קבוצת אורתוגונלית במרחב מכפלה פנימית שלא מכילה את ווקטור האפס היא בלתי תלויה לינארית.

הוכחה: תהי $\{u_1, \ldots, u_k\}$ קבוצה אורתוגונלית. נניח ש

$$\alpha_1 u_1 + \ldots + \alpha_k u_k = 0 \ .$$

אז לכל $1 \leq j \leq k$

$$\left\langle \sum_{i=1}^{k} \alpha_i u_i \ , \ u_j \right\rangle = \langle 0 \ , \ u_j \rangle = 0 \ .$$

מצד שני

$$\left\langle \sum_{i=1}^{k} \alpha_i u_i \ , \ u_j \right\rangle = \sum_{i=1}^{k} \alpha_i \left\langle u_i \ , \ u_j \right\rangle \ .$$

הקבוצה אורתוגונלית, אז $\langle u_i, u_j \rangle = 0$ אם $i \neq j$, לכן בהסכום לעיל כל האיברים מתאפסים חוץ מהאיבר של $i = j$. לכן נקבל

$$\left\langle \sum_{i=1}^{k} \alpha_i u_i \ , \ u_j \right\rangle = \alpha_j \left\langle u_j \ , \ u_j \right\rangle \ .$$

לכן

$$\alpha_j \left\langle u_j \ , \ u_j \right\rangle = 0 \ .$$

$u_j \neq 0$ (נתון), אז $\langle u_j \ , \ u_j \rangle \neq 0$.
לכן בהכרח

$$\alpha_j = 0$$

לכל $1 \leq j \leq k$.

■

משפט 2.2 קבוצת אורתוגונלית היא בסיס

נניח ש- V מרחב מכפלה פנימית כך ש $\dim(V) = n$.

כל קבוצה אורתוגונלית של n ווקטורים ב- V מהווה בסיס של V.

הוכחה: נניח ש V מרחב מכפלה פנימית, $\dim(V) = n$.
נניח ש $U = \{u_1, \ldots, u_n\} \in V$ קבוצה אורתוגונלית.
כל קבוצה אורתוגונלית היא בת"ל, לכן הקבוצה בת"ל.
בקבוצה יש n ווקטורים, לכן $\dim(U) = \dim(V)$.
לכן הקבוצה מהווה בסיס של V.

■

הגדרה 2.3 בסיס אורתוגונלי ובסיס אורתונורמלי

- בסיס של V המורכב מווקטורים אורתוגונליים נקרא **בסיס אורתוגונלי.**
- בסיס של V המורכב מווקטורים אורתונורמליים נקרא **בסיס אורתונורמלי.**

דוגמה 2.3

עבור כל אחד של הקבוצות ווקטורים הבאות של $\mathbb{R}^3$ עם מ"פ סטנדרטית. בדקו אם הקבוצה היא בסיס אורתוגונלי, ובסיס אורתנורמלי.

א) $$\left\{ u_1 = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}, u_2 = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}, u_3 = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix} \right\}$$

ב) $$\left\{ u_1 = \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ 2 \end{pmatrix}, u_2 = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ -1 \end{pmatrix}, u_3 = \begin{pmatrix} 4 \\ -1 \\ -1 \end{pmatrix} \right\}$$

פתרון:

א) $\langle u_1, u_2 \rangle = 1 \neq 0$

לכן הקבוצה לא אורתוגונלית.

ב)

$$\begin{aligned} \langle u_1, u_2 \rangle &= 0 \\ \langle u_1, u_3 \rangle &= 0 \\ \langle u_2, u_3 \rangle &= 0 \end{aligned}$$

לכן הקבוצה אורתוגונלית, ולכן הקבוצה בת"ל ולכן הקבוצה בסיס של $\mathbb{R}^3$.

$$\|u_1\| = \sqrt{1+4+4} = 3 \ , \quad \|u_2\| = \sqrt{2} \ , \quad \|u_3\| = \sqrt{18} \ .$$

לכן הקבוצה לא בסיס אורתונורמלי.

נבנה בסיס אורתונורמלי:

$$\left\{ \frac{1}{3}u_1, \frac{1}{\sqrt{2}}u_2, \frac{1}{\sqrt{18}}u_3 \right\}$$

דוגמה 2.4

במרחב $\mathbb{C}^4$ עם מ"פ סטנדרטית, נתונה קבוצת ווקטורים הבאה:

$$\left\{ u_1 = \begin{pmatrix} 0 \\ \frac{1}{2} \\ \frac{1}{2}i \\ \frac{1}{2} - \frac{1}{2}i \end{pmatrix}, u_2 = \begin{pmatrix} 0 \\ \frac{i}{\sqrt{2}} \\ \frac{-1}{\sqrt{2}} \\ 0 \end{pmatrix}, u_3 = \begin{pmatrix} 0 \\ \frac{1}{2} \\ \frac{-1}{2}i \\ \frac{-1}{2} + \frac{1}{2}i \end{pmatrix}, \right\}$$

בדקו אם הקבוצה אורתוגונלית ואורתונורמלית.

פתרון:

$$\langle u_1, u_2 \rangle = 0 + \frac{1}{2}\left(\frac{-i}{\sqrt{2}}\right) + \frac{1}{2}i\left(\frac{-1}{\sqrt{2}}\right) + \left(\frac{1}{2} - \frac{1}{2}i\right) \cdot 0 = \frac{-i}{\sqrt{2}} \neq 0$$

לכן הקבוצה אינה אורתוגונלית.

דוגמה 2.5

קבעו אם הקבוצות הבאות אורתוגונליות ואורתונורמליות במרחב $\mathbb{R}_3[x]$ עם מ"פ האינטגרלית בקטע $[0,1]$:

א) $\{1, x, x^2\}$

ב) $\left\{1, x-\frac{1}{2}, x^2-x+\frac{1}{6}\right\}$

פתרון:

א)

$$u_1 - 1\ , \quad u_2 = x\ , \quad u_3 = x^2\ .$$

$$\langle u_1, u_2\rangle = \int_0^1 1\cdot x\,dx = \left[\frac{x^2}{2}\right]_0^1 = \frac{1}{2} \neq 0$$

לכן B_1 קבוצה לא אורתוגונלית.

ב)

$$u_1 - 1\ , \quad u_2 = x-\frac{1}{2}\ , \quad u_3 = x^2-x+\frac{1}{6}\ .$$

$$\langle u_1, u_2\rangle = \int_0^1 1\cdot\left(x-\frac{1}{2}\right)dx = \left[\frac{x^2}{2}-\frac{x}{2}\right]_0^1 = 0$$

$$\langle u_1, u_3\rangle = \int_0^1 1\cdot\left(x^2-x+\frac{1}{6}\right)dx = \left[\frac{x^3}{3}-\frac{x^2}{2}+\frac{x}{6}\right]_0^1 = 0$$

$$\langle u_2, u_3\rangle = \int_0^1 \left(x-\frac{1}{2}\right)\cdot\left(x^2-x+\frac{1}{6}\right)dx = \int_0^1\left(x^3-x^2+\frac{x}{6}-\frac{x^2}{2}+\frac{x}{2}-\frac{1}{12}\right)dx$$

$$= \int_0^1 \left(x^3-\frac{3x^2}{2}+\frac{2x}{3}-\frac{1}{12}\right)dx = \left[\frac{x^4}{4}-\frac{x^3}{2}+\frac{x^2}{3}-\frac{x}{12}\right]_0^1 = \frac{1}{4}-\frac{1}{2}+\frac{1}{3}-\frac{1}{12} = 0$$

לכן הקבוצה אורתוגונלית.

$$\|u_1\|^2 = \langle u_1, u_1\rangle = \int_0^1 1\cdot 1\,dx = [x]_0^1 = 1$$

$$\|u_2\|^2 = \langle u_2, u_2\rangle = \int_0^1 \left(x-\frac{1}{2}\right)^2 dx = \int_0^1 \left(x^2-x+\frac{1}{4}\right)dx = \left[\frac{x^3}{3}-\frac{x^2}{2}+\frac{x}{4}\right]_0^1 = \frac{1}{3}-\frac{1}{2}+\frac{1}{4} = \frac{1}{12}\ .$$

$$\begin{aligned}\|u_3\|^2 &= \langle u_3, u_3\rangle \\ &= \int_0^1 \left(x^2 - x + \frac{1}{6}\right)^2 dx \\ &= \int_0^1 \left(x^4 - 2x^3 + \frac{x^2}{3} + x^2 - \frac{x}{3} + \frac{1}{36}\right) dx \\ &= \int_0^1 \left(x^4 - 2x^3 + \frac{4x^2}{3} - \frac{x}{3} + \frac{1}{36}\right) dx \\ &= \left[\frac{x^5}{5} - \frac{x^4}{2} + \frac{4x^3}{9} - \frac{x^2}{6} + \frac{x}{36}\right]_0^1 \\ &= \frac{1}{5} - \frac{1}{2} + \frac{4}{9} - \frac{1}{6} + \frac{1}{36} \\ &= \frac{36}{180} - \frac{90}{180} + \frac{80}{180} - \frac{30}{180} + \frac{5}{180} \\ &= \frac{1}{180} \ .\end{aligned}$$

לסיכום:

$$\|u_1\| = 1, \quad \|u_2\| = \frac{1}{12}, \quad \|u_3\| = \frac{1}{180} \ .$$

לכן הקבוצה אינה אורתונורמלית.

נבנה קבוצה אורתונורמלית:

$$\left\{u_1, \sqrt{12}\cdot u_2, \sqrt{180}\cdot u_3\right\} \ .$$

דוגמה 2.6

נתונה הקבוצה

$$A_1 = \begin{pmatrix}1 & 2 & 3\\ 0 & 1 & 2\\ 0 & 0 & 1\end{pmatrix} \ , \quad A_2 = \begin{pmatrix}2 & 0 & 0\\ 0 & -2 & 0\\ 0 & 0 & 0\end{pmatrix} \ , \quad A_3 = \begin{pmatrix}1 & 1 & -1\\ 0 & 1 & -1\\ 0 & 0 & 1\end{pmatrix} \ .$$

במרחב $\mathbb{R}^{3\times 3}$ עם מ"פ הסטנדרטית. בדקו אם הקבוצה אורתוגונלית ואורתונורמלית.

פתרון:

$$\langle A_1, A_2\rangle = \text{tr}\left(A_2^t \cdot A_1\right) = \text{tr}\left(\begin{pmatrix}2 & 0 & 0\\ 0 & -2 & 0\\ 0 & 0 & 0\end{pmatrix}\cdot\begin{pmatrix}1 & 2 & 3\\ 0 & 1 & 2\\ 0 & 0 & 1\end{pmatrix}\right) = \text{tr}\begin{pmatrix}2 & 2 & -2\\ 0 & -2 & 2\\ 0 & 0 & 0\end{pmatrix} = 2-2 = 0 \ .$$

$$\langle A_1, A_3\rangle = \text{tr}\left(A_3^t \cdot A_1\right) = \text{tr}\left(\begin{pmatrix}1 & 0 & 0\\ 1 & 1 & 0\\ -1 & -1 & 1\end{pmatrix}\cdot\begin{pmatrix}1 & 2 & 3\\ 0 & 1 & 2\\ 0 & 0 & 1\end{pmatrix}\right) = \text{tr}\begin{pmatrix}1 & 2 & 3\\ 1 & 3 & 5\\ -1 & -3 & -4\end{pmatrix} = 1+3-4 = 0 \ .$$

$$\langle A_2, A_3\rangle = \text{tr}\left(A_3^t \cdot A_2\right) = \text{tr}\left(\begin{pmatrix}1 & 0 & 0\\ 1 & 1 & 0\\ -1 & -1 & 1\end{pmatrix}\cdot\begin{pmatrix}2 & 0 & 0\\ 0 & -2 & 0\\ 0 & 0 & 0\end{pmatrix}\right) = \text{tr}\begin{pmatrix}2 & 0 & 0\\ 2 & -2 & 0\\ -2 & 2 & 0\end{pmatrix} = 2-2 = 0 \ .$$

לכן הקבוצה אורתוגונלית.

$$\|A_1\|^2 = \langle A_1, A_1\rangle = \operatorname{tr}\left(A_1^t \cdot A_1\right) = \operatorname{tr}\left(\begin{pmatrix}1&0&0\\2&1&2\\3&2&1\end{pmatrix}\cdot\begin{pmatrix}1&2&3\\0&1&2\\0&0&1\end{pmatrix}\right) = \operatorname{tr}\begin{pmatrix}1&2&3\\2&5&8\\3&8&14\end{pmatrix} = 20\ .$$

$$\|A_2\|^2 = \langle A_2, A_2\rangle = \operatorname{tr}\left(A_2^t \cdot A_2\right) = \operatorname{tr}\left(\begin{pmatrix}2&0&0\\0&-2&0\\0&0&0\end{pmatrix}\cdot\begin{pmatrix}2&0&0\\0&-2&0\\0&0&0\end{pmatrix}\right) = \operatorname{tr}\begin{pmatrix}4&0&0\\0&4&0\\0&-0&0\end{pmatrix} = 4+4 = 8\ .$$

$$\|A_3\|^2 = \langle A_3, A_3\rangle = \operatorname{tr}\left(A_3^t \cdot A_3\right) = \operatorname{tr}\left(\begin{pmatrix}1&0&0\\1&1&0\\-1&-1&1\end{pmatrix}\cdot\begin{pmatrix}1&1&-1\\0&1&-1\\0&0&1\end{pmatrix}\right) = \operatorname{tr}\begin{pmatrix}1&1&-1\\1&2&-2\\-1&-2&3\end{pmatrix} = 6\ .$$

לכן הקבוצה לא אורתונורמלית. אבל הקבוצה הבאה

$$\left\{\frac{1}{\|A_1\|}A_1, \frac{1}{\|A_2\|}A_2, \frac{1}{\|A_3\|}A_3\right\} = \left\{\frac{1}{\sqrt{20}}A_1, \frac{1}{\sqrt{8}}A_2, \frac{1}{\sqrt{6}}A_3\right\}$$

כן קבוצה אורתונומלית.

קודם הגדרנו מושג של היטל אורתוגונלי של ווקטור על תת מרחב. ניסחנו משפט שטוען את הדבר הבא:

אם V מרחב מכפלה פנימית, $U \subseteq V$ תת מרחב נוצר סופית, אז לכל ווקטור $\mathrm{v} \in V$ קיים ווקטור יחיד $u_0 \in V$ כך ש-

$$(\mathrm{v} - u_0) \perp U\ .$$

לווקטור u_0 קוראים ההיטל של v על U, אבל לא הוכחנו את קיומו.

נוכיח בהתחלה את קיומו של היטל בתנאי שלתת מרחב U קיים בסיס אורתונורמלי.

הגדרה 2.4 הגדרת ההיטל האורתוגונלי

נניח ש V מרחב מכפלה פנימית ונניח ש $U \subseteq V$ תת מרחב נוצר סופית של V. נניח ש

$$\{u_1, \ldots, u_k\}$$

בסיס אורתוגונלי של U. אז לכל ווקטור $\mathrm{v} \in V$, ההיטל האורתוגונלי של v מסומן ב- $P_U(\mathrm{v})$ ומוגדר

$$P_U(\mathrm{v}) = \sum_{i=1}^{k} \frac{\langle \mathrm{v}, u_i\rangle}{\|u_i\|^2} u_i\ .$$

האופרטור P_U נקרא **אופרטור ההטלה האורתוגונלי על** U.

משפט 2.3 משפט ההיטל האורתוגונלי

נניח ש V מרחב מכפלה פנימית, ו- $U \subseteq V$ תת מרחב נוצר סופית של V. נסמן את ההיטל האורתוגונלי של כל ווקטור $\mathrm{v} \in V$ על U ב- $P_U(\mathrm{v})$. הווקטור

$$\mathrm{v} - P_U(\mathrm{v})$$

אורתוגונלי לכל ווקטור ב- U.

כלומר

$$\langle \mathrm{v} - P_U(\mathrm{v}), u \rangle = 0$$

לכל $\mathrm{v} \in V$ ולכל $u \in U$.
נסמן את האורתוגונליות של הווקטור $\mathrm{v} - P_U(\mathrm{v})$ ביחס לתת מרחב U כך:

$$(\mathrm{v} - P_U(\mathrm{v})) \perp U \ .$$

הוכחה: לפי הגדרת היטל אורתוגונלי, צריך להוכיח שווקטור

$$(\mathrm{v} - P_U(\mathrm{v})) \perp U \ .$$

נניח ש $\{u_1, \ldots, u_k\}$ בסיס אורתוגונלי של U. לכל $1 \leq j \leq k$,

$$\begin{aligned}
\langle \mathrm{v} - P_U(\mathrm{v}), u_j \rangle &= \left\langle \mathrm{v} - \sum_{i=1}^{k} \frac{\langle \mathrm{v}, u_i \rangle}{\|u_i\|^2} u_i, u_j \right\rangle \\
&= \langle \mathrm{v}, u_j \rangle - \left\langle \sum_{i=1}^{k} \frac{\langle \mathrm{v}, u_i \rangle}{\|u_i\|^2} u_i, u_j \right\rangle \\
&= \langle \mathrm{v}, u_j \rangle - \sum_{i=1}^{k} \frac{\langle \mathrm{v}, u_i \rangle}{\|u_i\|^2} \cdot \langle u_i, u_j \rangle \\
&= \langle \mathrm{v}, u_j \rangle - \sum_{i=1}^{k} \frac{\langle \mathrm{v}, u_i \rangle}{\|u_i\|^2} \langle u_i, u_j \rangle \delta_{ij} \\
&= \langle \mathrm{v}, u_j \rangle - \frac{\langle \mathrm{v}, u_j \rangle}{\|u_j\|^2} \langle u_j, u_j \rangle \\
&= \langle \mathrm{v}, u_j \rangle - \frac{\langle \mathrm{v}, u_j \rangle}{\|u_j\|^2} \cdot \|u_j\|^2 \\
&= \langle \mathrm{v}, u_j \rangle - \langle \mathrm{v}, u_j \rangle \\
&= 0 \ .
\end{aligned}$$

הוכחנו ש $(\mathrm{v} - P_U(\mathrm{v})) \perp U$.

■

2.2 אופרטור הטלה האורתוגונלי

משפט 2.4 תכונות של אופרטור הטלה האורתוגונלי

נניח ש- V מרחב מכפלה פנימית ו- $U \subset V$ תת-מרחב של V.
נסמן את המשלים האורתוגונלי של U ב- $U^\perp$.

אופרטור ההטלה האורתוגונלי P_U מקיים את התכונות הבאות:

1) P_U העתקה לינארית.

2) לכל $u \in U$ מתקיים $P_U(u) = u$, ולכל $w \in U^\perp$ מתקיים $P_U(w) = 0$.

3) $\mathrm{Im}(P_U) = U$ וגם $\mathrm{Ker}(P_U) = U^\perp$.

4) $V = U \oplus U^\perp$

5) $P_U \circ P_U = P_U$

6) לכל $\mathrm{v} \in V$ מתקיים כי
$$(\mathrm{v} - P_U(\mathrm{v})) \in U^\perp$$

הוכחה:

1) P_U העתקה לינארית.

לכל $\mathrm{v}_1, \mathrm{v}_2 \in V$

$$\begin{aligned} P_U(\mathrm{v}_1 + \mathrm{v}_2) &= \sum_{i=1}^{k} \frac{\langle \mathrm{v}_1 + \mathrm{v}_2, u_i \rangle}{\|u_i\|^2} u_i \\ &= \sum_{i=1}^{k} \frac{(\mathrm{v}_1, u_i) + (\mathrm{v}_2, u_i)}{\|u_i\|^2} u_i \\ &= \sum_{i=1}^{k} \frac{\langle \mathrm{v}_1, u_i \rangle}{\|u_i\|^2} u_i + \sum_{i=1}^{k} \frac{\langle \mathrm{v}_2, u_i \rangle}{\|u_i\|^2} u_i \\ &= P_U(\mathrm{v}_1) + P_U(\mathrm{v}_2) \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} P_U(\alpha \mathrm{v}) &= \sum_{i=1}^{k} \frac{\langle \alpha \mathrm{v}, u_i \rangle}{\|u_i\|^2} u_i \\ &= \sum_{i=1}^{k} \frac{\alpha \langle \mathrm{v}, u_i \rangle}{\|u_i\|^2} u_i \\ &= \alpha \sum_{i=1}^{k} \frac{\langle \mathrm{v}, u_i \rangle}{\|u_i\|^2} u_i \\ &= \alpha P_U(\mathrm{v}) \end{aligned}$$

לכן P_U אופרטור לינארי.

2) נניח ש- $\{u_1, \ldots, u_k\}$ בסיס של U. אז לכל $u \in U$ קיימים סקלרים $\alpha_1, \ldots, \alpha_k$ כך ש $u = \alpha_1 u_1 + \ldots + \alpha_k u_k$. אז

$$P_U(u) = \sum_{i=1}^{k} \alpha_i P_U(u_i)$$

לכל $1 \leq j \leq k$,

$$\begin{aligned} P_U(u_j) &= \sum_{i=1}^{k} \frac{\langle u_j, u_i \rangle}{\|u_i\|^2} u_i \\ &= \frac{\langle u_j, u_j \rangle}{\|u_j\|^2} u_j \\ &= u_j \ . \end{aligned}$$

לכן

$$P_U(u) = \sum_{i=1}^{k} \alpha_i u_i = u \ .$$

לכל $w \in U^\perp$ מתקיים $\langle w, u_i \rangle = 0$ לכל $1 \leq i \leq k$. לכן

$$P_U(w) = \sum_{i=1}^{k} \frac{\langle w, u_i \rangle}{\|u_i\|^2} u_i = 0$$

3) לכל $a \in U$, לפי תנאי 2 $a = P_U(a) \in \text{Im}\,(P_U)$, לכן $U \subseteq \text{Im}\,(P_U)$.

לפי ההגדרה של ההיטל אם $\{u_1, \ldots, u_k\}$ בסיס אורתוגונלי של U, אז לכל ווקטור $a \in V$,

$$P_U(a) = \sum_{i=1}^{k} \frac{\langle a, u_i \rangle}{\|u_i\|^2} u_i$$

לכן $P_U(a) \in \text{span}\{u_1, \ldots, u_k\}$ לכן $P_U(a) \in U$ לכל $a \in V$. לכן $\text{Im}\,(P_U) \subseteq U$.

לכן $\text{Im}(P_U) = U$.

בסעיף 2 הוכחנו כי $U^\perp \subseteq \ker(P_U)$.
נוכיח כי $\ker(P_U) \subseteq U^\perp$.

נניח ש $\text{v} \in \ker(P_U)$. ז"א

$$P_U(\text{v}) = \sum_{i=1}^{k} \frac{\langle \text{v}, u_i \rangle}{\|u_i\|^2} u_i = 0.$$

מכיוון ש- $\{u_1, \ldots, u_k\}$ בת"ל אז בהכרח $\langle \text{v}, u_i \rangle = 0$ לכל $1 \leq i \leq k$.
לכן $\text{v} \in U^\perp$.

4) לכן $\dim(V) = \dim(\ker P_U) + \dim(\text{Im} P_U)$

$$\dim(V) = \dim\left(U^\perp\right) + \dim\left(U\right)$$

מכאן נובע כי

$$U \cap U^\perp = \{0\} \ .$$

5) לכל $\text{v} \in V$,

$$P_U(\text{v}) = u \in U \ .$$

לכן

$$\left(P_U \circ P_U\right)(\text{v}) = P_U\left(P_U(\text{v})\right) = P_U(u) = u \ ,$$

כלומר

$$P_U \circ P_U = P_U \ .$$

6) הוכחנו במשפט 2.3 כי

$$(\text{v} - P_U(\text{v})) \perp U$$

לכן

$$\text{v} - P_U(\text{v}) \in U^\perp \ .$$

■

משפט 2.5 משפט הפיכות האורתוגונלי

נניח ש V מרחב מכפלה פנימית נוצר סופית ו- $U \subset V$ תת מרחב של V. אז

א) $V = U \oplus U^{\perp}$

ב) $\left(U^{\perp}\right)^{\perp} = U$

הוכחה:

א) $V = U \oplus U^{\perp}$ הוכחנו במשפט 2.4.

ב)

1) נוכיח כי $U \subseteq \left(U^{\perp}\right)^{\perp}$.

נקח $u \in U$.
צ"ל $u \in \left(U^{\perp}\right)^{\perp}$.

לכל $\mathrm{v} \in U^{\perp}$, $\langle u, \mathrm{v} \rangle = 0 \Rightarrow u \in \left(U^{\perp}\right)^{\perp}$.

2) צ"ל $\left(U^{\perp}\right)^{\perp} \subseteq U$.
נקח $\mathrm{v} \in \left(U^{\perp}\right)^{\perp}$. לפי סעיף א' קיימים $u \in U$, $w \in U^{\perp}$ כך ש

$$\mathrm{v} = u + w \ .$$

נשים לב כי $\langle u, w \rangle = 0$.

$$\begin{aligned} \langle \mathrm{v}, w \rangle &= \langle u + w, w \rangle \\ &= \langle u, w \rangle + \langle w, w \rangle \\ &= \langle w, w \rangle \end{aligned}$$

מכיוון ש $\mathrm{v} \in (U^{\perp})^{\perp}$ ו- $w \in U^{\perp}$, אז נקבל כי $\langle \mathrm{v}, w \rangle = 0$. לכן $\langle w, w \rangle = 0$ ולכן $w = 0$.
לכן $\mathrm{v} = u \in U$.
הוכחנו כי $(U^{\perp})^{\perp} = U$.

■

2.3 תהליך גרם שמידט

משפט 2.6 תהליך גרם שמידט

נניח ש V מרחב מכפלה פנימית ו- $U \subset V$ תת-מרחב של V. נניח שהקבוצה

$$\{\mathrm{v}_1, \mathrm{v}_2, \ldots, \mathrm{v}_k \ .\}$$

היא בסיס של U. נסמן בסיס אורתוגונלי של U כך:

$$\{u_1, u_2, \ldots, u_k\} \ .$$

ניתן למצוא את כל הווקטורים בבסיס האורתוגונלי, באמצעות התהליך גרם שמידט:

$$\begin{aligned}
u_1 =& \mathrm{v}_1 \\
u_2 =& \mathrm{v}_2 - \frac{\langle \mathrm{v}_2, u_1 \rangle}{\|u_1\|^2} \cdot u_1 \\
u_3 =& \mathrm{v}_3 - \frac{\langle \mathrm{v}_3, u_1 \rangle}{\|u_1\|^2} \cdot u_1 \ - \frac{\langle \mathrm{v}_3, u_2 \rangle}{\|u_2\|^2} \cdot u_2 \\
& \vdots \\
u_k =& \mathrm{v}_k - \sum_{i=1}^{k-1} \frac{\langle \mathrm{v}_k, u_i \rangle}{\|u_i\|^2} \cdot u_i \\
& \vdots
\end{aligned}$$

דוגמה 2.7

$V = \mathbb{R}^4$ עם מכפלה פנימית סטנדרטית.

$$U = \text{span} \left\{ \mathrm{v}_1 = \begin{pmatrix} -1 \\ 0 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}, \mathrm{v}_2 = \begin{pmatrix} 0 \\ -1 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}, \mathrm{v}_3 = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ -1 \\ 1 \end{pmatrix} \right\}$$

מצאו בסיס אורתוגונלי ל- U.

פתרון:

נגדיר $u_1 = \mathrm{v}_1$. $V_1 = \text{span}(u_1)$.

$$\mathrm{v}_2 - \frac{\langle \mathrm{v}_2, u_1 \rangle}{\|u_1\|^2} \cdot u_1 = \begin{pmatrix} 0 \\ -1 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix} - \frac{1}{2} \begin{pmatrix} -1 \\ 0 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix} = \frac{1}{2} \begin{pmatrix} 1 \\ -2 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix} \ .$$

אפשר לבחור $u_2 = \begin{pmatrix} 1 \\ -2 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}$.

$$V_2 = \text{span}\{u_1, u_2\} = \text{span} \left\{ \begin{pmatrix} -1 \\ 0 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 1 \\ -2 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix} \right\} \ .$$

$$\begin{aligned}\mathrm{v}_3 - P_{V_2}(\mathrm{v}_3) =& \mathrm{v}_3 - \frac{\langle \mathrm{v}_3, u_1\rangle}{\|u_1\|^2}\cdot u_1 - \frac{\langle \mathrm{v}_3, u_2\rangle}{\|u_2\|^2}\cdot u_2 \\ =& \begin{pmatrix}0\\0\\-1\\1\end{pmatrix} - \frac{1}{2}\begin{pmatrix}-1\\0\\0\\1\end{pmatrix} - \frac{1}{6}\begin{pmatrix}1\\-2\\0\\1\end{pmatrix} \\ =& \frac{1}{3}\begin{pmatrix}1\\1\\-3\\1\end{pmatrix}\end{aligned}$$

נגדיר $u_3 = \begin{pmatrix}1\\1\\-3\\1\end{pmatrix}$. בסיס אורתוגונלי:

$$\left\{\begin{pmatrix}-1\\0\\0\\1\end{pmatrix},\quad \begin{pmatrix}1\\-2\\0\\1\end{pmatrix},\quad \begin{pmatrix}1\\1\\-3\\1\end{pmatrix}\right\}$$

נבנה בסיס אורתונורמלי:

$$\left\{\frac{1}{\sqrt{2}}u_1 = \begin{pmatrix}-\frac{1}{\sqrt{2}}\\0\\0\\\frac{1}{\sqrt{2}}\end{pmatrix},\quad \frac{1}{\sqrt{6}}u_2 = \begin{pmatrix}\frac{1}{\sqrt{6}}\\\frac{-2}{\sqrt{6}}\\0\\\frac{1}{\sqrt{6}}\end{pmatrix},\quad \frac{1}{\sqrt{12}}u_3 = \begin{pmatrix}\frac{1}{\sqrt{12}}\\\frac{1}{\sqrt{12}}\\\frac{-3}{\sqrt{12}}\\\frac{1}{\sqrt{12}}\end{pmatrix}\right\}$$

דוגמה 2.8

במרחב $\mathbb{R}_2[x]$ עם מכפלה פנימית אינטגרלית בקטע $[0,1]$. נתון הבסיס סטנדרטית

$$\left\{e_1 = 1,\ e_2 = x,\ e_3 = x^2\right\}\ .$$

מצאו בסיס אורתוגונלי.

פתרון:

$V_1 = \mathrm{span}(1)$, $u_1 = e_1 = 1$.

$$u_2 = e_2 - \frac{\langle e_2, u_1\rangle}{\|u_1\|^2}u_1 = x - \frac{1}{2}$$

$$\langle e_2, u_1\rangle = \int_0^1 x\,dx = \frac{1}{2}\ , \qquad \|u_1\|^2 = \int_0^1 1^2 dx = 1\ .$$

$$V_2 = \mathrm{span}\left(1, x - \frac{1}{2}\right)\ .$$

$$u_3 = e_3 - \frac{\langle e_3, u_1\rangle}{\|u_1\|^2}u_1 - \frac{\langle e_3, u_2\rangle}{\|u_2\|^2}u_2$$

$$\langle e_3, u_1\rangle = \int_0^1 x^2\,dx = \frac{1}{3}\ , \qquad \langle e_3, u_2\rangle = \int_0^1 x^2\left(x-\frac{1}{2}\right)\,dx = \left[\frac{x^4}{4}-\frac{x^3}{6}\right]_0^1 = \frac{1}{12}\ .$$

$$\|u_2\|^2 = \int_0^1 \left(x-\frac{1}{2}\right)^2\,dx = \int_0^1 \left(x^2-x+\frac{1}{4}\right)\,dx = \left[\frac{x^3}{3}-\frac{x^2}{2}+\frac{x}{4}\right]_0^1 = \frac{1}{12}\ .$$

לכן

$$u_3 = x^2 - \frac{1}{3} - u_2 = x^2 - x + \frac{1}{6}\ .$$

בסיס אורתוגונלי:

$$u_1 = 1\ , \qquad u_2 = x-\frac{1}{2}\ , \qquad u_3 = x^2-x+\frac{1}{6}\ .$$

נמצא בסיס אורתונורמלי:

$$\|u_1\|^2 = 1\ , \qquad \|u_2\|^2 = \frac{1}{12}\ ,$$

$$\begin{aligned}\|u_3\|^2 &= \int_0^1 \left(x^2-x+\frac{1}{6}\right)^2\,dx\\ &= \int_0^1 \left(x^4-2x^3+\frac{4}{3}x^2-\frac{1}{3}x+\frac{1}{36}\right)\,dx\\ &= \left[\frac{x^5}{5}-\frac{x^4}{2}+\frac{4}{9}x^3-\frac{1}{6}x^2+\frac{1}{36}x\right]_0^1\\ &= \frac{1}{180}\ .\end{aligned}$$

בסיס אורתונורמלי:

$$\left\{u_1,\ \sqrt{12}\,u_2,\ \sqrt{180}u_3\right\}\ .$$

דוגמה 2.9

מצאו בסיס אורתונורמלי למרחב $U=\operatorname{span}(1,x,x^2)$ ביחס למכפלה פנימית אינטגרלית בקטע $[-1,1]$.

פתרון:

נסמן $\mathrm{v}_1 = 1, \mathrm{v}_2 = x, \mathrm{v}_3 = x^2$.

$$u_1 = 1\ , \qquad u_2 = \mathrm{v}_2 - \frac{\langle \mathrm{v}_2, u_1\rangle}{\|u_1\|^2}u_1$$

$$\langle \mathrm{v}_2, u_1\rangle = \int_{-1}^1 x\,dx = \left[\frac{x^2}{2}\right]_{-1}^1 = 0\ .$$

לכן

$$u_2 = x\ .$$

$$u_3 = \mathrm{v}_3 - \frac{\langle \mathrm{v}_3, u_1\rangle}{\|u_1\|^2}u_1 - \frac{\langle \mathrm{v}_3, u_2\rangle}{\|u_2\|^2}u_2\ .$$

$$\|u_1\|^2 = \int_{-1}^1 1\,dx = [x]_{-1}^1 = 2\ .$$

$$\langle \mathrm{v}_3, u_1 \rangle = \int_{-1}^{1} x^2 dx = \left[\frac{x^3}{3} \right]_{-1}^{1} = \frac{2}{3} \ .$$

$$\langle \mathrm{v}_3, u_2 \rangle = 0 \ .$$

$$\|u_2\|^2 = \int_{-1}^{1} x^2 \, dx = \left[\frac{x^3}{3} \right]_{-1}^{1} = \frac{2}{3} \ .$$

לכן

$$u_3 = x^2 - \frac{1}{3} \ .$$

בסיס אורתוגונלי:

$$u_1 = 1 \ , \qquad u_2 = x \ , \qquad u_3 = x^2 - \frac{1}{3} \ .$$

נחפש בסיס אורתונורמלי:

$$\|u_1\|^2 = 2 \ , \qquad \|u_2\|^2 = \int_{-1}^{1} x^2 \, dx = \left[\frac{x^3}{3} \right]_{-1}^{1} = \frac{2}{3} \ .$$

$$\begin{aligned} \|u_3\|^2 &= \int_{-1}^{1} \left(x^2 - \frac{1}{3} \right)^2 dx \\ &= \int_{-1}^{1} \left(x^4 - \frac{2}{3} x^2 + \frac{1}{9} \right) dx \\ &= \left[\frac{x^5}{5} - \frac{2}{9} x^3 + \frac{1}{9} x \right]_{-1}^{1} \\ &= \frac{8}{45} \ . \end{aligned}$$

בסיס אורתונורמלי:

$$\left\{ \frac{1}{\sqrt{2}} \ , \quad \sqrt{\frac{3}{2}} x \ , \quad \sqrt{\frac{45}{8}} \left(x^2 - \frac{1}{3} \right) \right\} \ .$$

דוגמה 2.10

מצאו בסיס אורתונורמלי למרחב $U = \operatorname{span} \left\{ \mathrm{v}_1 = \begin{pmatrix} 2 \\ 2i \\ 2 \end{pmatrix}, \mathrm{v}_2 = \begin{pmatrix} 2+2i \\ 0 \\ 4 \end{pmatrix} \right\}$ ביחס למכפלה הפנימית הסטנדרטית ב- $\mathbb{C}^3$.

פתרון:

$$u_1 = \mathrm{v}_1 = \begin{pmatrix} 2 \\ 2i \\ 2 \end{pmatrix} \ .$$

$$u_2 = \mathrm{v}_2 - \frac{\langle \mathrm{v}_2, u_1 \rangle}{\|u_1\|^2} u_1$$

$$\langle \mathrm{v}_2, u_1 \rangle = (2+2i) \cdot 2 + 0 + 8 = 12 + 4i$$

$$\|u_1\|^2 = 12 \ .$$

$$\|u_2\|^2 = \frac{16}{9} + \frac{4}{9} + 4 + 4 + \frac{4}{9} = \frac{32}{3} \ .$$

לכן

$$u_2 = \begin{pmatrix} 2+2i \\ 0 \\ 4 \end{pmatrix} - \left(1 + \frac{1}{3}i\right) \begin{pmatrix} 2 \\ 2i \\ 2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \frac{4i}{3} \\ \frac{2}{3} - 2i \\ 2 - \frac{2}{3}i \end{pmatrix}$$

בסיס אורתונורמלי:

$$\frac{1}{\sqrt{12}} u_1 \ , \qquad \sqrt{\frac{3}{32}} u_2 \ .$$

2.4 *העשרה: משמעות גיאומטרית של ההיטל

יהי U ישר במישור, ותהי v נקודה כלשהי במישור שאינה על U. בגיאומטריה מוכיחים כי אפשר להוריד אנך מ- v על U, ואורך אנך זה הוא המרחק הקצר ביותר בין הנקודה v לנקודה כלשהי בישר. מרחק זה נקרא גם המרחק בין v ל- U. קיים טענה דומה גם במרחב מכפלה פנימית.

נגדיר כעת אנך מוקטור v לתת-מרחב U. צריך למצוא וקטור $u_0 \in U$ המקיים $(\mathrm{v} - u_0) \perp U$.



יהי V מרחב מכפלה פנימית ויהי $U \subset V$ תת-מרחב נוצר סופית של V. יהי $\mathrm{v} \in V$ שאינו שייך ל- U, כלומר $\mathrm{v} \notin U$.

א) נגדיר את ההיטל האורתוגונלי של וקטור v על תת מרחב U ע"י התנאי הבא:

$$(\mathrm{v} - u_0) \perp U \ .$$

ב) המרחק בין v ל U מוגדר להיות $d(\mathrm{v}, u_0)$, כלומר המרחק בין v להיטל של v על U.

2.5 * העשרה: משפט קיום בסיס אורתוגונלי

הגדרה 2.5 קיום בסיס אורתוגונלי

לכל מרחב מכפלה פנימית V ממימד סופי קיים בסיס אורתוגונלי.

הוכחה: נניח

$$\{\mathrm{v}_1, \ldots, \mathrm{v}_n\}$$

בסיס של V. נגדיר סדרת מרחבים ווקטורים

$$V_1 = \mathrm{span}\,(\mathrm{v}_1) \subset V_2 = \mathrm{span}\,(\mathrm{v}_1, \mathrm{v}_2) \subset \ldots \subset V_n = \mathrm{span}\,(\mathrm{v}_1, \mathrm{v}_2, \ldots, \mathrm{v}_n) = V$$

לכל $1 \leq i \leq n$.
נגדיר

$$u_i = \mathrm{v}_i - P_{V_{i-1}}(\mathrm{v}_i)\ .$$

נוכיח באינדוקציה כי $u_1, u_2, \ldots, u_n$ בסיס אורתוגונלי.
עבור $i = 1$ הקבוצה $\{u_1\}$ בסיס אורתוגונלי של V_1.
נניח שעבור i, קבוצת הווקטורים $\{u_1, \ldots, u_i\}$ אורתוגונלית.
נוכיח כי $u_{i+1} \perp u_j$ לכל $1 \leq j \leq i$, כאשר $u_{i+1} = \mathrm{v}_{i+1} - P_{V_i}(\mathrm{v}_{i+1})$.
הוכחנו במשפט 2.3 כי

$$(\mathrm{v}_{i+1} - P_{V_i}(\mathrm{v}_{i+1})) \perp V_i\ .$$

■