

חדו"א 1  
סמסטר א' תשפד  
עבודת בית 9

**שאלה 1**

**(א)** מהי הפונקציה הקדומה ל-  $f(x)$ ? תן את ההגדרה ואת הדוגמאות המתאימות.

**(ב)** בדקו שהפונקציה  $F(x)$  הנתונה היא קדומה ל-  $f(x)$ :  
(1)

$$f(x) = \frac{3}{9+x^2}, F(x) = \arctan\left(\frac{x}{3}\right) \quad (2)$$

$$f(x) = \frac{2}{x^2-1}, F(x) = \ln\left(\frac{x-1}{x+1}\right)$$

**(ג)** רשום פונקציה קדומה לפונקציה הנתונה:  
(1)

$$f(x) = e^{3x} \quad (2)$$

$$f(x) = \cos(5x + 6) \quad (3)$$

$$m \neq 0, f(x) = (mx + n)^{1/3} \quad (4)$$

$$(n \neq -1, a \neq 0) f(x) = (ax + b)^n$$

**שאלה 2** חשב את האינטגרלים הבאים:

$$\int \frac{(x+2)^2}{\sqrt[3]{x}} dx \quad (א)$$

$$\int e^{-3x+2} dx \quad (ב)$$

$$\int \frac{3^{2x} + 5^{x+1}}{4^x} dx \quad (ג)$$

$$\int \frac{x}{x+1} dx \quad (\text{ד})$$

$$\int \sin^2 x dx \quad (\text{ה})$$

$$\int \frac{1}{x^2 + 2x + 3} dx \quad (\text{ו})$$

$$\int \frac{1}{\sqrt{2x^2 - 12x}} dx \quad (\text{ז})$$

$$\int \frac{1}{\sqrt{12x - 2x^2}} dx \quad (\text{ח})$$

$$\int \sqrt[3]{2 - 5x} dx \quad (\text{ט})$$

$$\int \frac{x-1}{\sqrt{x}+1} dx \quad (\text{י})$$

$$\int (\sin x + \cos x)^2 dx \quad (\text{יא})$$

$$\int \sin(3x) \cos(5x) dx \quad (\text{יב})$$

$$\int \cot^2(x) dx \quad (\text{יג})$$

$$\int \frac{(2x+1)}{x^2+x+1} dx \quad (\text{יד})$$

**שאלה 3** חשב את האינטגרלים הבאים:

$$\int \ln x dx \quad (\text{א})$$

$$\int 2x \ln x dx \quad (\text{ב})$$

$$\int x^2 \sin(2x) dx \quad (\text{ג})$$

$$\int x^2 \arctan(x) dx \quad (\text{ד})$$

$$\int 9x^2 e^{3x} dx \quad (\text{ה})$$

**שאלה 4** חשב את האינטגרלים הבאים:

$$(א) \int \frac{(x+1)}{x(x-3)} dx$$

$$(ב) \int \frac{2x^2 + x + 3}{(x+2)(x^2 + x + 1)} dx$$

$$(ג) \int \frac{5x^3 - 17x^2 + 18x - 5}{(x-1)^3(x-2)} dx$$

$$(ד) \int \frac{x^2}{x^2 - 4x + 3} dx$$

$$(ה) \int \frac{x^3 + x^2}{x^2 - 6x + 5} dx$$

$$(ו) \int \frac{3x^3 + x^2 + 5x + 1}{x^3 + x} dx$$

**שאלה 5** חשב את האינטגרלים הבאים:

$$(א) \int \frac{1}{3 + \sin x} dx$$

$$(ב) \int \frac{1}{1 + 5 \cos x} dx$$

$$(ג) \int \frac{1}{\sin x + 2 \cos x + 6} dx$$

**שאלה 6** בצעו את ההצבה המביאה את חישוב האינטגרל לאינטגרציה של שבר אלגברי וחשבו את האינטגרל:

$$(א) \int \frac{\sqrt{x}}{1+x} dx$$

$$(ב) \int \frac{\sqrt{x+2}}{x} dx$$

$$(ג) \int \frac{1 + e^x}{(1 - e^{2x})e^x} dx$$

**שאלה 7** חשב את האינטגרלים הבאים:

$$(א) \int \sin^4 x \cos^5 x dx$$

$$\int \sin^2 x \cos^2 x \, dx \quad \text{(ב)}$$

$$\int \cos^6 x \, dx \quad \text{(ג)}$$

$$\int \sin^2 x \cos^4 x \, dx \quad \text{(ד)}$$

## תשובות

### שאלה 1

(א) הגדרה:  $F(x)$  פונקציה קדומה של פונקציה  $f(x)$  אם  $F'(x) = f(x)$ .  
דוגמאות:

$$F(x) = x^2 \Leftrightarrow (x^2)' = 2x \quad f(x) = 2x \text{ פונקציה קדומה ל-}$$

$$F(x) = a^x \Leftrightarrow (a^x)' = a^x \ln a \quad f(x) = a^x \ln a \text{ פונקציה קדומה ל-}$$

(ב)

$$f(x) = e^{3x} \quad (1) \quad (ג)$$

$$F(x) = \frac{1}{3}e^{3x}$$

$$f(x) = \cos(5x + 6) \quad (2)$$

$$F(x) = \frac{1}{5} \sin(5x + 6)$$

$$m \neq 0, f(x) = (mx + n)^{1/3} \quad (3)$$

$$F(x) = \frac{3}{4} \cdot \frac{1}{m} \cdot (mx + n)^{4/3}$$

$$(n \neq -1, a \neq 0) f(x) = (ax + b)^n \quad (4)$$

$$F(x) = \frac{1}{a} \cdot \frac{(ax + b)^{n+1}}{n+1}$$

■

### שאלה 2

(א)

$$\int \frac{(x+2)^2}{\sqrt[3]{x}} dx = \int \frac{x^2 + 4x + 4}{\sqrt[3]{x}} dx$$

$$= \int (x^{5/3} + 4x^{2/3} + 4x^{-1/3}) dx$$

$$= \frac{3}{8}x^{8/3} + \frac{12}{5}x^{5/3} + 6x^{2/3} + C$$

(ב)

$$\int e^{-3x+2} dx = -\frac{1}{3}e^{-3x+2} + C$$

(ג)

$$\int \frac{3^{2x} + 5^{x+1}}{4^x} dx = \int \left( \left( \frac{9}{4} \right)^x + 5 \cdot \left( \frac{5}{4} \right)^x \right) dx$$

$$= \frac{\left( \frac{9}{4} \right)^x}{\ln \left( \frac{9}{4} \right)} + 5 \cdot \frac{\left( \frac{5}{4} \right)^x}{\ln \left( \frac{5}{4} \right)} + C$$

(ד)

$$\begin{aligned}\int \frac{x}{x+1} dx &= \int \frac{x+1-1}{x+1} dx \\ &= x - \ln|x+1| + C\end{aligned}$$

(ה)

$$\begin{aligned}\int \sin^2 x dx &= \int \frac{(1 - \cos(2x))}{2} dx \\ &= \frac{1}{2} \left( x - \frac{1}{2} \sin(2x) \right) + C\end{aligned}$$

(ו)

$$\begin{aligned}\int \frac{1}{x^2 + 2x + 3} dx &= \int \frac{1}{(x+1)^2 + 2} dx \\ &= \int \frac{1}{t^2 + 2} dt \\ &= \frac{1}{\sqrt{2}} \arctan \left( \frac{t}{\sqrt{2}} \right) + C \\ &= \frac{1}{\sqrt{2}} \arctan \left( \frac{x+1}{\sqrt{2}} \right) + C\end{aligned}$$

(ז)

$$\begin{aligned}\int \frac{1}{\sqrt{2x^2 - 12x}} dx &= \frac{1}{\sqrt{2}} \int \frac{1}{\sqrt{x^2 - 6x}} dx \\ &= \frac{1}{\sqrt{2}} \int \frac{1}{\sqrt{(x-3)^2 - 9}} dx\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}t &= x - 3 \\ t' &= 1\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}&= \frac{1}{\sqrt{2}} \int \frac{1}{\sqrt{t^2 - 9}} dt \\ &\stackrel{\text{נוסחה 11 בדף הנוסחאות}}{=} \frac{1}{\sqrt{2}} \ln |t + \sqrt{t^2 - 9}| + C \\ &= \frac{1}{\sqrt{2}} \ln |x - 3 + \sqrt{x^2 - 6x}| + C\end{aligned}$$

(ח)

$$\begin{aligned}\int \frac{1}{\sqrt{12x - 2x^2}} dx &= \int \frac{1}{\sqrt{2}} \frac{1}{\sqrt{6x - x^2}} dx \\ &= \int \frac{1}{\sqrt{2}} \frac{1}{\sqrt{-(x^2 - 6x)}} dx \\ &= \int \frac{1}{\sqrt{2}} \frac{1}{\sqrt{-((x-3)^2 - 9)}} dx \\ &= \int \frac{1}{\sqrt{2}} \frac{1}{\sqrt{9 - (x-3)^2}} dx\end{aligned}$$

$$\begin{aligned} t &= x - 3 \\ t' &= 1 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} &= \int \frac{1}{\sqrt{2}} \frac{1}{\sqrt{9-t^2}} dt \\ &\stackrel{\text{נוסחה 10 בדרך הנוסחאות}}{=} \frac{1}{\sqrt{2}} \arcsin\left(\frac{t}{3}\right) + C \\ &= \frac{1}{\sqrt{2}} \arcsin\left(\frac{x-3}{3}\right) + C \end{aligned}$$

(ט)

$$\int \sqrt[3]{2-5x} \, dx$$

$$\begin{aligned} t &= 2 - 5x \\ t' &= -5 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} -\frac{1}{5} \int t^{1/3} \, dx &= -\frac{1}{5} \frac{t^{4/3}}{\frac{4}{3}} + C \\ &= -\frac{3}{20} (2-5x)^{4/3} + C \end{aligned}$$

(י)

$$\int \frac{x-1}{\sqrt{x}+1} \, dx$$

$$\begin{aligned} t &= \sqrt{x} \\ t' &= \frac{1}{2\sqrt{x}} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \int \frac{t^2-1}{t+1} \cdot 2t \cdot dt &= 2 \left( \frac{t^3}{3} - \frac{t^2}{2} \right) + C \\ &= 2 \left( \frac{x^{3/2}}{3} - \frac{x}{2} \right) + C \end{aligned}$$

(יא)

$$\begin{aligned} \int (\sin x + \cos x)^2 \, dx &= \int (\sin^2 x + \cos^2 x + 2 \sin x \cos x) \, dx \\ &= \int (1 + 2 \sin x \cos x) \, dx \\ &= \int (1 + \sin(2x)) \, dx \\ &= x - \frac{1}{2} \cos(2x) + C . \end{aligned}$$

(יב)

$$\begin{aligned} \int \sin(3x) \cos(5x) \, dx &= \int \frac{\sin(8x) - \sin(2x)}{2} \\ &= \frac{1}{2} \left( -\frac{1}{8} \cos(8x) + \frac{1}{2} \cos(2x) \right) + C \end{aligned}$$

(ג)

$$\begin{aligned}\int \cot^2(x) dx &= \int \left( \frac{1}{\sin^2(x)} - 1 \right) dx \\ &= -\cot(x) - x + C\end{aligned}$$

(ד)

$$\int \frac{(2x+1)}{x^2+x+1} dx$$

$$\begin{aligned}t &= x^2 + x + 1 \\ t' &= 2x + 1\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}\int \frac{t'}{t} dx &= \int \frac{1}{t} dt \\ &= \ln |t| + C \\ &= \ln |x^2 + x + 1| + C.\end{aligned}$$

■

### שאלה 3

$$\begin{aligned}\int \ln x dx & \quad (\text{א}) \\ u &= \ln x \\ v' &= 1 \\ u' &= \frac{1}{x} \\ v &= x\end{aligned}$$

$$\int \ln x dx = x \ln x - \int 1 dx = x \ln x - x + C$$

■

$$\int 2x \ln x dx \quad (\text{ב})$$

הנוסחה של אינטגרציה בחלקים:

$$\int u \cdot v' dx = u \cdot v - \int u' \cdot v dx$$

עבור  $u$  ו  $v'$  נבחר:

$$u = \ln x, \quad v' = 2x, \quad u' = \frac{1}{x}, \quad v = x^2$$

כך ש

$$\int u \cdot v' dx = u \cdot v - \int u' \cdot v dx,$$

$$\int 2x \ln x dx = x^2 \ln x - \int x dx = x^2 \ln x - \frac{x^2}{2} + C$$

■



$$\int x^2 \sin(2x) dx \quad (ג)$$

$$u = x^2$$

$$v' = \sin(2x)$$

$$u' = 2x$$

$$v = -\frac{1}{2} \cos(2x)$$

$$\begin{aligned} \int x^2 \sin(2x) dx &= x^2 \left( -\frac{1}{2} \cos(2x) \right) - \int \left( -\frac{1}{2} \cos(2x) \right) \cdot 2x dx \\ &= -\frac{x^2}{2} \cos(2x) + \int x \cos(2x) dx \end{aligned}$$

$$u = x$$

$$v' = \cos(2x)$$

$$u' = 1$$

$$v = \frac{1}{2} \sin(2x)$$

$$\begin{aligned} &= -\frac{x^2}{2} \cos(2x) + \frac{1}{2} x \sin(2x) - \frac{1}{2} \int \sin(2x) dx \\ &= -\frac{x^2}{2} \cos(2x) + \frac{1}{2} x \sin(2x) + \frac{1}{4} \cos(2x) + C . \end{aligned}$$

■

$$\int x^2 \arctan(x) dx \quad (ד)$$

$$u = \arctan(x)$$

$$v' = x^2$$

$$u' = \frac{1}{1+x^2}$$

$$v = \frac{x^3}{3}$$

$$\begin{aligned} \int x^2 \arctan(x) &= \frac{x^3}{3} \arctan(x) - \frac{1}{3} \int \frac{x^3}{x^2+1} dx \\ &= \frac{x^3}{3} \arctan(x) - \frac{1}{3} \int \left( x - \frac{x}{x^2+1} \right) dx \\ &= \frac{x^3}{3} \arctan(x) - \frac{1}{3} \int x dx + \frac{1}{3} \cdot \frac{1}{2} \int \frac{2x}{x^2+1} dx \\ &= \frac{x^3}{3} \arctan(x) - \frac{x^2}{6} + \frac{1}{6} \ln|x^2+1| + C . \end{aligned}$$

■

$$\int 9x^2 e^{3x} dx \quad (ה)$$

$$u = 9x^2$$

$$v' = e^{3x}$$

$$u' = 18x$$

$$v = \frac{e^{3x}}{3}$$

$$\int 9x^2 e^{3x} dx = 3x^2 e^{3x} - \int 6x e^{3x} dx$$

$$\begin{aligned} u &= 6x \\ v' &= e^{3x} \\ u' &= 6 \\ v &= \frac{e^{3x}}{3} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \int 9x^2 e^{3x} dx &= 3x^2 e^{3x} - 2x e^{3x} + \int 2e^{3x} dx \\ &= 3x^2 e^{3x} - 2x e^{3x} + \frac{2}{3} e^{3x} + C . \end{aligned}$$

■

שאלה 4

$$\int \frac{(x+1)}{x(x-3)} dx \quad (\aleph)$$

$$\frac{(x+1)}{x(x-3)} = \frac{A}{x} + \frac{B}{x-3} , \quad A(x-3) + Bx = x+1$$

$$B = \frac{4}{3} , A = \frac{-1}{3}$$

$$\int \left( -\frac{1}{3x} + \frac{4}{3(x-3)} \right) dx = -\frac{1}{3} \ln|x| + \frac{4}{3} \ln|x-3| + C$$

■

$$\int \frac{2x^2 + x + 3}{(x+2)(x^2 + x + 1)} dx \quad (\beth)$$

$$\frac{2x^2 + x + 3}{(x+2)(x^2 + x + 1)} = \frac{A}{x+2} + \frac{Bx+C}{x^2 + x + 1} , \quad A(x^2 + x + 1) + (Bx+C)(x+2) = 2x^2 + x + 3$$

$$x^2 : , A + B = 2 , \quad x : A + 2B + C = 1 , \quad x^0 : A + 2C = 3$$

$$\begin{aligned} B &= -1 , A = 3 \\ C &= 0 \end{aligned}$$

$$\int \left( \frac{3}{x+2} - \frac{x}{x^2 + x + 1} \right) dx = 3 \ln|x+2| - \int \frac{x}{\left(x + \frac{1}{2}\right)^2 + \frac{3}{4}} dx$$

$$\begin{aligned} t &= x + \frac{1}{2} \\ t' &= 1 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
&= 3 \ln |x+2| - \int \frac{t - \frac{1}{2}}{t^2 + \frac{3}{4}} dx \\
&= 3 \ln |x+2| - \frac{1}{2} \int \frac{2t}{t^2 + \frac{3}{4}} dt + \frac{1}{2} \int \frac{1}{t^2 + \frac{3}{4}} dt \\
&= 3 \ln |x+2| - \frac{1}{2} \ln |t^2 + \frac{3}{4}| + \frac{1}{2} \frac{2}{\sqrt{3}} \arctan \left( \frac{2}{\sqrt{3}} t \right) + C \\
&= 3 \ln |x+2| - \frac{1}{2} \ln |x^2 + x + 1| + \frac{1}{2} \frac{2}{\sqrt{3}} \arctan \left( \frac{2x+1}{\sqrt{3}} \right) + C
\end{aligned}$$

■

$$\begin{aligned}
&\int \frac{5x^3 - 17x^2 + 18x - 5}{(x-1)^3(x-2)} dx \quad (א) \\
&\frac{5x^3 - 17x^2 + 18x - 5}{(x-1)^3(x-2)} = \frac{A}{(x-1)^3} + \frac{B}{(x-1)^2} + \frac{C}{x-1} + \frac{D}{x-2} \\
&A(x-2) + B(x-1)(x-2) + C(x-1)^2(x-2) + D(x-1)^3 = 5x^3 - 17x^2 + 18x - 5 \\
&A = -1 \\
&B = 0 \\
&C = 2
\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
&= \int \frac{-1}{(x-1)^3} dx + 2 \int \frac{1}{x-1} dx + 3 \int \frac{1}{x-2} dx \\
&= \frac{1}{2(x-1)^2} + 2 \ln |x-1| + 3 \ln |x-2| + C
\end{aligned}$$

■

(ב)

$$\begin{aligned}
&\int \frac{x^2}{x^2 - 4x + 3} dx = \int \left( 1 + \frac{4x-3}{x^2 - 4x + 3} \right) dx = x + \int \frac{4x-3}{x^2 - 4x + 3} dx = x + \int \frac{4x-3}{(x-1)(x-3)} dx \\
&\frac{4x-3}{(x-1)(x-3)} = \frac{A}{x-1} + \frac{B}{x-3}, \quad A(x-3) + B(x-1) = 4x-3. \\
&A = -\frac{1}{2} \\
&B = \frac{9}{2}
\end{aligned}$$

$$x + \int \left( -\frac{1}{2(x-1)} + \frac{9}{2(x-3)} \right) dx = x - \frac{1}{2} \ln |x-1| + \frac{9}{2} \ln |x-3| + C$$

■

$$\int \frac{x^3 + x^2}{x^2 - 6x + 5} dx \quad (ג)$$

$$x^2 - 6x + 5 \Big) x^3 + x^2$$

$$\begin{array}{r} x \\ x^2 - 6x + 5 \Big) x^3 + x^2 \\ \underline{x^3 - 6x^2 + 5x} \phantom{0} \\ 7x^2 - 5x \phantom{0} \end{array}$$

$$\begin{array}{r} x + 7 \\ x^2 - 6x + 5 \Big) x^3 + x^2 \\ \underline{x^3 - 6x^2 + 5x} \phantom{0} \\ 7x^2 - 5x \phantom{0} \\ \underline{7x^2 - 42x + 35} \phantom{0} \\ 37x - 35 \phantom{0} \end{array}$$

$$\frac{x^3 + x^2}{x^2 - 6x + 5} = x + 7 + \frac{37x - 35}{x^2 - 6x + 5} = x + 7 + \frac{37x - 35}{(x - 5)(x - 1)}$$

$$\frac{37x - 35}{(x - 5)(x - 1)} = \frac{A}{x - 5} + \frac{B}{x - 1} = \frac{A(x - 1) + B(x - 5)}{(x - 5)(x - 1)}$$

$$A(x - 1) + B(x - 5) = 37x - 35$$

נציב  $x = 1$ :

$$-4B = 2 \quad \Rightarrow \quad B = -\frac{1}{2}.$$

נציב  $x = 5$ :

$$4A = 150 \quad \Rightarrow \quad A = \frac{75}{2}.$$

לכן

$$\frac{37x - 35}{(x - 5)(x - 1)} = \frac{75}{2(x - 5)} - \frac{1}{2(x - 1)}$$

ובסה"כ

$$\frac{x^3 + x^2}{x^2 - 6x + 5} = x + 7 + \frac{75}{2(x - 5)} - \frac{1}{2(x - 1)}.$$

לכן

$$\int \frac{x^3 + x^2}{x^2 - 6x + 5} dx = \int \left( x + 7 + \frac{75}{2(x - 5)} - \frac{1}{2(x - 1)} \right) dx = \frac{x^2}{2} + 7x + \frac{75}{2} \ln |x - 5| - \frac{1}{2} \ln |x - 1|.$$

■

$$\int \frac{3x^3 + x^2 + 5x + 1}{x^3 + x} dx \quad \text{¶}$$

$$x^3 + x \Big) 3x^3 + x^2 + 5x + 1$$

$$\begin{array}{r} 3 \\ x^3 + x \overline{) 3x^3 + x^2 + 5x + 1} \\ \underline{3x^3 + \phantom{x^2} + 3x} \phantom{+ 1} \\ x^2 + 2x + 1 \end{array}$$

$$\frac{3x^3 + x^2 + 5x + 1}{x^3 + x} = 3 + \frac{x^2 + 2x + 1}{x^3 + x}$$

$$\frac{x^2 + 2x + 1}{x^3 + x} = \frac{x^2 + 2x + 1}{x(x^2 + 1)} = \frac{A}{x} + \frac{Bx + C}{x^2 + 1} = \frac{A(x^2 + 1) + (Bx + C)x}{x(x^2 + 1)}$$

$$A(x^2 + 1) + (Bx + C)x = x^2 + 2x + 1$$

$x^2$ :	$A + B = 1$
$x$ :	$C = 2$
$x^0$ :	$A = 1$

לכן  $A = 1, B = 0, C = 2$  ונקבל

$$\frac{x^2 + 2x + 1}{x^3 + x} = \frac{1}{x} + \frac{2}{x^2 + 1}$$

ובסה"כ

$$\frac{3x^3 + x^2 + 5x + 1}{x^3 + x} = 3 + \frac{1}{x} + \frac{2}{x^2 + 1}$$

לכן

$$\int \frac{3x^3 + x^2 + 5x + 1}{x^3 + x} dx = \int \left( 3 + \frac{1}{x} + \frac{2}{x^2 + 1} \right) dx = 3x + \ln|x| + 2 \arctan(x) + C$$

■

## שאלה 5

$$\int \frac{1}{3 + \sin x} dx \quad (\text{א})$$

$$t = \tan\left(\frac{x}{2}\right)$$

$$t' = \frac{1}{2} \cdot \frac{1}{\cos^2\left(\frac{x}{2}\right)} = \frac{1}{2} \left( 1 + \tan^2\left(\frac{x}{2}\right) \right) = \frac{1}{2} (1 + t^2)$$

$$\sin x = \frac{2t}{1 + t^2} \quad (\text{זהות})$$

$$\begin{aligned}\int \frac{1}{3 + \sin x} dx &= \int \frac{1}{3 + \frac{2t}{1+t^2}} \cdot \frac{2}{1+t^2} t' dx \\ &= \int \frac{2}{3(1+t^2) + 2t} dt \\ &= \int \frac{2}{3 + 3t^2 + 2t} dt \\ &= \frac{2}{3} \cdot \int \frac{1}{t^2 + \frac{2}{3}t + 1} dt \\ &= \frac{2}{3} \cdot \int \frac{1}{\left(t + \frac{1}{3}\right)^2 + \frac{8}{9}} dt .\end{aligned}$$

$$z = t + \frac{1}{3}$$

$$z'_t = 1$$

$$\begin{aligned}\frac{2}{3} \cdot \int \frac{1}{\left(t + \frac{1}{3}\right)^2 + \frac{8}{9}} dt &= \frac{2}{3} \cdot \int \frac{1}{z^2 + \frac{8}{9}} dz \\ &= \frac{2}{3} \cdot \frac{3}{\sqrt{8}} \arctan \left( \frac{3}{\sqrt{8}} z \right) + C \\ &= \frac{2}{3} \cdot \frac{3}{\sqrt{8}} \arctan \left( \frac{3 \left(t + \frac{1}{3}\right)}{\sqrt{8}} \right) + C \\ &= \frac{2}{3} \cdot \frac{3}{\sqrt{8}} \arctan \left( \frac{3 \left(\tan \frac{x}{2} + \frac{1}{3}\right)}{\sqrt{8}} \right) + C .\end{aligned}$$

■

$$\int \frac{1}{1 + 5 \cos x} dx \quad \textbf{(ב)}$$

$$t = \tan \left( \frac{x}{2} \right)$$

$$t' = \frac{1}{2} \cdot \frac{1}{\cos^2 \left( \frac{x}{2} \right)} = \frac{1}{2} \left( 1 + \tan^2 \left( \frac{x}{2} \right) \right) = \frac{1}{2} (1 + t^2)$$

$$\text{(זהות)} \quad \cos x = \frac{1 - t^2}{1 + t^2}$$

$$\begin{aligned}\int \frac{1}{1+5\cos x} dx &= \int \frac{1}{1+5\left(\frac{1-t^2}{1+t^2}\right)} \cdot \left(\frac{2}{1+t^2}\right) \cdot t' dx \\ &= \int \frac{2}{1+t^2+5(1-t^2)} dt \\ &= \int \frac{2}{6-4t^2} dt \\ &= \frac{-1}{2} \int \frac{1}{t^2 - \frac{3}{2}} dt .\end{aligned}$$

$$\frac{1}{t^2 - \frac{3}{2}} = \frac{1}{\left(t + \sqrt{\frac{3}{2}}\right)\left(t - \sqrt{\frac{3}{2}}\right)} = \frac{A}{t + \sqrt{\frac{3}{2}}} + \frac{B}{t - \sqrt{\frac{3}{2}}}$$

$$A\left(t - \sqrt{\frac{3}{2}}\right) + B\left(t + \sqrt{\frac{3}{2}}\right) = 1$$

$$A = \frac{1}{\sqrt{6}} , \quad B = -\frac{1}{\sqrt{6}}$$

$$\begin{aligned}\frac{-1}{2} \int \left( \frac{1}{\sqrt{6}} \frac{1}{\left(t - \sqrt{\frac{3}{2}}\right)} - \frac{1}{\sqrt{6}} \frac{1}{\left(t + \sqrt{\frac{3}{2}}\right)} \right) dt &= -\frac{1}{2\sqrt{6}} \ln \left| t - \sqrt{\frac{3}{2}} \right| + \frac{1}{2\sqrt{6}} \ln \left| t + \sqrt{\frac{3}{2}} \right| \\ &= \frac{1}{2\sqrt{6}} \ln \left| \frac{t + \sqrt{\frac{3}{2}}}{t - \sqrt{\frac{3}{2}}} \right| \\ &= \frac{1}{2\sqrt{6}} \ln \left| \frac{\tan\left(\frac{x}{2}\right) + \sqrt{\frac{3}{2}}}{\tan\left(\frac{x}{2}\right) - \sqrt{\frac{3}{2}}} \right| + C\end{aligned}$$

■

ג)  $\int \frac{1}{\sin x + 2\cos x + 6} dx$  . זהויות של הצבה אוניברסלית:

$$t = \tan\left(\frac{x}{2}\right) , \quad t' = \frac{1}{2}(1+t^2) , \quad \cos x = \frac{1-t^2}{1+t^2} , \quad \sin x = \frac{2t}{1+t^2}$$

$$\begin{aligned}
 \int \frac{1}{\sin x + 2 \cos x + 6} dx &= \int \frac{1}{\left(\frac{2t}{1+t^2}\right) + 2\left(\frac{1-t^2}{1+t^2}\right) + 6} \cdot \left(\frac{2}{1+t^2}\right) \cdot t' dx \\
 &= \int \frac{2}{2t + 2 - 2t^2 + 6 + 6t^2} dt \\
 &= \int \frac{2}{8 + 2t + 4t^2} dt \\
 &= \frac{1}{2} \int \frac{1}{t^2 + \frac{t}{2} + 2} dt \\
 &= \frac{1}{2} \int \frac{1}{\left(t + \frac{1}{4}\right)^2 + \frac{31}{16}} dt \\
 z &= t + \frac{1}{4}, \quad z'_t = 1
 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 \frac{1}{2} \int \frac{1}{z^2 + \frac{31}{16}} dz &= \frac{1}{2} \frac{4}{\sqrt{31}} \arctan \left( \frac{4z}{\sqrt{31}} \right) + C \\
 &= \frac{1}{2} \frac{4}{\sqrt{31}} \arctan \left( \frac{4t + 1}{\sqrt{31}} \right) + C \\
 &= \frac{2}{\sqrt{31}} \arctan \left( \frac{4 \tan \left( \frac{x}{2} \right) + 1}{\sqrt{31}} \right) + C
 \end{aligned}$$

■

## שאלה 6

$$\int \frac{\sqrt{x}}{1+x} dx \quad (א)$$

$$t = \sqrt{x}$$

$$t' = \frac{1}{2\sqrt{x}} = \frac{1}{2t}$$



$$\begin{aligned}
 \int \frac{\sqrt{x}}{1+x} dx &= \int \frac{t}{1+t^2} dx \\
 &= \int \frac{t}{1+t^2} \cdot \frac{1}{t'} \cdot t' dx \\
 &= \int \frac{t}{1+t^2} \cdot \frac{1}{t'} dt \\
 &= \int \frac{t}{1+t^2} \cdot 2t dt \\
 &= \int \frac{2t^2}{1+t^2} dt \\
 &= \int \frac{2(1+t^2-1)}{1+t^2} dt \\
 &= \int \frac{2(1+t^2)-2}{1+t^2} dt \\
 &= \int \left( \frac{2(1+t^2)}{1+t^2} - \frac{2}{1+t^2} \right) dt \\
 &= \int \left( 2 - \frac{2}{1+t^2} \right) dt \\
 &= 2t - 2 \arctan t + C \\
 &= 2\sqrt{x} - 2 \arctan \sqrt{x} + C .
 \end{aligned}$$

■

$$\int \frac{\sqrt{x+2}}{x} dx \quad \text{ב) }$$

$$t = \sqrt{x+2} , \quad t' = \frac{1}{2\sqrt{x+2}} = \frac{1}{2t}$$

$$x = t^2 - 2 \quad \Leftarrow \quad x + 2 = t^2 \Leftarrow$$

$$\begin{aligned}
 \int \frac{t}{t^2-2} dx &= \int \frac{t}{t^2-2} \cdot \frac{1}{t'} \cdot t' dx \\
 &= \int \frac{t}{t^2-2} \cdot \frac{1}{t'} dt \\
 &= \int \frac{t}{t^2-2} \cdot 2t dt \\
 &= \int \frac{2t^2}{t^2-2} dt
 \end{aligned}$$

השבר בתוך האינטגרל ניתן לרשום כשברים חלקיים:

$$\begin{aligned}\frac{2t^2}{t^2-2} &= \frac{2(t^2-2+2)}{t^2-2} \\ &= \frac{2(t^2-2)+2}{t^2-2} \\ &= \frac{2(t^2-2)}{t^2-2} + \frac{4}{t^2-2} \\ &= 2 + \frac{4}{t^2-2} \\ &= 2 + \frac{4}{(t-\sqrt{2})(t+\sqrt{2})}\end{aligned}$$

$$\frac{4}{(t-\sqrt{2})(t+\sqrt{2})} = \frac{A}{t+\sqrt{2}} + \frac{B}{t-\sqrt{2}} = \frac{A(t-\sqrt{2})+B(t+\sqrt{2})}{(t-\sqrt{2})(t+\sqrt{2})}$$

$$\begin{aligned}B = \sqrt{2} &\Leftarrow 2\sqrt{2}B = 4 \Leftarrow t = \sqrt{2} \\ A = -\sqrt{2} &\Leftarrow -2\sqrt{2}A = 4 \Leftarrow t = -\sqrt{2}\end{aligned}$$

לכן

$$\frac{2t^2}{t^2-2} = 2 + \frac{\sqrt{2}}{t-\sqrt{2}} - \frac{\sqrt{2}}{t+\sqrt{2}}$$

והאינטגרל הופך ל

$$\begin{aligned}\int \frac{2t^2}{t^2-2} dt &= \int \left( 2 + \frac{\sqrt{2}}{t-\sqrt{2}} - \frac{1}{t+\sqrt{2}} \right) dt \\ &= 2t + \sqrt{2} \ln |t-\sqrt{2}| - \sqrt{2} \ln |t+\sqrt{2}| + C \\ &= 2\sqrt{x+2} + \sqrt{2} \ln |\sqrt{x+2}-\sqrt{2}| - \sqrt{2} \ln |\sqrt{x+2}+\sqrt{2}| + C\end{aligned}$$

■

$$\int \frac{1+e^x}{(1-e^{2x})e^x} dx \quad \text{ג}$$

$$t = e^x$$

$$t' = e^x = t$$

$$\int \frac{1+t}{(1-t^2)t} dx = \int \frac{1+t}{(1-t^2)t^2} \cdot t' dx = \int \frac{1+t}{(1-t^2)t^2} dt = \int \frac{1}{(1-t)t^2} dt$$

$$\frac{1}{(1-t)t^2} = \frac{A}{1-t} + \frac{B}{t^2} + \frac{C}{t} = \frac{At^2 + B(1-t) + Ct(1-t)}{(1-t)t^2}$$

$$At^2 + B(1-t) + Ct(1-t) = 1$$

$$t = 0 \rightsquigarrow B = 1, \quad t = 1 \rightsquigarrow A = 1, \quad t = 2 \rightsquigarrow 4A - B - 2C = 1 \Rightarrow C = 1.$$

$$\int \left( \frac{1}{1-t} + \frac{1}{t^2} + \frac{1}{t} \right) dt = -\ln|1-t| - \frac{1}{t} + \ln|t| + C = -\ln|1-e^x| - \frac{1}{e^x} + x + C$$

■

## שאלה 7

$$\int \sin^4 x \cos^5 x \, dx \quad \text{(א)}$$

$$t = \sin x, \quad t' = \cos x$$

$$\cos^2 x = 1 - \sin^2 x = 1 - t^2, \quad \cos^4 x = (1 - t^2)^2.$$

$$\begin{aligned} \int \sin^4 x \cos^5 x \, dx &= \int t^4 (1 - t^2)^2 t' \, dx \\ &= \int t^4 (1 - t^2)^2 \, dt \\ &= \int (t^8 - 2t^6 + t^4) \, dt \\ &= \frac{t^9}{9} - \frac{2t^7}{7} + \frac{t^5}{5} + C \\ &= \frac{\sin^9 x}{9} - \frac{2 \sin^7 x}{7} + \frac{\sin^5 x}{5} + C \end{aligned}$$

■

$$\int \sin^2 x \cos^2 x \, dx \quad \text{(ב)}$$

$$\sin^2 x \cos^2 x = (\sin x \cos x)^2 = \left( \frac{\sin 2x}{2} \right)^2 = \frac{1}{4} \sin^2 2x, = \frac{1}{4} \left( \frac{1 - \cos 4x}{2} \right) = \frac{1}{8} (1 - \cos 4x)$$

$$\begin{aligned} \int \frac{1}{8} (1 - \cos 4x) \, dx &= \frac{1}{8} \left( x - \frac{\sin 4x}{4} \right) + C \\ &= \frac{x}{8} - \frac{\sin 4x}{32} + C \end{aligned}$$

■

$$\int \cos^6 x \, dx \quad (ג)$$

$$\begin{aligned} \cos^6 x &= (\cos^2 x)^3 \\ &= \left( \frac{1 + \cos 2x}{2} \right)^3 \\ &= \frac{1}{8} (1 + 3 \cos 2x + 3 \cos^2 2x + \cos^3 2x) \\ &= \frac{1}{8} \left( 1 + 3 \cos 2x + 3 \left( \frac{1 + \cos 4x}{2} \right) + \cos^3 2x \right) \end{aligned}$$

$$\int \frac{1}{8} \left( 1 + 3 \cos 2x + 3 \left( \frac{1 + \cos 4x}{2} \right) + \cos^3 2x \right) dx = \frac{x}{8} + \frac{3}{16} \sin 2x + \frac{3}{16} x + \frac{3}{64} \sin 4x + \int \cos^3 2x dx$$

$$t = \sin 2x, \quad t' = 2 \cos 2x$$

$$\begin{aligned} &\frac{x}{8} + \frac{3}{16} \sin 2x + \frac{3}{16} x + \frac{3}{64} \sin 4x + \frac{1}{8} \int (1 - \sin^2 2x) \cos 2x \, dx \\ &= \frac{x}{8} + \frac{3}{16} \sin 2x + \frac{3}{16} x + \frac{3}{64} \sin 4x + \frac{1}{8} \int (1 - t^2) \frac{t'}{2} dx \\ &= \frac{x}{8} + \frac{3}{16} \sin 2x + \frac{3}{16} x + \frac{3}{64} \sin 4x + \frac{1}{16} \int (1 - t^2) dt \\ &= \frac{x}{8} + \frac{3}{16} \sin 2x + \frac{3}{16} x + \frac{3}{64} \sin 4x + \frac{1}{16} \int (1 - t^2) dt \\ &= \frac{x}{8} + \frac{3}{16} \sin 2x + \frac{3}{16} x + \frac{3}{64} \sin 4x + \frac{1}{16} \left( t - \frac{t^3}{3} \right) \\ &= \frac{5x}{16} + \frac{3}{16} \sin 2x + \frac{3}{64} \sin 4x + \frac{1}{16} \left( \sin 2x - \frac{\sin^3 2x}{3} \right) \\ &= \frac{5x}{16} + \frac{3}{16} \sin 2x + \frac{3}{64} \sin 4x + \frac{1}{16} \sin 2x - \frac{\sin^3 2x}{48} \\ &= \frac{5x}{16} + \frac{1}{4} \sin 2x + \frac{3}{64} \sin 4x - \frac{1}{48} \sin^3 2x + C \end{aligned}$$

■

(ד)

$$\int \sin^2 x \cos^4 x \, dx = \int (\sin x \cos x)^2 \cos^2 x \, dx$$

$$\sin x \cos x = \frac{\sin 2x}{2}, \quad \cos^2 x = \frac{1 + \cos 2x}{2}.$$

$$\begin{aligned}
\int \sin^2 x \cos^4 x \, dx &= \int (\sin x \cos x)^2 \cos^2 x \, dx \\
&= \int \frac{\sin^2 x}{4} \cdot \frac{1 + \cos 2x}{2} \, dx \\
&= \frac{1}{8} \int (\sin^2 x + \sin^2 2x \cos 2x) \, dx \\
&= \frac{1}{8} \int \left( \frac{1 - \cos 4x}{2} + \sin^2 2x \cos 2x \right) \, dx \\
&= \frac{1}{8} \int \left( \frac{1 - \cos 4x}{2} + \sin^2 2x \cos 2x \right) \, dx \\
&= \frac{1}{16} \int (1 - \cos 4x) \, dx + \frac{1}{8} \int \sin^2 2x \cos 2x \, dx \\
&= \frac{1}{16} \left( x - \frac{\sin 4x}{4} \right) + \frac{1}{8} \int \sin^2 2x \cos 2x \, dx \\
t &= \sin 2x, \quad t' = 2 \cos 2x
\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
\frac{1}{16} \left( x - \frac{\sin 4x}{4} \right) + \frac{1}{8} \int \sin^2 2x \cos 2x \, dx &= \frac{1}{16} \left( x - \frac{\sin 4x}{4} \right) + \frac{1}{8} \int t^2 \frac{t'}{2} \, dx \\
&= \frac{1}{16} \left( x - \frac{\sin 4x}{4} \right) + \frac{1}{16} \int t^2 \, dt \\
&= \frac{1}{16} \left( x - \frac{\sin 4x}{4} \right) + \frac{1}{16} \frac{t^3}{3} + C \\
&= \frac{1}{16} \left( x - \frac{\sin 4x}{4} \right) + \frac{1}{16} \frac{\sin^3 2x}{3} + C \\
&= \frac{x}{16} - \frac{\sin 4x}{64} + \frac{\sin^3 2x}{48} + C
\end{aligned}$$