

## שיעור 12

### אינטגרלים מסויימים

#### 12.1 אינטגרל של שברים אלגבריים (פונקציות רציונליות)

##### הגדרה 12.1 פונקציה רציונלית

פונקציה רציונלית (שבר אלגברי) זאת פונקציה מהצורה

$$y = \frac{P(x)}{Q(x)},$$

כאשר  $P(x), Q(x)$  פולינומים.

##### דוגמה 12.1 פונקציה רציונלית

$$f(x) = \frac{x^4 - 5x + 9}{x - 2} \text{ פונקציה רציונלית: } P(x) = x^4 - 5x + 9, Q(x) = x - 2.$$

##### הגדרה 12.2 פונקציה רציונלית אמיתית

שבר אלגברי

$$\frac{P(x)}{Q(x)}$$

נקרא אמיתי אם

$$\deg(P) < \deg(Q).$$

אם שבר אלגברי לא אמיתי, יש לעשות חילוק פולינומים.

##### דוגמה 12.2 חילוק פולינומים

חשבו את האינטגרל

$$\int \frac{x^4 - 5x + 9}{x - 2}.$$

##### פתרון:

שלב ראשון בחישוב אינטגרל של שבר אלגברי לא אמיתי, להגיע לשבר אלגברי אמיתי ע"י חילוק פולינומים. ע"י חילוק ארוך:

$$\frac{x^4 - 5x + 9}{x - 2} = x^3 + 2x^2 + 4x + 3 + \frac{15}{x - 2}$$

לכן

$$\int \frac{x^4 - 5x + 9}{x - 2} = \int \left( x^3 + 2x^2 + 4x + 3 + \frac{15}{x - 2} \right) = \frac{x^4}{4} + \frac{2}{3}x^3 + 2x^2 + 3x + 15 \ln|x - 2| + C .$$

■

יש 4 סוגים של שברים אלגבריים פשוטים:

סוג 1

$$\frac{A}{x - a}$$

סוג 2

$$\frac{A}{(x - a)^n} , \quad n \in \mathbb{N} , \quad n \geq 2 .$$

סוג 3

$$\frac{Mx + N}{x^2 + px + q} ,$$

כאשר ל-  $x^2 + px + q$  אין שורשים.

סוג 4

$$\frac{Mx + N}{(x^2 + px + q)^n} , n \in \mathbb{N} , \quad n \geq 2$$

כאשר ל-  $x^2 + px + q$  אין שורשים.

### דוגמה 12.3 אינטגרל של פונקציה רציונלית

$$\int \frac{2x + 1}{x^2 - 3x + 1} \text{ חשבו את}$$

פתרון:

$$\frac{2x + 1}{x^2 - 3x + 1} = \frac{2x + 1}{(x - 1)(x - 2)} = \frac{A}{x - 1} + \frac{B}{x - 2}$$

$$A(x - 2) + B(x - 1) = 2x + 1$$

$$\begin{aligned} x = 2 &\Rightarrow B = 5 \\ x = 1 &\Rightarrow A = -3 \end{aligned}$$

$$\int \frac{2x + 1}{x^2 - 3x + 1} dx = \int \left( \frac{-3}{x - 1} + \frac{5}{x - 2} \right) dx = -3 \ln|x - 1| + 5 \ln|x - 2| + C .$$

■

### דוגמה 12.4 אינטגרל של פונקציה רציונלית

$$\int \frac{x^2 + 4}{(x - 2)(x - 3)^2} \text{ חשבו את}$$

**פתרון:**

$$\frac{x^2 + 4}{(x-2)(x-3)^2} = \frac{A}{x-2} + \frac{B}{(x-3)^2} + \frac{C}{x-3} .$$

$$A(x-3)^2 + B(x-2) + C(x-3)(x-2) = x^2 + 4$$

$$\begin{aligned} x=3 &\Rightarrow B=13 \\ x=2 &\Rightarrow A=8 \\ x=0 &\Rightarrow 9A-2B+6C=4 \rightarrow C=-7 \end{aligned}$$

$$\int \frac{x^2 + 4}{(x-2)(x-3)^2} dx = \int \left( \frac{8}{x-2} + \frac{13}{(x-3)^2} - \frac{7}{x-3} \right) dx = 8 \ln|x-2| - \frac{13}{x-3} - 7 \ln|x-3| + C .$$

■

**דוגמה 12.5 אינטגרל של פונקציה רציונלית**

$$\int \frac{x^3 + 1}{x^2(x^2 + 1)} \text{ חשבו את}$$

**פתרון:**

$$\frac{x^3 + 1}{x^2(x^2 + 1)} = \frac{A}{x^2} + \frac{B}{x} + \frac{Cx + D}{x^2 + 1} .$$

$$A(x^2 + 1)^2 + Bx(x^2 + 1) + (Cx + D)x^2 = x^3 + 1$$

$$\begin{aligned} x^3 : & B + C = 1 \\ x^2 : & A + D = 0 \\ x : & B = 0 \\ x^0 : & A = 1 \end{aligned}$$

לכן

$$D = -1 , \quad C = 1 .$$

$$\int \frac{x^3 + 1}{x^2(x^2 + 1)} dx = \int \left( \frac{1}{x^2} + \frac{x-1}{x^2+1} \right) dx = \int \left( \frac{1}{x^2} + \frac{x}{x^2+1} - \frac{1}{x^2+1} \right) dx = -\frac{1}{x} + \frac{1}{2} \ln|x^2+1| - \arctan(x) + C .$$

■

**דוגמה 12.6 אינטגרל של פונקציה רציונלית**

$$I = \int \frac{2x^2 - 3x - 3}{(x-1)(x^2 - 2x + 5)} \text{ חשבו את}$$

**פתרון:**

$$\frac{2x^2 - 3x - 3}{(x-1)(x^2 - 2x + 5)} = \frac{A}{x-1} + \frac{Bx + C}{x^2 - 2x + 5} .$$

$$\begin{aligned} x^2 : \quad & A + B = 2 \\ x : \quad & -2A + C - B = -3 \\ x^0 : \quad & 5A - C = -3 \end{aligned}$$

לכן

$$A = -1, \quad B = 3, \quad C = -2.$$

$$I = \int \frac{2x^2 - 3x - 3}{(x-1)(x^2 - 2x + 5)} dx = \int \left( -\frac{1}{x-1} + \frac{3x-2}{x^2 - 2x + 5} \right) dx = -\ln|x-1| + \int \left( \frac{3x-2}{(x-1)^2 + 4} \right) dx.$$

נגדיר  $u = x - 1$ :

$$\begin{aligned} I &= \ln|x-1| + \int \frac{3(u+1)-2}{u^2+4} du \\ &= \ln|x-1| + \int \frac{3(u+1)-2}{u^2+4} du \\ &= \ln|x-1| + 3 \int \frac{u}{u^2+4} du - \int \frac{1}{u^2+4} du \\ &= \ln|x-1| + \frac{3}{2} \ln|u^2+4| - \frac{1}{2} \arctan\left(\frac{u}{2}\right) \\ &= \ln|x-1| + \frac{3}{2} \ln|(x-1)^2+4| - \frac{1}{2} \arctan\left(\frac{x-1}{2}\right) \end{aligned}$$

■

## למה 12.1 שלבים באינטגרציה של שברים אלגבריים

**שלב 1.** לחלק במכנה (חילוק פולינומי) במידה ש  $\deg(P) \geq \deg(Q)$ .

**שלב 2.** להציב שבר אלגברי אמיתי כסכום של שברים פשוטים.

**שלב 3.** לבצע אינטגרציה של כל שבר פשוט.

## דוגמה 12.7 אינטגרל של פונקציה רציונלית

$$I = \int \frac{x^5 + 2x^3 + 4x + 4}{x^4 + 2x^3 + 2x^2} dx \quad \text{חשבו את}$$

**פתרון:**

ע"י חילוק ארוך:

$$\frac{x^5 + 2x^3 + 4x + 4}{x^4 + 2x^3 + 2x^2} = x - 2 + \frac{4x^3 + 4x^2 + 4x + 4}{x^4 + 2x^3 + 2x^2} = x - 2 + 4 \left( \frac{x^3 + x^2 + x + 1}{x^4 + 2x^3 + 2x^2} \right)$$

$$\frac{x^3 + x^2 + x + 1}{x^4 + 2x^3 + 2x^2} = \frac{4x^3 + 4x^2 + 4x + 4}{x^2(x^2 + 2x + 2)} = \frac{A}{x^2} + \frac{B}{x} + \frac{Cx + D}{x^2 + 2x + 2}$$

$$A(x^2 + 2x + 2) + Bx(x^2 + 2x + 2) + (Cx + D)x^2 = x^3 + x^2 + x + 1$$

$$\begin{aligned} x^3 : \quad & B + C = 1 \\ x^2 : \quad & 2A + 2B + D = 1 \\ x : \quad & 2A + 2B = 1 \\ x^0 : \quad & 2A = 1 \end{aligned}$$

לכן

$$A = \frac{1}{2}, \quad B = 0, \quad C = 1, \quad D = \frac{1}{2}.$$

$$I = \int \left( x - 2 + \frac{2}{x^2} + \frac{4x+2}{x^2+2x+2} \right) dx = \int \left( x - 2 + \frac{2}{x^2} + \frac{4x+2}{(x+1)^2+1} \right) dx = \frac{x^2}{2} - 2x - \frac{2}{x} + 4 \int \frac{x + \frac{1}{2}}{(x+1)^2+1} dx.$$

נגדיר  $u = x + 1$ :

$$\begin{aligned} I &= \frac{x^2}{2} - 2x - \frac{2}{x} + 4 \int \frac{u - \frac{1}{2}}{u^2 + 1} du \\ &= \frac{x^2}{2} - 2x - \frac{2}{x} + 2 \ln |u^2 + 1| - 2 \arctan(u) + C \\ &= \frac{x^2}{2} - 2x - \frac{2}{x} + 2 \ln |(x+1)^2 + 1| - 2 \arctan(x+1) + C \end{aligned}$$


■

## 12.2 אינטגרל מסוים

### הגדרה 12.3 אינטגרל מסוים

נניח שפונקציה  $y = f(x)$  מוגדרת בקטע  $[a, b]$ . נחלק את הקטע  $[a, b]$  לקטעים קטנים על ידי נקודות

$$a = x_0 < x_1 < \dots < x_n = b.$$



מכל קטע  $[x_i, x_{i+1}]$  נבחר נקודה  $c_i$  באופן שרירותי. נבנה סכום אינטגרלי:

$$\sum_{i=1}^n f(x_i) \cdot (x_i - x_{i-1}) .$$

נסמן  $\Delta x_i = x_i - x_{i-1}$ . נפעיל את הגבול כאשר  $\max(\Delta x_i) \rightarrow 0$ . נקבל

$$\lim_{\max(\Delta x_i) \rightarrow 0} \sum_{i=1}^n f(x_i) \Delta x_i = \int_a^b f(x) dx .$$

האגף הימין הוא האינטגרל המסוים של  $f(x)$  בקטע  $[a, b]$ .

## משפט 12.1 קיום אינטגרל מסוים

אם  $f(x)$  רציפה בקטע  $[a, b]$  אז האינטגרל מסוים  $\int_a^b f(x) dx$  קיים.

## משפט 12.2 משמעות הגיאומטרית של אינטגרל מסוים

אם  $f(x) \geq 0$  פונקציה רציפה בקטע  $[a, b]$ , אז  $\int_a^b f(x) dx$  שווה לשטח הטרפז העקום החסום ע"י הקווים  $y = f(x)$ ,  $y = 0$ , מלמעלה ו-  $x = a$ ,  $x = b$  בצדדים.

## משפט 12.3 נוסחת ניוטון לייבניץ

אם  $\int f(x) dx = F(x) + C$  אז  $\int_a^b f(x) dx = F(b) - F(a)$ .

### דוגמה 12.8

$$\int_0^3 x^2 dx = \left[ \frac{x^3}{3} \right]_0^3 = \frac{3^3}{3} - 0 = 9.$$

### דוגמה 12.9

$$\int_{-2}^2 \frac{1}{4+x^2} dx = \frac{1}{2} \left[ \arctan \left( \frac{x}{2} \right) \right]_{-2}^2 = \frac{1}{2} [\arctan(1) - \arctan(-1)] = \frac{1}{2} \left[ \frac{\pi}{4} - \left( -\frac{\pi}{4} \right) \right] = \frac{\pi}{4}.$$

### דוגמה 12.10

$$\int_e^{e^2} \frac{1}{x \cdot \ln x} dx = [\ln |\ln x|]_e^{e^2} = [\ln |\ln e^2 - \ln e|] = [\ln |2 - 1|] = 0.$$

## משפט 12.4 תכונות של אינטגרל מסויים

$$\int_a^b c \cdot f(x) dx = c \cdot \int_a^b f(x) dx \quad .1$$

$$\int_a^b [f(x) \pm g(x)] dx = \int_a^b f(x) dx \pm \int_a^b g(x) dx \quad .2$$

$$\int_a^b f(x) dx = - \int_b^a f(x) dx \quad .3$$

$$\int_a^b f(x) dx = \int_a^c f(x) dx + \int_c^b f(x) dx \quad .4 \text{ עבור } a < c < b$$

$$\left( \int_a^x f(t) dt \right)' = f(x) \quad .5$$

.1

.2

.3

.4

.5

$$\int_a^x f(t)dt = F(x) - F(a)$$

כאשר  $F(x)$  פונקציה קדומה של  $f(x)$ . לכן

$$\left( \int_a^x f(t)dt \right)'_x = (F(x) - F(a))'_x = F'(x) = f(x) .$$

### דוגמה 12.11

עבור אילו ערכי  $x$  לגרף הפונקציה

$$f(x) = \int_0^x e^{-(t+2)^2}$$

יש נקודת פיתול?

**פתרון:**

$$f'(x) = e^{-(x+2)^2} .$$

$$f''(x) = -2(x+2)e^{-(x+2)^2} = 0 \quad \Rightarrow \quad x = -2 .$$

### דוגמה 12.12 החלפת משתנים באינטגרל מסויים

$$\int_1^{e^2} \frac{\ln^2 x}{x} dx \quad \text{חשבו את}$$

**פתרון:**

נגדיר

$$u = \ln x , \quad u' = \frac{1}{x} , \quad u(e^2) = 2 , \quad u(1) = 0 .$$

$$\int_1^{e^2} \frac{\ln^2 x}{x} dx = \int_0^2 u^2 u' dx = \int_0^2 u^2 du = \left[ \frac{u^3}{3} \right]_0^2 = \frac{8}{3} .$$



### דוגמה 12.13 החלפת משתנים באינטגרל מסויים

חשבו את  $\int_0^4 \frac{1}{1+\sqrt{x}} dx$

**פתרון:**

נגדיר

$$u = \sqrt{x}, \quad u' = \frac{1}{2\sqrt{x}} = \frac{1}{2u}, \quad u(4) = 2, \quad u(0) = 0.$$

$$\begin{aligned} \int_0^4 \frac{1}{1+\sqrt{x}} dx &= \int_0^2 \frac{1}{1+u} \cdot 2u \cdot \frac{1}{2u} du \\ &= \int_0^2 \frac{1}{1+u} \cdot 2u \cdot u' dx \\ &= \int_0^2 \frac{2u}{1+u} du \\ &= \int_0^2 \left( 2 - \frac{2}{1+u} \right) du \\ &= [2u - 2 \ln |1+u|]_0^2 \\ &= 4 - 2 \cdot \ln 3. \end{aligned}$$

■

### דוגמה 12.14 החלפת משתנים באינטגרל מסויים

חשבו את  $\int_0^{\ln 2} \sqrt{e^x - 1} dx$

**פתרון:**

נגדיר

$$u = \sqrt{e^x - 1}, \quad u' = \frac{1}{2\sqrt{e^x - 1}} \cdot e^x = \frac{u^2 + 1}{2u}, \quad u(\ln 2) = 1, \quad u(0) = 0.$$

$$\begin{aligned} \int_0^{\ln 2} \sqrt{e^x - 1} dx &= \int_0^1 u \cdot \frac{u^2 + 1}{2u} \cdot \frac{2u}{u^2 + 1} du \\ &= \int_0^1 u \cdot \frac{2u}{u^2 + 1} \cdot u' dx \\ &= \int_0^1 u \cdot \frac{2u}{u^2 + 1} du \\ &= \int_0^1 \frac{2u^2}{u^2 + 1} du \\ &= \int_0^1 \left( 2 - \frac{2}{u^2 + 1} \right) du \\ &= [2u - 2 \arctan(u)]_0^1 \\ &= 2 - 2 \arctan(1) = 2 - \frac{\pi}{2} \end{aligned}$$



### דוגמה 12.15 החלפת משתנים באינטגרל מסויים

חשבו את  $\int_{-1}^2 \sqrt{2-x} dx$

**פתרון:**  
נגדיר

$$u = \sqrt{2-x}, \quad u' = \frac{1}{2\sqrt{2-x}} \cdot (-1) = \frac{-1}{2u}, \quad u(2) = 0, \quad u(-1) = \sqrt{3}.$$

$$\begin{aligned} \int_{-1}^2 \sqrt{2-x} dx &= \int_{-1}^2 u \cdot (-2u) \cdot \frac{-1}{2u} dx \\ &= \int_{-1}^2 u \cdot (-2u) \cdot u' dx \\ &= \int_{\sqrt{3}}^0 (-2u^2) du \\ &= \int_0^{\sqrt{3}} 2u^2 du \\ &= \left[ \frac{2}{3} u^3 \right]_0^{\sqrt{3}} \\ &= \frac{2}{3} 3^{3/2}. \end{aligned}$$



### למה 12.2 אינטגרציה בחלקים באינטגרל מסויים

$$\begin{aligned} \int_a^b u dv &= [uv]_a^b - \int_a^b v du \\ \int_a^b u v' dx &= [uv]_a^b - \int_a^b v u' dx \end{aligned}$$

### דוגמה 12.16 אינטגרציה בחלקים באינטגרל מסויים

חשבו את  $\int_1^e x \cdot \ln x dx$

**פתרון:**  
נגדיר

$$u = \ln x, \quad v' = x, \quad u' = \frac{1}{x}, \quad v = \frac{x^2}{2}.$$

$$\begin{aligned}\int_1^e x \cdot \ln x \, dx &= \left[ \ln x \cdot \frac{x^2}{2} \right]_1^e - \int_1^e \frac{x^2}{2} \cdot \frac{1}{x} \, dx \\ &= \left[ \ln x \cdot \frac{x^2}{2} \right]_1^e - \int_1^e \frac{x}{2} \, dx \\ &= \left[ \ln x \cdot \frac{x^2}{2} \right]_1^e - \left[ \frac{x^2}{4} \right]_1^e \\ &= \left[ \ln e \cdot \frac{e^2}{2} - \ln 1 \cdot \frac{1}{2} \right] - \left[ \frac{e^2}{4} - \frac{1}{4} \right] , \\ &= \frac{e^2}{2} - \frac{e^2}{4} + \frac{1}{4} \\ &= \frac{e^2}{4} + \frac{1}{4} .\end{aligned}$$

### דוגמה 12.17 אינטגרציה בחלקים באינטגרל מסויים

חשבו את  $\int_0^\pi x \cdot \sin x \, dx$

**פתרון:**

נגדיר

$$u = x , \quad v' = \sin x , \quad u' = 1 , \quad v = -\cos x .$$

$$\begin{aligned}\int_0^\pi x \cdot \sin x \, dx &= [-x \cdot \cos x]_0^\pi - \int_0^\pi (-\cos x) \, dx \\ &= [-x \cdot \cos x]_0^\pi + [\sin x]_0^\pi \\ &= [-\pi \cdot \cos \pi + 0 \cdot \cos 0] + \sin \pi - \sin 0 \\ &= \pi .\end{aligned}$$

### דוגמה 12.18

חשבו את  $\int_{-3}^3 e^{-x^2} \sin x \, dx$

**פתרון:**

$$\int_{-3}^3 e^{-x^2} \sin x \, dx = 0$$

בגלל ש-  $e^{-x^2} \sin x$  פונקציה אי-זוגית והתחום סימטרי ביחס לראשית הצירים.

### דוגמה 12.19

עבור אילו ערכי  $a$  מתקיים  $I = \int_0^2 \min(x, a) \, dx = 1$  ?

**פתרון:**

$a \leq 0$

$$I = \int_0^2 a \, dx = [ax]_0^2 = 2a \neq 1 .$$

$a \geq 2$

$$I = \int_0^2 x \, dx = \left[ \frac{x^2}{2} \right]_0^2 = 2 \neq 1 .$$

$1 < a < 2$

$$I = \int_0^a x \, dx + \int_a^2 a \, dx = \left[ \frac{x^2}{2} \right]_0^a + [ax]_a^2 = \frac{a^2}{2} + 2a - a^2 = -\frac{a^2}{2} + 2a = 1 .$$

$$a^2 - 4a + 2 = 0$$

$$a = 2 \pm \sqrt{2}$$

לכן התשובה היא  $a = 2 - \sqrt{2}$ .

## דוגמה 12.20

חשבו את  $I = \int_0^{2\pi} \cos(\max(x, \pi)) \, dx$

**פתרון:**

$$\begin{aligned} \int_0^{2\pi} \cos(\max(x, \pi)) \, dx &= \int_0^{\pi} \cos(\pi) \, dx + \int_{\pi}^{2\pi} \cos(x) \, dx \\ &= [-x]_0^{\pi} + [\sin x]_{\pi}^{2\pi} \\ &= -\pi . \end{aligned}$$

## דוגמה 12.21

חשבו את  $I = \int_0^{\pi/2} \frac{\cos x}{2 + 3 \sin x} \, dx$

**פתרון:**

נגדיר

$$u = 2 + 3 \sin x , \quad u' = 3 \cos x .$$

$$\begin{aligned}\int_0^{\pi/2} \frac{\cos x}{2 + 3 \sin x} dx &= \int_0^{\pi/2} \frac{\frac{u'}{3}}{u} dx \\ &= \int_2^5 \frac{1}{u} du \\ &= \left[ \ln u \right]_2^5 \\ &= \ln \frac{5}{2} .\end{aligned}$$

## 12.22 דוגמה

חשבו את  $I = \int_0^5 |2x - 4| dx$

**פתרון:**

$$\begin{aligned}\int_0^5 |2x - 4| dx &= \int_2^5 (2x - 4) dx + \int_0^2 (-(2x - 4)) dx \\ &= \int_2^5 (2x - 4) dx + \int_0^2 (4 - 2x) dx \\ &= \left[ x^2 - 4x \right]_2^5 + \left[ 4x - x^2 \right]_0^2 \\ &= [25 - 20 - 4 + 8] + [8 - 4] \\ &= 13 .\end{aligned}$$

## 12.23 דוגמה

מצא את ערכו של  $t$  ( $t > 0$ ) עבורו האינטגרל  $I = \int_0^t (2 - te^{-0.5x}) dx$  הוא מקסימאלי. חשבו את הערך המקסימאלי.

**פתרון:**

$$F(t) = \int_0^t (2 - te^{-0.5x}) dx = \left[ 2x + 2te^{-0.5x} \right]_0^t = 2t + 2te^{-0.5t} - 2t = 2te^{-0.5t} .$$

$$F'(t) = 2e^{-0.5t} \left( 1 - \frac{t}{2} \right) = 0 \quad \Rightarrow \quad t = 2 .$$


עבור  $t = 2$  ל  $F(t)$  יש ערך מקסימאלי.

$$F(2) = 2 \cdot 2 \cdot e^{-0.5 \cdot 2} = \frac{4}{e} .$$

### דוגמה 12.24 חישוב שטח

מצאו את השטח החסום ע"י גרף הפונקציה  $y = x^3$  והישרים  $y = 0, x = 1$ .

פתרון:




$$S = \int_0^1 x^3 dx = \left[ \frac{x^4}{4} \right]_0^1 = \frac{1}{4}.$$

### דוגמה 12.25 חישוב שטח

מצאו את השטח החסום ע"י  $y = \frac{1}{x^2}, y = x, y = 0, x = 3$ .

פתרון:




$$S = \int_0^1 x \, dx + \int_1^3 \frac{1}{x^2} \, dx = \left[ \frac{x^2}{2} \right]_0^1 - \left[ \frac{1}{x} \right]_1^3 = \frac{1}{2} - \frac{1}{3} + 1 = \frac{7}{6}.$$

### דוגמה 12.26 חישוב שטח

מצאו את השטח החסום ע"י  $y = x^2 - 2x$ ,  $y = 0$ ,  $x = 3$ ,  $x = 0$ .

פתרון:




$$\begin{aligned}
 S &= - \int_0^2 (x^2 - 2x) dx + \int_2^3 (x^2 - 2x) dx \\
 &= - \left[ \frac{x^3}{3} - x^2 \right]_0^2 + \left[ \frac{x^3}{3} - x^2 \right]_2^3 \\
 &= - \left[ \frac{2^3}{3} - 2^2 \right] + \left[ \frac{3^3}{3} - 3^2 - \frac{2^3}{3} + 2^2 \right] \\
 &= - \frac{8}{3} + 4 + 9 - 9 - \frac{8}{3} + 4 \\
 &= \frac{8}{3} .
 \end{aligned}$$

### דוגמה 12.27 חישוב שטח

מצאו את השטח החסום ע"י  $y = \sqrt{x}$ ,  $y = 0$ ,  $y = 2$ .

פתרון:




$$\begin{aligned}
 S &= \int_0^4 2 dx - \int_0^4 \sqrt{x} dx \\
 &= [2x]_0^4 - \left[ \frac{2}{3} x^{3/2} \right]_0^4 \\
 &= 8 - \frac{2}{3} \cdot 4^{3/2} \\
 &= \frac{8}{3} .
 \end{aligned}$$



## דוגמה 12.28 חישוב שטח

מצאו את השטח החסום ע"י  $y = x$ ,  $y = 2 - x^2$ .

**פתרון:**



$$\begin{aligned}
 S &= \int_{-2}^1 (2 - x^2 - x) dx \\
 &= \left[ 2x - \frac{x^3}{3} - \frac{x^2}{2} \right]_{-2}^1 \\
 &= \left[ 2 - \frac{1}{3} - \frac{1}{2} \right] - \left[ -4 + \frac{8}{3} - \frac{4}{2} \right] \\
 &= \frac{9}{2}.
 \end{aligned}$$

## דוגמה 12.29 חישוב שטח

מצאו את השטח החסום ע"י  $y = x^2 - 2x + 2$ , המשיק לפרבולה הזאת בנקודה  $(3, 5)$  וציר ה- $y$ .

**פתרון:**


נמצא את משוואת המשיק:

$$y' = 2x - 2$$

$$y'(3) = 4$$

משוואת המשיק:

$$y - 5 = 4(x - 3) \quad \Rightarrow \quad y = 4x - 7.$$




$$\begin{aligned}
 S &= \int_0^3 ((x^2 - 2x + 2) - (4x - 7)) \, dx \\
 &= \left[ \frac{x^3}{3} - x^2 + 2x \right]_0^3 - [2x^2 - 7x]_0^3 \, dx \\
 &= \left[ \frac{3^3}{3} - 3^2 + 6 \right] - [18 - 21] \\
 &= 9 .
 \end{aligned}$$

### דוגמה 12.30 חישוב שטח

מצאו את השטח החסום ע"י  $y = \sin |x|$ ,  $y = |x| - \pi$ .

**פתרון:**




$$\begin{aligned} S &= 2 \int_0^{\pi} (\sin x - (x - \pi)) dx \\ &= 2 \left[ -\cos x - \frac{x^2}{2} + \pi x \right]_0^{\pi} \\ &= 2 \left[ 1 - \frac{\pi^2}{2} + \pi^2 \right] 0 - 2[-1] \\ &= 4 + \pi^2 . \end{aligned}$$



### משפט 12.5 חישוב נפח גוף סיבוב סביב ציר ה- $x$

בהינתן גרף של פונקציה  $y = f(x)$  בקטע  $[a, b]$ . הנפח של גוף סיבוב סביב ציר ה- $x$  הוא


$$V = \pi \int_a^b f^2(x) dx .$$



### דוגמה 12.31 חישוב נפח

מצאו את נפח גוף הסיבוב סביב ציר ה- $x$  של התחום המישורי החסום ע"י  $y = \sin x$  בתחום  $0 \leq x \leq \pi$ .

פתרון:




$$\begin{aligned}
 V &= \pi \int_0^{\pi} \sin^2 x \, dx \\
 &= \pi \int_0^{\pi} \frac{1 - \cos 2x}{2} \, dx \\
 &= \pi \left[ \frac{x}{2} - \frac{1}{4} \sin 2x \right]_0^{\pi} \\
 &= \frac{\pi^2}{2} .
 \end{aligned}$$

### דוגמה 12.32 חישוב נפח

מצאו את נפח גוף הסיבוב סביב ציר ה- $x$  של התחום החסום ע"י  $y = \sqrt{x}$ ,  $y = x^2$ .

**פתרון:**




$$\begin{aligned} V &= \pi \int_0^1 (\sqrt{x})^2 dx - \pi \int_0^1 x^4 dx \\ &= \pi \left[ \frac{x^2}{2} \right]_0^1 - \pi \left[ \frac{x^5}{5} \right]_0^1 \\ &= \pi \left[ \frac{1}{2} - \frac{1}{5} \right] \\ &= \frac{3\pi}{10} . \end{aligned}$$

### דוגמה 12.33 חישוב נפח

חשבו את נפח גוף הסיבוב סביב ציר ה- $x$  של התחום החסום ע"י  $y = \frac{\sqrt{x}}{x+1}$  בתחום  $0 \leq x \leq 1$ .

**פתרון:**



$$V = \pi \int_0^1 \frac{x}{(x+1)^2} dx .$$

$$\frac{x}{(x+1)^2} = \frac{A}{(x+1)^2} + \frac{B}{x+1} = \frac{A+B(x+1)}{(x+1)^2} .$$

$$x : \quad B = 1$$

$$x^0 : \quad A + B = 0 \Rightarrow A = -1.$$

$$V = \pi \int_0^1 \left( -\frac{1}{(x+1)^2} + \frac{1}{x+1} \right) dx = \pi \left[ \frac{1}{x+1} + \ln|x+1| \right]_0^1 = \pi \left[ \frac{1}{2} + \ln|2| - 1 \right] = \pi \left( \ln|2| - \frac{1}{2} \right) .$$

■