


ירמיהו מילר


חז"א 2 למדמ"ח

תשפ"ג סמסטר ב'

לוקטור יש גודל וכיוון. בפרט, אפשר שלטני וקטורים יש גודל שווה אבל כיוונים שונים. לדוגמה יש לוקטורים $\overrightarrow{OA} = (2, 4, 6)$ ו $\overrightarrow{OA'} = (4, 6, 2)$ אותו מדל $|\overrightarrow{OA}| = |\overrightarrow{OA'}| = \sqrt{56}$, אבל יש להם כיוונים שונים (ראו שרטוט).



נכליל את ההגדרה למעלה של וקטור מראשית לנקודה במרחב- xyz לוקטור מנקודה לנקודה, אשר אף משניהם לא בהכרח הראשית. לדוגמה, נתונות שתי נקודות $A(1, 2, 5)$ ו- $B(4, 4, 11)$, ניתן להגדיר את הוקטור מנקודה A לנקודה B .



כדי לעבור מנקודה A לנקודה B , יש לעבור
3 יחידות בכיוון ה- x ,


ירמיהו מילר

חז"א 2 למדמ"ח

תשפ"ג סמסטר ב'

הנדסה גאומטרית

נניח ש A נקודה עם קואורדינטות $(1, 2, 3)$ ביחס לראשית.



אפשר להגדיר הוקטור \overrightarrow{OA} להיות הקו שמתחיל בנקודה O ומסתיים בנקודה A .

כדי לעבור מנקודה O לנקודה A , אפשר לעבור

יחידה אחת לאורך ציר ה- x (לאורך OC),
2 יחידות לאורך ציר ה- y (לאורך CB),
ו- 3 יחידות לאורך ציר ה- z (לאורך BA).

אומרים כי הקואורדינטות של הוקטור \overrightarrow{OA} הן $(1, 2, 3)$ ביחס למערכת צירים. נסמן את הוקטור בצורה $\overrightarrow{OA} = (1, 2, 3)$.

המספרים $(1, 2, 3)$ נקראים הקואורדינטות או הרכיבים של הוקטור. לוקטור יש גודל וכיוון. הגודל של הוקטור מוגדר להיות האורך של הקו של הוקטור מהזנב לראש.

נחשב את אורך הוקטור OA לפי פיתגורס:

$$|OA|^2 = |OB|^2 + |AB|^2$$
$$|OB|^2 = |OC|^2 + |BC|^2 = x_1^2 + y_1^2, \quad |AB|^2 = z_1^2$$

לכן

$$|OA|^2 = x_1^2 + y_1^2 + z_1^2,$$


לכן גודל הוקטור \overrightarrow{OA} הוא

$$|OA| = \sqrt{x_1^2 + y_1^2 + z_1^2} = \sqrt{14}.$$

באופן כללי נתון וקטור $\vec{a} = (x_1, y_1, z_1)$ הגודל של הוקטור ניתן ע"י

$$|\vec{a}| = \sqrt{x_1^2 + y_1^2 + z_1^2}.$$

ירמיהו מילר חדו"א 2 למדמ"ח תשפ"ג סמסטר ב'



נשים לב כי יש וקטורים \overline{AB} ו- \overline{CD} אותם רכיבים:

$$\overline{AB} = (3, 2, 6) = \overline{CD} ,$$

ויותר מזה הכיוונים של השני וקטורים שווים, כלומר הוקטורים מקבילים. זאת תוצאה של העובדה שיש להשני וקטורים אותם רכיבים. הכיוון של וקטור נקבע ע"י הרכיבים שלו.

האורך של הוקטור גם לא משתנה כאשר נניח אותו על נקודה התחלתית שונה. לפי פיתגורס:

$$|AB| = \sqrt{3^2 + 2^2 + 6^2} = 7 , \quad |CD| = \sqrt{3^2 + 2^2 + 6^2} = 7 .$$

הגדרה 2: וקטור כיוון

נתון וקטור $\vec{a}(a_x, a_y, a_z)$ ונתון הנקודה $A = (x_1, y_1, z_1)$ כלשהי. אז כאשר הוקטור \vec{a} מתחיל בנקודה A , הוא עובר לנקודה B בת קואורדינטות (x_2, y_2, z_2) כאשר

$$x_2 = x_1 + a_x , \quad y_2 = y_1 + a_y , \quad z_2 = z_1 + a_z .$$

ירמיהו מילר חדו"א 2 למדמ"ח תשפ"ג סמסטר ב'

2 יחידות בכיוון ה- y .
ו- 6 יחידות בכיוון ה- z .

לכן נגדיר את הוקטור \overline{AB} כך:


$$\overline{AB} = (3, 2, 6) .$$

הרכיב ה- x של \overline{AB} הוא ההפרש בין הקואורדינטות ה- x של הנקודות A ו- B : $x_B - x_A = 3$.
מאותה מידה, הרכיב ה- y של \overline{AB} הוא ההפרש בין הקואורדינטות ה- y של A ו- B : $y_B - y_A = 2$.
והרכיב ה- z של \overline{AB} הוא ההפרש בין הקואורדינטות ה- z של A ו- B : $z_B - z_A = 6$.

הגדרה 1: וקטור בין שתי נקודות

באופן כללי, בהינתן שתי נקודות $A(a_1, a_2, a_3)$ ו- $B(b_1, b_2, b_3)$ הוקטור \overline{AB} בין A ל- B הינו

$$\overline{AB} = (b_1 - a_1, b_2 - a_2, b_3 - a_3) .$$




הגודת של הוקטור, לפי פיתגורס הינו

$$|\overline{AB}| = \sqrt{(b_1 - a_1)^2 + (b_2 - a_2)^2 + (b_3 - a_3)^2} .$$

למעשה אנחנו לא צריכים נקודות מסוימות כדי לגדיר וקטור. לוקטור אין נקודת התחלתית קבועה אבל אפשר "להניח" אותו בכל נקודה במישור / מרחב. לדוגמה נקח הוקטור מדוגמה הקודמת. הוקטור בעל בת קואורדינטות $(3, 2, 6)$ התחיל בנקודה $A(1, 2, 5)$ והסתיים בנקודה $B(4, 4, 11)$. אבל ניתן לקחת אותו וקטור, להניח את הזנב על הנקודה $C(10, 11, 14)$ ונמצא כי הראש של הוקטור יהיה בנקודה

$$D = (10, 11, 14) + (3, 2, 6) = (13, 13, 20) ,$$

כלומר הוקטור $(3, 2, 6)$ כאשר הוא מתחיל בנקודה $C(10, 11, 14)$ מסתיים בנקודה $D(13, 13, 20)$ (ראו שרטוט למטה).



משפט 1: אורך של וקטור

האורך (או גודל) של הוקטור $\vec{a}(a_x, a_y, a_z)$ יסומן ב $|\vec{a}|$ או לעיתים a (בלי הגג מעל) וניתן ע"י הנוסחה של פיתגורס:

$$|\vec{a}| = \sqrt{a_x^2 + a_y^2 + a_z^2}$$


משפט 2: חיבור וקטורים

מבחנית קואורדינטות, הסכום של $\vec{a} = (a_1, a_2, a_3)$ ו- $\vec{b} = (b_1, b_2, b_3)$ נתון ע"י

$$\vec{a} + \vec{b} = (a_1 + b_1, a_2 + b_2, a_3 + b_3) \text{ .}$$

גיאומטרית, החיבור מתבצע ע"י כלל המקבילית:

מניחים את שני הוקטורים כך שיהחלו באותה הנקודה ומניחים עותק של כל אחד מהם בקצה של השני כך שנוצרת מקבילית. האלכסון של המקבילית הוא הסכום.



משפט 3: כפל וקטור בסקלר

הכפלה של וקטור \vec{a} בסקלר k תשנה אורכו:

אם $k > 0$ כיוונו לא ישתנה,

אם $k < 0$ כיוונו ייחפך,

אם $k = 0$ נקבל וקטור האפס.

אלברית: אם $\vec{a} = (a_1, a_2, a_3)$ אז

$$k\vec{a} = (ka_1, ka_2, ka_3) \text{ .}$$

משפט 4: תנאי קולינאריות

אם שני וקטורים \vec{a} ו- \vec{b} קולינאריים אז קיים $t \in \mathbb{R}$ כך ש-

$$\vec{b} = t \cdot \vec{a} \text{ .}$$

פורמאלי:

$$\vec{b} \parallel \vec{a} \iff \exists t : \vec{b} = t \cdot \vec{a} \text{ .}$$

הגדרה 3: הבסיס הסטנדרטי

נגדיר שלושה וקטורים הבאים:


• הוקטור i מקביל לכיוון x וגודלו 1

• הוקטור j מקביל לכיוון y וגודלו 1

• הוקטור k מקביל לכיוון z וגודלו 1

הקבוצה של הוקטורים i, j, k נקרא הבסיס הסטנדרטי. הקואורדינטות של הוקטורים אלו הן:

$$i(1, 0, 0) \text{ , } j(0, 1, 0) \text{ , } k(0, 0, 1) \text{ .}$$



בהינתן וקטור $\vec{a} = (a_x, a_y, a_z)$ ניתן לבטא אותו במונחים של הבסיס מצורה


$$\vec{a} = a_x \vec{i} + a_y \vec{j} + a_z \vec{k} \text{ .}$$

תשפ"ג סמסטר ב'	חזר"א 2 למדמ"ח	ירמיהו מילר	חזר"א 2 למדמ"ח	ירמיהו מילר
----------------	----------------	-------------	----------------	-------------

משפט 6:

1. אם $\vec{a} \cdot \vec{b} = 0$ אז $\vec{b} \perp \vec{a}$
 2. אם $\vec{a} \cdot \vec{b} = 0$ אז $\theta = 90^\circ = \pi/2$
 3. אם $\vec{a} \cdot \vec{b} < 0$ אז $\cos \theta < 0$ ולכן $\theta > 90^\circ$
 4. $\vec{a} \cdot \vec{a} = |\vec{a}|^2$
 5. $\vec{a} \cdot \vec{b} = \vec{b} \cdot \vec{a}$
- לכל $\vec{a}, \vec{b} \in \mathbb{R}^3$

הגדרה 6: היטל של וקטור \vec{a} על וקטור \vec{b}



אורך ההיטל של \vec{a} על וקטור \vec{b} הוא $|\vec{b}| \cdot \cos(\alpha)$.

לכן, $|\vec{a} \cdot \vec{b}|$ שווה למכפלת האורך של \vec{a} באורך ההיטל של \vec{a} על \vec{b} .

הגדרה 4: וקטור יחידה

בהינתן וקטור $\vec{a} = (a_x, a_y, a_z)$ בעל אורך $|\vec{a}| = \sqrt{a_x^2 + a_y^2 + a_z^2}$ נגדיר וקטור יחידה המסומן \hat{a} , אשר כיוונו שווה לכיוון של \vec{a} ואורכו שווה ל-1.

\hat{a} ניתן ע"י הנוסחה


$$\hat{a} = \frac{1}{|\vec{a}|} \vec{a} = \left(\frac{a_x}{|\vec{a}|}, \frac{a_y}{|\vec{a}|}, \frac{a_z}{|\vec{a}|} \right)$$

הגדרה 5: מכפלת סקלרית

נתונים שני וקטורים $\vec{a} = (a_1, a_2, a_3)$ ו- $\vec{b} = (b_1, b_2, b_3)$ המכפלת סקלרית שלהם הוא

(#1) $\vec{a} \cdot \vec{b} = a_1 b_1 + a_2 b_2 + a_3 b_3$.

משפט 5:



נתונים שני וקטורים \vec{a} ו- \vec{b} , הזווית θ ביניהם, הינה

$$\cos \theta = \frac{\vec{a} \cdot \vec{b}}{|\vec{a}| |\vec{b}|} = \frac{a_1 b_1 + a_2 b_2 + a_3 b_3}{\sqrt{a_1^2 + a_2^2 + a_3^2} \sqrt{b_1^2 + b_2^2 + b_3^2}}$$

תשפ"ג סמסטר ב'

חדו"א 2 למדמ"ח


ירמיהו מילר

תשפ"ג סמסטר ב'

חדו"א 2 למדמ"ח

ירמיהו מילר

משפט 7: זוויות של וקטור



נתון וקטור $\vec{a} = (a_x, a_y, a_z)$. נניח ש-

α הזווית בין \vec{a} וכיוון ה- x ,

β הזווית בין \vec{a} וכיוון ה- y ,

γ הזווית בין \vec{a} וכיוון ה- z ,

(תראו תרשים לעיל). אז

$$\cos \alpha = \frac{a_x}{|\vec{a}|}, \quad \cos \beta = \frac{a_y}{|\vec{a}|}, \quad \cos \gamma = \frac{a_z}{|\vec{a}|}.$$

שים לב לפי משפט 7? נתון וקטור \vec{a} עם זוויות α, β, γ ביחס לצירים, הוקטור היחידה של \vec{a} ניתן ע"י

$$\hat{a} = (\cos \alpha, \cos \beta, \cos \gamma).$$

הגדרה 7: מכפלת וקטורית

נתון שני וקטורים $\vec{b} = (b_1, b_2, b_3)$ ו- $\vec{a} = (a_1, a_2, a_3)$

$$\vec{a} \times \vec{b} = (a_2 b_3 - a_3 b_2, a_3 b_1 - a_1 b_3, a_1 b_2 - a_2 b_1) = \begin{vmatrix} \vec{i} & \vec{j} & \vec{k} \\ a_1 & a_2 & a_3 \\ b_1 & b_2 & b_3 \end{vmatrix}$$

משפט 9: תנאי קופלנריות

שלשה וקטורים $\vec{a}, \vec{b}, \vec{c}$ נמצאים במישור אחת א"אם

$$\vec{a} \cdot (\vec{b} \times \vec{c}) = 0.$$

משפט 8: מכפלת וקטורית וזווית בין וקטורים

אם θ הזווית בין הוקטורים \vec{a} ו- \vec{b} אז מתקיים

$$|\vec{a} \times \vec{b}| = |\vec{a}| |\vec{b}| \sin \theta.$$


הוכחה:

$$\begin{aligned} |\vec{a} \times \vec{b}|^2 &= (y_1 z_2 - y_2 z_1)^2 + (z_1 x_2 - z_2 x_1)^2 + (x_1 y_2 - x_2 y_1)^2 \\ &= (x_1^2 + y_1^2 + z_1^2)(x_2^2 + y_2^2 + z_2^2) - (x_1 x_2 + y_1 y_2 + z_1 z_2)^2 \\ &= |\vec{a}|^2 |\vec{b}|^2 - (\vec{a} \cdot \vec{b})^2 \\ &= |\vec{a}|^2 |\vec{b}|^2 - |\vec{a}|^2 |\vec{b}|^2 \cos^2 \theta \\ &= |\vec{a}|^2 |\vec{b}|^2 (1 - \cos^2 \theta) \\ &= |\vec{a}|^2 |\vec{b}|^2 \sin^2 \theta. \end{aligned}$$

$$\Rightarrow |\vec{a} \times \vec{b}| = |\vec{a}| |\vec{b}| \sin \theta.$$

משפט 12: נפח פירמידה


$$V = \frac{1}{6} |\overrightarrow{AD} \cdot (\overrightarrow{AB} \times \overrightarrow{AC})|$$



משפט 13: מרחק מנקודה למישור

בהינתן נקודה $P(x_0, y_0, z_0)$ ומישור בעל משוואה $Ax + By + Cz + D = 0$, המרחק d בין P לנקודה הכי קרובה אליו הנמצא במישור ניתן ע"י

$$d = \frac{|Ax_0 + By_0 + Cz_0 + D|}{\sqrt{A^2 + B^2 + C^2}}.$$



xyz .

הגדרה 8: משוואת המישור

המשוואה המתארת מישור בכללי במרחב xyz הינה

$$Ax + By + Cz + D = 0$$

כאשר לפחות אחד המקדמים A, B, C אינו אפס.


ניתן לרשום משוואת המישור בצורה

$$\frac{x}{m} + \frac{y}{n} + \frac{z}{p} = 1.$$

בצורה הזאת המספרים m, n, p הם הנקודות חיתוך של המישור עם הצירי x, y, z בהתאמה כמתואר בשרטוט.

משפט 10: שטח משולש

$$S_{\triangle ABC} = \frac{1}{2} |\overrightarrow{AB} \times \overrightarrow{AC}|$$



משפט 11: מכפלה מעורבת

א) נתון שלושה וקטורים $\vec{a}, \vec{b}, \vec{c}$ המכפלה מעורבת מוגדרת להיות


$$\vec{a} \cdot (\vec{b} \times \vec{c}) = \vec{c} \cdot (\vec{a} \times \vec{b}) = \vec{b} \cdot (\vec{c} \times \vec{a}) = \begin{vmatrix} a_1 & a_2 & a_3 \\ b_1 & b_2 & b_3 \\ c_1 & c_2 & c_3 \end{vmatrix}$$

ב)

$$\vec{a} \cdot (\vec{b} \times \vec{c}) = \vec{c} \cdot (\vec{a} \times \vec{b}) = \vec{b} \cdot (\vec{c} \times \vec{a}).$$

ג) הערך מוחלט של המכפלה מעורבת שווה לנפח של המקבילן הנוצר ע"י השלושה וקטורים $\vec{a}, \vec{b}, \vec{c}$ כמתואר בתרשים. כלומר

$$V_{\text{מקבילן}} = |\vec{a} \cdot (\vec{b} \times \vec{c})|.$$







ד) הוקטורים $\vec{a}, \vec{b}, \vec{c}$ הם קופלנריים (שלתכם נמצאים באותו מישור) אם ורק אם

$$\vec{a} \cdot (\vec{b} \times \vec{c}) = 0.$$


תשפ"ג סמסטר ב' ירמיהו מילר

חדו"א 2 למדמ"ח

<p>תשפ"ג סמסטר ב'</p>	<p>חדו"א 2 למדמ"ח</p>	<p>ירמיהו מילר</p>
<p>המשור לא עובר את הראשית הצירים.</p> <p>$A, B, C, D \neq 0$</p>		<p>$Ax + By + Cz + D = 1$</p>
<p>המשור לא עובר את הראשית הצירים.</p> <p>$m, n, p \neq 0$</p>		<p>$\frac{x}{m} + \frac{y}{n} + \frac{z}{p} = 1$</p>
<p>המשור עובר דרך הראשית הצירים.</p> <p>$(0, 0, 0)$</p>		<p>$Ax + By + Cz = 0$</p>
<p>המשור לא עובר את הראשית הצירים.</p> <p>$A, B, D \neq 0$</p>		<p>$Ax + By + D = 0$</p>

תשפ"ג סמסטר ב' ירמיהו מילר

חדו"א 2 למדמ"ח




משור מוגדר ע"י שלוש נקודות שבהן הוא עובר, בתנאי ששלושת הנקודות לא על אותו ישר (כלומר לא קולינאריות).

משפט 14: משוואת המישור העובר דרך שלוש נקודות

משוואת המישור העובר דרך שלוש הנקודות הנמנות $(x_1, y_1, z_1), (x_2, y_2, z_2), (x_3, y_3, z_3)$ ניתן לרשום בצורה:

$$\begin{vmatrix} x & y & z \\ x_1 & y_1 & z_1 \\ x_2 & y_2 & z_2 \\ x_3 & y_3 & z_3 \end{vmatrix} = 0.$$



תשפ"ג סמסטר ב' ירמיהו מילר

תשפ"ג סמסטר ב' ירמיהו מילר

חז"א 2 למדמ"ח

<p>$B, C \neq 0$ משתנה ה-x לא משתתף במשוואת המישור. המישור עובר דרך הראשית הצירים. המישור מכיל את ציר ה-x.</p>		$By + Cz = 0$
<p>$A, D \neq 0$ משתני y ו-z לא משתתפים במשוואת המישור. המישור חותך את ציר ה-x ב-$x = m$. המישור מקביל למישור yz.</p>		$Ax + D = 0 \Leftrightarrow x = m$
<p>$B, D \neq 0$ משתני x ו-z לא משתתפים במשוואת המישור. המישור חותך את ציר ה-x ב-$y = n$. המישור מקביל למישור xz.</p>		$By + D = 0 \Leftrightarrow y = n$
<p>$C, D \neq 0$ משתני x ו-y לא משתתפים במשוואת המישור. המישור חותך את ציר ה-x ב-$z = p$. המישור מקביל למישור xy.</p>		$Cz + D = 0 \Leftrightarrow z = p$

ירמיהו מילר

חז"א 2 למדמ"ח

תשפ"ג סמסטר ב'

<p>$A, C, D \neq 0$ משתנה ה-y לא משתתף במשוואת המישור. המישור לא חותך את ציר ה-y ולא עובר דרך הראשית הצירים.</p>		$Ax + Cz + D = 0$
<p>$B, C, D \neq 0$ משתנה ה-x לא משתתף במשוואת המישור. המישור לא חותך את ציר ה-x ולא עובר דרך הראשית הצירים.</p>		$By + Cz + D = 0$
<p>$A, B \neq 0$ משתנה ה-z לא משתתף במשוואת המישור. המישור עובר דרך הראשית הצירים. המישור מכיל את ציר ה-z.</p>		$Ax + By = 0$
<p>$A, C \neq 0$ משתנה ה-y לא משתתף במשוואת המישור. המישור עובר דרך הראשית הצירים. המישור מכיל את ציר ה-y.</p>		$Ax + Cz = 0$

משפט 15: שטח משולש במישור x,y

שטח S של המשולש אשר קדקדיו הם בנקודות (x_1, y_1) , (x_2, y_2) , (x_3, y_3) הוא

$$S = \pm \frac{1}{2} \begin{vmatrix} x_1 & y_1 & 1 \\ x_2 & y_2 & 1 \\ x_3 & y_3 & 1 \end{vmatrix}$$

משפט 16: מרחק מנקודה למישור

המרחק d מהנקודה $P(x_0, y_0, z_0)$ למישור $Ax + By + Cz + D = 0$ הוא

$$d = \frac{|Ax_0 + By_0 + Cz_0 + D|}{\sqrt{A^2 + B^2 + C^2}}$$

משפט 17: נפח הפירמידה המשולשת במרחב x,y,z

הנפח V של הפירמידה המשולשת אשר קדקדיה הם בנקודות (x_1, y_1, z_1) , (x_2, y_2, z_2) , (x_3, y_3, z_3) , (x_4, y_4, z_4) הוא

$$V = \pm \frac{1}{6} \begin{vmatrix} x_1 & y_1 & z_1 & 1 \\ x_2 & y_2 & z_2 & 1 \\ x_3 & y_3 & z_3 & 1 \\ x_4 & y_4 & z_4 & 1 \end{vmatrix}$$

משפט 18: משוואת המישור במרחב

משוואת המישור המאונך לוקטור (A, B, C) העובר דרך הנקודה $M = (x_0, y_0, z_0)$ היא

$$A(x - x_0) + B(y - y_0) + C(z - z_0) = 0.$$

אם נשווה למשוואה $Ax + By + Cz + D = 0$ נקבל ש- $D = -Ax_0 - By_0 - Cz_0$.

n נקרא הנורמל למישור.

הוכחה: עבור הנקודה $P = (x, y, z)$ במישור מתקיים כי

$$n \cdot \overrightarrow{MP} = 0$$

בגלל ש n מאונך למישור ו- \overrightarrow{MP} מוכל מקביל למישור.

$$\Rightarrow A \cdot (x - x_0) + B \cdot (y - y_0) + C \cdot (z - z_0) = 0.$$




משפט 19: מרחק מנקודה למישור

המרחק d מהנקודה $P(x_0, y_0, z_0)$ למישור $Ax + By + Cz + D = 0$ הוא


$$d = \frac{|Ax_0 + By_0 + Cz_0 + D|}{\sqrt{A^2 + B^2 + C^2}}.$$

הנקודה הקרובה ביותר במישור ל- P היא הנקודה שדרכה עובר ניצב למישור שעובר דרך P .



הגדרה 9: היטל של נקודה על מישור

ההיטל של נקודה $P(x_0, y_0, z_0)$ על מישור $Ax + By + Cz + D = 0$ כלומר, נקודה M_0 כך ש- $\overrightarrow{M_0P}$ מקביל לנורמל n למישור.




תשפ"ג סמסטר ב'	חזר"א 2 למדמ"ח	תשפ"ג סמסטר ב'	חזר"א 2 למדמ"ח	ירמיהו מילר
----------------	----------------	----------------	----------------	-------------

הגדרה 10: השיקוף של נקודה ביחס מישור

השיקוף P^* של נקודה $P(x_0, y_0, z_0)$ ביחס למישור מוגדר להיות

$$P^* = P - 2\overline{M_0P} \ ,$$

כאשר M_0 ההיטל של P על המישור.



שיטה אחרת ויותר קלה:

אם נרשום את הישר העובר את הנקודה P וההיטל שלו במישור בצורה

$$M(t) = P + t \cdot \vec{n}$$

כשאר \vec{n} הנורמל של המישור. נניח ש- t_0 הוא הערך של הפרמטר t בנקודת ההיטל, M_0 של P ביחס למישור. אז השיקוף של P ביחס למישור זו ניתן ע"י

$$P^* = M(2t_0) = P + 2t_0\vec{n} \ .$$

בהינתן שני מישורים $\left\{ \begin{array}{l} A_1x + B_1y + C_1z + D_1 = 0 \\ A_2x + B_2y + C_2z + D_2 = 0 \end{array} \right.$ ניתן להגדיר להם שלושה מצבים הדדיים: נחתכים, מתלכדים או מקבילים.

1 המישורים נחתכים אם הוקטורים (A_1, B_1, C_1) ו- (A_2, B_2, C_2) לא מקבילים. במצב זה החיתוך בין המישורים הוא קו ישר.

לדוגמה, נתונים שני מישורים $\left\{ \begin{array}{l} 2x - 3y + z + 1 = 0 \\ x - z + 3 = 0 \end{array} \right.$. המישורים נחתכים בגלל ש- $(1, 0, -1) \nparallel (2, -3, 1)$.

2 המישורים מקבילים אם אין להם נקודה משותפת. כלומר אין פתרון למערכת במצב זה. הוקטור (A_1, B_1, C_1) מקביל לוקטור (A_2, B_2, C_2) אבל $\frac{D_1}{A_1} \neq \frac{D_2}{A_2}$ (ניתן להחליף ב- B או C).

ירמיהו מילר

חזר"א 2 למדמ"ח

תשפ"ג סמסטר ב'

תשפ"ג סמסטר ב'

חזר"א 2 למדמ"ח

ירמיהו מילר

לדוגמה, נתונים המישורים $\left\{ \begin{array}{l} 2x - 3y + z + 1 = 0 \\ 6x - 9y + 3z + 2 = 0 \end{array} \right.$ אבל $(2, -3, 1) \parallel (6, -9, 3)$. לכן המישורים מקבילים.

3 המישורים מתלכדים אם כל הנקודות שלהם משותפות במצב זה, הוקטורים (A_1, B_1, C_1) ו- (A_2, B_2, C_2) מקבילים. מספיק שיש רק נקודה אחת משותפת שכן מישור נקבע ע"י נקודה ווקטור ניצבנו.

לדוגמה, נתונים שני מישורים $\left\{ \begin{array}{l} 2x - 3y + z + 1 = 0 \\ -4x + 6y - 2z - 2 = 0 \end{array} \right.$. המישורים מתלכדים בגלל ש- $(-4, 6, -2) \parallel (2, -3, 1)$ והנקודה $(0, 0, -1)$ נקודה משותפת.

משפט 20: שטח משולש במישור xy

שטחו S של המשולש אשר קדקודיו הם בנקודות (x_1, y_1) , (x_2, y_2) , (x_3, y_3) הוא

$$S = \pm \frac{1}{2} \begin{vmatrix} x_1 & y_1 & 1 \\ x_2 & y_2 & 1 \\ x_3 & y_3 & 1 \end{vmatrix}$$

משפט 21: מרחק מנקודה למישור

המרחק d מהנקודה $P(x_0, y_0, z_0)$ למישור $Ax + By + Cz + D = 0$ הוא


$$d = \frac{|Ax_0 + By_0 + Cz_0 + D|}{\sqrt{A^2 + B^2 + C^2}}$$

משפט 22: נפח הפירמידה המשולשת במרחב xyz

הנפח V של הפירמידה המשולשת אשר קדקודיה הם בנקודות (x_1, y_1, z_1) , (x_2, y_2, z_2) , (x_3, y_3, z_3) הוא (x_4, y_4, z_4)

$$V = \pm \frac{1}{6} \begin{vmatrix} x_1 & y_1 & z_1 & 1 \\ x_2 & y_2 & z_2 & 1 \\ x_3 & y_3 & z_3 & 1 \\ x_4 & y_4 & z_4 & 1 \end{vmatrix}$$

הגדרה 11: משוואת הישר בצורה פרמטרית



משוואת הישר העובר דרך הנקודה $M_0(x_0, y_0, z_0)$ במקביל לוקטור $\vec{a} = (a_1, a_2, a_3)$ הוא

$$(x, y, z) = M_0 + t \cdot \vec{a} = (x_0, y_0, z_0) + t(a_1, a_2, a_3),$$

או באופן שקול

$$x = x_0 + a_1 t, \quad y = y_0 + a_2 t, \quad z = z_0 + a_3 t.$$

הוקטור \vec{a} נקרא וקטור הכיוון, הקואורדינטות (a_1, a_2, a_3) נקראות קואורדינטות הכיוון של הישר.

משפט 23: משוואת הישר בצורה קנונית

משוואת הישר העובר דרך נקודה נתונה $M_0(x_0, y_0, z_0)$ במקביל לוקטור נתון, $\vec{a} = (a_1, a_2, a_3)$ בצורה קנונית היא

$$\frac{x - x_0}{a_1} = \frac{y - y_0}{a_2} = \frac{z - z_0}{a_3}.$$

- אם המקדם של x שווה אפס, כלומר אם $a_1 = 0$, נחלקי את החלק שלו במשוואה ע"י

$$x = x_0.$$

$$x = x_0.$$

- אם המקדם של y שווה אפס, כלומר אם $a_2 = 0$, נחלקי את החלק שלו במשוואה ע"י

$$y = y_0.$$

$$y = y_0.$$

- אם המקדם של z שווה אפס, כלומר אם $a_3 = 0$, נחלקי את החלק שלו במשוואה ע"י

$$z = z_0.$$


$$z = z_0.$$

- במקרה ששניהם מהמקדמים הם אפס, למשל $a_1 = a_2 = 0$, הישר נתון ע"י

$$\begin{cases} x = x_0 \\ y = y_0 \end{cases}$$

כלומר הישר מקביל לציר ה- z .

משפט 24: ישר כחיתוך של שני מישורים



בהינתן שני מישורים


$$A_1x + B_1y + C_1z + D_1 = 0,$$

$$A_2x + B_2y + C_2z + D_2 = 0,$$

שאינם מתלכדים או מקבילים קובעים את הישר שבו הם מפגשים. צמד המשוואות של שני המישורים נקרא **משוואה כללית של הישר**.

מכיוון שיש שתי משוואות בשלושה נעלמים, אז הפתרון יהיה בצורה קבוצה של אינסוף פתרונות פרמטר חופשי, אשר הוא דווקא הפרמטר המופיע במשוואה פרמטרית של הישר.

משפט 25: חלוקה של וקטור ביחס נתון



$$\frac{AC}{CB} = \frac{\lambda_1}{\lambda_2}.$$


$$x_c = \frac{\lambda_2 x_A + \lambda_1 x_B}{\lambda_1 + \lambda_2}, \quad y_c = \frac{\lambda_2 y_A + \lambda_1 y_B}{\lambda_1 + \lambda_2}, \quad z_c = \frac{\lambda_2 z_A + \lambda_1 z_B}{\lambda_1 + \lambda_2}.$$

הגדרה 12: מרחק בין ישרים מצטלבים

היה $\vec{a} + t\vec{b}$ $N(t) : (x, y, z) = N_0 + t\vec{b}$ ישרים מצטלבים. המרחק ביניהם מוגדר להיות המרחק בין השתי נקודות Q ו- P הקרובות ביותר על הישרים.

(3) מקבילים אם

הישרים נמצאים באותו מישור. $\vec{M_0N_0} \times \vec{M_0N_1} \neq \vec{0}$ ו- $(a_1, a_2, a_3) \parallel (b_1, b_2, b_3)$




(4) נחתכים אם

ו- $(a_1, a_2, a_3) \nparallel (b_1, b_2, b_3)$

$$d = \frac{\vec{M_0N_0} \cdot (\vec{a} \times \vec{b})}{|\vec{a} \times \vec{b}|} = 0,$$

כלומר והמרחק בין הישרים שווה לאפס, אז הישרים נחתכים. הישרים נמצאים במישור באותו מישור ולכן הם נחתכים.




(5) מצטלבים

אם $(a_1, a_2, a_3) \nparallel (b_1, b_2, b_3)$ ו- $\vec{M_0N_0} \cdot (\vec{a} \times \vec{b}) \neq 0$,

$$d = \frac{\vec{M_0N_0} \cdot (\vec{a} \times \vec{b})}{|\vec{a} \times \vec{b}|} \neq 0,$$

כלומר והמרחק בין הישרים אינו שווה לאפס, אז הישרים מצטלבים. הישרים אינם נמצאים באותו מישור ולכן הם מצטלבים.



ניתן לחשב את המרחק d ע"י לבחור כל שתי נקודות M_0 ו- N_0 על השני ישרים לפי הנוסחה:

$$d = \frac{\vec{M_0N_0} \cdot (\vec{a} \times \vec{b})}{|\vec{a} \times \vec{b}|}.$$

משפט 26: מצב ההדדי בין שני ישרים במרחב

(1) נתונים שני ישרים


$$M(t) : (x, y, z) = M_0 + t \cdot \vec{a} = (x_0, y_0, z_0) + t \cdot (a_1, a_2, a_3)$$


$$N(s) : (x, y, z) = N_0 + s \cdot \vec{b} = (x_0, y_0, z_0) + s \cdot (b_1, b_2, b_3)$$

ונתון שתי נקודות M_1, M_2 על הישר $M(t)$ ושתי נקודות N_1, N_2 על הישר $N(t)$. ישנו ארבע אפשרויות למצב ההדדי ביניהם:

(2) מתלכדים אם

הישרים מתלכדים. $\vec{M_0N_0} \times \vec{M_0N_1} = \vec{0}$ ו- $(a_1, a_2, a_3) \parallel (b_1, b_2, b_3)$





משפט 27: מצב הדידי בין ישר למישור

בהינתן מישור $0 = D + Cz + By + Ax$ וישר $(a_1, a_2, a_3) \cdot (x_0, y_0, z_0) + t \cdot (a_1, a_2, a_3)$ יש בניהם שלושה מצבים הדדיים אפשריים:

(א) הישר מוכלל במישור

$$(A, B, C) \perp (a_1, a_2, a_3) \Rightarrow (A, B, C) \cdot (a_1, a_2, a_3) = 0.$$

וכל הנקודות של הישר נמצאות גם על המישור. מספיק שיהיו שתי נקודות.

(ב) הישר מקביל למישור

$$(A, B, C) \perp (a_1, a_2, a_3) \Rightarrow (A, B, C) \cdot (a_1, a_2, a_3) = 0.$$

ואין להם נקודה משותפת.

(ג) הישר נחתך עם המישור


$$(A, B, C) \not\perp (a_1, a_2, a_3) \Rightarrow (A, B, C) \cdot (a_1, a_2, a_3) \neq 0.$$

הווקטור הכיוון של הישר לא ניצב למישור ויש להם נקודה אחת משותפת.

הגדרה 13: זווית בין מישורים וישרים


(א) הזווית בין שני מישורים מוגדרת להיות הזווית בין הווקטורים הנורמלים שלהם.

$$\cos \alpha = \frac{|\vec{n}_1 \cdot \vec{n}_2|}{|\vec{n}_1| \cdot |\vec{n}_2|}$$




(ב) הזווית בין שני ישרים גם מצטלבים מוגדרת להיות הזווית בין וקטורים הכיוון שלהם.

$$\cos \alpha = \frac{|\vec{a} \cdot \vec{b}|}{|\vec{a}| \cdot |\vec{b}|}$$



(ג) הזווית בין מישור לישר מוגדרת להיות המשלמה לזווית בין הנורמל של המישור והקטור הכיוון של הישר.

$$\sin \alpha = \frac{|\vec{a} \cdot \vec{n}|}{|\vec{a}| \cdot |\vec{n}|}$$



הגדרה 14: מרחק בין נקודה לישר

הנקודה הקרובה ביותר M_1 על הישר ל- P תהיה נקודה שבה $\vec{M_1P}$ ניצב ל- \vec{a} . ואז

$$d = |\vec{M_1P}| = |\vec{M_0P}| \sin \alpha = \frac{|\vec{M_0P} \times \vec{a}|}{|\vec{a}|}$$

תשפ"ג סמסטר ב'

חז"א 2 למדמ"ח

ירמיהו מילר

