

**1 דוגמא.** בר היא בנקאית השקעות מתוחכמת המציעה ללקוחותיה את ההגרלה הבאה: בסיכוי  $\frac{2}{5}$  תקבלו רווח של 10. בסיכוי  $\frac{1}{5}$  לא תרוויחו ולא תפסידו דבר, ובסיכוי  $\frac{3}{5}$  תפסידו 5. חשבו את התוחלת וסטיית התקן של  $X$  המייצג את הרווח מהשקעה אצל בר.

**פיתרון.** תוחלת הרווח היא חיובית שכן

$$\mu_X = 10 \cdot \frac{2}{5} + 0 \cdot \frac{1}{5} - 5 \cdot \frac{2}{5} = 2,$$

$$\mu_{X^2} = 100 \cdot \frac{2}{5} + 0^2 \cdot \frac{1}{5} + 25 \cdot \frac{2}{5} = 50,$$

$$V(X) = \mu_{X^2} - \mu_X^2 = 50 - 4 = 46,$$

$$\Rightarrow \sigma_X = \sqrt{46}.$$

■

**2 דוגמא.** הסיכוי אשר חולה מחלים ממחלת דם חריג הוא 0.4. אם 15 אנשים נדבקים עם המחלה זו, מהי ההסתברות אשר

1. לפחות 10 יחלימו

2. בין 3 עד 8 יחלימו

3. בדיוק 5 יחלימו?

**פיתרון.** נגדיר  $X$  להיות מספר החולים אשר יחלימו.

1.

$$\begin{aligned} P(X \geq 10) &= 1 - P(X < 10) \\ &= 1 - \sum_{k=0}^9 f_{X \sim \text{Bin}(15, 0.4)}(k) \\ &= 1 - \sum_{k=0}^9 \binom{15}{k} 0.4^k (1 - 0.4)^{15-k} \\ &= 1 - 0.9662 = 0.0338. \end{aligned}$$

2.

$$\begin{aligned} P(3 \leq X \leq 8) &= 1 - P(X < 3) - P(X > 8) \\ &= \sum_{k=3}^8 f_{X \sim \text{Bin}(15, 0.4)}(k) \\ &= \sum_{k=0}^8 f_{X \sim \text{Bin}(15, 0.4)}(k) - \sum_{k=0}^2 f_{X \sim \text{Bin}(15, 0.4)}(k) \\ &= \left( \sum_{k=0}^8 - \sum_{k=0}^2 \right) \binom{15}{k} 0.4^k (1 - 0.4)^{15-k} \\ &= 0.9050 - 0.0271 = 0.8779. \end{aligned}$$

3.

$$\begin{aligned} P(X = 5) &= f_{X \sim \text{Bin}(15, 0.4)}(k = 5) \\ &= \binom{15}{5} 0.4^5 (1 - 0.4)^{10} \end{aligned}$$



**3 דוגמא.** מחשב משתמש במילים באורך 8 ביטים. כאשר משדרים ביטים בקו התקשורת יש סיכוי של 0.1 (לשגיאה בביט בודד שמשודר. בכדי לשפר את איכות הקו, משודר כל ביט 3 פעמים ברצף והפענוח של כל שלשת ביטים מתבצע על ידי החלטת הרוב. למשל: אם רוצים לשדר 0, משדרים בקו "000" והמקלט מפענח את התשדורת כ-0 אם השלשה שהגיעה אליו מורכבת מלפחות שני אפסים.

1. חשבו את ההסתברות שמילת מחשב תפוענח נכון.
  2. מצאו את התפלגות מספר המילים שפוענחו באופן שגוי בקובץ המכיל 1000 מילים.
- פתרון: נשים לב שכמות הטעויות בשליחה של ביט בודד מתפלגת  $X \sim \text{Bin}(3, 0.1)$  ולכן ההסתברות שתהיה שגיאה בפענוח ביט בודד היא

$$P(X \geq 2) = \binom{3}{2} 0.1^2 0.9 + \binom{3}{1} 0.1^3 = 0.028$$

1. כמות השגיאות במילה באורך 8 ביטים מתפלגת

$$Y \sim \text{Bin}(8, 0.028)$$

ולכן המילה תפוענח נכון בהסתברות

$$P(Y = 0) = \binom{8}{0} p^0 (1-p)^8 = (1 - 0.028)^8 = 0.796 .$$

2. לאור הסעיף הקודם, ההסתברות לשגיאה בפענוח מילה בודדת היא

$$1 - 0.796 = 0.203 ,$$

לכן מספר המילים שפוענחו באופן שגוי בקובץ המכיל 1000 מילים מתפלג  $\text{Bin}(1000, 0.203)$ .

**4 דוגמא.** בכד 9 כדורים לבנים ו-1 שחור. מושכים באקראי בזה אחר זה כדור מהכד. נסמן ב- $X$  את מספר המשיכות עד לקבלת שחור וב- $Y$  את מספר המשיכות עד לקבלת 3 שחורים. מצאו את התפלגות  $X$  כאשר המשיכה היא עם החזרה.

**פיתרון.**  $X$  מקבל ערכים  $\mathbb{N}/\{0\}$ . בכל הוצאה ישנה הסתברות של  $\frac{9}{10}$  לכדור לבן (כישלון) והסתברות של  $p = \frac{1}{10}$  לכדור לבן (הצלחה). כלומר, קיבלנו מ"מ גאומטרי

$$X \sim G\left(\frac{1}{10}\right) .$$



**5 דוגמא.** חלקיקים נפלטים מחומר רדיואקטיבי בתהליך פואסון עם קצב של 0.5 חלקיקים לשנייה. חשבו את ההסתברויות הבאות:

1. ייפלט לפחות חלקיק אחד בשנייה נתונה.
2. ייפלטו יותר מ-3 חלקיקים ב-5 שניות.

**פיתרון.** התהליך בשאלה הוא תהליך פואסון בעל פרמטר  $\lambda = 0.5$  לכן

1.

$$P(X \geq 1) = 1 - P(X = 0) = 1 - e^{-0.5} \frac{0.5^0}{0!} = 0.393 .$$

2. כעת בשאלה הוא תהליך פואסון שונה בעל פרמטר  $5\lambda$ :

$$\begin{aligned} P(X_5 > 3) &= 1 - P(X_5 = 0) - P(X_5 = 1) - P(X_5 = 2) - P(X_5 = 3) \\ &= 1 - e^{-5\lambda} \frac{(5\lambda)^0}{0!} - e^{-5\lambda} \frac{(5\lambda)^1}{1!} - e^{-5\lambda} \frac{(5\lambda)^2}{2!} - e^{-5\lambda} \frac{(5\lambda)^3}{3!} \\ &= 1 - e^{-5(0.5)} \frac{(5(0.5))^0}{0!} - e^{-5(0.5)} \frac{(5(0.5))^1}{1!} - e^{-5(0.5)} \frac{(5(0.5))^2}{2!} - e^{-5(0.5)} \frac{(5(0.5))^3}{3!} \\ &= 0.242 \end{aligned}$$

מאחר ו-  $X_5$  מתפלג  $P(0.5, 5)$

■

6 **דוגמא. (פונקצית התפלגות)** מטילים 2 קוביות. נסמן ב-  $X$  את סכום התוצאות שהתקבלו. מצאו את ההתפלגות של  $X$ .

**פיתרון.** נתחיל מהתומך. התוצאות האפשרויות בסכום של 2 קוביות הן המספרים הטבעיים מ-2 עד 12. בכדי לחשב את ההסתברות לכל ערך נשתמש במרחב מדגם סימטרי: גודל מרחב המדגם הוא  $6^2 = 36$ , ככמות האפשרויות לבחור תוצאה לקוביה הראשונה מתוך 6 ותוצאה לקוביה השנייה מתוך 6. נחשב את ההסתברות של כל תוצאה בנפרד:

$$\begin{aligned} P(X=2) &= \frac{|\{(1,1)\}|}{6^2} = \frac{1}{36}, \\ P(X=3) &= \frac{|\{(2,1), (1,2)\}|}{6^2} = \frac{2}{36}, \\ P(X=4) &= \frac{|\{(1,3), (2,2), (3,1)\}|}{6^2} = \frac{3}{36}, \\ &\vdots \\ P(X=7) &= \frac{|\{(1,6), (2,5), (3,4), (4,3), (5,2), (6,1)\}|}{6^2} = \frac{6}{36}, \\ P(X=8) &= \frac{|\{(2,6), (3,5), (4,4), (5,3), (6,2)\}|}{6^2} = \frac{5}{36}, \\ P(X=9) &= \frac{|\{(3,6), (4,5), (5,4), (6,3)\}|}{6^2} = \frac{4}{36}, \\ &\vdots \\ P(X=12) &= \frac{|\{(6,6)\}|}{6^2} = \frac{1}{36}, \end{aligned}$$

ובאופן דומה ממשיכים לחשב את האפשרויות לכל הערכים האפשריים בתומך. באופן כללי קל לראות שהנוסחא, כאשר  $p$  זו הסכום של ה-2 הקוביות, היא (עיין משוואה (??) לעיל)

$$P(X=p) = \frac{1}{36} \times \begin{cases} (p-1) & p < 8 \\ (p-1) - 2(p-7) & 8 \leq p < 14 \end{cases}$$

■

7 **דוגמא. (פונקצית התפלגות מצטברת)** אלון הוא סוחר ממולח בשוק ההון. הוא משקיע סכום של \$1000 במכשיר פיננסי אשר בכל שנה מכפיל את הכסף בסיכוי  $\frac{2}{3}$  או מפסיד חצי מההשקעה בסיכוי  $\frac{1}{3}$ . השנים הן בלתי תלויות. נגדיר את  $X$  להיות שווי ההשקעה של אלון לאחר שנתיים. מצאו את פונקצית ההתפלגות המצטברת של  $X$

**פיתרון.** כפי שציינו בדוגמה ??, התומך של  $X$  כעת הוא

$$\text{supp}(X) = \{250, 1000, 4000\}.$$

על כן, פונקציית ההתפלגות המצטברת של  $X$  היא

$$F_X(k) = P(X \leq k) = \begin{cases} 0 & k < 250, \\ \frac{1}{9} & 250 \leq k < 1000, \\ \frac{5}{9} & 1000 \leq k < 4000, \\ 1 & 4000 \leq k. \end{cases}$$

■

**8 דוגמא. (תוחלת)** בן הוא סוחר מתוחכם ולכן הוא מציע לאלון להפקיד אצלו 100 שקלים בתחילת השנה. בסיכוי של  $\frac{2}{5}$  הסכום יוכפל, ובסיכוי  $\frac{2}{5}$  הסכום יצטמצם בחצי בסוף השנה. מה תהיה תוחלת הכסף של אלון לאחר קבלת ההצעה? נסמן ב- $X$  את שווי כסף של אלון בסוף השנה.

$$E[X] = 200 \cdot \frac{2}{5} + 50 \cdot \frac{3}{5} = 110.$$

זאת אומרת שהצעתו של בן מגלמת תוחלת רווח של 10%!

**9 דוגמא. (ליניאריות של תוחלת)** בחנות ירקות קטנה ישנם 3 תפוחים ו-4 אגסים. אלון קונה 2 פירות באקראי. בן המוכר מרוויח על כל תפוח 2 ש"ח ועל כל אגס 4 ש"ח. מצאו את תוחלת הרווח של בן.

**פיתרון.** נגדיר מ"מ  $Q$  עבור הרווח של בן, ומשתנה מקרי  $X$  כמספר התפוחים שאלון קנה. על כן,

$$Q = 2X + 4(2 - X) = 8 - 2X$$

$$P(X=1) = \frac{4}{7}, \quad P(X=2) = \frac{3}{7} \cdot \frac{2}{6} = \frac{1}{7}, \quad P(X=0) = \frac{4}{7} \cdot \frac{3}{6} = \frac{2}{7}.$$

מכאן נובע ש

$$E[X] = 0 \cdot \frac{2}{7} + 1 \cdot \frac{4}{7} + 2 \cdot \frac{1}{7} = \frac{6}{7}.$$

נשתמש בתכונת הליניאריות לחישוב התוחלת של

$$E[Q] = 8 - 2E[X] = 8 - \frac{12}{7} = \frac{44}{7}.$$

■

**10 דוגמא. (ליניאריות של תוחלת)** בוחרים קוד באורך 10 תווים, כאשר כל תו נבחר באקראי מתוך הספרות 0 - 9 ללא קשר לתווים האחרים שנבחרו. נסמן ב- $X$  מ"מ הסופרים את מספר הרצפים 11 בקוד. חשבו את  $E[X]$ .

**פיתרון.** נגדיר מ"מ  $X_i$ ,  $i = 1, \dots, 9$  כאשר  $X_i$  מקבל את הערך 1 אם ורק אם במקום ה- $i$  מתחיל רצף של 11. לכן

$$X = \sum_{i=1}^9 X_i.$$

$$\begin{aligned}
 E[X] &= E\left[\sum_{i=1}^9 X_i\right] \\
 &= \sum_{i=1}^9 E[X_i] \\
 &= \sum_{i=1}^9 [1 \cdot P(X_i = 1) + 0 \cdot P(X_i = 0)] \\
 &= \sum_{i=1}^9 P(X_i = 1) \\
 &= \sum_{i=1}^9 \frac{1}{10} \cdot \frac{1}{10} \\
 &= \frac{9}{100} .
 \end{aligned}$$

■

**11 דוגמא.** ריבית הלייבור במכללה שמעון נקבעת באקראי על ידי דגימה של אחד מעשרת הבנקים המסחריים. הבנקים ממסופרים מ-1 עד 10 כאשר בנק  $i$  מעניק ריבית בשיעור  $i$  ללקוחותיו. לאחר זמן מה נסגרו בנקים 1 ו-2 (בשל הענקת ריבית לא כדאית...). חשבו את הסיכוי שריבית הלייבור נמוכה מ-6 וכן את תוחלת ושונות הריבית. בצעו את החישובים עבור התקופה שקדמה לסגירת הבנקים ולאחר הסגירה.

**פיתרון.** נגדיר משתנה מקרי  $X$  להיות הריבית טרם הסגירה ו- $Y$  להיות הריבית לאחר שנסגרו הבנקים המדוברים. לכן

$$X \sim U[1, 10]$$

-1

$$Y \sim U[3, 10] .$$

כמו כן, לפי מסקנה ??

$$E[X] = \frac{10 + 1}{2} = 5.5$$

לפי מסקנה ??

$$V(X) = \frac{(10 - 1 + 1)^2 - 1}{12} = \frac{99}{12} .$$

באופן דומה עבור מאורע  $Y$ , לפי מסקנה ??

$$E[Y] = \frac{10 + 3}{2} = 6.5$$

לפי מסקנה ??

$$V(Y) = \frac{(10 - 3 + 1)^2 - 1}{12} = \frac{63}{12} .$$

$$P(Y \leq 5) = \frac{3}{8} = 0.375 , \quad P(X \leq 5) = \frac{5}{10} = 0.5 .$$

■