

אלגברה לינארית 1 למדמ"ח

מועד א'

מרצים: ד"ר זהבה צבי, ד"ר מרינה ברשדסקי, ד"ר ירמיהו מילר.

תשפ"ה סמסטר א'

השאלון מכיל 11 עמודים (כולל עמוד זה וכולל דף נוסחאות).

בהצלחה!

הנחיות למדור בחינות שאלוני בחינה

- לשאלון הבחינה יש לצרף מחברת.
- ניתן להשתמש במחשבון מדעי לא גרפי עם צג קטן.

חומר עזר

- דפי נוסחאות של הקורס (7 עמודים בפורמט A4), מצורפים לשאלון.

אחר / הערות יש לענות על השאלות באופן הבא:

- יש לנמק היטב כל שלב של פתרון. תשובה ללא הסבר וללא נימוק, אפילו נכונה, לא תתקבל.
- יש לפתור 4 מתוך 5 השאלות הבאות. משקל כל שאלה 25 נקודות.
- סדר התשובות אינו משנה, אך יש לרשום ליד כל תשובה את מספרה.
- הסבר היטב את מהלך הפתרון.
- יש לציין את השאלות שעניתם עליהן בתחילת המחברת.

שאלה 1 (25 נקודות)

תהי $A = \begin{pmatrix} -1 & 0 & 0 \\ 1 & 1 & 5 \\ -1 & -2 & -5 \end{pmatrix}$ נגדיר

$$W = \left\{ \begin{pmatrix} a+b \\ -b \\ a-b \end{pmatrix} \mid a, b \in \mathbb{R} \right\}, \quad U = \{v \in \mathbb{R}^3 \mid Av = -v\}.$$

(א) (7 נק') הוכיחו כי U, W תתי מרחבים של \mathbb{R}^3 .

(ב) (7 נק') מצאו בסיס ומימד של U, W .

(ג) (7 נק') מצאו בסיסים ומימדים ל- $U + W$ ול- $U \cap W$.

(ד) (4 נק') יהי \mathbb{F} שדה יהיו U, V מרחבים וקטורים מעל \mathbb{F} .

תהי $T: U \rightarrow V$ העתקה ליניארית. $\{u_1, u_2, \dots, u_k\}$ קבוצת וקטורים ב U . הוכיחו או הפריכו:
אם הקבוצה $\{T(u_1), T(u_2), \dots, T(u_k)\}$ בלתי תלויה ליניארית אז הקבוצה $\{u_1, u_2, \dots, u_k\}$ בלתי תלויה ליניארית. (אין קשר לסעיפים קודמים).

שאלה 2 (25 נקודות)

יהי $a \in \mathbb{R}$ פרמטר. נתבונן במטריצה

$$A = \begin{pmatrix} -a & a+2 & 2a \\ 2a+1 & -a-2 & -a^2-3a+6 \\ a & -a-2 & a^2-2a-4 \end{pmatrix}$$

(א) (7 נק') מצאו את כל ערכי הפרמטר a שעבורם המטריצה אינה הפיכה.

(ב) (7 נק') עבור $a = -1$ מצאו בסיס ומימד של $\text{col}(A)$ ול- $\text{Nul}(A)$.

(ג) (6 נק') עבור $a = -1$ מצאו בסיס ומימד של $\text{col}(A) \cap \text{Nul}(A)$.

(ד) (5 נק')

יהי \mathbb{F} שדה. תהי $A \in \mathbb{F}^{n \times n}$ כך שלכל מטריצה $B \in \mathbb{F}^{n \times n} \neq 0$ מתקיים $AB \neq 0$.
הוכיחו כי A הפיכה. (אין קשר לסעיפים קודמים).

שאלה 3 (25 נקודות)

(א) (7 נק') במרחב $\mathbb{R}_3[x]$ נתונים וקטורים

$$u_1 = 1 + 2x + x^2 + 3x^3, \quad u_2 = 2 - x + x^2 + 2x^3, \quad u_3 = -1 + 8x + x^2 + 5x^3, \quad w = a + x + bx^2 + 5x^3.$$

עבור אילו ערכי a, b הוקטור w שייך לתת המרחב הנפרש על ידי הוקטורים u_1, u_2, u_3 ?

(ב) (7 נק') עבור הערכים של a, b שמצאתם בסעיף א', בטאו את הוקטור w כצירוף לינארי של u_1, u_2, u_3 .

(ג) (5 נק') האם הוקטורים u_1, u_2, u_3, w פורשים את המרחב $\mathbb{R}_3[x]$? נמקו את תשובתכם.

(ד) (3 נק') הוכיחו או הפריכו:

לכל $A \in \mathbb{R}^{5 \times 3}$ קיים $b \in \mathbb{R}^5$ כך שלמשוואה $AX = b$ אין פתרון.
(אין קשר לסעיפים קודמים).

(ה) (3 נק') תהי $A \in \mathbb{R}^{n \times n}$ מטריצה הפיכה ויהי $b \in \mathbb{R}^n$. הוכיחו או הפריכו:
למערכת $Ax = b$ יש יותר מפתרון אחד.
(אין קשר לסעיפים קודמים).

שאלה 4 (25 נקודות)

(א) (8 נק') פתרו את המערכת הליניארית הבאה מעל \mathbb{C} :

$$\begin{cases} 2ix + (4 - 2i)y + 4z = 6 - 4i, \\ 2x + (-2 - 4i)y + (1 - 2i)z = 1 - i, \\ (1 + i)x + (1 - 3i)y + (3 + i)z = 7 + 3i. \end{cases}$$

(ב) (7 נק') קבעו לאילו ערכים של a הוקטורים הבאים תלויים ליניארית מעל \mathbb{C} :

$$\begin{pmatrix} 1 \\ a \\ 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ a+1 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ a-1 \end{pmatrix}.$$

(ג) (5 נק') יהי \mathbb{F} שדה. תהיינה מטריצות $A, B \in \mathbb{F}^{m \times n}$. הוכיחו או הפריכו:
אם ב- A יש שורת אפסים אז $\dim(\text{col}(A)) < n$. (אין קשר לסעיפים קודמים).

(ד) (5 נק') תהיינה מטריצות $A, B \in \mathbb{R}^{n \times n}$. הוכיחו או הפריכו:
אם $AB = B$ ו- $B \neq 0$ אז A מטריצה היחידה. (אין קשר לסעיפים קודמים).

שאלה 5 (25 נקודות)

נתונה העתקה לינארית $T : \mathbb{R}_3[x] \rightarrow \mathbb{R}^{2 \times 2}$ המוגדרת ע"י:

$$T(a + bx + cx^2 + dx^3) = \begin{pmatrix} a + 3b + 4c - 3d & b + 3c - 2d \\ a + c & 3a + 7b + 6c - 5d \end{pmatrix}$$

לכל $a + bx + cx^2 + dx^3 \in \mathbb{R}_3[x]$.

- א) (5 נק') מצאו את המטריצה המייצגת הסטנדרטית של T .
- ב) (5 נק') האם T על? האם T חד-חד ערכית? נמקו תשובתכם.
- ג) (5 נק') מצאו בסיס ואת המימד של $\text{Im}T$ ותנו דוגמה לאיבר בתמונה של T פרט מאיברי הבסיס.
- ד) (5 נק') מצאו בסיס ואת המימד של $\text{Ker}T$. תנו דוגמה לאיבר בגרעין של T פרט איברי הבסיס.
- ה) (5 נק') מצאו את כל הוקטורים $a + bx + cx^2 + dx^3 \in \mathbb{R}_3[x]$ כך ש-

$$T(a + bx + cx^2 + dx^3) = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 1 & 3 \end{pmatrix}.$$

פתרונות

שאלה 1

א) נוכיח כי U תת-מרחב:

שיטה 1

$$U = \{v \in \mathbb{R}^3 \mid Av = -v\} \Rightarrow U = \{v \in \mathbb{R}^3 \mid Av + v = 0\} \Rightarrow U = \{v \in \mathbb{R}^3 \mid (A + I)v = 0\}$$

ז"א $U = \text{Nul}(A + I)$. מרחב האפס של כל מרטיצה היא תת-מרחב לכן U תת-מרחב.

שיטה 2

נבדוק שכל ה-3 תנאים של תת-מרחב מתקיים:

(1) יהיו $v_1, v_2 \in \mathbb{R}^3$ שני וקטורים שונים אשר שייכים ל- U .
ז"א $Av_1 = -v_1$ וגם $Av_2 = -v_2$ לכן

$$A(v_1 + v_2) = -(v_1 + v_2)$$

לכן $v_1 + v_2 \in U$.

(2) יהי $v_1 \in \mathbb{R}^3$ וקטור ששייך ל- U ו- $\alpha \in \mathbb{R}$ סקלר.
ז"א

$$Av_1 = -v_1 \Rightarrow \alpha Av_1 = -\alpha v_1 \Rightarrow A(\alpha v_1) = -\alpha v_1$$

לכן $\alpha v_1 \in U$.

(3) יהי 0 וקטור האפס של \mathbb{R}^3 .

$$A \cdot 0 = -0$$

לכן $0 \in U$.

נוכיח כי W תת-מרחב:

שיטה 1

$$W = \left\{ \begin{pmatrix} a+b \\ -b \\ a-b \end{pmatrix} \mid a, b \in \mathbb{R} \right\} \Rightarrow W = \left\{ a \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix} + b \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \\ -1 \end{pmatrix} \mid a, b \in \mathbb{R} \right\}$$

$$W = \text{span} \left\{ \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \\ -1 \end{pmatrix} \right\} \quad \text{ז"א}$$

כל פרישה היא תת-מרחב לכן W תת-מרחב.

שיטה 2

נבדוק שכל ה-3 תנאים של תת-מרחב מתקיים:

(1) יהיו $v_1, v_2 \in \mathbb{R}^3$ שני וקטורים שונים אשר שייכים ל- U .
 ז"א $v_1 = \begin{pmatrix} a_1 + b_1 \\ -b_1 \\ a_1 - b_1 \end{pmatrix}$ כאשר $a_1, b_1 \in \mathbb{R}$ וגם $v_2 = \begin{pmatrix} a_2 + b_2 \\ -b_2 \\ a_2 - b_2 \end{pmatrix}$ כאשר $a_2, b_2 \in \mathbb{R}$ לכן

$$v_1 + v_2 = \begin{pmatrix} a_1 + a_2 + b_1 + b_2 \\ -b_1 - b_2 \\ a_1 + a_2 - b_1 - b_2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} a + b \\ -b \\ a - b \end{pmatrix},$$

כאשר $a = a_1 + a_2, b = b_1 + b_2$ לכן $v_1 + v_2 \in W$.

(2) יהי $v_1 \in \mathbb{R}^3$ וקטור ששייך ל- W ו- $\alpha \in \mathbb{R}$ סקלר.
 ז"א

$$\alpha v_1 = \begin{pmatrix} \alpha a_1 + \alpha b_1 \\ -\alpha b_1 \\ \alpha a_1 - \alpha b_1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} a + b \\ -b \\ a - b \end{pmatrix},$$

כאשר $a = \alpha a_1, b = \alpha b_1$ לכן $\alpha v_1 \in U$.

(3) יהי $\begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}$ וקטור האפס של \mathbb{R}^3 .

$$\begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} a + b \\ -b \\ a - b \end{pmatrix}$$

כאשר $a = 0, b = 0$ לכן $0 \in W$.

(ב)

(ג)

(ד) נניח בשלילה כי יש שני פתרונות $x_1 \neq x_2$. אז

$$Mx_1 = b \quad Mx_2 = b$$

ז"א

$$Mx_1 - Mx_2 = b - b = 0.$$

המכללה האקדמית להנדסה סמי שמעון

מכאן

$$M(x_1 - x_2) = 0.$$

M הפכייה לכן קיימת M^{-1} כך ש-

$$M^{-1}M(x_1 - x_2) = 0 \Rightarrow I(x_1 - x_2) = 0x_1 - x_2 = 0 \Rightarrow x_1 = x_2$$

בסתירה לכך ש- $x_1 \neq x_2$ לכן קיים רק פתרון יחיד.

שאלה 2

(א)

(ב)

(ג)

(ד) טענה לא נכונה. דוגמה נגדית: $A = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}, B = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}$

$$AB = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 0 \end{pmatrix} = B$$

הרי $AB = B$ ו- $A \neq I$.

שאלה 3

(א)

$$\begin{pmatrix} 1 & 2 & -1 & | & a \\ 2 & -1 & 8 & | & 1 \\ 1 & 1 & 1 & | & b \\ 3 & 2 & 5 & | & 5 \end{pmatrix} \xrightarrow{\substack{R_2 - 2R_1 \\ R_3 - R_1 \\ R_4 - 3R_1}} \begin{pmatrix} 1 & 2 & -1 & | & a \\ 0 & -5 & 10 & | & 1 - 2a \\ 0 & -1 & 2 & | & b - a \\ 0 & -4 & 8 & | & 5 - 3a \end{pmatrix} \xrightarrow{R_2 \leftrightarrow R_3} \begin{pmatrix} 1 & 2 & -1 & | & a \\ 0 & -1 & 2 & | & b - a \\ 0 & -5 & 10 & | & 1 - 2a \\ 0 & -4 & 8 & | & 5 - 3a \end{pmatrix}$$

$$\xrightarrow{R_2 \rightarrow -R_2} \begin{pmatrix} 1 & 2 & -1 & | & a \\ 0 & 1 & -2 & | & a - b \\ 0 & -5 & 10 & | & 1 - 2a \\ 0 & -4 & 8 & | & 5 - 3a \end{pmatrix} \xrightarrow{\substack{R_3 \rightarrow R_3 + 5R_2 \\ R_4 \rightarrow R_4 + 4R_2}} \begin{pmatrix} 1 & 2 & -1 & | & a \\ 0 & 1 & -2 & | & a - b \\ 0 & 0 & 0 & | & 1 - 5b + 3a \\ 0 & 0 & 0 & | & 5 + a - 4b \end{pmatrix}$$

לכל $5 + a - 4b = 0, 1 - 5b + 3a = 0$ יש פתרון w צירוף ליניארי של u_1, u_2, u_3 .

ז"א לכל $a = 3, b = 2$ יש פתרון ואז w צירוף ליניארי של u_1, u_2, u_3 .
נציב $a = 3, b = 2$:

(ב)

$$\left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 2 & -1 & a \\ 0 & 1 & -2 & a-b \\ 0 & 0 & 0 & 1-5b+3a \\ 0 & 0 & 0 & 5+a-4b \end{array} \right) \xrightarrow{a=3, b=2} \left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 2 & -1 & 3 \\ 0 & 1 & -2 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{array} \right)$$

הפתרון למערכת זו היא

$$\begin{pmatrix} 1-3t \\ 1+2t \\ t \end{pmatrix}, \quad t \in \mathbb{R}$$

לכן

$$(1-3t)u_1 + (1+2t)u_2 + tu_3 = w$$

לכל $t \in \mathbb{R}$. למשל אם נציב $t=0$:

$$u_1 + u_2 = w$$

למשל אם נציב $t=1$:

$$-2u_1 + 3u_2 + u_3 = w$$

(ג) $\dim \{u_1, u_2, u_3, w\} = 2$ ו- $\dim \mathbb{R}_3[x] = 4$ לכן לא אפשרי שוקטורים $\{u_1, u_2, u_3, w\}$ פורשים $\mathbb{R}_3[x]$.

(ד) טענה נכונה.

אם v_1, \dots, v_k תלויים לינארית אז קיימים סקלרים לא כולם אפסים עבורם

$$\alpha_1 v_1 + \dots + \alpha_k v_k = 0$$

לכן

$$T(\alpha_1 v_1 + \dots + \alpha_k v_k) = T(0) = 0.$$

T העתקה לינארית לכן $T(0) = 0$ ולפי התכונת הליניאריות של העתקה לינארית נקבל

$$\alpha_1 T(v_1) + \dots + \alpha_k T(v_k) = 0.$$

מכיוון שמובטח שלא כל המקדמים אפסים אז נקבל כי $T(v_1), \dots, T(v_k)$ תלויים לינארית.

שאלה 4

(א) טענה לא נכונה. דוגמה נגדית:

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 0 \end{pmatrix} \in \mathbb{R}^3 \text{ לכל } b \text{ למשוואה } Ax = b \text{ יש פתרון.}$$

(ב) טענה נכונה.

אם $A \in \mathbb{R}^{5 \times 3}$ אז ל- A יש 5 שורות ו-3 עמודות.
לכן במדורגת יש לכל היותר 3 עמודות מובילות ולכן 2 שורות האחרונות הן שורות אפסים.
לכן קיים וקטור $b \in \mathbb{R}^5$ שאיננו צירוף ליניארי של העמודות של A , כי ייתכן שורת סתירה.

(ג) נניח בשלילה כי A לא הפיכה.

אז קיים וקטור $v \neq 0 \in \mathbb{F}^n$ עבורו $Av = 0$.

לכן קיים וקטור $B = \begin{pmatrix} | & | & \cdots & | \\ v & v & \cdots & v \\ | & | & \cdots & | \end{pmatrix}$ כך ש- $AB = 0$ ו- $B \neq 0$. בסתירה לכך שלכל $B \neq 0$ מתקיים $AB \neq 0$.

(ד) יהי $v \in V$.

T "על" ולכן קיים $u \in U$ כך ש- $T(u) = v$.

$\{u_1, \dots, u_k\}$ פורשת את U ולכן קיימים סקלרים $\alpha_1, \dots, \alpha_k$ עבורם

$$u = \alpha_1 u_1 + \dots + \alpha_k u_k.$$

מכיוון ש- T העתקה ליניארית אז

$$v = T(u) = T(\alpha_1 u_1 + \dots + \alpha_k u_k) = \alpha_1 T(u_1) + \dots + \alpha_k T(u_k)$$

ז"א הקבוצה $\{T(u_1), \dots, T(u_k)\}$ פורשת את V .

שאלה 5

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 3 & 4 & -3 \\ 0 & 1 & 3 & -2 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 3 & 7 & 6 & -5 \end{pmatrix} \quad (\text{א})$$

(ב) נדרג את A :

$$\begin{pmatrix} 1 & 3 & 4 & -3 \\ 0 & 1 & 3 & -2 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 3 & 7 & 6 & -5 \end{pmatrix} \xrightarrow{R_3 \leftrightarrow R_4} \begin{pmatrix} 1 & 3 & 4 & -3 \\ 0 & 1 & 3 & -2 \\ 3 & 7 & 6 & -5 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} \xrightarrow{R_3 - 3R_1} \begin{pmatrix} 1 & 3 & 4 & -3 \\ 0 & 1 & 3 & -2 \\ 0 & -2 & -6 & 4 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

$$\xrightarrow{R_3 + 2R_2} \begin{pmatrix} 1 & 3 & 4 & -3 \\ 0 & 1 & 3 & -2 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

לא כל השורות מובילות לכן T לא "על".

לא כל העמודות מובילות לכן T לא "חד-חד-ערכית".

(ג)

$$\text{col}(A) = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \\ 3 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 3 \\ 1 \\ 0 \\ 7 \end{pmatrix}$$

$$\text{Im}(T) = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 3 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 3 & 1 \\ 0 & 7 \end{pmatrix}$$

$$\dim \text{Im}(T) = 2$$

(ד)

$$\text{Nul}(A) = \text{span} \left\{ \begin{pmatrix} 5 \\ -3 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} -3 \\ 2 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix} \right\}.$$

$$\text{Ker}(T) = \text{span} \{ 5 - 3x + x^2, -3 + 2x + x^3 \}.$$

$$\dim \text{ker}(T) = 2$$

(ה) יש לפתור את המערכת

$$A \begin{pmatrix} a \\ b \\ c \\ d \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}$$

$$\left(\begin{array}{cccc|c} 1 & 3 & 4 & -3 & 1 \\ 0 & 1 & 3 & -2 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 1 \\ 3 & 7 & 6 & -5 & 0 \end{array} \right) \xrightarrow{R_3 \leftrightarrow R_4} \left(\begin{array}{cccc|c} 1 & 3 & 4 & -3 & 1 \\ 0 & 1 & 3 & -2 & 0 \\ 3 & 7 & 6 & -5 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 1 \end{array} \right) \xrightarrow{R_3 \rightarrow R_3 - 3R_1} \left(\begin{array}{cccc|c} 1 & 3 & 4 & -3 & 1 \\ 0 & 1 & 3 & -2 & 0 \\ 0 & -2 & -6 & 4 & -3 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 1 \end{array} \right)$$

$$\xrightarrow{R_3 \rightarrow R_3 + 2R_1} \left(\begin{array}{cccc|c} 1 & 3 & 4 & -3 & 1 \\ 0 & 1 & 3 & -2 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & -3 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 1 \end{array} \right) \xrightarrow{R_4 \rightarrow 3R_4 + R_3} \left(\begin{array}{cccc|c} 1 & 3 & 4 & -3 & 1 \\ 0 & 1 & 3 & -2 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & -3 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{array} \right)$$

יש שורת סתירה במדורגת ולכן למערכת הזאת לא קיים פתרון.