

# אלגברה לינארית סמסטר סתו 2022-23

## עבודה עצמית 7

**שאלה 1** לכל אחת מהקבוצות הבאות קבע האם היא ת"ל או בת"ל:

(א)  $\{(1, 2, 3), (4, 5, 6), (7, 8, 11)\}$

(ב)  $\{(2, 1, -1), (1, -2, 1), (7, -4, 1)\}$

(ג)  $\{(2, 1, -1), (1, -2, 1)\}$

לכל אחת מהקבוצות התלויות לינארית שמצאות, רשמו צרוף לינארי לא טריוויאלי של איברי הקבוצה הנותן את וקטור האפס.

**שאלה 2**

תן דוגמא לשתי קבוצות  $S, T$  המוכלות ב-  $\mathbb{R}^4$  כך ש-  $S \subseteq T$  ומתקיים:

(א)  $T$  בת"ל ו-  $S$  בת"ל.

(ב)  $T$  ת"ל ו-  $S$  ת"ל.

(ג)  $T$  ת"ל ו-  $S$  בת"ל.

**שאלה 3**

תהייה  $X \subseteq Y$  קבוצות של וקטורים ב-  $\mathbb{R}^n$ . הוכח או הפרך:

(א) אם  $X$  בת"ל אז  $Y$  בת"ל.

(ב) אם  $Y$  בת"ל אז  $X$  בת"ל.

(ג) אם  $0 \in X$  אז  $X$  ת"ל.

(ד) אם מספר הוקטורים ב-  $X$  קטן מ-  $n$  אז  $X$  בת"ל.

**שאלה 4** נתונה הקבוצה

$$\left\{ u_1 = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix}, u_2 = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ a \end{pmatrix}, u_3 = \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ a \end{pmatrix} \right\}$$

(א) מצאו לאילו ערכי  $a$  הקבוצה היא בת"ל.

(ב) מצאו לאילו ערכי  $a$  הקבוצה פורשת את  $\mathbb{R}^3$ .

(ג) לכל אחד מערכי  $a$  עבורם הקבוצה אינה בת"ל, בטאו את אחד הוקטורים כצ"ל של שני האחרים.

(ד) נתונה הקבוצה

$$\left\{ \begin{pmatrix} 5 \\ a+4 \\ 3 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 4 \\ a-5 \\ 6 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 3 \\ a^2+\sqrt{5} \\ 9 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 2 \\ 8a \\ 9a-4 \end{pmatrix} \right\}$$

מצאו לאילו ערכי  $a$  הקבוצה היא בת"ל.

**שאלה 5** תהי  $\{v_1, v_2, v_3\}$  קבוצה בת"ל ב-  $\mathbb{R}^n$ . הוכח:

(א) הקבוצה  $\{v_1 + v_2 + v_3, v_2 + v_3, 2v_1 + 3v_2\}$  היא בת"ל.

(ב) הקבוצה  $\{v_1 + v_2 + v_3, v_2 + v_3, 2v_1 + 3v_2 + 3v_3\}$  היא ת"ל.

**שאלה 6** תהי  $S = \{v_1, v_2, v_3, v_4\}$  קבוצת בת"ל ב-  $\mathbb{R}^n$ . קבע לאילו ערכים של  $k$  מתקיים:

הקבוצה

$$T = \{v_1 + v_3 + kv_4, v_1 + v_2 + 2v_3 + v_4, 2v_1 + 2v_3 - v_4, kv_1 - v_2 + kv_3 - 2v_4\}$$

בת"ל. לכל אחד מערכי  $k$  עבורו הקבוצה  $T$  היא ת"ל, רשמו את אחד הוקטורים ב-  $T$  כצירוף לינארי של שאר הוקטורים ב-  $T$ .

**שאלה 7** לכל אחת מהקבוצות הבאות קבע האם היא תלויה לינארית. אם כן, רשום צ"ל לא טריויאלי של איברי הקבוצה הנותן את וקטור האפס.

(א)

$$\{2t^3 + t^2 + t + 1, 3t^3 + 3t + 2, t^3 + 2t^2 - 2t + 1\}$$

(ב)

$$\{3t^3 + 8t^2 - 8t + 7, t^3 + 4t^2 - 2t + 3, t^3 + 6t^2 - t + 4\}$$

(ג)

$$\{t^3 + 3t^2 + 6t + 3, -3t^3 + 2t - 1, t^3 + t^2 - t\}$$

(ד)

$$\{2t^3 + t^2 + t + 1, 3t^3 + 2, t, 0\}$$

**שאלה 8** לכל אחת מהקבוצות הבאות קבע האם היא תלויה לינארית. אם כן, רשום צ"ל לא טריויאלי של איברי הקבוצה הנותן את וקטור האפס.

(א)

$$\begin{pmatrix} 0 & 2 \\ -1 & 0 \end{pmatrix}, \quad \begin{pmatrix} 2 & 0 \\ 5 & 1 \end{pmatrix}, \quad \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}.$$

(ב)

$$\begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 2 & 3 \end{pmatrix}, \quad \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}, \quad \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ -1 & 7 \end{pmatrix}.$$

(ג)

$$\begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 2 & 3 \end{pmatrix}, \quad \begin{pmatrix} 2 & 3 \\ 5 & 7 \end{pmatrix}, \quad \begin{pmatrix} 0 & 3 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}, \quad \begin{pmatrix} 1 & 4 \\ 1 & 2 \end{pmatrix}, \quad \begin{pmatrix} 1 & 3 \\ 1 & 4 \end{pmatrix}.$$

**שאלה 9** לאילו ערכי  $k$  הקבוצה  $\left\{ \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 2 & 3 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 2 & 3 \\ 5 & 7 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ -1 & k \end{pmatrix} \right\}$  היא ת"ל?

**שאלה 10** נסמן  $g(t) = e^t + 5e^{2t-1} - 3e^{3t-1}$

$$T = \{f_1 = e^{t+1}, f_2(t) = e^{2t-1}, f_3(t) = e^{3t}\}.$$

האחרים  $g(t) \in \text{sp}(T)$ ? אם כן, הציגו אותו כצ"ל של איברי  $T$ . הסבירו מדוע  $T \cup \{g(t)\}$  ת"ל?

**שאלה 11** נתונות הקבוצות הבאות במרחב הוקטורי של כל הפונקציות מ- $\mathbb{R}$  ל- $\mathbb{R}$ . הראו שכל אחת מהקבוצות היא בת"ל.

(א)

$$\{f_1 = \sin t, f_2(t) = \cos t, f_3(t) = t\}.$$

(ב)

$$\{f_1 = 1, f_2(t) = t + 1, f_3(t) = e^{t+1}\}.$$

(ג)

$$\{f_1 = e^{t+1}, f_2(t) = e^{2t+1}, f_3(t) = e^{3t+1}\}.$$

**שאלה 12** נסמן ב- $F(\mathbb{R})$  את המרחב הווקטורי של כל הפונקציות מ- $\mathbb{R}$  ל- $\mathbb{R}$ .

(א)

תן דוגמה של שלושה ווקטורים תלויים ליניארית ב- $F(\mathbb{R})$ .

(ב)

תהייה  $f_1(x), \dots, f_n(x)$  פונקציות גזירות. הוכח או הפוך:  
 1. אם הקבוצה  $\{f_1(x), \dots, f_n(x)\}$  ת"ל אז גם הקבוצה  $\{f'_1(x), \dots, f'_n(x)\}$  ת"ל.  
 2. אם הקבוצה  $\{f'_1(x), \dots, f'_n(x)\}$  ת"ל אז גם הקבוצה  $\{f_1(x), \dots, f_n(x)\}$  ת"ל.

## פתרונות

### שאלה 1

(א)

שיטה 1

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 4 & 7 \\ 2 & 5 & 8 \\ 3 & 6 & 11 \end{pmatrix}, \quad \text{Det}(A) = -6,$$

$\text{Det}(A) \neq 0$  לכן הוקטורים בת"ל.

שיטה 2

$$\begin{pmatrix} 1 & 4 & 7 \\ 2 & 5 & 8 \\ 3 & 6 & 11 \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} 1 & 4 & 7 \\ 0 & -3 & -6 \\ 0 & 0 & 2 \end{pmatrix}$$

כל העמודות מובילות לכן הוקטורים בת"ל. ■

(ב)

שיטה 1

$$A = \begin{pmatrix} 2 & 1 & 7 \\ 1 & -2 & -4 \\ -1 & 1 & 1 \end{pmatrix}, \quad \text{Det}(A) = 0$$

לכן הוקטורים ת"ל.

שיטה 2

$$\begin{pmatrix} 2 & 1 & 7 \\ 1 & -2 & -4 \\ -1 & 1 & 1 \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} 1 & 0 & 2 \\ 0 & 1 & 3 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

יש שתי עמודות מובילות לכן הוקטורים ת"ל.  $k_2 = -3, k_2 = -3k_3, k_1 = -2k_3$ .

$$-2(1, 2, -1) - 3(1, -2, 1) + (7, -4, 1) = \vec{0}.$$

■

(ג)

שיטה 1

$$A = \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 1 & -2 \\ -1 & 1 \end{pmatrix}, \quad \text{Det}(A^t A) = 35,$$

$\text{Det}(A^t A) \neq 0$  לכן הקבוצה בת"ל.

שיטה 2

$$A = \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 1 & -2 \\ -1 & 1 \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 0 & 5 \\ 0 & 3 \end{pmatrix}$$

שתי עמודות מובילות, לכן הוקטורים בת"ל.

■

## שאלה 2

(א)

$$T = \left\{ \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} \right\}, \quad S = \left\{ \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} \right\}$$

■

(ב)

$$T = \{\bar{0}\}, \quad S = \{\bar{0}\}$$

■

(ג)

$$T = \left\{ \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 2 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} \right\}, \quad S = \left\{ \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} \right\}$$

■

## שאלה 3

(א) נתון:  $X \subseteq Y, X, Y \in \mathbb{R}^n$ .

טענה:  $X$  בת"ל  $\Leftarrow Y$  בת"ל.

דוגמה נגדית:

$$X = \left\{ \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix} \right\} \subseteq \mathbb{R}^2, \text{ בת"ל, } Y = \left\{ \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 2 \\ 0 \end{pmatrix} \right\} \subseteq \mathbb{R}^2, \text{ בת"ל.}$$

■

(ב) נתון:  $X \subseteq Y, Y$  בת"ל.

צריך להוכיח:  $X$  בת"ל.

הוכחה:

נניח מדרך השלילה,  $X = \{v_1, \dots, v_n\}$  בת"ל. לכן קיימים סקלרים  $k_1, \dots, k_n$  שלא כולם אפסים כך ש-  $k_1 v_1 + \dots + k_n v_n = \bar{0}$ .  $v_1, \dots, v_n \in Y \Leftarrow X \subseteq Y$ . מכאן נובע ש  $Y$  בת"ל. סתירה. ■

(ג) נתון:  $\bar{0} \in X, X \subseteq Y$ .

צ"ל:  $X$  בת"ל

הוכחה:

לכל  $v_1, \dots, v_n \in X$  מתקיים

$$0 \cdot v_1 + \dots + 0 \cdot v_n + 1 \cdot \bar{0} = \bar{0}.$$

לכן  $X$  בת"ל. ■

(ד) טענה: מספר הוקטורים ב-  $X$  קטן מ-  $n \Leftarrow X$  בת"ל.

דוגמה נגדית:

$$X = \left\{ \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \end{pmatrix} \right\} \in \mathbb{R}^2, \text{ בת"ל.}$$

■

(א) הקבוצה בת"ל אם כל העמודות מובילות במטריצה מדורגת:

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 2 \\ 1 & a & a \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 1 \\ 0 & a-1 & a-1 \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 0 & a-1 & a-1 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

עבור  $a \neq 1$  יש שלוש עמודות מובילות, לכן  $u_3, u_2, u_1$  בת"ל. ■

■ (ב)

(ג)  $a = 1$ :

$$\left( \begin{array}{cc|c} 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 2 \\ 1 & 1 & 1 \end{array} \right) \rightarrow \left( \begin{array}{cc|c} 1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 \end{array} \right)$$

$$k_2 \in \mathbb{R}, k_3 = 0, k_1 = -k_2 \\ k_1 = -1 \Leftarrow k_2 = 1$$

$$-u_1 + 2u_2 + 0 \cdot u_3 = \bar{0}$$

■

(ד) אי אפשר שהקבוצה של 4 וקטורים השייכים ל  $\mathbb{R}^3$  תהיה בת"ל: יש בקבוצה יותר וקטורים מן המימד של המרחב:  $\text{Dim}(\mathbb{R}^3) = 3$ . ■

## שאלה 5

(א) שיטה 1:

הקבוצה  $S = \{v_1 + v_2 + v_3, v_2 + v_3, 2v_1 + 3v_2\}$  בת"ל אם למטריצה  $A = \begin{pmatrix} v_1 + v_2 + v_3 & v_2 + v_3 & 2v_1 + 3v_2 \end{pmatrix}$  יש דטרמיננטה שונה מ-0.

$$A = \begin{pmatrix} v_1 + v_2 + v_3 & v_2 + v_3 & 2v_1 + 3v_2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} v_1 & v_2 & v_3 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} 1 & 0 & 2 \\ 1 & 1 & 3 \\ 1 & 1 & 0 \end{pmatrix}$$

ואז

$$\det(A) = \det \begin{pmatrix} v_1 & v_2 & v_3 \end{pmatrix} \det \begin{pmatrix} 1 & 0 & 2 \\ 1 & 1 & 3 \\ 1 & 1 & 0 \end{pmatrix} = -3 \cdot \det \begin{pmatrix} v_1 & v_2 & v_3 \end{pmatrix}.$$

$\det \begin{pmatrix} v_1 & v_2 & v_3 \end{pmatrix} \neq 0$  בגלל שהקבוצה  $\{v_1, v_2, v_3\}$  בת"ל. לכן  $\det(A) \neq 0$  והקבוצה  $S$  בת"ל.

שיטה 2:

$$k_1(v_1 + v_2 + v_3) + k_2(v_2 + v_3) + k_3(2v_1 + 3v_2) = \bar{0}$$

$$(k_1 + 2k_3)v_1 + (k_1 + k_2 + 3k_3)v_2 + (k_1 + k_2)v_3 = \bar{0}$$

$v_1, v_2, v_3$  בת"ל לכן

$$\left. \begin{array}{l} k_1 + 2k_3 = 0 \\ k_1 + k_2 + 3k_3 = 0 \\ k_1 + k_2 = 0 \end{array} \right\} \left( \begin{array}{ccc} 1 & 0 & 2 \\ 1 & 1 & 3 \\ 1 & 1 & 0 \end{array} \right) \rightarrow \left( \begin{array}{ccc} 1 & 0 & 2 \\ 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & -3 \end{array} \right)$$

למערכת פתרון יחיד:  $k_3 = 0, k_2 = 0, k_1 = 0$  לכן הוקטורים בת"ל. ■

שיטה 1:

(ב)

הקבוצה  $S = \{v_1 + v_2 + v_3, v_2 + v_3, 2v_1 + 3v_2 + 3v_3\}$  ת"ל אם למטריצה  $A = \begin{pmatrix} v_1 + v_2 + v_3 & v_2 + v_3 & 2v_1 + 3v_2 + 3v_3 \end{pmatrix}$  יש דטרמיננטה שווה ל-0.

$$A = \begin{pmatrix} v_1 + v_2 + v_3 & v_2 + v_3 & 2v_1 + 3v_2 + 3v_3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} v_1 & v_2 & v_3 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} 1 & 0 & 2 \\ 1 & 1 & 3 \\ 1 & 1 & 3 \end{pmatrix}$$

ואז

$$\det(A) = \det \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 1 \\ 2 & 3 & 3 \end{pmatrix} \det \begin{pmatrix} v_1 & v_2 & v_3 \end{pmatrix} = 0 \cdot \det \begin{pmatrix} v_1 & v_2 & v_3 \end{pmatrix} = 0.$$

לכן הקבוצה  $S$  ת"ל.

שיטה 2:

$$k_1(v_1 + v_2 + v_3) + k_2(v_2 + v_3) + k_3(2v_1 + 3v_2 + 3v_3) = \bar{0}$$

$$(k_1 + 2k_3)v_1 + (k_1 + k_2 + 3k_3)v_2 + (k_1 + k_2 + 3k_3)v_3 = \bar{0}$$

$v_1, v_2, v_3$  בת"ל לכן

$$\left. \begin{array}{l} k_1 + 2k_3 = 0 \\ k_1 + k_2 + 3k_3 = 0 \\ k_1 + k_2 + 3k_3 = 0 \end{array} \right\} \left( \begin{array}{ccc} 1 & 0 & 2 \\ 1 & 1 & 3 \\ 1 & 1 & 3 \end{array} \right) \rightarrow \left( \begin{array}{ccc} 1 & 0 & 2 \\ 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 0 \end{array} \right)$$

$k_3 \in \mathbb{R}, k_2 = -k_3, k_1 = -2k_3$  למערכת יש פתרון לא טריוויאלי, לכן הוקטורים ת"ל. ■



## שאלה 6

### שיטה 1

הקבוצה  $T$  בת"ל אס"ס

$$x(v_1 + v_3 + kv_4) + y(v_1 + v_2 + 2v_3 + v_4) + z(v_1 + 2v_3 - v_4) + w(kv_1 - v_2 + kv_3 - 2v_4) = 0$$

מתקיימת רק אם  $(x, y, z, w) = (0, 0, 0, 0)$

$$(x + y + z + kw)v_1 + (y + w)v_2 + (x + 2y + 2z + k)v_3 + (kx + y - z - 2w)v_4 = 0$$

תהי  $A = (v_1 + v_3 + kv_4 \quad v_1 + v_2 + 2v_3 + v_4 \quad 2v_1 + 2v_3 - v_4 \quad kv_1 - v_2 + kv_3 - 2v_4)$  ניתן לכתוב  $A$  בצורה

$$A = (v_1 \quad v_2 \quad v_3 \quad v_4) \cdot \begin{pmatrix} 1 & 1 & 2 & k \\ 0 & 1 & 0 & -1 \\ 1 & 2 & 2 & k \\ k & 1 & -1 & -2 \end{pmatrix}.$$

$$T \text{ בת"ל אס"ס } \neq 0 \quad \det \begin{pmatrix} 1 & 1 & 2 & k \\ 0 & 1 & 0 & -1 \\ 1 & 2 & 2 & k \\ k & 1 & -1 & -2 \end{pmatrix}$$

$$\begin{aligned} \begin{vmatrix} 1 & 1 & 2 & k \\ 0 & 1 & 0 & -1 \\ 1 & 2 & 2 & k \\ k & 1 & -1 & -2 \end{vmatrix} &= \begin{vmatrix} 1 & 1 & 0 & k \\ 0 & 1 & 0 & -1 \\ 1 & 2 & 0 & k \\ k & 1 & -1 & -2k \end{vmatrix} \\ &= (-1 - 2k) \cdot \begin{vmatrix} 1 & 1 & k \\ 0 & 1 & -1 \\ 1 & 2 & k \end{vmatrix} \\ &= (-1 - 2k) \cdot \begin{vmatrix} 1 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & -1 \\ 1 & 2 & 0 \end{vmatrix} \\ &= (-1 - 2k) \cdot (-1) \\ &= 1 + 2k. \end{aligned}$$

ולכן הקבוצה בת"ל אס  $k \neq -\frac{1}{2}$ .

### שיטה 2

$$x(v_1 + v_3 + kv_4) + y(v_1 + v_2 + 2v_3 + v_4) + z(v_1 + 2v_3 - v_4) + w(kv_1 - v_2 + kv_3 - 2v_4) = 0$$

$$(x + y + z + kw)v_1 + (y + w)v_2 + (x + 2y + 2z + k)v_3 + (kx + y - z - 2w)v_4 = 0 = \bar{0}$$

$v_1, v_2, v_3, v_4$  בת"ל לכן

$$\left. \begin{aligned} x + y + z + kw &= 0 \\ y + w &= 0 \\ x + 2y + 2z + kw &= 0 \\ kx + y - z - 2w &= 0 \end{aligned} \right\} \rightarrow \begin{pmatrix} 1 & 1 & 2 & k \\ 0 & 1 & 0 & -1 \\ 1 & 2 & 2 & k \\ k & 1 & -1 & -2 \end{pmatrix}$$

כל העמודות מובילות אם  $k = -\frac{1}{2}$  ■

## שאלה 7

(א)

$$u_1 = 2t^3 + t^2 + t + 1, \quad u_2 = 3t^3 + 3t + 2, \quad u_3 = t^3 + 2t^2 - 2t + 1$$

$$k_1 u_1 + k_2 u_2 + k_3 u_3 = \bar{0}$$

$$k_1(2t^3 + t^2 + t + 1) + k_2(3t^3 + 3t + 2) + k_3(t^3 + 2t^2 - 2t + 1) = \bar{0}$$

$$\left. \begin{aligned} 2k_1 + 3k_2 + k_3 &= 0 \\ k_1 + 2k_3 &= 0 \\ k_1 + 3k_2 - 2k_3 &= 0 \\ k_1 + 2k_2 + k_3 &= 0 \end{aligned} \right\}$$

$$\begin{pmatrix} 2 & 3 & 1 \\ 1 & 0 & 2 \\ 1 & 3 & -2 \\ 1 & 2 & 1 \end{pmatrix} \xrightarrow{\substack{R_2 \rightarrow R_1 - 2R_2 \\ R_3 \rightarrow R_1 - 2R_3 \\ R_4 \rightarrow R_1 - 2R_4}} \begin{pmatrix} 2 & 3 & 1 \\ 0 & 3 & -3 \\ 0 & -3 & 5 \\ 0 & -1 & -1 \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} 2 & 3 & 1 \\ 0 & 1 & -1 \\ 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

3 עמודות מובילות, לכן  $u_3, u_2, u_1$  בת"ל. ■

(ב)

$$u_1 = 3t^3 + 8t^2 - 8t + 7, \quad u_2 = t^3 + 4t^2 - 2t + 3, \quad u_3 = t^3 + 6t^2 - t + 4$$

$$k_1 u_1 + k_2 u_2 + k_3 u_3 = \bar{0}$$

$$k_1(3t^3 + 8t^2 - 8t + 7) + k_2(t^3 + 4t^2 - 2t + 3) + k_3(t^3 + 6t^2 - t + 4) = \bar{0}$$

$$\left. \begin{aligned} 3k_1 + k_2 + k_3 &= 0 \\ 8k_1 + 4k_2 + 6k_3 &= 0 \\ -8k_1 - 2k_2 - 1k_3 &= 0 \\ 7k_1 + 3k_2 + 4k_3 &= 0 \end{aligned} \right\}$$

$$\begin{pmatrix} 3 & 1 & 1 \\ 8 & 4 & 6 \\ -8 & -2 & -1 \\ 7 & 3 & 4 \end{pmatrix} \xrightarrow{\substack{R_2 \rightarrow -8R_1 + 3R_2 \\ R_3 \rightarrow 8R_1 + 3R_3 \\ R_4 \rightarrow -7R_1 + 3R_4}} \begin{pmatrix} 3 & 1 & 1 \\ 0 & 4 & 10 \\ 0 & 2 & 5 \\ 0 & 2 & 5 \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} 3 & 1 & 1 \\ 0 & 2 & 5 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

$$\xrightarrow{R_1 \rightarrow R_2 - 2R_1} \begin{pmatrix} -6 & 0 & 3 \\ 0 & 2 & 5 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} \xrightarrow{\substack{R_1 \rightarrow -\frac{1}{6}R_1 \\ R_2 \rightarrow \frac{1}{2}R_2}} \begin{pmatrix} 1 & 0 & -\frac{1}{2} \\ 0 & 1 & \frac{5}{2} \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

$$k_1 = \frac{1}{2}k_2, \quad k_2 = -\frac{5}{2}k_3, \quad k_3 \in \mathbb{R}$$

$u_3, u_2, u_1$  ת"ל.

נציב  $k_2 = -5, k_1 = 1 \Leftarrow k_3 = 2$

$$u_1 - 5u_2 + 2u_3 = \bar{0} .$$

■

(ג)

$$u_1 = t^3 + 3t^2 + 6t + 3, \quad u_2 = -3t^3 + 2t - 1, \quad u_3 = t^3 + t^2 - t$$

$$k_1 u_1 + k_2 u_2 + k_3 u_3 = \bar{0}$$

$$k_1(t^3 + 3t^2 + 6t + 3) + k_2(-3t^3 + 2t - 1) + k_3(t^3 + t^2 - t) = \bar{0}$$

$$\left. \begin{aligned} k_1 + k_3 &= 0 \\ 3k_1 + k_3 &= 0 \\ 6k_1 + 2k_2 - k_3 &= 0 \\ 3k_1 - k_2 &= 0 \end{aligned} \right\}$$

$$\begin{pmatrix} 1 & -3 & 1 \\ 3 & 0 & 1 \\ 6 & 2 & -1 \\ 3 & -1 & 0 \end{pmatrix} \xrightarrow{\substack{R_2 \rightarrow -3R_1 + R_2 \\ R_3 \rightarrow R_3 - 6R_1 \\ R_4 \rightarrow R_4 - 3R_1}} \begin{pmatrix} 1 & -3 & 1 \\ 0 & 9 & -2 \\ 0 & 20 & -7 \\ 0 & 8 & -3 \end{pmatrix} \xrightarrow{\substack{R_3 \rightarrow 9R_3 - 20R_2 \\ R_4 \rightarrow 9R_4 - 8R_2}} \begin{pmatrix} 1 & -3 & 1 \\ 0 & 9 & -2 \\ 0 & 0 & -16 \\ 0 & 0 & -11 \end{pmatrix}$$

$$\rightarrow \begin{pmatrix} 1 & -3 & 1 \\ 0 & 9 & -2 \\ 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

כל העמודות מובילות, לכן  $u_3, u_2, u_1$  בת"ל.

■

(ד)

$$0 \cdot (2t^3 + t^2 + t + 1) + 0 \cdot (3t^3 + 2) + 0 \cdot t + 1 \cdot 0 = \bar{0}$$

לכן הוקטורים ת"ל.

■

## שאלה 8

(א)

$$u_1 = \begin{pmatrix} 0 & 2 \\ -1 & 0 \end{pmatrix}, \quad u_2 = \begin{pmatrix} 2 & 0 \\ 5 & 1 \end{pmatrix}, \quad u_3 = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}.$$

נרשום  $u_3, u_2, u_1$  כוקטורים ב  $\mathbb{R}^4$  ע"י איזומורפיזם:

$$u_1 = \begin{pmatrix} 0 \\ 2 \\ -1 \\ 0 \end{pmatrix}, \quad u_2 = \begin{pmatrix} 2 \\ 0 \\ 5 \\ 1 \end{pmatrix}, \quad u_3 = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}.$$

נדרג את המטריצה המורכבת מהוקטורים:

$$\begin{pmatrix} 0 & 2 & 1 \\ 2 & 0 & 1 \\ -1 & 5 & 1 \\ 0 & 1 & 0 \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} 1 & -5 & -1 \\ 2 & 0 & 1 \\ 0 & 2 & 1 \\ 0 & 1 & 0 \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} 1 & -5 & -1 \\ 0 & 10 & 3 \\ 0 & 2 & 1 \\ 0 & 1 & 0 \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} 1 & -5 & -1 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 2 & 1 \\ 0 & 10 & 3 \end{pmatrix}$$

$$\rightarrow \begin{pmatrix} 1 & -5 & -1 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 3 \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} 1 & -5 & -1 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

כל העמודות מובילות לכן  $u_3, u_2, u_1$  בת"ל. ■

(ב)

$$0 \cdot \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 2 & 3 \end{pmatrix} + 1 \cdot \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix} + 0 \cdot \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ -1 & 7 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}$$

לכן הוקטורים ת"ל. ■

(ג)

$$u_1 = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 2 & 3 \end{pmatrix}, \quad u_2 = \begin{pmatrix} 2 & 3 \\ 5 & 7 \end{pmatrix}, \quad u_3 = \begin{pmatrix} 0 & 3 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}, \quad u_4 = \begin{pmatrix} 1 & 4 \\ 1 & 2 \end{pmatrix}, \quad u_5 = \begin{pmatrix} 1 & 3 \\ 1 & 4 \end{pmatrix}.$$

$\dim M_{2 \times 2}(\mathbb{R}) = 4$  לכן כל 5 וקטורים במרחב הזה הם ת"ל.  
נמצא צירוף לינארי הלא טריוויאלי ששווה לוקטור האפס:

$$\begin{pmatrix} 1 & 2 & 0 & 1 & 1 \\ 1 & 3 & 3 & 4 & 3 \\ 2 & 5 & 1 & 1 & 1 \\ 3 & 7 & 0 & 2 & 4 \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 & -\frac{25}{4} \\ 0 & 1 & 0 & 0 & \frac{11}{4} \\ 0 & 0 & 1 & 0 & -2 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & \frac{7}{4} \end{pmatrix}$$

$$k_1 = \frac{25}{4}k_5, \quad k_2 = -\frac{11}{4}k_5, \quad k_3 = 2k_5, \quad k_4 = -\frac{7}{4}k_5, \quad k_5 \in \mathbb{R}.$$

$$25 \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 2 & 3 \end{pmatrix} - 11 \begin{pmatrix} 2 & 3 \\ 5 & 7 \end{pmatrix} + 8 \begin{pmatrix} 0 & 3 \\ 1 & 0 \end{pmatrix} - 7 \begin{pmatrix} 1 & 4 \\ 1 & 2 \end{pmatrix} + 4 \begin{pmatrix} 1 & 3 \\ 1 & 4 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}$$

## שאלה 9

$$\begin{pmatrix} 1 & 2 & 1 \\ 1 & 3 & 2 \\ 2 & 5 & -1 \\ 3 & 7 & k \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} 1 & 2 & 1 \\ 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & -4 \\ 0 & 0 & k-4 \end{pmatrix}$$

$$\underline{k \neq 4}$$

$$\begin{pmatrix} 1 & 2 & 1 \\ 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & -4 \\ 0 & 0 & k-4 \end{pmatrix} \xrightarrow{R_4 \rightarrow 4R_4 + (k-4)R_3} \begin{pmatrix} 1 & 2 & 1 \\ 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & -4 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

עבור  $k \neq 4$  קיבלנו 3 עמודות מובילות ולכן הוקטורים בת"ל.

$$\underline{k = 4}$$

נקבל

$$\begin{pmatrix} 1 & 2 & 1 \\ 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & -4 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

כל העמודות מובילות לכן הוקטורים בת"ל.  
מסקנה: לא קיים  $k$  עבורו הוקטורין ת"ל.

■

$$g(t) = e^t + 5e^{2t-1} - 3e^{3t-1} \quad \underline{\text{שאלה 10}}$$

$$T = \{f_1 = e^{t+1}, f_2(t) = e^{2t-1}, f_3(t) = e^{3t}\}.$$

$$g(t) = e \cdot e^t + 5 \cdot e^{2t-1} - \frac{3}{e} \cdot e^{3t} = e \cdot f_1(t) + 5 \cdot f_2(t) - \frac{3}{e} \cdot f_3(t).$$

$$g(t) = \text{sp}(f_1, f_2, f_3) \quad \text{לכן } T \cup \{g(t)\} \text{ ת"ל כי } \bar{0} = g(t) - e \cdot f_1(t) + 5 \cdot f_2(t) - \frac{3}{e} \cdot f_3(t).$$

■

## שאלה 11

(א)

$$\{f_1 = \sin t, f_2(t) = \cos t, f_3(t) = t\}.$$

$$k_1 f_1(t) + k_2 f_2(t) + k_3 f_3(t) = \bar{0}.$$

$$k_1 \sin t + k_2 \cos t + k_3 t = \bar{0}.$$

$$k_2 = 0 \Leftarrow t = 0$$

$$\text{נציב } t = \frac{\pi}{2} \Leftarrow \begin{cases} k_1 + \frac{\pi}{2} k_3 = 0 \\ \pi k_3 = 0 \end{cases} \Leftarrow \begin{cases} k_1 = 0 \\ k_3 = 0 \end{cases} \text{ לכן הוקטורים בת"ל.}$$

(ב)

$$\{f_1 = 1, f_2(t) = t + 1, f_3(t) = e^{t+1}\}.$$

הקבוצה בת"ל עם הוורונסקיאן שונה מאפס לכל  $t$ :

$$W(t) = \begin{vmatrix} f_1 & f_2 & f_3 \\ f_1' & f_2' & f_3' \\ f_1'' & f_2'' & f_3'' \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} 1 & t+1 & e^{t+1} \\ 0 & 1 & e^{t+1} \\ 0 & 0 & e^{t+1} \end{vmatrix} = e^{t+1} \neq 0 \quad \forall t$$

ז"א  $W(t) \neq 0$  לכל  $t$  ולכן הקבוצה בת"ל.

ג)

$$\{f_1 = e^{t+1}, f_2(t) = e^{2t+1}, f_3(t) = e^{3t+1}\}.$$

הקבוצה בת"ל עם הוורונסקיאן שונה מאפס לכל  $t$ :

$$W(t) = \begin{vmatrix} f_1 & f_2 & f_3 \\ f_1' & f_2' & f_3' \\ f_1'' & f_2'' & f_3'' \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} e^{t+1} & e^{2t+1} & e^{3t+1} \\ e^{t+1} & 2e^{2t+1} & 3e^{3t+1} \\ e^{t+1} & 4e^{2t+1} & 9e^{3t+1} \end{vmatrix} = e^{6t+3} \begin{vmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 1 & 2 & 3 \\ 1 & 4 & 9 \end{vmatrix} = 2e^{6t+3} \neq 0 \quad \forall t$$

ז"א  $W(t) \neq 0$  לכל  $t$  ולכן הקבוצה בת"ל. ■

## שאלה 12

$$2f_1 - f_2 = \bar{0} \text{ כי } \{f_1(x) = x, f_2(x) = 2x\} \quad (\text{א})$$

(1) (ב)

נתון:  $f_1, \dots, f_n$  גזירות,  $f_1, \dots, f_n$  בת"ל.

צ"ל:  $f_1', \dots, f_n'$  בת"ל.

הוכחה:  $f_1, \dots, f_n$  בת"ל, לכן קיימים  $k_1, \dots, k_n$  שלא כלם אפסים כך ש

$$k_1 f_1 + \dots + k_n f_n = \bar{0}$$

$$(k_1 f_1 + \dots + k_n f_n)' = k_1 f_1' + \dots + k_n f_n' = \bar{0}$$

לכן  $f_1', \dots, f_n'$  בת"ל.

(2)

$$f_2(x) = x^2 + 1, f_1(x) = \frac{x^2}{2} \text{ :דוגמה נגדית:}$$

$$f_1'(x) = x, \quad f_2'(x) = 2x$$

$$2f_1' - f_2' = \bar{0} \text{ כי } f_2', f_1' \text{ בת"ל, כי } f_2, f_1 \text{ בת"ל:}$$

$$k_1 \frac{x^2}{2} + k_2(x^2 + 1) = \bar{0} \quad \Rightarrow \quad \left(\frac{k_1}{2} + k_2\right) = 0$$

$$.k_1 = 0 \Leftarrow x \in \mathbb{R} \text{ לכל } k_1 x^2 = 0 \Leftarrow k_2 = 0 \Leftarrow x = 0 \text{ } x \in \mathbb{R} \text{ לכל}$$

■