

1 דוגמא. מטילים 2 קוביות. נסמן ב- X את סכום התוצאות שהתקבלו. כמו כן

$$\begin{aligned}\omega &= \{(1, 1)\}, & X(\omega) &= 2, \\ \omega &= \{(2, 1), (1, 2)\}, & X(\omega) &= 3, \\ \omega &= \{(1, 3), (2, 2), (3, 1)\}, & X(\omega) &= 4, \\ &\vdots & & \\ \omega &= \{(6, 6)\}, & X(\omega) &= 12.\end{aligned}$$

זו דוגמה של מ"מ כאשר X הוא המשתנה המקרי.

2 דוגמא. מטילים 3 קוביות הוגנות. נגדיר משתנה מקרי X להיות התוצאה המקסימלית מבין ההטלות. כמו כן

$$\begin{aligned}\omega &= \{(1, 1, 1)\}, & X(\omega) &= 1, \\ \omega &= \{(2, 1, 1), (1, 2, 1), (1, 1, 2)\}, & X(\omega) &= 2, \\ &\vdots & & \\ \omega &= \{(3, 2, 1), (2, 3, 1), (1, 2, 3), \dots\}, & X(\omega) &= 3, \\ &\vdots & & \\ \omega &= \{(6, 6, 6)\}, & X(\omega) &= 6.\end{aligned}$$

זו דוגמה של מ"מ כאשר X הוא המשתנה המקרי.

3 דוגמא. נטיל קוביה הוגנת ונניח כי X מחזיר את תוצאת ההטלה. אזי

$$\text{Supp}(X) = \{1, 2, 3, 4, 5, 6\}$$

וההתפלגות של X היא

$$f_X(k) = \begin{cases} \frac{1}{6} & k \in \text{supp}(X) \\ 0 & \text{אחרת} \end{cases}$$

במילים, $f_X(k) = \frac{1}{6}$ לכל k בתומך, ו-0 אחרת. חשוב לזכור שהתפלגות היא פונקציה ולכן יש צורך לתאר אותה בכל נקודה. משמע, זה לא מספיק לציין את ערכי הפונקציה רק על התומך, אלא בכל נקודה $k \in \mathbb{R}$.

4 דוגמא. אלון הוא סוחר ממולח בשוק ההון. הוא משקיע סכום של \$1000 במכשיר פיננסי אשר בכל שנה מכפיל את הכסף בסיכוי $\frac{2}{3}$ או מפסיד חצי מההשקעה בסיכוי $\frac{1}{3}$. השנים הן בלתי תלויות. נגדיר את X להיות שווי ההשקעה של אלון לאחר שנתיים. התומך של X כעת הוא

$$\text{supp}(X) = \{250, 1000, 4000\},$$

על כן, ההתפלגות של X היא

$$f_X(1000) = \frac{4}{9}, \quad f_X(4000) = \frac{4}{9}, \quad f_X(250) = \frac{1}{9}$$

ו-0 אחרת.

5 דוגמא. מטילים 2 קוביות. נסמן ב- X את סכום התוצאות שהתקבלו. מצאו את ההתפלגות של X .

פיתרון. נתחיל מהתומך. התוצאות האפשרויות בסכום של 2 קוביות הן המספרים הטבעיים מ-2 עד 12. בכדי לחשב את ההסתברות לכל ערך נשתמש במרחב מדגם סימטרי: גודל מרחב המדגם הוא $6^2 = 36$, ככמות האפשרויות לבחור תוצאה לקוביה הראשונה מתוך 6 ותוצאה לקוביה השנייה מתוך 6. נחשב את ההסתברות של כל תוצאה בנפרד:

$$\begin{aligned} P(X=2) &= \frac{|\{(1,1)\}|}{6^2} = \frac{1}{36}, \\ P(X=3) &= \frac{|\{(2,1), (1,2)\}|}{6^2} = \frac{2}{36}, \\ P(X=4) &= \frac{|\{(1,3), (2,2), (3,1)\}|}{6^2} = \frac{3}{36}, \\ &\vdots \\ P(X=7) &= \frac{|\{(1,6), (2,5), (3,4), (4,3), (5,2), (6,1)\}|}{6^2} = \frac{6}{36}, \\ P(X=8) &= \frac{|\{(2,6), (3,5), (4,4), (5,3), (6,2)\}|}{6^2} = \frac{5}{36}, \\ P(X=9) &= \frac{|\{(3,6), (4,5), (5,4), (6,3)\}|}{6^2} = \frac{4}{36}, \\ &\vdots \\ P(X=12) &= \frac{|\{(6,6)\}|}{6^2} = \frac{1}{36}, \end{aligned}$$

ובאופן דומה ממשיכים לחשב את האפשרויות לכל הערכים האפשריים בתומך. באופן כללי קל לראות שהנוסחה, כאשר p זו הסכום של ה-2 הקוביות, היא (עייין משוואה (??) לעייל)

$$P(X=p) = \frac{1}{36} \times \begin{cases} (p-1) & p < 8 \\ (p-1) - 2(p-7) & 8 \leq p < 14 \end{cases}$$

■

6 הגדרה. (פונקצית התפלגות מצטברת) פונקצית התפלגות מצטברת מסומנת ע"י $F_X(x)$ של מ"מ בדיד X בעל פונקצית התפלגות $f_X(k)$ מוגדרת להיות

$$F_X(x) = \sum_{\substack{k \in X \\ k \leq x}} f_X(k).$$

במילים אחרות, פונקצית התפלגות מצטברת $F_X(x)$ מוגדרת להיות הפונקציה שתחומה הוא הישר הממשי וטווחה הקטע $[0, 1]$ ומקיימת

$$F_X(x) = P(X \leq x) \quad \forall x \in X.$$

7 דוגמא. אלוך הוא סוחר ממולח בשוק ההון. הוא משקיע סכום של \$1000 במכשיר פיננסי אשר בכל שנה מכפיל את הכסף בסיכוי $\frac{2}{3}$ או מפסיד חצי מההשקעה בסיכוי $\frac{1}{3}$. השנים הן בלתי תלויות. נגדיר את X להיות שווי ההשקעה של אלוך לאחר שנתיים. מצאו את פונקצית ההתפלגות המצטברת של X וציירו אותה.

פיתרון. כפי שציינו בדוגמה 4, התומך של X כעת הוא

$$\text{supp}(X) = \{250, 1000, 4000\}.$$

על כן, פונקציית ההתפלגות המצטברת של X היא

$$F_X(k) = P(X \leq k) = \begin{cases} 0 & k < 250, \\ \frac{1}{9} & 250 \leq k < 1000, \\ \frac{5}{9} & 1000 \leq k < 4000, \\ 1 & 4000 \leq k. \end{cases}$$

■

8 דוגמא. התוחלת של הטלת קוביה היא

$$E[X] = \sum_{k=1}^6 k \frac{1}{6} = \frac{7}{2}.$$

9 דוגמא. בן הוא סוחר מתוחכם ולכן הוא מציע לאלון להפקיד אצלו 100 שקלים בתחילת השנה. בסיכוי של $\frac{2}{5}$ הסכום יוכפל, ובסיכוי $\frac{3}{5}$ הסכום יצטמצם בחצי בסוף השנה. מה תהיה תוחלת הכסף של אלון לאחר קבלת ההצעה? נסמן ב- X את שווי כסף של אלון בסוף השנה.

$$E[X] = 200 \cdot \frac{2}{5} + 50 \cdot \frac{3}{5} = 110.$$

זאת אומרת שהצעתו של בן מגלמת תוחלת רווח של 10%!

10 דוגמא. בחנות ירקות קטנה ישנם 3 תפוחים ו-4 אגסים. אלון קונה 2 פירות באקראי. בן המוכר מרוויח על כל תפוח 2 ש"ח ועל כל אגס 4 ש"ח. מצאו את תוחלת הרווח של בן.

פיתרון. נגדיר מ"מ Q עבור הרווח של בן, ומשתנה מקרי X כמספר התפוחים שאלון קנה. על כן,

$$Q = 2X + 4(2 - X) = 8 - 2X$$

$$P(X = 1) = \frac{4}{7}, \quad P(X = 2) = \frac{3}{7} \cdot \frac{2}{6} = \frac{1}{7}, \quad P(X = 0) = \frac{4}{7} \cdot \frac{3}{6} = \frac{2}{7}.$$

מכאן נובע ש

$$E[X] = 0 \cdot \frac{2}{7} + 1 \cdot \frac{4}{7} + 2 \cdot \frac{1}{7} = \frac{6}{7}.$$

נשתמש בתכונת הליניאריות לחישוב התוחלת של

$$E[Q] = 8 - 2E[X] = 8 - \frac{12}{7} = \frac{44}{7}.$$

■

דוגמא. בוחרים קוד באורך 10 תווים, כאשר כל תו נבחר באקראי מתוך הספרות 0 - 9 ללא קשר לתווים האחרים שנבחרו. נסמן ב- X מ"מ הסופרים את מספר הרצפים 11 בקוד. חשבו את $E[X]$.

פיתרון. נגדיר מ"מ X_i , $i = 1, \dots, 9$, כאשר X_i מקבל את הערך 1 אם ורק אם במקום ה- i מתחיל רצף של 11. לכן

$$X = \sum_{i=1}^9 X_i$$

$$\begin{aligned}
 E[X] &= E\left[\sum_{i=1}^9 X_i\right] \\
 &= \sum_{i=1}^9 E[X_i] \\
 &= \sum_{i=1}^9 [1 \cdot P(X_i = 1) + 0 \cdot P(X_i = 0)] \\
 &= \sum_{i=1}^9 P(X_i = 1) \\
 &= \sum_{i=1}^9 \frac{1}{10} \cdot \frac{1}{10} \\
 &= \frac{9}{100}.
 \end{aligned}$$

■

11 דוגמא. ניקח משתנה מקרי X בעל התפלגות

$$P(X = k) = \begin{cases} \frac{1}{3} & k = -1, \\ \frac{1}{6} & k = 0, \\ \frac{1}{2} & k = 1. \end{cases}$$

חשבו את $E[X]$ ואת $E[X^4]$.**פיתרון.** נשתמש בהגדרת התוחלת ונקבל

$$\begin{aligned}
 E[X] &= (-1) \cdot \frac{1}{3} + 0 \cdot \frac{1}{6} + 1 \cdot \frac{1}{2} = \frac{1}{6}, \\
 E[X^4] &= (-1)^4 \cdot \frac{1}{3} + 0^4 \cdot \frac{1}{6} + 1^4 \cdot \frac{1}{2} = \frac{5}{6}.
 \end{aligned}$$

■

12 דוגמא. נניח ש X הוא המספר של רכבים אשר עוברים דרך השתיפת רכב בין השעות 16 : 00 ו- 17 : 00. ל- X יש את ההתפלגות

k	4	5	6	7	8	9
$P(X = k)$	$\frac{1}{12}$	$\frac{1}{12}$	$\frac{1}{4}$	$\frac{1}{4}$	$\frac{1}{6}$	$\frac{1}{6}$

הפונקציה $g(X) = 2X - 1$ מציג את הרווח ב \$ עבור X . מצאו את תוחלת הרווח בין השעות 16 : 00 ו- 17 : 00.**פיתרון.**

$$\begin{aligned}
 E[g(X)] &= E[2X - 1] \\
 &= \sum_{k=4}^9 (2x - 1) f_X(k) \\
 &= 7 \cdot \frac{1}{12} + 9 \cdot \frac{1}{12} + 11 \cdot \frac{1}{4} + 13 \cdot \frac{1}{4} + 15 \cdot \frac{1}{6} + 17 \cdot \frac{1}{6}
 \end{aligned}$$



13 דוגמא. בר היא בנקאית השקעות מתוחכמת המציעה ללקוחותיה את ההגרלה הבאה: בסיכוי $\frac{2}{5}$ תקבלו רווח של 10. בסיכוי $\frac{1}{5}$ לא תרוויחו ולא תפסידו דבר, ובסיכוי $\frac{3}{5}$ תפסידו 5. חשבו את התוחלת וסטיית התקן של X המייצג את הרווח מהשקעה אצל בר.

פיתרון. תוחלת הרווח היא חיובית שכן

$$E[X] = 10 \cdot \frac{2}{5} + 0 \cdot \frac{1}{5} - 5 \cdot \frac{2}{5} = 2,$$

$$(E[X])^2 = 100 \cdot \frac{2}{5} + 0^2 \cdot \frac{1}{5} + 25 \cdot \frac{2}{5} = 50,$$

$$V(X) = E[X^2] - (E[X])^2 = 50 - 4 = 46,$$

$$\Rightarrow \sigma_X = \sqrt{46}.$$

