

עבודה 6: משפט קיילי המילטון, פולינום מינימל #2

שאלה 1 נתונה מטריצה $A = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 0 \end{pmatrix}$ חשבו את A^{-2} , A^{12} באמצעות משפט קיילי המילטון.

שאלה 2 עבור המטריצות הבאות מצאו את הפולינום האופייני והמינימלי

$$A = \begin{pmatrix} 3 & 1 & 0 \\ -4 & -1 & 0 \\ 4 & -8 & -2 \end{pmatrix} \quad \text{(א)}$$

$$A = \begin{pmatrix} 8 & 3 & -3 \\ -6 & -1 & 3 \\ 12 & 6 & -4 \end{pmatrix} \quad \text{(ב)}$$

$$A = \begin{pmatrix} 5 & -6 & -6 \\ -1 & 4 & 2 \\ 3 & -6 & -4 \end{pmatrix} \quad \text{(ג)}$$

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 2 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 2 \end{pmatrix} \quad \text{(ד)}$$

שאלה 3 עבור אילו ערכי k המטריצה $\begin{pmatrix} k+3 & 0 & 0 \\ -k-3 & k & k+3 \\ -k-3 & k & k+3 \end{pmatrix}$ אינה לכסינה מעל \mathbb{R} .

שאלה 4 הוכיחו כי לכל מטריצות דומות A, B ולכל פולינום f קיימת מטריצה הפיכה P כך ש $f(B) = P^{-1} \cdot f(A) \cdot P$

שאלה 5 נתונה מטריצה $A = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 4 \end{pmatrix}$. מצאו את A^{-1} באמצעות משפט קיילי המילטון.

שאלה 6 תהי A מטריצה הפיכה מסדר $n \times n$. הוכיחו כי A^{-1} היא צירוף לינארי של המטריצות $I, A, A^2, \dots, A^{n-1}$. (רמז: היעזרו במשפט קיילי המילטון)

שאלה 7 תהי A מטריצה ריבועית כך שהפולינום המינימלי שלה הינו $m_A(x) = (x-1)^2$. יהי $f(x) = x^2 + 4x + 3$. הוכיחו כי מטריצה $f(A)$ הפיכה.

שאלה 8 נתון אופרטור לינארי $T : \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^3$ שמוגדר ע"י

$$T \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -x + y + 2z \\ 2x + y + 3z \\ x + z \end{pmatrix}.$$

בדקו אם התת מרחב $W = \text{span} \left\{ \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix} \right\}$ הוא T שמור.

שאלה 9

תהי A מטריצה המקיימת $A^2 = A$.

(א) מהן האפשרויות לפולינום המינימלי של A ולערכים עצמיים של A .

(ב) הוכיחו כי הפולינום האופייני של A מתפרק לגורמים לינאריים.

שאלה 10

הוכיחו או הפריכו על ידי דוגמה נגדית:

(א) אם $m_A(x) = m_B(x)$ אז מטריצות A ו- B דומות.

(ב) אם $m_A(x) = m_B(x)$ אז $p_A(x) = p_B(x)$.

שאלה 11

הוכיחו: לכל מטריצה $A \in \mathbb{R}^{2 \times 2}$,

$$A^2 \in \text{span} \{I, A\}.$$

שאלה 12

$$A = \begin{pmatrix} 2 & -1 & 1 \\ -1 & 2 & -1 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \quad \text{(א) נתונה מטריצה}$$

(1) מצאו את הפולינום האופייני והמינימלי של מטריצה A .

(2) מצאו את הערכים העצמיים והמרחבים העצמיים של A .

(3) האם המטריצה לכסינה? אם כן, מצאו מטריצה אלכסונית D ומטריצה הפיכה P ש: $D = P^{-1} \cdot A \cdot P$.

אם לא, הסבירו זאת.

(ב) תהי A מטריצה הפיכה בעלת ערך עצמי $\alpha \in \mathbb{R}$. יהי u וקטור עצמי של A השייך לערך העצמי α .

(1) הוכיחו ש- u הינו וקטור עצמי של A^{-1} ומצאו את הערך העצמי השייך ל- u .

(2) הוכיחו ש- u הינו וקטור עצמי של A^2 ומצאו את הערך העצמי השייך ל- u .

שאלה 13 נתונה המטריצה

$$A = \begin{pmatrix} 2 & 0 & -1 & 2 \\ 0 & 3 & 4 & 8 \\ 0 & 0 & 1 & 7 \\ 0 & 0 & 0 & -1 \end{pmatrix}.$$

הוכיחו ש:

$$A^{-1} = \frac{1}{6} (5I + 5A - 5A^2 + A^3).$$

שאלה 14

(א) נתונה מטריצה $A = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 0 \end{pmatrix}$. חשבו באמצעות משפט קיילי המילטון את

(1) A^{15}

(2) A^{-1}

(ב) תהי A מטריצה ריבועית כך שהפולינום המינימלי שלה הינו $m_A(x) = (x+1)^2$. יהי $f(x) = x^2 - 2x + 3$. הוכיחו כי מטריצה $f(A)$ הפיכה.

תשובות

שאלה 1 $p_A(x) = 1 - x^3$ לפי משפט קיילי המילטון:

$$p_A(A) = I - A^3 = 0 \Rightarrow A^3 = I \Rightarrow A^2 \cdot A = I \Rightarrow A^{-2} = A = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 0 \end{pmatrix}.$$

$$A^3 = I \Rightarrow A^{12} = (A^3)^4 = I^4 = I.$$

$$A^{-2} = A^3 \cdot A^{-2} = A.$$

שאלה 2

$$A = \begin{pmatrix} 3 & 1 & 0 \\ -4 & -1 & 0 \\ 4 & -8 & -2 \end{pmatrix} \quad (\text{א})$$

$$\begin{aligned} p_A(x) = |A - xI| &= \begin{vmatrix} 3-x & 1 & 0 \\ -4 & -1-x & 0 \\ 4 & -8 & -2-x \end{vmatrix} \\ &= (-2-x)((3-x)(-1-x)+4) \\ &= (-2-x)(-3+x-3x+x^2+4) \\ &= (-2-x)(1-2x+x^2) \\ &= -(x+2)(x-1)^2. \end{aligned}$$

$$p_A(x) = (x-1)^2(x+2) \text{ לכן}$$

האפשרויות לפולינום המינימלי הן:

$$(x+2)(x-1), \quad (x+2)(x-1)^2.$$

$$\text{נבדוק } (x+2)(x-1):$$

$$(A+2I)(A-I) = \begin{pmatrix} 5 & 1 & 0 \\ -4 & 1 & 0 \\ 4 & -8 & 0 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} 2 & 1 & 0 \\ -4 & -2 & 0 \\ 4 & -8 & -3 \end{pmatrix} \neq 0$$

$$m_A(x) = -(x-1)^2(x+2) \text{ לכן}$$

$$A = \begin{pmatrix} 8 & 3 & -3 \\ -6 & -1 & 3 \\ 12 & 6 & -4 \end{pmatrix} \quad (\text{ב})$$

$$\begin{aligned}
p_A(x) &= |A - xI| = \begin{vmatrix} 8-x & 3 & -3 \\ -6 & -1-x & 3 \\ 12 & 6 & -4-x \end{vmatrix} \\
&= (8-x)((-1-x)(-4-x) - 18) - 3(-6(-4-x) - 36) - 3(-36 + 12(1+x)) \\
&= (8-x)(4 + 4x + x + x^2 - 18) - 3(24 + 6x - 36) - 3(-36 + 12 + 12x) \\
&= (8-x)(5x + x^2 - 14) - 3(6x - 12) - 3(-24 + 12x) \\
&= (8-x)(x+7)(x-2) - 18(x-2) - 36(x-2) \\
&= (x-2)((8-x)(x+7) - 54) \\
&= (x-2)(8x - x^2 + 56 - 7x - 54) \\
&= (x-2)(x - x^2 + 2) \\
&= -(x-2)(x-2)(x+1) \\
&= -(x+1)(x-2)^2.
\end{aligned}$$

$$.p_A(x) = (x-2)^2(x+1) \text{ לכן}$$

האפשרויות דפןלינום המינימלי הן

$$(x-2)^2(x+1), \quad (x-2)(x+1)$$

$$: (x-2)(x+1) \text{ נבדוק}$$

$$(A - 2I)(A + I) = \begin{pmatrix} 6 & 3 & -3 \\ -6 & -3 & 3 \\ 12 & 6 & -6 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} 9 & 3 & -3 \\ -6 & 0 & 3 \\ 12 & 6 & -3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

$$.m_A(x) = (x-2)(x+1) \text{ לכן}$$

$$A = \begin{pmatrix} 5 & -6 & -6 \\ -1 & 4 & 2 \\ 3 & -6 & -4 \end{pmatrix} \quad \mathfrak{A}$$

$$\begin{aligned}
p_A(x) &= |A - xI| = \begin{vmatrix} 5-x & -6 & -6 \\ -1 & 4-x & 2 \\ 3 & -6 & -4-x \end{vmatrix} \\
&= (5-x)((4-x)(-4-x) + 12) + 6(4+x-6) - 6(6-3(4-x)) \\
&= (5-x)(-16 + x^2 + 12) + 6(x-2) - 6(-6 + 3x) \\
&= (5-x)(x^2 - 4) + 6(x-2) - 18(x-2) \\
&= (5-x)(x+2)(x-2) - 12(x-2) \\
&= (x-2)((5-x)(x+2) - 12) \\
&= (x-2)(5x - x^2 + 10 - 2x - 12) \\
&= (x-2)(3x - x^2 - 2) \\
&= -(x-2)(x-1)(x-2) \\
&= -(x-2)^2(x-1).
\end{aligned}$$

$$p_A(x) = (x-2)^2(x-1) \text{ לכן}$$

האפשרויות לפולינום המינימלי הן:

$$(x-2)(x-1), \quad (x-2)^2(x-1)$$

$$\text{נבדוק } (x-2)(x-1):$$

$$(A-2I)(A-I) = \begin{pmatrix} 3 & -6 & -6 \\ -1 & 2 & 2 \\ 3 & -6 & -6 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} 4 & -6 & -6 \\ -1 & 3 & 2 \\ 3 & -6 & -5 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

$$m_A(x) = (x-2)(x-1) \text{ לכן}$$

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 2 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 2 \end{pmatrix} \quad \text{ד) המטריצה משולשית עליונה לכן הפולינום האופייני הוא}$$

$$p_A(x) = (x-2)(x-1)^2.$$

האפשרויות לפולינום המינימלי הן:

$$(x-2)(x-1), \quad (x-2)(x-1)^2$$

$$\text{נבדוק } (x-2)(x-1):$$

$$(A-2I)(A-I) = \begin{pmatrix} -1 & 0 & 2 \\ 0 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} 0 & 0 & 2 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

$$m_A(x) = (x-2)(x-1) \text{ לכן}$$

שאלה 3

$$A = \begin{pmatrix} k+3 & 0 & 0 \\ -k-3 & k & k+3 \\ -k-3 & k & k+3 \end{pmatrix}$$

$$|A-xI| = \begin{vmatrix} k+3-x & 0 & 0 \\ -k-3 & k-x & k+3 \\ -k-3 & k & k+3-x \end{vmatrix}$$

$$= (k+3-x)((k-x)(k+3-x) - k(k+3))$$

$$= (k+3-x)(k^2 + 3k - kx - 3x - kx + x^2 - k^2 - 3k)$$

$$= (k+3-x)(-2kx - 3x + x^2)$$

$$= (k+3-x)x(x-2k-3)$$

$$= -(x-(k+3))x(x-(2k+3)).$$

מקרה 1: $k + 3 = 0$

$$k + 3 = 0 \quad \Rightarrow \quad k = -3 .$$

$$p_A(x) = x^2(x + 3) .$$

ערכים עצמיים: $x = 0$ מריבוי אלגברי 2, $x = -3$ מריבוי אלגברי 1.

נחשב את המרחב עצמי השייך ל $x = 0$:

$$\begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 0 & -3 & 0 \\ 0 & -3 & 0 \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} 0 & -3 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

הריבוי הגאומטרי של $x = 0$ שווה לריבוי האלגברי לכן A לכסינה.

מקרה 2: $k = \frac{-3}{2}$

$$k = \frac{-3}{2} \quad \Rightarrow \quad p_A(x) = x^2 \left(x - \frac{3}{2} \right)$$

ערכים עצמיים: $x = 0$ מריבוי אלגברי 2, $x = \frac{3}{2}$ מריבוי אלגברי 1.

נחשב את המרחב עצמי השייך ל $x = 0$:

$$\begin{pmatrix} \frac{3}{2} & 0 & 0 \\ -\frac{3}{2} & -\frac{3}{2} & \frac{3}{2} \\ -\frac{3}{2} & -\frac{3}{2} & \frac{3}{2} \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ -1 & -1 & 1 \\ -1 & -1 & 1 \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ -1 & -1 & 1 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & -1 & 1 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

הריבוי הגאומטרי שווה ל-1, הריבוי האלגברי שווה ל-2, לכן A לא לכסינה.

מקרה 3: $k + 3 = 2k + 3$

$$k + 3 = 2k + 3 \quad \Rightarrow \quad k = 0 .$$

$$p_A(x) = x(x - 3)^2 .$$

ערכים עצמיים: $x = 0$ מריבוי אלגברי 1, $x = 3$ מריבוי אלגברי 2.

נחשב את המרחב עצמי השייך ל $x = 3$:

$$\begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 \\ -3 & -3 & 3 \\ -3 & 0 & 0 \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} -3 & -3 & 3 \\ -3 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} 1 & 1 & -1 \\ 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} 1 & 1 & -1 \\ 0 & -1 & 1 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

הריבוי הגאומטרי 1, הריבוי האלגברי 2, לכן A לא לכסינה.

מקרה 4: $k \neq -3, \frac{-3}{2}, 0$

A לכסינה כי $p_A(x)$ מתפרק לגורמין לינאריים שונים.

תשובה סופית: A לא לכסינה עבור $k = \frac{-3}{2}$ ו $k = 0$.

שאלה 4 A ו- B דומות לכן קיימת P הפיכה כך ש-

$$B = PAP^{-1}.$$

לכל i טבעי,

$$\begin{aligned} B^i &= (PAP^{-1})^i = \overbrace{(PAP^{-1}) (PAP^{-1}) \dots (PAP^{-1})}^{i \text{ איברים}} \\ &= PAP^{-1} PAP^{-1} \dots PAP^{-1} \\ &= PAIAI \dots IAP^{-1} \\ &= PA \cdot A \cdot \dots \cdot AP^{-1} \\ &= PA^i P^{-1} \end{aligned} \quad (*)$$

נניח ש $f(x)$ פולינום מצורה

$$f(x) = a_0 + a_1x + a_2x^2 + \dots + a_kx^k.$$

$$\begin{aligned} f(B) &= a_0I + a_1B + a_2B^2 + \dots + a_kB^k \\ &= a_0P \cdot P^{-1} + a_1PAP^{-1} + a_2(PAP^{-1})^2 + \dots + a_k(PAP^{-1})^k \end{aligned}$$

נציב (*) ונקבל

$$\begin{aligned} f(B) &= a_0P \cdot P^{-1} + a_1PAP^{-1} + a_2PA^2P^{-1} + \dots + a_kPA^kP^{-1} \\ &= P(a_0 + a_1A + a_2A^2 + \dots + a_kA^k)P^{-1} \\ &= Pf(A)P^{-1}. \end{aligned}$$

שאלה 5

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 4 \end{pmatrix}$$

$$|A - xI| = \begin{vmatrix} 1-x & 2 \\ 3 & 4-x \end{vmatrix} = (1-x)(4-x) - 6 = x^2 - 4x - x + 4 - 6 = x^2 - 5x - 2.$$

$$p_A(x) = x^2 - 5x - 2$$

$$P_A(A) = A^2 - 5A - 2I = 0 \Rightarrow A^2 - 5A = 2I \Rightarrow \frac{1}{2}(A^2 - 5A) = I \Rightarrow \frac{1}{2}A(A - 5I) = I$$

$$\Rightarrow A^{-1} = \frac{1}{2}(A - 5I) \Rightarrow A^{-1} = \begin{pmatrix} -2 & 1 \\ \frac{3}{2} & -\frac{1}{2} \end{pmatrix}.$$

שאלה 6

נסמן

$$m_A(x) = x^n + a_{n-1}x^{n-1} + a_{n-2}x^{n-2} + \dots + a_1x + a_0 .$$

אז

$$m_A(A) = A^n + a_{n-1}A^{n-1} + a_{n-2}A^{n-2} + \dots + a_1A + a_0I = 0 .$$

A הפיכה לכן $a_0 \neq 0$
(הסבר: נניח ש $a_0 = 0$. אז

$$A^n + a_{n-1}A^{n-1} + \dots + a_1A = A \cdot (A^{n-1} + a_{n-1}A^{n-2} + \dots + a_1I) = 0$$

A הפיכה לכן קיימת A^{-1}

$$A^{-1}A \cdot (A^{n-1} + a_{n-1}A^{n-2} + \dots + a_1I) = 0 \Rightarrow A^{n-1} + a_{n-1}A^{n-2} + \dots + a_1I = 0 .$$

קיבלנו פולינום שמתאפס ע"י A מדרגה קטנה יותר מדרגה של $m_A(x)$. סתירה. לכן $a_0 \neq 0$.

נכפיל $m_A(x)$ ב- A^{-1} :

$$A^{-1} \cdot m_A(A) = A^{-1} (A^n + a_{n-1}A^{n-1} + \dots + a_1A + a_0I) = A^{n-1} + a_{n-1}A^{n-2} + \dots + a_1I + a_0A^{-1} = 0 .$$

לכן

$$A^{-1} = -\frac{1}{a_0}A^{n-1} - \frac{a_{n-1}}{a_0}A^{n-2} - \dots - \frac{a_1}{a_0}I$$

שאלה 7

$$f(x) = x^2 + 4x + 3 = (x-1)^2 + 6x + 2 = m_A(x) + 2(3x+1) .$$

לכן

$$f(A) = m_A(A) + 2(3A+I) .$$

$m_A(A) = 0$ ו $2(3A+1) \neq 0$ אחרת יהיה פולינום שמתאפס ע"י A מדרגה נמוכה יותר מ- m_A , סתירה. לכן

$$f(A) = 2(3A+I) .$$

נניח ש- A מסדר $n \times n$. אז

$$|f(A)| = |2(3A+I)| = \left| 6 \left(A + \frac{1}{3}I \right) \right| = 6^n \left| I - \left(-\frac{1}{3}A \right) \right| \neq 0$$

כי $-\frac{1}{3}$ לא ערך עצמי של A בגלל ש- $-\frac{1}{3}$ לא שורש של $m_A(x)$. לכן $|f(A)| \neq 0$ ולכן $f(A)$ הפיכה.

שאלה 8

$$T \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -1+2 \\ 2+3 \\ 1+1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 \\ 5 \\ 2 \end{pmatrix} \notin W$$

לכן התת מרחב W אינו T -שמור.

שאלה 9

(א) נתון: $A^2 = A$. נסמן $f(x) = x^2 - x = x(x-1)$. לכן $f(A) = 0$. פולינום המינימלי של A מחלק כל פולינום המתאפס ע"י A :

$$m_A(x) \mid x(x-1).$$

מכאן האפשרויות ל- $m_A(x)$ הן

$$x, \quad x-1, \quad x(x-1).$$

האפשרויות לערכים עצמיים של A הן: 0, או 1, או 0 וגם 1.

(ב) לכל מטריצה $A \in \mathbb{F}^{n \times n}$, ולכל פולינום $f(x)$ שמתאפס ע"י A , הפולינום האופייני מחלק את $f^n(x)$:

$$p_A(x) \mid f^n(x).$$

לכן כל גורם אי-פריק של $p_A(x)$ מופיע גם ב- $f(x)$. מתפרק לגורמים לינאריים, לכן גם $p_A(x)$ מתפרק לגורמים לינאריים.

שאלה 10

(א) דוגמה נגדית:

$$A = \begin{pmatrix} 2 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 2 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 2 \end{pmatrix}, \quad B = \begin{pmatrix} 2 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 2 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 2 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 2 \end{pmatrix}.$$

A ו- B לא דומות:

$$A - 2I = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} \Rightarrow \dim(\text{Nul}(A - 2I)) = 3.$$

$$B - 2I = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} \Rightarrow \dim(\text{Nul}(B - 2I)) = 2.$$

ז"א הריבוי גאומטרי של הערך עצמי $\lambda = 2$ של A , והריבוי גאומטרי של הערך עצמי $\lambda = 2$ של B לא זהים, לכן A ו- B לא דומות. אבל ל- A ו- B יש אותו פולינום מינימלי:

$$m_A(x) = m_B(x) = (x-2)^2.$$

(ב) דוגמה נגדית:

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 2 \end{pmatrix}, \quad B = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 2 \end{pmatrix}.$$

$$p_A(x) = (x-1)^3(x-2), \quad p_B(x) = (x-1)^2(x-2)^2.$$

$$m_A(x) = (x-1)^2(x-2), \quad m_B(x) = (x-1)^2(x-2).$$

שאלה 11

לפי משפט קיילי המילטון, לכל $A \in \mathbb{R}^{2 \times 2}$ מטריצה ריבועית, $p_A(A) = 0$ כאשר $p_A(x)$ הוא הפולינום האופייני של A .

עבור מטריצה 2×2 , $p_A(x)$ הוא פולינום מתוקן מסדר 2. נרשום

$$p_A(x) = \alpha_0 + \alpha_1 x + x^2.$$

$$\begin{aligned} p_A(A) &= 0 \\ \Rightarrow \alpha_0 I + \alpha_1 A + A^2 &= 0 \\ \Rightarrow A^2 &= -\alpha_0 I - \alpha_1 A \end{aligned}$$

ז"א

$$A^2 \in \text{span}\{I, A\}.$$

מש"ל.

שאלה 12

(א) 1

$$\begin{aligned} |A - \lambda I| &= \begin{vmatrix} 2-\lambda & -1 & 1 \\ -1 & 2-\lambda & -1 \\ 0 & 0 & 1-\lambda \end{vmatrix} \\ &= (1-\lambda) \begin{vmatrix} 2-\lambda & -1 \\ -1 & 2-\lambda \end{vmatrix} \\ &= (1-\lambda) ((2-\lambda)(2-\lambda) - 1) \\ &= (1-\lambda) (\lambda^2 - 4\lambda + 4 - 1) \\ &= (1-\lambda) (\lambda^2 - 4\lambda + 3) \\ &= (1-\lambda) (\lambda-3) (\lambda-1) \\ &= -(\lambda-1)^2 (\lambda-3) \end{aligned}$$

הפולינום האופייני הוא

$$p_A(\lambda) = (\lambda-1)^2(\lambda-3).$$

האפשרויות לפולינום המינימלי הן:

$$(\lambda-1)(\lambda-3), \quad (\lambda-1)^2(\lambda-3).$$

נבדוק $(\lambda-1)(\lambda-3)$:

$$(A - I)(A - 3I) = \begin{pmatrix} 1 & -1 & 1 \\ -1 & 1 & -1 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} -1 & -1 & 1 \\ -1 & -1 & -1 \\ 0 & 0 & -2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

לכן $m_A(\lambda) = (\lambda-1)(\lambda-3)$.

(2) ערכים עצמיים:

$\lambda = 1$ מריבוי אלגברי 2

$\lambda = 3$ מריבוי אלגברי 1.

נחשב את המרחב עצמי V_1 השייך לערך עצמי 1:

$$\begin{pmatrix} 2-\lambda & -1 & 1 \\ -1 & 2-\lambda & -1 \\ 0 & 0 & 1-\lambda \end{pmatrix} \stackrel{\lambda=1}{=} \begin{pmatrix} 1 & -1 & 1 \\ -1 & 1 & -1 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} \xrightarrow{R_2 \rightarrow R_2 + R_1} \begin{pmatrix} 1 & -1 & 1 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

פתרון $(x, y, z) = (y - z, y, z) = y(1, 1, 0) + z(-1, 0, 1)$ לכן

$$V_1 = \text{span} \left\{ \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} -1 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix} \right\}$$

$\dim(V_1) = 2$, ז"א הריבוי גאומטרי 2.

נחשב את המרחב עצמי V_3 השייך לערך עצמי 3:

$$\begin{pmatrix} 2-\lambda & -1 & 1 \\ -1 & 2-\lambda & -1 \\ 0 & 0 & 1-\lambda \end{pmatrix} \stackrel{\lambda=3}{=} \begin{pmatrix} -1 & -1 & 1 \\ -1 & -1 & -1 \\ 0 & 0 & -2 \end{pmatrix} \xrightarrow{R_2 \rightarrow R_2 - R_1} \begin{pmatrix} -1 & -1 & 1 \\ 0 & 0 & -2 \\ 0 & 0 & -2 \end{pmatrix} \xrightarrow{R_3 \rightarrow R_3 - R_2} \begin{pmatrix} -1 & -1 & 1 \\ 0 & 0 & -2 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

פתרון $(x, y, z) = (-y, y, 0) = y(-1, 1, 0)$ לכן

$$V_3 = \text{span} \left\{ \begin{pmatrix} -1 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix} \right\}$$

$\dim(V_3) = 1$, ז"א הריבוי גאומטרי 1.

(3) עבור כל אחד של הערכים עצמיים הריבוי גאומטרי שווה לריבוי אלגברי לכן A לכסינה.

$$D = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 3 \end{pmatrix}, \quad P = \begin{pmatrix} 1 & -1 & -1 \\ 1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 \end{pmatrix}.$$

(1) (ב)

$$A \cdot u = \alpha u$$

A הפיכה לכן קיימת A^{-1} כך ש- $A \cdot A^{-1} = I$. נכפיל מצד שמאל ב- A^{-1} :

$$A^{-1} \cdot A \cdot u = A^{-1} \cdot (\alpha u) \quad \Rightarrow \quad I \cdot u = \alpha A^{-1} \cdot u \quad \Rightarrow \quad u = \alpha A^{-1} \cdot u.$$

A הפיכה לכן 0 לא יכול להיות ערך עצמי, כלומר $\alpha \neq 0$. לכן ההופכית $\alpha^{-1} = \frac{1}{\alpha}$ קיימת. נכפיל ב- α^{-1} ונקבל

$$\alpha^{-1} u = \alpha^{-1} \cdot \alpha A^{-1} \cdot u \quad \Rightarrow \quad A^{-1} \cdot u = \frac{1}{\alpha} u.$$

(2)

$$A \cdot u = \alpha u \quad \Rightarrow \quad A^2 \cdot u = A \cdot (\alpha u) = \alpha A \cdot u = \alpha \cdot \alpha u = \alpha^2 u.$$

שאלה 14

(א) 1 הפולינום האופייני של A הוא:

$$|A - xI| = \begin{vmatrix} -x & 1 & 0 \\ 0 & -x & 1 \\ 1 & 0 & -x \end{vmatrix} = -x \cdot (x^2) - 1 \cdot (-1) = 1 - x^3 .$$

לכן $p_A(x) = A^3 - I$ לפי משפט קיילי-המילטון:

$$p_A(A) = 0 \quad \Rightarrow \quad A^3 - I = 0 \quad \Rightarrow \quad A^3 = I \quad \Rightarrow \quad A \cdot A^2 = I$$

לכן

$$A^{-1} = A^2 = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 0 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \end{pmatrix} .$$

(2

$$A^{15} = (A^3)^5 = I^5 = I .$$

(ב) נרשום $f(x)$ בצורה

$$f(x) = x^2 - 2x + 3 = x^2 + 2x + 1 - 4x + 2 = (x + 1)^2 - 4 \left(x - \frac{1}{2} \right) = m_A(x) - 4 \left(x - \frac{1}{2} \right) .$$

נציב A בפולינום f :

$$f(A) = m_A(A) - 4 \left(A - \frac{1}{2}I \right) = -4 \left(A - \frac{1}{2}I \right) ,$$

בגלל ש- $m_A(A) = 0$ כי A מאפסת את הפולינום המינימלי. לכן

$$|f(A)| = (-4)^n \left| A - \frac{1}{2}I \right| .$$

$|A - \frac{1}{2}I| \neq 0$ כי $\frac{1}{2}$ לא ערך עצמי של A בגלל ש $\frac{1}{2}$ לא שורש של הפולינום המינימלי. לכן

$$|f(A)| \neq 0$$

ולכן $f(A)$ הפיכה.