

מחלקה למדעי המחשב

09/06/24 כ"ב בניסן תשפ"ד

14 : 00 – 17 : 00

## אלגברה ליניארית 1 למדמ"ח

מועד ג'

מרצים: ד"ר זהבה צבי, ד"ר ירמיהו מילר, ד"ר מרינה ברשדסקי.

תשפ"ד סמסטר א'

השאלון מכיל 11 עמודים (כולל עמוד זה וכולל דף נוסחאות).

**בהצלחה!**

### הנחיות למדור בחינות שאלוני בחינה

• לשאלון הבחינה יש לצרף מחברת.

• ניתן להשתמש במחשבון מדעי לא גרפי עם צג קטן.

### חומר עזר

• דפי נוסחאות של הקורס (7 עמודים בפורמט A4), מצורפים לשאלון.

אחר / הערות יש לענות על השאלות באופן הבא:

• יש לנמק היטב כל שלב של פתרון. תשובה ללא הסבר וללא נימוק, אפילו נכונה, לא תתקבל.

• יש לפתור 4 מתוך 5 השאלות הבאות. משקל כל שאלה 25 נקודות.

• סדר התשובות אינו משנה, אך יש לרשום ליד כל תשובה את מספרה.

• הסבר היטב את מהלך הפתרון.

• יש לציין את השאלות שעניתם עליהן בתחילת המחברת.

**שאלה 1 (25 נקודות)**
**(א) (13 נקודות)**

נתונה המערכת הליניארית

$$\left. \begin{aligned} x + 3y + (k - 2)z &= 3 \\ kx + (5k - 4)y + (k^2 - 2k + 4)z &= 3k + 2 \\ -2kx + (-4 - 4k)y + (-k^2 - k + 8)z &= -5k - 1 \end{aligned} \right\}$$

עבור אילו ערכי הפרמטר  $k$  למערכת פתרון יחיד, אינסוף פתרונות ואין פתרון. במקרה של אינסוף פתרונות רשמו את הפתרון הכללי.

**(ב) (3 נקודות) נתונים הווקטורים במרחב ווקטורי  $\mathbb{R}_{\leq 2}[x]$ :**

$$\{u_1 = 1 + kx - 2kx^2, u_2 = 3 + (5k - 4)x + (-4 - 4k)x^2, u_3 = k - 2 + (k^2 - 2k + 4)x + (-k^2 - k + 8)x^2\}.$$

עבור אילו ערכי הפרמטר  $k$  הקבוצה  $\{u_1, u_2\}$  פורשת  $\mathbb{R}_{\leq 2}[x]$ ?

**(ג) (3 נקודות) עבור אילו ערכי הפרמטר  $k$  הקבוצה  $\{u_1, u_2, u_3\}$  פורשת  $\mathbb{R}_{\leq 2}[x]$ ?**

לכל אחד מהקבוצות הבאות הוכיחו או הפריכו שהיא שדה:

**(ד) (4 נקודות)  $F_1 = \{a \in \mathbb{R}\}$  שעליה מוגדרות הפעולות חיבור  $\oplus$  וכפל  $\odot$  לפי הנוסחאות:**

$$a \oplus b = 2a + 3b, \quad a \odot b = 2ab + a + 2b.$$

**(ה) (4 נקודות)  $F_2 = \left\{ \begin{pmatrix} a & 0 \\ 0 & b \end{pmatrix} \mid a, b \in \mathbb{R} \right\}$  עליה מוגדרות הפעולות חיבור מטריצות וכפל מטריצות.**
**שאלה 2 (25 נקודות)**

במרחב  $\mathbb{R}^{2 \times 2}$  נתונים הווקטורים

$$u_1 = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 1 & 3 \end{pmatrix}, \quad u_2 = \begin{pmatrix} 2 & -1 \\ 1 & 2 \end{pmatrix}, \quad u_3 = \begin{pmatrix} -1 & 8 \\ 1 & 5 \end{pmatrix}, \quad w = \begin{pmatrix} a & 1 \\ b & 5 \end{pmatrix}$$

**(א) (5 נקודות) עבור אילו ערכי  $a, b$  ווקטור  $w$  שייך לתת מרחב הנפרש על ידי הווקטורים  $u_1, u_2, u_3$ ?**
**(ב) (5 נקודות) עבור הערכים של  $a, b$  שמצאת בסעיף א', רשמו את ווקטור  $w$  כצירוף לינארי של  $u_1, u_2, u_3$  בשתי דרכים שונות (רשמו שני צירופים שונים).**

(ג) (4 נקודות) האם הווקטורים  $u_1, u_2, u_3, w$  פורשים המרחב  $\mathbb{R}^{2 \times 2}$ ? נמקו את תשובתכם.

(ד) (5 נקודות) האם הווקטורים  $u_1, u_2, u_3$  תלויים לינארית? אם כן מצאו צירוף לינארי לא טריוויאלי של  $u_1, u_2, u_3$  השווה לווקטור האפס.

(ה) (6 נקודות) נתונה הפונקציה  $T: \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^3$  המוגדרת על ידי

$$T \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} x+1 \\ y \\ x+y \end{pmatrix}.$$

בדקו אם  $T$  העתקה לינארית.

## שאלה 3 (25 נקודות)

נתונה מטריצה  $C$  במרחב  $\mathbb{R}^{3 \times 3}$ :

$$C = \begin{pmatrix} a & 9 & 0 \\ 1 & a & 1 \\ 1 & a & a \end{pmatrix}$$

(א) (5 נקודות) לכל ערך של  $a$  מצאו את המימד ובסיס של  $\text{Nul}(C)$ .

(ב) (5 נקודות) לכל ערך של  $a$  מצאו את המימד ובסיס של  $\text{Col}(C)$ .

(ג) (5 נקודות) נתונה מטריצה  $M \in \mathbb{R}^{4 \times 8}$ . האם יכול להיות ש- $\dim(\text{Nul}(M)) = 3$ ? נמקו את תשובתכם.

תהיינה  $A, B \in \mathbb{R}^{n \times n}$ . הוכיחו או הפריכו על ידי דוגמה נגדית את הטענות הבאות:

(ד) (5 נקודות) אם  $AB = A$  ו- $A \neq 0$  אז  $B = I$ .

(ה) (5 נקודות) אם קיים ווקטור  $u \in \mathbb{R}^n$  ( $u \neq \bar{0}$ ) המקיים  $Au = Bu$  אז  $A = B$ .

## שאלה 4 (25 נקודות)

(א) (7 נקודות) נתונות הקבוצות ווקטורים של  $\mathbb{R}_{\leq 2}[x]$ :

$$B = \{1 + 2x + 3x^2, 1 - x^2, 1 + 2x\}, \quad C = \{2x - x^2, 1 + x, 1 + x^2\}.$$

הוכיחו כי הקבוצה  $B$  בסיס של  $\mathbb{R}_{\leq 2}[x]$  והקבוצה  $C$  בסיס של  $\mathbb{R}_{\leq 2}[x]$ .

(ב) (6 נקודות) נתון הווקטור  $w$  של  $\mathbb{R}_{\leq 2}[x]$  אשר הווקטור הקואורדינטות שלו על פי בסיס  $B$  הינו

מצאו את הווקטור הקואורדינטות של  $w$  על פי הבסיס  $C$ .  $[w]_B = \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ 1 \end{pmatrix}$ .

(ג) (6 נקודות) נתונים הווקטורים  $w_1, w_2, w_3$  של המרחב ווקטורי  $\mathbb{R}_{\leq 2}[x]$ :

$$w_1 = b_1 + b_2 + b_3, \quad w_2 = b_1 - b_2 + 3b_3, \quad w_3 = b_1 + 2b_2.$$

קבעו אם הווקטורים  $w_1, w_2, w_3$  בלתי תלויים ליניארית.

יהיו ווקטורים שונים של  $\mathbb{R}^n$  ( $u_1 \neq u_2 \neq u_3$  ו-  $n \geq 3$ ). הוכיחו או הפריכו על ידי דוגמה נגדית:

(ד) (3 נקודות) אם  $\{u_1, u_2\}$  בת"ל אז  $\{u_1, u_2, u_3\}$  בת"ל.

(ה) (3 נקודות) אם  $\{u_1, u_2, u_3\}$  בת"ל אז  $\{u_1, u_2\}$  בת"ל.

## שאלה 5 (25 נקודות)

תהי  $T : \mathbb{R}_{\leq 2}[x] \rightarrow \mathbb{R}_{\leq 2}[x]$  העתקה ליניארית המוגדרת ע"י:

$$T(a + bx + cx^2) = (a - 2c) + (a - b - c)x + (a - 2c)x^2.$$

(א) (5 נקודות) מצאו את המטריצה המייצגת הסטנדרטית של  $T$ .

(ב) (5 נקודות) מצאו בסיס ומימד לגרעין של  $T$ .

(ג) (5 נקודות) מצאו בסיס ומימד לתמונה של  $T$ .

(ד) (5 נקודות) הוכיחו שלא קיימת מטריצה  $B$  שמקיימת  $A \cdot B = 2I$ , כאשר  $I$  המטריצה היחידה.

(ה) (5 נקודות) נניח כי  $S : U \rightarrow V$  העתקה ליניארית ממרחב ווקטורי  $U$  למרחב ווקטורי  $V$ . הוכיחו או הפריכו על ידי דוגמה נגדית:

אם  $\{u_1, \dots, u_k\}$  ת"ל אז  $\{S(u_1), \dots, S(u_k)\}$  ת"ל.

## פתרונות

### שאלה 1 (25 נקודות)

#### (א) (13 נקודות)

$$\begin{pmatrix} 1 & 3 & k-2 & | & 3 \\ k & 5k-4 & (k-2)k+4 & | & 3k+2 \\ -2k & -4(k+1) & -k^2-k+8 & | & -5k-1 \end{pmatrix} \xrightarrow[R_3 \rightarrow R_3 + 2kR_1]{R_2 \rightarrow R_2 - kR_1} \begin{pmatrix} 1 & 3 & k-2 & | & 3 \\ 0 & 2(k-2) & 4 & | & 2 \\ 0 & 2(k-2) & k^2-5k+8 & | & k-1 \end{pmatrix}$$

$$\xrightarrow{R_3 \rightarrow R_3 - R_2} \begin{pmatrix} 1 & 3 & k-2 & | & 3 \\ 0 & 2(k-2) & 4 & | & 2 \\ 0 & 0 & k^2-5k+4 & | & k-3 \end{pmatrix}$$

$$= \begin{pmatrix} 1 & 3 & k-2 & | & 3 \\ 0 & 2(k-2) & 4 & | & 2 \\ 0 & 0 & (k-4)(k-1) & | & k-3 \end{pmatrix}$$

עבור  $k=2$  נקבל:

$$\begin{pmatrix} 1 & 3 & 0 & | & 3 \\ 0 & 0 & 4 & | & 2 \\ 0 & 0 & -2 & | & -1 \end{pmatrix} \xrightarrow{R_3 \rightarrow 2R_3 + R_2} \begin{pmatrix} 1 & 3 & 0 & | & 3 \\ 0 & 0 & 4 & | & 2 \\ 0 & 0 & 0 & | & 0 \end{pmatrix}$$

יש משתנה חופשי ואין שורת סתירה לכן יש אינסוף פתרונות. פתרון הכללי:  $y \in \mathbb{R}$ ,  $(x, y, z) = (3 - 3y, y, \frac{1}{2})$ .

עבור  $k=4$  נקבל  $\begin{pmatrix} 1 & 3 & 2 & | & 3 \\ 0 & 4 & 4 & | & 2 \\ 0 & 0 & 0 & | & 1 \end{pmatrix}$ . קיבלנו שורת סתירה ולכן לא קיים פתרון.

עבור  $k=1$  נקבל  $\begin{pmatrix} 1 & 3 & -1 & | & 3 \\ 0 & -2 & 4 & | & 2 \\ 0 & 0 & 0 & | & -2 \end{pmatrix}$ . קיבלנו שורת סתירה ולכן לא קיים פתרון.

עבור  $k \neq 1, 2, 4$  אין שורת סתירה ואין משתנה חופשי לכן למערכת פתרון יחיד.

**(ב) (3 נקודות)**  $\dim(\mathbb{R}_{\leq 2}[x]) = 3$  ובקבוצה  $\{u_1, u_2\}$  יש רק 2 ווקטורים לכן אין מצב ש  $\{u_1, u_2\}$  פורשת  $\mathbb{R}_{\leq 2}[x]$ . ז"א לא קיים ערך של  $k$  עבורו הקבוצה  $\{u_1, u_2\}$  פורשת  $\mathbb{R}_{\leq 2}[x]$ .

**(ג) (3 נקודות)** נרשום  $\{u_1, u_2, u_3\}$  כווקטורים על ידי האיזומורפיזם הטבעי:

$$w_1 = \begin{pmatrix} 1 \\ k \\ -2k \end{pmatrix}, \quad w_2 = \begin{pmatrix} 3 \\ 5k-4 \\ -4-4k \end{pmatrix}, \quad w_3 = \begin{pmatrix} k-2 \\ k^2-2k+4 \\ -k^2-k+8 \end{pmatrix}$$

נבדוק עבור אילו ערכי  $k$  הווקטורים בת"ל. בעזרת סעיף א':

$$\begin{pmatrix} | & | & | \\ w_1 & w_2 & w_3 \\ | & | & | \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 3 & k-2 \\ k & 5k-4 & (k-2)k+4 \\ -2k & -4(k+1) & -k^2-k+8 \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} 1 & 3 & k-2 \\ 0 & 2(k-2) & 4 \\ 0 & 0 & (k-4)(k-1) \end{pmatrix}$$

עבור  $k \neq 1, 2, 4$  כל העמודות מובילות לכן הקבוצה בת"ל לכן הקבוצה פורשת  $\mathbb{R}_{\leq 2}[x]$ .

(ד) (4 נקודות)  $F_1$  לא שדה. דוגמה נגדית:  $a = 1, b = 2$ .

$$1 \oplus 2 = 2 \cdot 1_3 \cdot 2 = 8, \quad 2 \oplus 1 = 2 \cdot 2 + 3 \cdot 1 = 7, \quad 1 \oplus 2 \neq 2 \oplus 1.$$

כלומר חוק החילוף לא מתקיים.

(ה) (4 נקודות)  $F_2$  לא שדה. דוגמה נגדית:  $A = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}$ .

$A$  לא הפיכה לכן לא קיימת  $A^{-1}$  כך ש-  $A \cdot A^{-1} = I$  כאשר  $I$  מטריצה יחידה.

## שאלה 2 (25 נקודות)

(א) (5 נקודות)  $\mathbb{R}^{2 \times 2} \cong \mathbb{R}^4$  לכן אפשר לעבוד עם הווקטורים ב-  $\mathbb{R}^4$ :

$$v_1 = \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ 1 \\ 3 \end{pmatrix}, \quad v_2 = \begin{pmatrix} 2 \\ -1 \\ 1 \\ 2 \end{pmatrix}, \quad v_3 = \begin{pmatrix} -1 \\ 8 \\ 1 \\ 5 \end{pmatrix}, \quad v = \begin{pmatrix} a \\ 1 \\ b \\ 5 \end{pmatrix}$$

$$v = \text{span} \{v_1, v_2, v_3\} \Rightarrow v = k_1 v_1 + k_2 v_2 + k_3 v_3.$$

$$\left( \begin{array}{ccc|c} 1 & 2 & -1 & a \\ 2 & -1 & 8 & 1 \\ 1 & 1 & 1 & b \\ 3 & 2 & 5 & 5 \end{array} \right) \xrightarrow{\substack{R_2 \rightarrow R_2 - 2R_1 \\ R_3 \rightarrow R_3 - R_1 \\ R_4 \rightarrow R_4 - 3R_1}} \left( \begin{array}{ccc|c} 1 & 2 & -1 & a \\ 0 & -5 & 10 & 1-2a \\ 0 & -1 & 2 & b-a \\ 0 & -4 & 8 & 5-3a \end{array} \right)$$

$$\xrightarrow{R_2 \leftrightarrow R_3} \left( \begin{array}{ccc|c} 1 & 2 & -1 & a \\ 0 & -1 & 2 & b-a \\ 0 & -5 & 10 & 1-2a \\ 0 & -4 & 8 & 5-3a \end{array} \right)$$

$$\xrightarrow{\substack{R_3 \rightarrow R_3 - 5R_2 \\ R_4 \rightarrow R_4 - 4R_2}} \left( \begin{array}{ccc|c} 1 & 2 & -1 & a \\ 0 & -1 & 2 & b-a \\ 0 & 0 & 0 & 3a-5b+1 \\ 0 & 0 & 0 & a-4b+5 \end{array} \right)$$

**המכללה האקדמית להנדסה סמי שמעון**

$$b = 2, a = 3 \Leftrightarrow \begin{cases} 3a - 5b = -1 \\ a - 4b = -5 \end{cases} \quad \text{למערכת יש פתרון כאשר}$$

(ב) (5 נקודות) עבור  $b = 2, a = 3$ :

$$\left( \begin{array}{ccc|c} 1 & 2 & -1 & 3 \\ 0 & -1 & 2 & -1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{array} \right) \xrightarrow{R_1 \rightarrow R_1 + 2R_2} \left( \begin{array}{ccc|c} 1 & 0 & 3 & 1 \\ 0 & 1 & -2 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{array} \right)$$

$$k_1 = -2, k_2 = 3 \Leftrightarrow k_3 = 1 \quad \text{נציב} \quad k_3 \in \mathbb{R} \quad \begin{cases} k_1 = -3k_3 + 1 \\ k_2 = 2k_3 + 1 \end{cases}$$

$$w = -2u_1 + 3u_2 + u_3 .$$

$$k_1 = 1, k_2 = 1 \Leftrightarrow k_3 = 0 \quad \text{נציב}$$

$$w = u_1 + u_2 .$$

(ג) (4 נקודות)

$u_1, u_2, u_3, w$  תלויים לינארית בגלל שלא כל העמודות מובילות, לכן  $u_1, u_2, u_3, w$  תלויים לינארית. לפיכך  $u_1, u_2, u_3, w$  אינם פורשים את  $\mathbb{R}^{2 \times 2}$ . נמתא את הצירוף הלינארי הלא טריוויאלי של  $u_1, u_2, u_3$  ששווה לוקטור האסס:

$$\left( \begin{array}{ccc|c} 1 & 0 & 3 & 0 \\ 0 & 1 & -2 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{array} \right)$$

$$(x, y, z) = (-3z, 2z, z), \quad z \in \mathbb{R} \quad \text{נציב} \quad x = 3, y = 2 \Leftrightarrow z = 1$$

$$-3u_1 + 2u_2 + u_3 = 0 .$$

(ד) (6 נקודות)  $T : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^3$  המוגדרת על ידי

$$T \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} x+1 \\ y \\ x+y \end{pmatrix} .$$

$$T \text{ לא העתקה לינארית. דוגמה נגדית: } u_1 = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix} .$$

$$T(u_1) = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix} , \quad T(2u_1) = T \begin{pmatrix} 2 \\ 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 3 \\ 0 \\ 2 \end{pmatrix} \neq 2T(u_1) .$$

**המכללה האקדמית להנדסה סמי שמעון**

## שאלה 3 (25 נקודות)

(א) (5 נקודות)

$$\begin{pmatrix} a & 9 & 0 \\ 1 & a & 1 \\ 1 & a & a \end{pmatrix} \xrightarrow{\substack{R_2 \rightarrow aR_1 - R_1 \\ R_3 \rightarrow aR_3 - R_1}} \begin{pmatrix} a & 9 & 0 \\ 0 & a^2 - 9 & a \\ 0 & a^2 - 9 & a^2 \end{pmatrix} \xrightarrow{R_3 \rightarrow R_3 - R_2} \begin{pmatrix} a & 9 & 0 \\ 0 & a^2 - 9 & a \\ 0 & 0 & (a-1)a \end{pmatrix}$$

$$= \begin{pmatrix} a & 9 & 0 \\ 0 & (a+3)(a-3) & a \\ 0 & 0 & (a-1)a \end{pmatrix}$$

עבור  $a = 0$  נקבל  $\begin{pmatrix} 0 & 9 & 0 \\ 0 & -9 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} \xrightarrow{R_2 \rightarrow R_2 + R_1} \begin{pmatrix} 0 & 9 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$  פתרון הכללי למשוואה הומוגנית:

$$\begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} x \\ 0 \\ z \end{pmatrix} = x \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} + z \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}, \quad x, z \in \mathbb{R}.$$

$$\dim(\text{Nul}(C)) = 2, B_{\text{Nul}(C)} = \left\{ \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix} \right\}$$

עבור  $a = 3$  נקבל  $\begin{pmatrix} 3 & 9 & 0 \\ 0 & 0 & 3 \\ 0 & 0 & 6 \end{pmatrix} \xrightarrow{R_3 \rightarrow R_3 - 2R_2} \begin{pmatrix} 3 & 9 & 0 \\ 0 & 0 & 3 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$  פתרון הכללי למשוואה הומוגנית:

$$\begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -3y \\ y \\ 0 \end{pmatrix} = y \begin{pmatrix} -3 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}, \quad y \in \mathbb{R}.$$

$$\dim(\text{Nul}(C)) = 1, B_{\text{Nul}(C)} = \left\{ \begin{pmatrix} -3 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix} \right\}$$

עבור  $a = -3$  נקבל  $\begin{pmatrix} -3 & 9 & 0 \\ 0 & 0 & -3 \\ 0 & 0 & 12 \end{pmatrix} \xrightarrow{R_3 \rightarrow R_3 + 4R_2} \begin{pmatrix} -3 & 9 & 0 \\ 0 & 0 & -3 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$  פתרון הכללי למשוואה הומוגנית:

$$\begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 3y \\ y \\ 0 \end{pmatrix} = y \begin{pmatrix} 3 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}, \quad y \in \mathbb{R}.$$



$$\dim(\text{Nul}(C)) = 1, B_{\text{Nul}(C)} = \left\{ \begin{pmatrix} 3 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix} \right\}$$

עבור  $a = 1$  נקבל  $\begin{pmatrix} 1 & 9 & 0 \\ 0 & -8 & 1 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} \xrightarrow{R_1 \rightarrow 8R_1 + 9R_2} \begin{pmatrix} 8 & 0 & 9 \\ 0 & -8 & 1 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$  פתרון הכללי למשוואה הומוגנית:

$$\begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -\frac{9}{8}z \\ \frac{1}{8}z \\ z \end{pmatrix} = \frac{1}{8}z \begin{pmatrix} -9 \\ 1 \\ 8 \end{pmatrix}, \quad z \in \mathbb{R}.$$

$$\dim(\text{Nul}(C)) = 1, B_{\text{Nul}(C)} = \left\{ \begin{pmatrix} -9 \\ 1 \\ 8 \end{pmatrix} \right\}$$

**(ב) (5 נקודות)**

$$\dim(\text{Col}(C)) = 1, B_{\text{Col}(C)} = \left\{ \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} \right\}, a = 0 \text{ עבור}$$

$$\dim(\text{Col}(C)) = 2, B_{\text{Col}(C)} = \left\{ \begin{pmatrix} 3 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 3 \end{pmatrix} \right\}, a = 3 \text{ עבור}$$

$$\dim(\text{Col}(C)) = 2, B_{\text{Col}(C)} = \left\{ \begin{pmatrix} -3 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ -3 \end{pmatrix} \right\}, a = -3 \text{ עבור}$$

$$\dim(\text{Col}(C)) = 1, B_{\text{Col}(C)} = \left\{ \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix} \right\}, a = 1 \text{ עבור}$$

עבור  $a = -3$  נקבל  $\begin{pmatrix} -3 & 9 & 0 \\ 0 & 0 & -3 \\ 0 & 0 & 12 \end{pmatrix} \xrightarrow{R_3 \rightarrow R_3 + 4R_2} \begin{pmatrix} -3 & 9 & 0 \\ 0 & 0 & -3 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$  פתרון הכללי למשוואה הומוגנית:

$$\begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 3y \\ y \\ 0 \end{pmatrix} = y \begin{pmatrix} 3 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}, \quad y \in \mathbb{R}.$$

$$\dim(\text{Nul}(C)) = 1, B_{\text{Nul}(C)} = \left\{ \begin{pmatrix} 3 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix} \right\}$$

עבור  $a = 1$  נקבל  $\begin{pmatrix} 1 & 9 & 0 \\ 0 & -8 & 1 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} \xrightarrow{R_1 \rightarrow 8R_1 + 9R_2} \begin{pmatrix} 8 & 0 & 9 \\ 0 & -8 & 1 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$ . פתרון הכללי למשוואה הומוגנית:

$$\begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -\frac{9}{8}z \\ \frac{1}{8}z \\ z \end{pmatrix} = \frac{1}{8}z \begin{pmatrix} -9 \\ 1 \\ 8 \end{pmatrix}, \quad z \in \mathbb{R}.$$

$$\dim(\text{Nul}(C)) = 1, B_{\text{Nul}(C)} = \left\{ \begin{pmatrix} -9 \\ 1 \\ 8 \end{pmatrix} \right\}$$

(ג) (5 נקודות)  $M \in \mathbb{R}^{4 \times 8}$ . אם  $\dim(\text{Nul}(M)) = 3$  אז  $\text{rank}(M) = 8 - 3 = 5$ . וז"ל  $\dim(\text{Row}(M)) = 5$ .  
למטריצה  $M$  יש 4 שורות אז  $\dim(\text{Row}(M)) \leq 4$ . לכן לא יכול להיות ש- $\dim(\text{Nul}(M)) = 3$ .

(ד) (5 נקודות) טענה לא נכונה. דוגמה נגדית:  $A = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}, B = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}$ .

$$AB = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix} = A.$$

(ה) (5 נקודות) טענה לא נכונה. דוגמה נגדית:  $u = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix}, A = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}, B = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}$ .

$$Au = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix}, \quad Bu = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix}.$$

הרי  $Au = Bu$  ו- $A \neq B$ .

## שאלה 4 (25 נקודות)

(א) (7 נקודות)

$$b_1 = \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ 3 \end{pmatrix}, \quad b_2 = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ -1 \end{pmatrix}, \quad b_3 = \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ 0 \end{pmatrix}$$

$$\left( \begin{array}{ccc|ccc} | & | & | & & & \\ b_1 & b_2 & b_3 & & & \\ | & | & | & & & \end{array} \right) = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 2 & 0 & 2 \\ 3 & -1 & 0 \end{pmatrix} \xrightarrow{\substack{R_2 \rightarrow R_2 - 2R_1 \\ R_3 \rightarrow R_3 - 3R_1}} \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 0 & -2 & 0 \\ 0 & -4 & -3 \end{pmatrix} \xrightarrow{R_3 \rightarrow R_3 - 2R_2} \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 0 & -2 & 0 \\ 0 & 0 & -3 \end{pmatrix}$$

כל העמודות מובילות לכן  $b_1, b_2, b_3$  בת"ל.  $\dim\{b_1, b_2, b_3\} = 3 = \dim(\mathbb{R}_{\leq 2}[x])$ . לכן הקבוצה  $\{b_1, b_2, b_3\}$  מהווה בסיס של  $\mathbb{R}_{\leq 2}[x]$ .

$$c_1 = \begin{pmatrix} 0 \\ 2 \\ -1 \end{pmatrix}, \quad c_2 = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}, \quad c_3 = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}$$

$$\left( \begin{array}{c|c|c} | & | & | \\ c_1 & c_2 & c_3 \\ | & | & | \end{array} \right) = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 1 \\ 2 & 1 & 0 \\ -1 & 0 & 1 \end{pmatrix} \xrightarrow{R_1 \leftrightarrow R_2} \begin{pmatrix} 2 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 1 \\ -1 & 0 & 1 \end{pmatrix} \xrightarrow{R_3 \rightarrow 2R_3 + R_1} \begin{pmatrix} 2 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 2 \end{pmatrix} \xrightarrow{R_3 \rightarrow R_3 - R_2} \begin{pmatrix} 2 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

כל העמודות מובילות לכן  $c_1, c_2, c_3$  בת"ל.  $\dim \{c_1, c_2, c_3\} = 3 = \dim(\mathbb{R}_{\leq 2}[x])$ .  $\{c_1, c_2, c_3\}$  הקבוצה מהווה בסיס של  $\mathbb{R}_{\leq 2}[x]$ .

**(ב) (6 נקודות)**  $[w]_C = P_{B \rightarrow C}[w]_B$  כאשר  $P_{B \rightarrow C}$  המטריצה המעבר מבסיס  $B$  ל-  $C$  בסיס  $C$ .

$$\begin{aligned} (C|B) &= \left( \begin{array}{ccc|ccc} 0 & 1 & 1 & 1 & 1 & 1 \\ 2 & 1 & 0 & 2 & 0 & 2 \\ -1 & 0 & 1 & 3 & -1 & 0 \end{array} \right) \xrightarrow{R_1 \leftrightarrow R_2} \left( \begin{array}{ccc|ccc} 2 & 1 & 0 & 2 & 0 & 2 \\ 0 & 1 & 1 & 1 & 1 & 1 \\ -1 & 0 & 1 & 3 & -1 & 0 \end{array} \right) \\ &\xrightarrow{R_3 \rightarrow 2R_3 + R_1} \left( \begin{array}{ccc|ccc} 2 & 1 & 0 & 2 & 0 & 2 \\ 0 & 1 & 1 & 1 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 2 & 8 & -2 & 2 \end{array} \right) \\ &\xrightarrow{R_3 \rightarrow R_3 - R_2} \left( \begin{array}{ccc|ccc} 2 & 1 & 0 & 2 & 0 & 2 \\ 0 & 1 & 1 & 1 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & 7 & -3 & 1 \end{array} \right) \\ &\xrightarrow{R_2 \rightarrow R_2 - R_3} \left( \begin{array}{ccc|ccc} 2 & 1 & 0 & 2 & 0 & 2 \\ 0 & 1 & 0 & -6 & 4 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 7 & -3 & 1 \end{array} \right) \\ &\xrightarrow{R_1 \rightarrow R_1 - R_2} \left( \begin{array}{ccc|ccc} 2 & 0 & 0 & 8 & -4 & 2 \\ 0 & 1 & 0 & -6 & 4 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 7 & -3 & 1 \end{array} \right) \\ &\xrightarrow{R_1 \rightarrow \frac{1}{2}R_1} \left( \begin{array}{ccc|ccc} 1 & 0 & 0 & 4 & -2 & 1 \\ 0 & 1 & 0 & -6 & 4 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 7 & -3 & 1 \end{array} \right) \\ &\quad P_{B \rightarrow C} = \begin{pmatrix} 4 & -2 & 1 \\ -6 & 4 & 0 \\ 7 & -3 & 1 \end{pmatrix} \\ [w]_C &= P_{B \rightarrow C}[w]_B = \begin{pmatrix} 4 & -2 & 1 \\ -6 & 4 & 0 \\ 7 & -3 & 1 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ 2 \end{pmatrix}_C. \end{aligned}$$

**(ג) (6 נקודות)**

עלינו לבדוק האם  $\exists$  צירוף לינארי לא טריוויאלי של  $w_1, w_2, w_3$  אשר נותן את  $\vec{0}$  (ווקטור האפס).

$$\begin{aligned} 0 &= \alpha_1 w_1 + \alpha_2 w_2 + \alpha_3 w_3 \\ &= \alpha_1 (b_1 + b_2 + b_3) + \alpha_2 (b_1 - b_2 + 3b_3) + \alpha_3 () \\ &= (\alpha_1 + \alpha_2 + \alpha_3)b_1 + (\alpha_1 - \alpha_2 + 2\alpha_3)b_2 + (\alpha_1 + 3\alpha_2 + 0\alpha_3)b_3 \end{aligned}$$

יש לנו כאן צירוף לינארי של  $b_1, b_2, b_3$  שנותן את 0 מאחר והם בת"ל נקבל את המערכת הבאה:

$$\begin{aligned} \alpha_1 + \alpha_2 + \alpha_3 &= 0 \\ \alpha_1 - \alpha_2 + 2\alpha_3 &= 0 \\ \alpha_1 + 3\alpha_2 + 0\alpha_3 &= 0 \end{aligned}$$

אם למערכת פתרון יחיד אז  $w_1, w_2, w_3$  בת"ל אחרת  $w_1, w_2, w_3$  ת"ל.

$$\begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 1 & -1 & 2 \\ 1 & 3 & 0 \end{pmatrix} \xrightarrow{\substack{R_2 \rightarrow R_2 - R_1 \\ R_3 \rightarrow R_3 - R_1}} \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 0 & -2 & 1 \\ 0 & 2 & -1 \end{pmatrix} \xrightarrow{R_2 \rightarrow -\frac{1}{2}R_2} \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & -\frac{1}{2} \\ 0 & 2 & -1 \end{pmatrix}$$

$$\xrightarrow{R_3 \rightarrow R_3 - 2R_2} \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & -\frac{1}{2} \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} \xrightarrow{R_1 \rightarrow R_1 - R_2} \begin{pmatrix} 1 & 0 & \frac{3}{2} \\ 0 & 1 & -\frac{1}{2} \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

למערכת יש  $\infty$  פתרונות  $\Leftarrow w_1, w_2, w_3$  ת"ל.  
נשים לב

$$\frac{3}{2}w_1 - \frac{1}{2}w_2 = w_3.$$

**(ד) (3 נקודות)** טענה לא נכונה. דוגמה נגדית:  $u_1 = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}, u_2 = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}, u_3 = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}$  ווקטורים של  $\mathbb{R}^3$ . הרי

$\{u_1, u_2\}$  בת"ל ו-  $\{u_1, u_2, u_3\}$  ת"ל.

**(ה) (3 נקודות)** טענה נכונה. נוכיח דרך השלילה. נניח כי  $\{u_1, u_2, u_3\}$  בת"ל ו-  $\{u_1, u_2\}$  ת"ל.  
אז מתקיים

$$\alpha_1 u_1 + \alpha_2 u_2 = 0$$

עם מקדמים לא כולם אפסים, כלומר אחד המקדמים,  $\alpha_i \neq 0$ .  
נוסיף  $0 \cdot u_3$  לשני האגפים ונקבל

$$\alpha_1 u_1 + \alpha_2 u_2 + 0 \cdot u_3 = 0$$

הרי קיבלנו צירוף לינארי של  $u_1, u_2, u_3$  עם מקדמים לא כולם אפסים ששווה לווקטור האפס.  
ז"א  $u_1, u_2, u_3$  ת"ל. זאת סותר את ההנחה ש-  $u_1, u_2, u_3$  בת"ל.

**שאלה 5 (25 נקודות)**

**(א) (5 נקודות)** המטריצה המייצגת הסטנדרטית:  $A = \begin{pmatrix} 1 & 0 & -2 \\ 1 & -1 & -1 \\ 1 & 0 & -2 \end{pmatrix}$

**(ב) (5 נקודות)**

$$\begin{pmatrix} 1 & 0 & -2 \\ 1 & -1 & -1 \\ 1 & 0 & -2 \end{pmatrix} \xrightarrow[R_3 \rightarrow R_3 - R_1]{R_2 \rightarrow R_2 - R_1} \begin{pmatrix} 1 & 0 & -2 \\ 0 & -1 & 1 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} \xrightarrow{R_1 \rightarrow R_1 + 2R_2} \begin{pmatrix} 1 & -2 & 0 \\ 0 & -1 & 1 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

בסיס של  $\text{Nul}(A)$ :

$$B_{\text{Nul}(A)} = \left\{ \begin{pmatrix} 2 \\ 2 \\ 1 \end{pmatrix} \right\}$$

$$B_{\text{Ker}(T)} = \{2 + 2x + x^2\}$$

$$\dim(\text{Ker}(T)) = 2$$

**(ג) (5 נקודות)**

$$B_{\text{col}(A)} = \left\{ \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 \\ -1 \\ 0 \end{pmatrix} \right\}.$$

$$\dim(\text{Im}(A)) = 2$$

$$B_{\text{Im}(T)} = \{1 + x + x^2, -x\}.$$

$$\dim(\text{Im}(T)) = 2$$

**(ד) (5 נקודות)** מסעיף א'  $A = \begin{pmatrix} 1 & 0 & -2 \\ 1 & -1 & -1 \\ 1 & 0 & -2 \end{pmatrix}$

שורה שלישית שווה לשורה ראשונה לכן  $|A| = 0$  לא הפיכה.  
נניח כי  $A \leftarrow A \left( \frac{1}{2}B \right) = I \leftarrow AB = 2I$  הפיכה. בסתירה לכך ש-  $A$  לא הפיכה.

**(ה) (5 נקודות)**