

## שעור 9

### משחק בייסיאני

#### 9.1 עקרון האדישות

##### משפט 9.1 עקרון האדישות במשחק שני שחקנים

יהי  $\sigma^*$  שיווי משקל במשחק בצורה אסטרטגית.

- תהיינה  $s_1$  ו- $\hat{s}_1$  שתי אסטרטגיות טהורות של שחקן 1. אם  $\sigma_1^*(s_1) > 0$  וכן  $\sigma_1^*(\hat{s}_1) > 0$  אזי

$$U_1(s_1, \sigma_2^*) = U_1(\hat{s}_1, \sigma_2^*) .$$

- תהיינה  $s_2$  ו- $\hat{s}_2$  שתי אסטרטגיות טהורות של שחקן 2. אם  $\sigma_2^*(s_2) > 0$  וכן  $\sigma_2^*(\hat{s}_2) > 0$  אזי

$$U_2(\sigma_1^*, s_2) = U_2(\sigma_1^*, \hat{s}_2) .$$

##### משפט 9.2 \*עקרון האדישות במשחק $n$ שחקנים

יהי  $\sigma^*$  שיווי משקל במשחק בצורה אסטרטגית ותהיינה  $s_i$  ו- $\hat{s}_i$  שתי אסטרטגיות טהורות של שחקן  $i$ . אם  $\sigma_i^*(s_i) > 0$  וכן  $\sigma_i^*(\hat{s}_i) > 0$  אזי

$$U_i(s_i, \sigma_{-i}^*) = U_i(\hat{s}_i, \sigma_{-i}^*) .$$

#### דוגמה 9.1 ()

נתון המשחק הבא בצורה אסטרטגית.

$I \backslash II$	$L$	$R$
$T$	1, -1	0, 2
$B$	0, 1	2, 0

מצאו כל שיווי משקל של המשחק.

#### פתרון:

נבדוק שיווי משקל באסטרטגיות טהורות:

$I \backslash II$	$L$	$R$
$T$	<u>1</u> , -1	0, <u>2</u>
$B$	0, <u>1</u>	<u>2</u> , 0

ז"א אין נקודת שיווי משקל באסטרטגיות טהורות. לכן בהכרח קיימת נקודת שיווי משקל באסטרטגיות מעורבות.

$$S_1 = \{[x(T), (1-x)(B)] \mid x \in [0, 1]\}.$$

קבוצות האסטרטגיות של שחקן 1:  
המזוהה עם הקטע  $[0, 1]$ .

$$S_2 = \{[y(L), (1-y)(R)] \mid y \in [0, 1]\}$$

קבוצות האסטרטגיות של שחקן 2:  
המזוהה עם הקטע  $[0, 1]$ .

$$U_1(x, y) = xy + 2(1-x)(1-y) = 3xy - 2x - 2y + 2.$$

פונקצית התועלת של שחקן 1:

$$U_2(x, y) = -xy + 2x(1-y) + y(1-x) = -4xy + 2x + y.$$

פונקצית התועלת של שחקן 2:

נסמן תשובה טובה ביותר של שחקן 2 לאסטרטגיה  $x$  של שחקן 1 כ:

$$\sigma_2(x) = \operatorname{argmax}_{y \in [0, 1]} U_2(x, y) = \{y \in [0, 1] \mid U_2(x, y) \geq U_2(x, z) \forall z \in [0, 1]\}$$


ז"א  $\sigma_2(x)$  הוא אוסף של כל הערכים של  $y$  עבורם ל-  $U_2(x, y)$  יש מקסימום. נרשום  $U_2(x, y)$  כפונקציה לינארית של  $y$ :

$$U_2(x, y) = y(1 - 4x) + 2x.$$

אם השיפוע חיובי הפונקציה עולה והמקסימום מתקבל ב-  $y = 1$ .

אם השיפוע שלילי הפונקציה יורדת והמקסימום מתקבל ב-  $y = 0$ .

אם השיפוע 0 הפונקציה קבועה וכל הנקודות הן נקודות מקסימום והסימן של השיפוע משתנה ב-  $x = \frac{1}{4}$ .



נסמן תשובה טובה ביותר של שחקן 1 לאסטרטגיה  $y$  של שחקן 2 כ:

$$\sigma_1(y) = \operatorname{argmax}_{x \in [0, 1]} U_1(x, y) = \{x \in [0, 1] \mid U_1(x, y) \geq U_1(x, z) \forall z \in [0, 1]\}$$

ז"א  $\sigma_1(y)$  הוא אוסף של כל הערכים של  $x$  עבורם ל-  $U_1(x, y)$  יש מקסימום.


נרשום את  $U_1(x, y)$  כפונקציה לינארית של  $x$ :

$$U_1(x, y) = x(3y - 2) - 2y + 2.$$


אם השיפוע חיובי הפונקציה עולה והמקסימום מתקבל ב-  $x = 1$ .

אם השיפוע שלילי הפונקציה יורדת והמקסימום מתקבל ב-  $x = 0$ .

אם השיפוע 0 הפונקציה קבועה וכל הנקודות הן נקודות מקסימום והסימן של השיפוע משתנה ב-  $y = \frac{2}{3}$ .



צמד אסטרטגיות  $(x^*, y^*)$  נקודת שיווי משקל אם ורק אם  $x^* \in \sigma_1(y^*)$  ו-  $y^* \in \sigma_2(x^*)$ , כלומר אם ורק אם הנקודה  $(x^*, y^*)$  תהיה על שני הגרפים של  $\sigma_1(y)$  ו-  $\sigma_2(x)$ . הנקודה היחידה שמקיימת את תנאי זה היא  $(x^* = \frac{1}{4}, y^* = \frac{2}{3})$ .



לכן השיווי משקל היחיד של המשחק הוא  $(x^* = \frac{1}{4}, y^* = \frac{2}{3})$  והתשלומים לשחקנים 1 ו- 2 של השיווי משקל הם

$$U_1(x^*, y^*) = \frac{2}{3}, \quad U_2(x^*, y^*) = \frac{1}{2}.$$

## שיטה 2

לכל שתי זוג אסטרטגיות מעורבות  $(x, y)$  מתקיים

$$U_1(T, y) = y, \quad U_1(B, y) = 2(1 - y), \quad U_2(x, L) = 1 - 2x, \quad U_2(x, R) = 2x.$$

מעקרון האדישות, בשיווי משקל בהכרח שחקן 1 אדיש בין  $T$  ל-  $B$ , ושחקן 2 אדיש בין  $L$  ו-  $R$ . כלומר, אם  $(x^*, y^*)$  שיווי המשקל אזי

• שחקן 1 אדיש בין  $T$  ל-  $B$ :

$$U_1(T, y^*) = U_1(B, y^*) \Rightarrow y^* = 2(1 - y^*) \Rightarrow y^* = \frac{2}{3}.$$

• שחקן 2 אדיש בין  $L$  ל-  $R$ :

$$U_2(x^*, L) = U_2(x^*, R) \Rightarrow 1 - 2x^* = 2x^* \Rightarrow x^* = \frac{1}{4}$$

וקיבלנו אמנם את שיווי משקל שמצאנו קודם.

■

## 9.2 תחרות דואפול על פי קורנוט

### דוגמה 9.2 (י)

שני יצרניים 1 ו- 2 מייצרים אותו מוצר ומתחרים על שוק הקונים הפוטנציאליים. יהי  $q_1$  כמות המוצר שיצרן 1 מייצר ו-  $q_2$  כמות המוצר שיצרן 2 מייצר. הכמות הכוללת של מוצרים בשוק היא

$$Q = q_1 + q_2.$$

יהי  $P(Q)$  המחיר של יחידה של המוצר בשוק:

$$P(Q) = \begin{cases} a - Q & Q < a \\ 0 & Q \geq a \end{cases}.$$

(א) פרמטר שמכמת ביקוש למוצר בשוק שנקרא **פרמטר הביקוש**). נניח כי עלות הייצור של יחידה ליצרן 1 ועלות הייור של יחידה וליצרן 2 נתונות על ידי

$$C_1(q_1) = cq_1, \quad C_2(q_2) = cq_2.$$

מצאו את השיווי משקל של המשחק.

### פתרון:

זהו משחק שני שחקנים (היצרנים 1 ו-2). האסטרטגיות של שחקן 1 הן הכמויות  $q_1$  שהוא בוחר לייצר, אשר קבוצה רציפה של ערכים חיוביים, ובאותה מידה האסטרטגיות לשחקן 2 הן הקבוצה הרציפה של כמויות  $q_2$ . לכן קבוצת האסטרטגיות של כל שחקן היא  $[0, \infty)$ .

אם שחקן 1 בוחר באסטרטגיה  $q_1$  ושחקן 2 בוחר באסטרטגיה  $q_2$ , התשלום לשחקן 1 הוא

$$u_1(q_1, q_2) = q_1(a - q_1 - q_2) - q_1c = q_1(a - c - q_1 - q_2),$$

והתשלום לשחקן 2 הוא

$$u_2(q_1, q_2) = q_2(a - q_1 - q_2) - q_2c = q_2(a - c - q_1 - q_2).$$

במשחק שני שחקנים ווקטור אסטרטגיות  $(s_1^*, s_2^*)$  שיווי משקל אם

$$\begin{aligned} u_1(s_1^*, s_2^*) &\geq u_1(s_1, s_2^*) & \forall s_1 \in S_1, \\ u_2(s_1^*, s_2^*) &\geq u_2(s_1^*, s_2) & \forall s_2 \in S_2. \end{aligned}$$

ז"א הנקודה שבה

$$u_1(s_1^*, s_2^*) = \max_{s_1 \in S_1} u_1(s_1, s_2^*),$$

ו-  $s_2^*$  הנקודה שבה

$$u_2(s_1^*, s_2^*) = \max_{s_2 \in S_2} u_2(s_1^*, s_2).$$

במודל של קורנוט, תנאי זה הוא כי הווקטור אסטרטגיות  $(q_1^*, q_2^*)$  שיווי משקל אם לכל שחקן:

$$u_1(q_1^*, q_2^*) = \max_{0 \leq q_1 \leq \infty} u_1(q_1, q_2^*) = \max_{0 \leq q_1 \leq \infty} [q_1(a - c - q_1 - q_2^*)]$$

ו-

$$u_2(q_1^*, q_2^*) = \max_{0 \leq q_2 \leq \infty} u_2(q_1^*, q_2) = \max_{0 \leq q_2 \leq \infty} [q_2(a - c - q_1^* - q_2)].$$

המקסימום של  $u_1(q_1, q_2^*)$  לפי  $q_1$  מתקבל בנקודה שבה הנגזרת מתאפסת:

$$\frac{\partial u_1(q_1, q_2^*)}{\partial q_1} = a - c - 2q_1 - q_2^* \stackrel{!}{=} 0 \Rightarrow q_1^* = \frac{a - c - q_2^*}{2}.$$

ובאותה מידה המקסימום של  $u_2(q_1^*, q_2)$  לפי  $q_2$  מתקבל בנקודה שבה הנגזרת מתאפסת:

$$\frac{\partial u_2(q_1^*, q_2)}{\partial q_2} = a - c - q_1^* - 2q_2 \stackrel{!}{=} 0 \Rightarrow q_2^* = \frac{a - c - q_1^*}{2}.$$

לפיכך, אם הצמד כמויות  $(q_1^*, q_2^*)$  שיווי משקל אז הכמויות חייבות לקיים את התנאים

$$q_1^* = \frac{1}{2}(a - q_2^* - c), \quad q_2^* = \frac{1}{2}(a - q_1^* - c).$$

הפתרון למערכת זו הינו

$$q_1^* = q_2^* = \frac{a - c}{3}.$$

### דוגמה 9.3 ()

שני יצרניים 1 ו-2 מייצרים אותו מוצר ומתחרים על שוק הקונים הפוטנציאליים. יהי  $q_1$  כמות המוצר שיצרן 1 מייצר ו- $q_2$  כמות המוצר שיצרן 2 מייצר. שחקן 1 בוחר המחיר של המוצר שלו להיות  $p_1$  ליחידה, ושחקן 2 בוחר המחיר של המוצר שלו להיות  $p_2$  ליחידה. הכמות  $q_1$  ששחקן 1 צריך לייצר נקבע על ידי הפונקציה

$$q_1 = a - p_1 + bp_2$$

כאשר  $b > 0$  והכמות  $q_2$  ששחקן 2 צריך לייצר נקבע על ידי הפונקציה

$$q_2 = a - p_2 + bp_1.$$

מצאו את השיווי משקל של המשחק.

### פתרון:

האסטרטגיות של שחקן 1 הן המחירים  $p_1$  שהוא בוחר, אשר מהווה קבוצה רציפה של ערכים חיוביים, ובאותה מידה האסטרטגיות לשחקן 2 הן הקבוצה הרציפה של מחירים  $p_2$ . לכן קבוצת האסטרטגיות של כל שחקן היא  $[0, \infty)$ .

אם שחקן 1 בוחר באסטרטגיה  $p_1$  ושחקן 2 בוחר באסטרטגיה  $q_2$ , התשלום לשחקן 1 הוא

$$u_1(p_1, p_2) = p_1 q_1 - c q_1 = (p_1 - c)(a - p_1 + b p_2)$$

והתשלום לשחקן 2 הוא

$$u_2(p_1, p_2) = p_2 q_2 - c q_2 = (p_2 - c)(a - p_2 + b p_1)$$

הווקטור אסטרטגיות  $(p_1^*, p_2^*)$  שיווי משקל אם לכל שחקן:

$$u_1(p_1^*, p_2^*) = \max_{0 \leq p_1 \leq \infty} u_1(p_1, q_2^*) = \max_{0 \leq p_1 \leq \infty} [(p_1 - c)(a - p_1 + b p_2^*)]$$

-1

$$u_2(p_1^*, p_2^*) = \max_{0 \leq p_2 \leq \infty} u_1(p_1^*, p_2) = \max_{0 \leq p_2 \leq \infty} [(p_2 - c)(a - p_2 + b p_1^*)]$$

המקסימום של  $u_1(p_1, p_2^*)$  לפי  $p_1$  מתקבל בנקודה שבה הנגזרת מתאפסת:

$$\frac{\partial u_1(p_1, p_2^*)}{\partial p_1} = a - 2p_1 + b p_2^* + c \stackrel{!}{=} 0 \Rightarrow p_1^* = \frac{a + c + b p_2^*}{2},$$

והמקסימום של  $u_2(p_1^*, p_2)$  לפי  $p_2$  מתקבל בנקודה שבה הנגזרת מתאפסת:

$$\frac{\partial u_2(p_1^*, p_2)}{\partial p_2} = a - 2p_2 + b p_1^* + c \stackrel{!}{=} 0 \Rightarrow p_2^* = \frac{a + c + b p_1^*}{2}.$$

לפיכך, אם הצמד כמויות  $(p_1^*, p_2^*)$  שיווי משקל אז הכמויות חייבות לקיים את התנאים

$$p_1^* = \frac{a + c + bp_2^*}{2}, \quad p_2^* = \frac{a + c + bp_1^*}{2}.$$

הפתרון למערכת זו הינו

$$p_1^* = p_2^* = \frac{a + c}{2 - b}.$$

■

## 9.3 משחק בייסיאני

### הגדרה 9.1 משחק שני שחקנים בייסיאני

הצורה הנורמלית של משחק בייסיאני 2 שחקנים היא

$$G = \{(A_1, A_2), (T_1, T_2), (p_1, p_2), u_1, u_2\}$$

כאשר

- $A_1 = \{a_1, b_1, \dots\}$  קבוצות הפעולות לשחקן 1 ו-  $A_2 = \{a_2, b_2, \dots\}$  קבוצות הפעולות לשחקן 2
- $T_1$  קבוצת ערכים פרטיים של שחקן 1 ו-  $T_2$  קבוצת ערכים פרטיים של שחקן 2.
- $p_1$  מסמן את ההסתברות לפי שחקן 1, שהערך פרטי של שחקן 2 הוא  $t_2$  בידיעה שהערך פרטי שלו הוא  $t_1$ :

$$p_1 = P(t_2 | t_1)$$

וכן  $p_2$  מסמן את ההסתברות לפי שחקן 2, שהערך פרטי של שחקן 1 הוא  $t_1$  בידיעה שהערך פרטי שלו הוא  $t_2$ :

$$p_2 = P(t_1 | t_2)$$

- $u_1$  פונקציית התשלום של שחקן 1 שהיא פונקציה של הפעולות  $a_1 \in A_1, a_2 \in A_2$  והערך הפרטי שלו  $t_1 \in T_1$  שידוע רק לשחקן 1:

$$u_1(a_1, a_2, t_1)$$

וכן  $u_2$  פונקציית התשלום של שחקן 2 שהיא פונקציה של הפעולות  $a_1 \in A_1, a_2 \in A_2$  והערך הפרטי שלו  $t_2 \in T_2$  שידוע רק לשחקן 2:

$$u_2(a_1, a_2, t_2).$$

### הגדרה 9.2 אסטרטגיה במשחק שני שחקנים בייסיאני

נתון משחק שני שחקנים בייסיאני:

$$G = \{(A_1, A_2), (T_1, T_2), (p_1, p_2), u_1, u_2\}.$$

אסטרטגיה לשחקן 1 היא פונקציה  $s_1(t_1)$  של  $t_1 \in T_1$  כך שלכל  $t_1 \in T_1$  הפונקציה  $s_1(t_1)$  נותנת פעולה  $a_1 \in A_1$

$$s_1 : t_1 \mapsto a_1.$$

וכן אסטרטגיה של שחקן 2 היא פונקציה  $s_2(t_2)$  של  $t_2 \in T_2$  כך שלכל  $t_2 \in T_2$  הפונקציה  $s_2(t_2)$  נותנת פעולה  $a_2 \in A_2$

$$s_2 : t_2 \mapsto a_2.$$

### הגדרה 9.3 שיווי משקל נאש בייסיאני

נתון משחק שני שחקנים בייסיאני:

$$G = \{(A_1, A_2), (T_1, T_2), (p_1, p_2), u_1, u_2\}.$$

הווקטור אסטרטגיות  $(s_1^*, s_2^*)$  הוא שיווי משקל נאש בייסיאני אם

$$\sum_{t_2 \in T_2} u_1(s_1^*(t_1), s_2^*(t_2)) P(t_2|t_1) = \max_{a_1 \in A_1} \sum_{t_2 \in T_2} u_1(a_1, s_2^*(t_2)) P(t_2|t_1)$$

$$\sum_{t_1 \in T_1} u_2(s_1^*(t_1), s_2^*(t_2)) P(t_1|t_2) = \max_{a_2 \in A_2} \sum_{t_1 \in T_1} u_2(s_1^*(t_1), a_2) P(t_1|t_2)$$

### דוגמה 9.4 (מלחמת המינים עם ידיעה לא שלמה)

זוג מתכנן בילוי למוצא שבת. האפשרויות העומדות לרשותם הן מסעדה (Restaurant (R) או צפייה במשחק כדורגל, (Football (F). הגבר (P) מעדיף צפייה במשחק הכדורגל בעוד האישה (C) מעדיפה את המסעדה אך שניהם מעדיפים להיות ביחד גם אם הבילוי המשותף הוא הפחות עדיף בעיניהם.

Camilla מקבלת תשלום  $2 + t_c$  אם שניהם הולכים למסעדה כאשר  $t_c$  ערך פרטי שידוע רק ל-Camilla ולא ל-Pete.

Pete מקבל תשלום  $2 + t_p$  אם שניהם הולכים למשחק כדורגל כאשר  $t_p$  ערך פרטי שידוע רק ל-Pete ולא ל-Camilla.

Pete \ Camilla	Restaurant	Football
	Restaurant	Football
Restaurant	$2 + t_c, 1$	$0, 0$
Football	$0, 0$	$1, 2 + t_p$

הערך הפרטי  $t_c$  מתפלג אחיד בטווח  $[0, x]$  ו- $t_p$  מתפלג אחיד בטווח  $[0, x]$ .  $t_c$  ו- $t_p$  בלתי תלויים.

Camilla משחקת R אם  $t_c$  גדול מערך מסויים  $\alpha$ , אחרת היא משחקת F.

Pete משחק F אם  $t_p$  גדול מערך מסויים  $\beta$ , אחרת הוא משחק R.

מצאו את הערכים של  $\alpha$  ו- $\beta$  עבורם הווקטור אסטרטגיות  $(s_1^*, s_2^*) = (R, F)$  שיווי משקל נאש בייסיאני של המשחק.

**פתרון:**

C \ P	R	F
	R	F
R	$2 + t_c, 1$	$0, 0$
F	$0, 0$	$1, 2 + t_p$

$$G = \{(A_C, A_P), (T_C, T_P), (p_C, p_P), u_C, u_P\}$$

$t_C$  ו- $t_P$  מתפלגים אחידה בתחום  $[0, x]$  והם בלתי תלויים, לכן

$$p_C = P(t_C | t_P) = P(t_C), \quad p_P = P(t_P | t_C) = P(t_P).$$

$$A_C = \{\text{Restaurant, Football}\} = \{R, F\}, \quad A_P = \{\text{Restaurant, Football}\} = \{R, F\}.$$

Camilla משחקת  $R$  בהסתברות  $\frac{x - \alpha}{x}$  ומשחקת  $F$  בהסתברות  $\frac{\alpha}{x}$ .

Pete משחק  $F$  בהסתברות  $\frac{x - \beta}{x}$  ומשחק  $R$  בהסתברות  $\frac{\beta}{x}$ .

תשלום ל-Camilla אם היא משחקת  $R$ :

$$u_1(s_1 = R) = \frac{\beta}{x}(2 + t_C) + \left(\frac{x - \beta}{x}\right) \cdot 0 = \frac{\beta}{x}(2 + t_C).$$

תשלום ל-Camilla אם היא משחקת  $F$ :

$$u_1(s_1 = F) = \frac{\beta}{x} \cdot 0 + \left(\frac{x - \beta}{x}\right) \cdot 1 = \frac{1 - \beta}{x}.$$

$$u_1(s_1 = R) \geq u_1(s_1 = F) \Rightarrow \frac{\beta}{x}(2 + t_C) \geq \frac{x - \beta}{x} \Rightarrow t_C \geq \frac{x - \beta}{\beta} - 2 = \frac{x}{\beta} - 3 \stackrel{!}{=} \alpha.$$

תשלום ל-Pete אם הוא משחק  $R$ :

$$u_2(s_2 = R) = \left(1 - \frac{\alpha}{x}\right) \cdot 1 + \frac{\alpha}{x} \cdot 0 = 1 - \frac{\alpha}{x}.$$

תשלום ל-Pete אם הוא משחק  $F$ :

$$u_2(s_2 = F) = \left(1 - \frac{\alpha}{x}\right) \cdot 0 + \frac{\alpha}{x}(2 + t_P) = \frac{\alpha}{x}(2 + t_P).$$

$$u_2(s_2 = F) \geq u_2(s_2 = R) \Rightarrow \frac{\alpha}{x}(2 + t_P) \geq 1 - \frac{\alpha}{x} \Rightarrow (2 + t_P) \geq \frac{x}{\alpha} - 1 \Rightarrow t_P \geq \frac{x}{\alpha} - 3 \stackrel{!}{=} \beta.$$

הפתרון של המערכת הוא

$$\frac{x}{\left(\frac{x}{\beta} - 3\right)} - 3 = \beta \Rightarrow x - \frac{3x}{\beta} + 9 = x - 3\beta \Rightarrow -\frac{3x}{\beta} + 9 + 3\beta = 0 \Rightarrow -3x + 9\beta + 3\beta^2 = 0$$

$$\Rightarrow \beta^2 + 3\beta - x = 0 \Rightarrow \beta = \frac{-3 + \sqrt{9 + 4x}}{2}.$$

$$\text{לכן } \frac{x}{\alpha} - 3 = \beta$$

$$\alpha = \frac{x}{3 + \beta} = \frac{2x}{3 + \sqrt{9 + 4x}} = \frac{2x}{3 + \sqrt{9 + 4x}} \cdot \left(\frac{3 - \sqrt{9 + 4x}}{3 - \sqrt{9 + 4x}}\right) = \frac{-3 + \sqrt{9 + 4x}}{2} = \beta$$

לכן התשובה סופית היא האסטרטגיה  $(s_1^*, s_2^*) = (R, F)$  שיווי משקל אם

$$t_C \geq \alpha = \frac{-3 + \sqrt{9 + 4x}}{2}, \quad t_P \geq \beta = \frac{-3 + \sqrt{9 + 4x}}{2}.$$



## דוגמה 9.5 (מכרז מחיר ראשון)

במכרז מחיר ראשון שני שחקנים  $i = 1, 2$  מתחרים על קניית מוצר מסוים. שחקן 1 מעריך שהמוצר שווה  $v_1$  ושחקן 2 מעריך כי המוצר שווה  $v_2$ . ז"א אם שחקן  $i$  מנצח ומשלם מחיר  $p$  אז הרווח שלו יהיה  $v_i - p$ . ההערכות של השני שחקנים הם בלתי תלויים ומפולגים אחיד בתחום  $[0, 1]$ . השחקן עם ההצעה הגבוה ביותר מנצח ומשלם את מחיר שווה להצעה שלו. השחקן השני לא משלם כלום. במקרה של תיקו מטילים מטבע. השחקנים אדישי סיכון.

## פתרון:

$$G = \{(A_1, A_2), (T_1, T_2), (p_1, p_2), u_1, u_2\}$$

קבוצת הפעולות של שחקן 1 היא ההצעות האפשריות שלו,  $b_1 \in [0, \infty)$  וקבוצת הפעולות של שחקן 2 היא ההצעות האפשריות שלו  $b_2 \in [0, \infty)$

$$A_1 = [0, \infty), \quad A_2 = [0, \infty).$$

הקבוצה  $T_1$  של ערכים פרטיים של שחקן 1 היא הקבוצה של ההערכות  $v_1 \in [0, 1]$  של המוצר שלו, וכמו כן  $T_2$  הוא הקבוצה של ההערכות  $v_2 \in [0, 1]$ . לכן

$$T_1 = [0, 1], \quad T_2 = [0, 1].$$

השתי ההערכות  $v_1, v_2$  בלתי תלויות לכן  $p_1 = P(v_2 = \beta | v_1 = \alpha) = P(v_2 = \beta) = \beta$  ז"א שחקן 1 מאמין כי הערך של  $v_2$  הוא  $\beta$  בהסתברות  $\beta$  בלי קשר לערך של  $v_1$ . ולהפך,  $p_2 = P(v_1 = \alpha | v_2 = \beta) = P(v_1 = \alpha) = \alpha$  ז"א שחקן 2 מאמין כי הערך של  $v_1$  הוא  $\alpha$  בהסתברות  $\alpha$  בלי קשר לערך של  $v_2$ .

$$u_1(b_1, b_2, v_1, v_2) = \begin{cases} v_1 - b_1 & b_1 > b_2 \\ \frac{v_1 - b_1}{2} & b_1 = b_2 \\ 0 & b_1 < b_2 \end{cases}, \quad u_2(b_1, b_2, v_1, v_2) = \begin{cases} v_2 - b_2 & b_2 > b_1 \\ \frac{v_2 - b_2}{2} & b_2 = b_1 \\ 0 & b_2 < b_1 \end{cases}$$

הווקטור אסטרטגיות  $(b_1^*(v_1), b_2^*(v_2))$  שיווי משקל נאש בייסיאני אם

$$u_1(b_1^*, b_2^*, v_1, v_2) = \max_{b_1} \left[ (v_1 - b_1) P(b_1 > b_2^*(v_2)) + \frac{1}{2} (v_1 - b_1) P(b_1 = b_2^*(v_2)) \right]$$

-1

$$u_2(b_1^*, b_2^*, v_1, v_2) = \max_{b_2} \left[ (v_2 - b_2) P(b_2 > b_1^*(v_1)) + \frac{1}{2} (v_2 - b_2) P(b_2 = b_1^*(v_1)) \right]$$

אנחנו משערים כי קיים שיווי משקל לינארי:

$$b_1^*(v_1) = a_1 + c_1 v_1, \quad b_2^*(v_2) = a_2 + c_2 v_2.$$

נניח כי שחקן 2 בוחר באסטרטגיה  $b_2^*(v_2) = a_2 + c_2 v_2$ . אז עבור הערך  $v_2$ , תשובה טובה ביותר  $b_1^*$  לשחקן 1 מקיימת

$$\begin{aligned} u_1(b_1^*, b_2^*, v_1, v_2) &= \max_{b_1} \left[ (v_1 - b_1) P(b_1 > a_2 + c_2 v_2) + \frac{1}{2} (v_1 - b_1) P(b_1 = a_2 + c_2 v_2) \right] \\ &= \max_{b_1} (v_1 - b_1) P\left(v_2 < \frac{b_1 - a_2}{c_2}\right) \\ &= \max_{b_1} (v_1 - b_1) \left(\frac{b_1 - a_2}{c_2}\right) \end{aligned}$$

$$\frac{\partial}{\partial b_1} \left( \frac{1}{c_2} (v_1 - b_1) (b_1 - a_2) \right) = \frac{v_1 + a_2 - 2b_1}{c_2} \stackrel{!}{=} 0 \Rightarrow b_1^* = \frac{v_1 + a_2}{2}$$

נניח כי שחקן 1 בוחר באסטרטגיה  $b_1^*(v_1) = a_1 + c_1 v_1$ . אז עבור הערך  $v_1$ , תשובה טובה ביותר  $b_2^*$  לשחקן 2 מקיימת

$$\begin{aligned} u_2(b_1^*, b_2^*, v_1, v_2) &= \max_{b_2} \left[ (v_2 - b_2) P(b_2 > a_1 + c_1 v_1) + \frac{1}{2} (v_2 - b_2) P(b_2 = a_1 + c_1 v_1) \right] \\ &= \max_{b_2} (v_2 - b_2) P\left(v_1 < \frac{b_2 - a_1}{c_1}\right) \\ &= \max_{b_2} (v_2 - b_2) \left(\frac{b_2 - a_1}{c_1}\right) \end{aligned}$$

$$\frac{\partial}{\partial b_2} \left( \frac{1}{c_1} (v_2 - b_2) (b_2 - a_1) \right) = \frac{v_2 + a_1 - 2b_2}{c_1} \stackrel{!}{=} 0 \Rightarrow b_2^* = \frac{v_2 + a_1}{2}$$

לכן

$$b_1^* = \frac{v_1}{2} + \frac{a_2}{2} = a_1 + c_1 v_1 \Rightarrow c_1 = \frac{1}{2}, \quad a_1 = \frac{a_2}{2},$$

$$b_2^* = \frac{v_2}{2} + \frac{a_1}{2} = a_2 + c_2 v_2 \Rightarrow c_2 = \frac{1}{2}, \quad a_2 = \frac{a_1}{2}.$$

הפתרון למערכת זה היא

$$c_1 = \frac{1}{2}, \quad a_1 = 0, \quad c_2 = \frac{1}{2}, \quad a_2 = 0.$$

לפיכך האסטרטגיות של שיווי משקל הן

$$b_1^*(v_1) = \frac{v_1}{2}, \quad b_2^*(v_2) = \frac{v_2}{2}.$$

■

## דוגמה 9.6 (דואפול עם ערכים פרטיים)

שני יצרנים 1 ו-2 מייצרים אותו מוצר ומתרחים על שוק הקונים הפוטנציאליים. היצרנים מחליטים על הכמות שהם ייצרו, וההיצע הכולל קובע את מחיר המוצר, שהוא זהה לשני היצרנים. נסמן ב- $q_1$  וב- $q_2$  את הכמויות שמייצרים היצרנים 1 ו-2 בהתאמה. אזי הכמות הכוללת של המוצרים בשוק הוא  $q_1 + q_2$ . נניח כי המחיר של יחידה שווה ל- $P = a - q_1 - q_2$  כאשר  $a$  פרמטר הביקוש. עלות הייצור של יחידה ליצרן הראשון וליצרן 2 הוא  $c$ . הפרמטר הביקוש  $a$  שווה ל- $a^H$  (ביקוש גבוהה) או  $a^L$  (ביקוש נמוך). הערך של  $a$  ידוע ליצרן הראשון אך אינה ידוע ליצרן השני. כל שייצרן זה יודע הוא שהפרמטר הביקוש שווה ל- $a^L$  בהסתברות  $\theta$  או  $a^H$  בהסתברות  $1 - \theta$ .

מה הם התנאים על  $\theta$ ,  $a_L$ ,  $a_H$  ו- $c$  כך ש- $q_1, q_2$  הכמויות חיוביים בשיווי משקל.

מהו השיווי משקל נאש הבייסיאני של המשחק?

## פתרון:

כמות של יצרן 1:  $q_1$ . כמות של יצרן 2:  $q_2$ .

מחיר ליחידה אחת של המוצר:  $P = a - q_1 - q_2$ .

עלות ליחידה לשחקן 1 ולשחקן 2:  $c = 1$ .

פרמטר הביקוש לשחקן 1:  $a = a^H$  או  $a = a^L$  והוא ידוע לשחקן 1 ולא לשחקן 2.

עבור שחקן 2:  $a = a^L$  בהסתברות  $\theta$  ו-  $a = a^H$  בהסתברות  $1 - \theta$ .

צורה בייסיאנית של המשחק:

$$\bullet N = \{1, 2\}$$

$$\bullet T_2 = \{1\}, T_1 = \{a^L, a^H\}$$

$$\bullet p_{II}(t_1 = a^L | t_2 = 1) = p_{II}(t_1 = a^L) = \theta$$

$$\bullet p_{II}(t_1 = a^H | t_2 = 1) = p_{II}(t_1 = a^H) = 1 - \theta$$

$$\bullet A_2 = \{q_2\}, A_1 = \{q_1^H, q_1^L\}$$

• פורנצית תשלום לשחקן 1:

$$u_1(s_1(t_1), s_2(t_2), t_1)$$

פורנצית תשלום לשחקן 2:

$$u_2(s_1(t_1), s_2(t_2), t_2 = 1)$$

•

$$s_1(t = a^H) = q_1^H, \quad s_2(t_2 = a^L) = q_1^L, \quad s_2(t_2 = 1) = q_2.$$

לשחקן 1, אם  $a = a^H$ :

$$u_1(s_1(t = a^H), s_2(t_2), t_1 = a^H) = u_1(q_1^H, q_2) = q_1^H(a - q_1^H - q_2 - c).$$

לשחקן 1, אם  $a = a^L$ :

$$u_1(s_1(t = a^L), s_2(t_2), t_1 = a^L) = u_1(q_1^L, q_2) = q_1^L(a - q_1^L - q_2 - c).$$

לשחקן 2,  $s_1(t_1 = q^L) = q_1^L$  בהסתברות  $\theta$  ו-  $s_1(t_1 = a^H) = q_1^H$  בהסתברות  $1 - \theta$ .

$$u_2(s_1(t_1), s_2(t_2), t_2 = 1) = u_1(q_1^H, q_1^L, q_2) = q_2(\theta a^L + (1 - \theta)a^H - \theta q_1^L - (1 - \theta)q_1^H - q_2 - c)$$

$$\frac{\partial u_1(q_1^H, q_2)}{\partial q_1^H} = a - c - 2q_1^H - q_2 \stackrel{!}{=} 0 \Rightarrow q_1^{H*} = \frac{a_H - c - q_2}{2}.$$

$$\frac{\partial u_1(q_1^L, q_2)}{\partial q_1^L} = a - c - 2q_1^L - q_2 \stackrel{!}{=} 0 \Rightarrow q_1^{L*} = \frac{a_L - c - q_2}{2}.$$

$$\frac{\partial u_2(q_1^L, q_1^H, q_2)}{\partial q_2} = \theta a^L + (1 - \theta)a^H - \theta q_1^L - (1 - \theta)q_1^H - 2q_2 - c \stackrel{!}{=} 0$$

$$\Rightarrow q_2^* = \frac{\theta a^L + (1 - \theta)a^H - \theta q_1^L - (1 - \theta)q_1^H + c}{2}.$$

הפתרון למערכת זו הוא

$$\begin{aligned} q_2^* &= \frac{\theta a_H + (1 - \theta)a_L - c}{3} \\ q_1^H &= \frac{(3 - \theta)a_H - (1 - \theta)a_L - 2c}{6} \\ q_1^L &= \frac{(2 + \theta)a_L - \theta a_H - 2c}{6} \end{aligned}$$

התנאים עבורם  $q_2 \geq 0$  הם

$$q_2 \geq 0 \quad \Rightarrow \quad \theta a_H + (1 - \theta)a_L - c \geq 0 \quad \Rightarrow \quad \theta \geq \frac{c - a_L}{a_H - a_L} .$$

$$q_1(a_L) \geq 0 \quad \Rightarrow \quad \frac{(2 + \theta)a_L - \theta a_H - 2c}{6} \geq 0 \quad \Rightarrow \quad \theta \leq \frac{2(c - a_L)}{a_H - a_L} .$$

$$q_1(a_H) \geq 0 \quad \Rightarrow \quad \frac{(3 - \theta)a_H - (1 - \theta)a_L - 2c}{6} \geq 0 \quad \Rightarrow \quad \theta \leq \frac{2c - 3a_H + a_L}{a_H - a_L} .$$

■