


## תרגילים : סיבוכיות

קליקה:


בהינתן גרף לא מכוון  $G = (V, E)$  קליקה ב-  $G$  היא תת קבוצה של קדקודים  $C \subseteq V$  כך שלכל שני קדקודים  $u_1, u_2 \in C$  מתקיים  $(u_1, u_2) \in E$ .

דוגמה: קליקה בגודל  $k = 3$


כיסוי בקדקודים:

בהינתן גרף לא מכוון  $G = (V, E)$  כיסוי בקדקודים ב-  $G$  הוא תת קבוצה של קדקודים  $C \subseteq V$  כך שלכל צלע  $(u_1, u_2) \in E$  מתקיים  $u_1 \in C$  או  $u_2 \in C$ .


דוגמה: כיסוי בקדקודים בגודל  $k = 2$



דוגמה: קליקה בגודל  $k = 5$




דוגמה: כיסוי בקדקודים בגודל  $k = 5$



קבוצה בלתי תלוייה:

בהינתן גרף לא מכוון  $G = (V, E)$  קבוצה בלתי תלוייה ב-  $G$  היא תת קבוצה של קדקודים  $S \subseteq V$  כך שלכל שני קדקודים  $(u_1, u_2) \in S$  מתקיים  $(u_1, u_2) \notin E$ .

דוגמה: קבוצה בלתי תלוייה בגודל  $k = 3$



## שאלה 1

בעיית קליקה (Clique):

קלט: גרף לא מכוון  $G = (V, E)$  ומספר טבעי  $k$ .

פלט: האם  $G$  מכיל קליקה בגודל  $k$ ?

$$Clique = \{ \langle G, k \rangle \mid G \text{ מכיל קליקה בגודל } k \}.$$

בעיית כיסוי בקדקודים (Vertex-Cover):

קלט: גרף לא מכוון  $G = (V, E)$  ומספר טבעי  $k$ .

פלט: האם  $G$  מכיל כיסוי בקדקודים  $k$ ?

$$VC = \{ \langle G, k \rangle \mid G \text{ מכיל כיסוי בקדקודים בגודל } k \}.$$

הוכיחו כי קיימת רדוקציה זמן-פולינומיאלית מבעיית Clique לבעיית Vertex-Cover. כלומר

$$Clique \leq_p VertexCover.$$

## שאלה 2

בהינתן גרף לא מכוון  $G = (V, E)$ . קבוצת קדקודים  $U \subseteq V$  תקרא **קבוצת בלתי תלויה** אם לכל זוג קדקודים  $u_1, u_2$  ב-  $U$  מתקיים ש-

$$(u_1, u_2) \notin E.$$

בהינתן גרף לא מכוון  $G = (V, E)$ . קבוצת קדקודים  $U \subseteq V$  תקרא **קליקה** אם לכל זוג קדקודים  $u_1, u_2$  ב-  $U$  מתקיים ש-

$$(u_1, u_2) \in E.$$

נתבונן בשפות הפורמליות הבאות:

$$IS = \{ \langle G, k \rangle \mid G \text{ is an undirected graph, } k \text{ is an integer, } G \text{ includes an independent set of size at least } k \}$$

$$CLQ = \{ \langle G, k \rangle \mid G \text{ is an undirected graph, } k \text{ is an integer, } G \text{ includes an clique of size at least } k \}$$

הוכיחו כי

$$IS \leq_P CLQ.$$

כלומר, הראו כי קיימת רדוקציית התאמה פולינומיאלית מהשפה  $IS$  לשפה  $CLQ$ . יש להראות כי הרדוקציית התאמה וכי היא ניתנת לחישוב בזמן פולינומיאלי.

## שאלה 3

בהינתן גרף לא מכוון  $G = (V, E)$ . קבוצת קדקודים  $U \subseteq V$  תקרא **קבוצת בלתי תלויה** אם לכל זוג קדקודים  $u_1, u_2$  ב-  $U$  מתקיים ש-

$$(u_1, u_2) \notin E.$$

בהינתן גרף לא מכוון  $G = (V, E)$ . קבוצת קדקודים  $U \subseteq V$  תקרא **ניסוי קדקודים** ב-  $G$  אם לכל צלע  $(u_1, u_2) \in E$ , מתקיים ש-

$$u_1 \in U \vee u_2 \in U.$$

נתבונן בשפות הפורמליות הבאות:

$$IS = \{ \langle G, k \rangle \mid G \text{ is an undirected graph, } k \text{ is an integer, } G \text{ includes an independent set of size at least } k \}$$

$$VC = \{ \langle G, k \rangle \mid G \text{ is an undirected graph, } k \text{ is an integer, } G \text{ includes a vertex cover of size at least } k \}$$

הוכיחו כי

$$IS \leq_P VC.$$

כלומר, הראו כי קיימת רדוקציית התאמה פולינומיאלית מהשפה  $IS$  לשפה  $VC$ . יש להראות כי הרדוקציית התאמה וכי היא ניתנת לחישוב בזמן פולינומיאלי.

## תשובות

**שאלה 1** בהינתן זוג  $\langle G, k \rangle$  הקלט עבור Clique, ניצור זוג  $\langle G', k' \rangle$  הקלט של VC ע"י פונקציה הרדוקציה  $f$ :

$$f(\langle G, k \rangle) = \langle G', k' \rangle$$

ונוכיח כי

$$\langle G, k \rangle \in \text{Clique} \Rightarrow \langle G', k' \rangle \in \text{VertexCover}$$

$$\langle G, k \rangle \in \text{Clique} \Leftarrow \langle G', k' \rangle \in \text{VertexCover}$$

הגדרת הרדוקציה

• נגדיר את  $G' = (V', E')$  להיות הגרף המשלים של  $G = (V, E)$ ,

• כלומר  $V' = V$  ו-  $E' = \{(u_1, u_2) \mid (u_1, u_2) \notin E\}$ .

• נגדיר  $k' = |V| - k$ .

נכונות הרדוקציה

כיוון  $\Leftarrow$

נניח כי  $\langle G, k \rangle \in \text{Clique}$ .

$\Leftarrow$  מכיל קליקה  $C$  בגודל  $k$ .

$\Leftarrow$  כל שני קדקודים ב-  $C$  מחוברים בצלע ב-  $G$ .

$\Leftarrow$  כל שני קדקודים ב-  $C$  לא מחוברים בצלע ב-  $G'$ .

$\Leftarrow$   $V \setminus C$  היא כיסוי בקדקודים ב-  $G'$  בגודל  $k' = |V| - k$ .

$\Leftarrow$   $G'$  מכיל כיסוי בקדקודים בגודל  $k'$ .

$\Leftarrow \langle G', k' \rangle \in \text{VertexCover}$

כיוון  $\Rightarrow$

נניח כי  $\langle G', k' \rangle \in \text{VertexCover}$ .

$\Leftarrow$   $G'$  מכיל כיסוי בקדקודים  $S$  בגודל  $k'$ .

$\Leftarrow$  כל שני קדקודים ש  $V' \setminus S$  לא מחוברים בצלע ב-  $G'$ .

$\Leftarrow$  לפי ההגדרת הרדוקציה  $V' = V$ .

לכן כל שני קדקודים ש  $V \setminus S$  לא מחוברים בצלע ב-  $G'$ .

$\Leftarrow$  כל שני קדקודים ש  $V \setminus S$  מחוברים בצלע ב-  $G$ .

$\Leftarrow$   $V \setminus S$  היא קליקה ב-  $G$  בגודל  $k = |V| - k'$ .

$\Leftarrow$   $G$  מכיל קליקה בגודל  $k$ .

**שאלה 2** עלינו להוכיח כי  $\exists$  רידוקציית זמן-פולינומיאלית מ-  $IS$  ל-  $CLQ$ :

$$IS \leq_P CLQ .$$

ראשית נגדיר את הבעיות  $CLQ$  ו-  $IS$ .

הגדרת הבעיית  $CLQ$ :

קלט: גרף לא מכוון  $G = (V, E)$  ומספר שלם חיובי  $k$ .

פלט: האם  $G$  מכיל קליקה בגודל לפחות  $k$ .

$$CLQ = \{ \langle G, k \rangle \mid G \text{ מכיל קליקה בגודל } k \text{ לפחות} \} .$$

הגדרת הבעיית  $IS$ :

קלט: גרף לא מכוון  $G = (V, E)$  ומספר שלם חיובי  $k$ .

פלט: האם  $G$  מכיל קבוצה בלתי תלוייה בגודל לפחות  $k$ .

$$IS = \{ \langle G, k \rangle \mid G \text{ מכיל קבוצה בלתי תלוייה בגודל } k \text{ לפחות} \} .$$

פונקציית הרדוקציה:

אנחנו נגדיר פונקציית הרדוקציה  $R$  שבהינתן זוג  $\langle G, k \rangle \in IS$  מחזירה  $R \langle G, k \rangle \in CLQ$ , כלומר

$$R(\langle G, k \rangle) = \langle G', k' \rangle . \quad (*)$$

כך ש:

$$\langle G, k \rangle \in IS \iff \langle G', k' \rangle \in CLQ . \quad (**)$$

הפונקציית הרדוקציה במשוואה (\*) מוגדרת כך שהתנאים הבאים מתקיימים:

**(1)** נניח שהגרף הוא  $G = (V, E)$ .

אז הגרף  $G'$  הוא הגרף המשלים של  $G = (V, E)$ .

ז"א  $G' = \bar{G} = (V, \bar{E})$  כאשר



$$\bar{E} = \{ (u_1, u_2) \mid (u_1, u_2) \notin E \} .$$

**(2)**  $k' = k$ .

לדוגמה, בהינתן הגרף  $G = (V, E)$  שמכיל קבוצה בלתי תלוייה בגודל  $k = 3$ , הפונקציית הרדוקציה  $R$  מחזירה את הגרף  $\bar{G} = (V, \bar{E})$  ואת המספר  $k' = k = 3$ , כמתואר בתרשים למטה:

$$G = (V, E)$$

$$\bar{G} = (V, \bar{E})$$



### נכונות הרדוקציה

כעת נוכיח שתנאי (\*2) מתקיים.

### כיוון $\Leftarrow$

בהינתן גרף  $G = (V, E)$  ושלם  $k$ .

נניח כי  $\langle G, k \rangle \in IS$ .

$\Leftarrow$  מכיל קבוצה בלתי תלוייה בגודל  $k$  לפחות.

$\Leftarrow$  מכיל קבוצה בלתי תלוייה  $U$  בגודל  $k$ .

$\Leftarrow$  כל שני קדקודים ב-  $U$  **לא מחוברים** בצלע של  $G$ .

$\Leftarrow$  כל שני קדקודים ב-  $U$  **מחוברים** בצלע של  $\bar{G}$ .

$\Leftarrow$  הקבוצה  $U$  היא קליקה בגודל  $k$  של  $\bar{G}$ .

$\Leftarrow$  הקבוצה  $U$  היא קליקה בגודל  $k' = k$  של  $G' = \bar{G}$ .

$\Leftarrow \langle G', k' \rangle \in CLQ$

### כיוון $\Rightarrow$

בהינתן גרף  $G'$  ושלם  $k'$ .

נניח כי  $\langle G', k' \rangle \in CLQ$ .

$\Leftarrow$   $G'$  מכיל קליקה בגודל  $k'$  לפחות.

$\Leftarrow$   $G'$  מכיל קליקה  $U'$  בגודל  $k'$ .

על פי ההגדרה של הפונקציית הרדוקציה  $R: G' = \bar{G}$ .

$\Leftarrow$   $\bar{G}$  מכיל קליקה  $U'$  בגודל  $k'$ .

$\Leftarrow$  כל שני קדקודים ב-  $U'$  מחוברים בצלע של  $\bar{G}$ .

$\Leftarrow$  כל שני קדקודים ב-  $U'$  לא מחוברים בצלע של המשלים של הגרף  $\bar{G}$ , דהיינו  $G$ .

$\Leftarrow$  הקבוצה  $U'$  היא קבוצה בלתי תלויה בגודל  $k' = k$  של  $G$ .

$\Leftarrow \langle G, k \rangle \in IS$

**שאלה 3** עלינו להוכיח כי  $\exists$  רידוקציית זמן-פולינומיאלית מ-  $IS$  ל-  $VC$ :

$$IS \leq_P VC .$$

ראשית נגדיר את הבעיות  $VC$  ו-  $IS$ .

הגדרת הבעיית  $VC$ :

קלט: גרף לא מכוון  $G = (V, E)$  ומספר שלם חיובי  $k$ .

פלט: האם קיים כיסוי קדקודים ב-  $G$  בגודל לפחות  $k$ .

$$VC = \{ \langle G, k \rangle \mid G \text{ מכיל כיסוי קדקודים בגודל } k \text{ לפחות} \} .$$

הגדרת הבעיית  $IS$ :

קלט: גרף לא מכוון  $G = (V, E)$  ומספר שלם חיובי  $k$ .

פלט: האם  $G$  מכיל קבוצה בלתי תלויה בגודל לפחות  $k$ .

$$IS = \{ \langle G, k \rangle \mid G \text{ מכיל קבוצה בלתי תלויה בגודל } k \text{ לפחות} \} .$$

פונקציית הרדוקציה:

אנחנו נגדיר פונקציית הרדוקציה  $R$  שבהינתן זוג  $\langle G, k \rangle \in IS$ , מחזירה  $R$   $\langle G', k' \rangle \in VC$ , כלומר

$$R(\langle G, k \rangle) = \langle G', k' \rangle . \quad (*)$$

כך ש:

$$\langle G, k \rangle \in IS \Leftrightarrow \langle G', k' \rangle \in VC . \quad (**)$$

הפונקציית הרדוקציה במשוואה (\*) מוגדרת כך שהתנאים הבאים מתקיימים:

$$(1) \text{ נניח שהגרף הוא } G = (V, E)$$

$$\text{אז הגרף } G' \text{ הוא אותו גרף } G = (V, E)$$

$$(2) \text{ } k' = |V| - k$$

נכונות הרדוקציה

כעת נוכיח שתנאי (\*) מתקיים.

כיוון  $\Leftarrow$

בהינתן גרף  $G = (V, E)$  ושלם  $k$ .

נניח כי  $\langle G, k \rangle \in IS$ .

$\Leftarrow$   $G$  מכיל קבוצה בלתי תלוייה  $U$  בגודל  $k$  לפחות.

$\Leftarrow$   $G$  מכיל קבוצה בלתי תלוייה  $U$  בגודל  $k$ .

$\Leftarrow$  כל שני קדקודים ב-  $U$  לא מחוברים בצלע ב-  $G$ .

$\Leftarrow$   $V \setminus U$  היא כיסוי קדקודים ב-  $G$  בגודל  $k' = |V| - k$ .

$\Leftarrow$  הגרף  $G' = \bar{G}$  מכיל כיסוי קדקודים בגודל  $k$ .

$\Leftarrow \langle G', k' \rangle \in VC$

$\Rightarrow$  כיוון

בהינתן גרף  $G'$  ושלם  $k'$ .

נניח כי  $\langle G', k' \rangle \in VC$ .

$\Leftarrow$   $G'$  מכיל כיסוי קדקודים בגודל  $k'$  לפחות.

$\Leftarrow$   $G'$  מכיל כיסוי קדקודים  $U'$  בגודל  $k'$ .

$\Leftarrow$   $G$  מכיל כיסוי קדקודים  $U'$  בגודל  $k'$ .

$\Leftarrow$  כל שני קדקודים ב-  $V \setminus U'$  היא קבוצת בלתי תלוייה ב-  $G'$  בגודל  $k' = |V| - k$ .

$\Leftarrow$  הגרף  $G = G'$  מכיל קבוצה בלתי תלוייה בגודל  $k$ .