



המכללה האקדמית להנדסה סמי שמעון

היחידה למתמטיקה – המחלקה להנדסת תוכנה

חדו"א 2 להנדסת תוכנה 300101

תשפ"ב סמסטר קיץ

מועד א'

19.09.2022, כ"ג באלול תשפ"ב, 9:00-12:00, משך הבחינה: 3 שעות

המרצה האחראית: ד"ר יבגניה אקרמן

המרצה: ד"ר אריה מאיר בראדסקי

חומר עזר: מחשבון רגיל, דף נוסחאות (מצורף לשאלון). סטודנטים בעלי זכאות לדף נוסחאות מורחב יקבלו אותו במבחן.

הוראות לנבחן:

- הבחינה מורכבת מ-8 שאלות. מתוכן יש לפתור 6 שאלות בהתאם לפירוט.
- יש לכתוב בכתב יד ברור ומסודר ולפרט כל שלב בחישובים. תשובות ללא הסבר, אפילו גיוניות, לא תתקבלנה.
- יש לרשום ליד כל תשובה את מספר השאלה, ובמידה ויש גם את מספר הסעיף.

השאלון מכיל 6 עמודים כולל עמוד זה וכולל דפי נוסחאות.

בהצלחה!

שאלות 1 ו-2 הן שאלות חובה!

שאלה 1 (20 נק'):

- א. (10 נק') מצאו את הנקודות הקריטיות של הפונקציה $z(x, y) = e^{x^2+y^2-2x}$ ובררו את סוגיהן.
- ב. (10 נק') מצאו את הערך הגדול ביותר ואת הערך הקטן ביותר של הפונקציה $z(x, y) = e^{x^2+y^2-2x}$ בתחום $D = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 \mid x^2 + y^2 \leq 1, x, y, 0\}$.

שאלה 2 (22 נק'):

- א. (12 נק') מצאו את תחום ההתכנסות של הטור $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(x-9)^n}{3^n n^2}$. האם בנקודה $x = 8$ הטור מתכנס בהחלט, בתנאי או מתבדר? נמקו את התשובה.
- ב. (10 נק') החליפו את סדר האינטגרציה באינטגרל $\int_0^1 dx \int_{y=x}^{y=1} e^{y^2} dy$ וחשבו אותו.
- רמז:** האינטגרל ניתן לחישוב רק אחרי החלפת סדר האינטגרציה.

פתרו 3 מבין השאלות 3-6

שאלה 3 (16 נק'):

- א. (8 נק') מהו הערך המינימלי האפשרי של הנגזרת הכיוונית של הפונקציה $z(x, y) = e^{x^2 - y^2}$ בנקודה $A(1, 0)$ ובאיזה כיוון הוא מתקבל?
- ב. (8 נק') מצאו את ההיטל של הנקודה $M(1, -1, 0)$ על המישור $2x - z + 2 = 0$.

שאלה 4 (16 נק'):

- תהינה $u(x, y, z) = xz - \frac{y}{z} - z + 2$, ו- $P(1, 0, -1)$.
- א. (12 נק') רשמו את משוואת המישור המשיק למשטח הרמה של הפונקציה $u(x, y, z)$ אשר עובר דרך הנקודה P .
- ב. (4 נק') תנו דוגמא של וקטור $\vec{a}$ כך שיתקיים: $\frac{du}{d\vec{a}}(P) = 0$. נמקו את התשובה.

שאלה 5 (16 נק'):

- א. (12 נק') ציירו את הגוף D החסום על ידי המשטחים הבאים:
 $x = 0, y = 0, z = 0, x + y = 4, z = 16 - y^2$
 חשבו את נפח הגוף D .
- ב. (4 נק') מצאו את הזווית בין הישר $l: \{x = 1 + t, y = -3t, z = 2 - t, t \in \mathbb{R}\}$ לבין המישור $2x - y + 5z = 1$.

שאלה 6 (16 נק'):

- א. (12 נק') מצאו את המסה של הטבעת (המישורית)
 $D = \{(x, y) \mid 4 \leq x^2 + y^2 \leq 16\}$
 כאשר צפיפות החומר של הגוף היא $\rho(x, y) = x$.
- ב. (4 נק') תנו דוגמא של טור (לאו דווקא חיובי) $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ מתכנס, כזה שהטור $\sum_{n=1}^{\infty} a_n^2$ מתבדר.

פתרו 1 מבין השאלות 7-8

שאלה 7 (10 נק'):

וקטורים $\vec{a}_1 = (2, -1, 0)$ ו- $\vec{a}_2 = (1, 0, 1)$ מקבילים למישור המשיק למשטח הרמה $u = 6$ של הפונקציה

$$u(x, y, z) = x^2 + y^2 + z^2$$

א. (5 נק') מצאו את נקודות ההשקה.

ב. (5 נק') הרכיבו את המשוואה הפרמטרית של הישר הנורמלי למשטח הרמה $u = 6$ העובר דרך נקודות ההשקה שמצאתם.

שאלה 8 (10 נק'):

במישור $x = 0$ מצאו את הנקודה P כך שסכום המרחקים ממנה עד לנקודות $M(4, 4, 6)$ ו-

$N(8, -10, 2)$ יהיה מינימלי וחשבו את הסכום המינימלי.

1. נפח של פירמידה משולשת ABCD : $V = \frac{1}{6} |(\overrightarrow{DA} \times \overrightarrow{DB}) \cdot \overrightarrow{DC}|$

2. מרחק מהנקודה (x_0, y_0, z_0) למישור $Ax + By + Cz + D = 0$: $d = \frac{|Ax_0 + By_0 + Cz_0 + D|}{\sqrt{A^2 + B^2 + C^2}}$

3. מרחק מהנקודה M לישר העובר דרך הנקודה N במקביל לוקטור $\vec{a}$: $d = \frac{|\overrightarrow{MN} \times \vec{a}|}{|\vec{a}|}$

4. מרחק בין שני ישרים מצטלבים שעוברים דרך נקודות M ו-N במקביל לוקטורים $\vec{a}$ ו- $\vec{b}$: $d = \frac{|\overrightarrow{MN} \cdot (\vec{a} \times \vec{b})|}{|\vec{a} \times \vec{b}|}$

5. משוואת המישור העובר דרך הנקודה $M_0(x_0, y_0, z_0)$ במאונך לווקטור נורמל $n(A, B, C)$: $A(x - x_0) + B(y - y_0) + C(z - z_0) = 0$

6. הצגה פרמטרית של הישר העובר דרך הנקודה (x_0, y_0, z_0) במקביל לווקטור $a(l, m, n)$: $\{x = x_0 + l \cdot t, y = y_0 + m \cdot t, z = z_0 + n \cdot t\} \quad -\infty < t < \infty$

7. משוואת מישור המשיק למשטח $F(x, y, z) = 0$ בנקודה $M_0(x_0, y_0, z_0)$: $F'_x(M_0)(x - x_0) + F'_y(M_0)(y - y_0) + F'_z(M_0)(z - z_0) = 0$

8. נגזרת מכוונת של $z(x, y)$ בנקודה M_0 ובכיוון של וקטור $\vec{a}$: $\frac{dz(M_0)}{d\vec{a}} = \frac{\text{grad } z(M_0) \cdot \vec{a}}{|\vec{a}|}$

9. קריטריון $\Delta(M) = f''_{xx}(M) \cdot f''_{yy}(M) - (f''_{xy}(M))^2$ לבדיקת קיום אקסטרמום לוקלי של $f(x, y)$

10. פונקצית לגרנזי למציאת אקסטרמום של $f(x, y)$ בתנאי $\varphi(x, y) = 0$: $L(x, y) = f(x, y) + \lambda \varphi(x, y)$

11. מעבר לקואורדינטות קוטביות : $\iint_D f(x, y) dx dy = \iint_D f(r \cos \varphi, r \sin \varphi) r dr d\varphi$

12. חישוב המסה m ומרכז המסה (x_c, y_c) של "גוף מישורי" D בעל צפיפות $\rho(x, y)$: $m = \iint_D \rho(x, y) dx dy$; $x_c = \frac{1}{m} \iint_D x \rho(x, y) dx dy$; $y_c = \frac{1}{m} \iint_D y \rho(x, y) dx dy$

13. חישוב של אינטגרל קווי מסוג ראשון :

(א) המסלול L מוגדר באופן $y = y(x)$: $\int_L f(x, y) dl = \int_a^b f(x, y(x)) \sqrt{1 + y'(x)^2} dx$

(ב) מסלול L מוגדר באופן פרמטרי : $\int_L f(x, y) dl = \int_{t_1}^{t_2} f(x(t), y(t)) \sqrt{x'(t)^2 + y'(t)^2} dt$

14. נוסחת גרין : $\oint_L P(x, y) dx + Q(x, y) dy = \iint_D \left(\frac{\partial Q}{\partial x} - \frac{\partial P}{\partial y} \right) dx dy$

15. מבחני קושי ודלמבר לבדיקת התכנסות של טורים חיוביים :

אם קיים הגבול $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{a_{n+1}}{a_n} = q$ (דלמבר) או אם קיים הגבול $\lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{a_n} = q$ (קושי)

אזי אם $q < 1$ הטור $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ מתכנס ואם $q > 1$ הטור $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ מתבדר.

16. רדיוס ההתכנסות R של הטור $\sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n$: $R = \frac{1}{\lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{|a_n|}}$ או $R = \lim_{n \rightarrow \infty} \left| \frac{a_n}{a_{n+1}} \right|$

$$17. \text{טור טיילור עבור הפונקציה } f(x): \sum_{n=0}^{\infty} \frac{f^{(n)}(a)}{n!} (x-a)^n$$

18. טורי מקלורן עבור מספר פונקציות בסיסיות:

$$\frac{1}{1-x} = 1 + x + x^2 + \dots + x^n + \dots \quad [-1 < x < 1]; \quad e^x = 1 + x + \frac{x^2}{2!} + \dots + \frac{x^n}{n!} + \dots \quad [-\infty < x < \infty]$$

$$\sin x = x - \frac{x^3}{3!} + \dots + (-1)^n \frac{x^{2n+1}}{(2n+1)!} + \dots; \quad \cos x = 1 - \frac{x^2}{2!} + \dots + (-1)^n \frac{x^{2n}}{(2n)!} + \dots \quad [-\infty < x < \infty]$$

19. נגזרות: $1. (c)' = 0, \quad c = \text{const}; \quad 2. (x^n)' = nx^{n-1}; \quad (u \cdot v)' = u' \cdot v + u \cdot v';$

3. $(a^x)' = a^x \cdot \ln a; \quad 4. (\log_a x)' = \frac{1}{x \ln a}; \quad \left(\frac{u}{v}\right)' = \frac{u' \cdot v - u \cdot v'}{v^2};$

5. $(\sin x)' = \cos x; \quad 6. (\cos x)' = -\sin x; \quad (f(g(x)))' = f'(g(x)) \cdot g'(x)$

7. $(\operatorname{tg} x)' = \frac{1}{\cos^2 x}; \quad 8. (\operatorname{ctg} x)' = -\frac{1}{\sin^2 x};$

9. $(\operatorname{arctg} x)' = \frac{1}{1+x^2}; \quad 10. (\arcsin x)' = \frac{1}{\sqrt{1-x^2}}; \quad \text{פונקציה פרמטרית:}$

11. $(\arccos x)' = -\frac{1}{\sqrt{1-x^2}}; \quad 12. (\operatorname{arcc} \operatorname{tg} x)' = -\frac{1}{1+x^2}; \quad \begin{cases} x = x(t), \\ y = y(t) \end{cases} \quad y'_x = \frac{y'_t}{x'_t}$

20. אינטגרלים: $1. \int (ax+b)^n dx = \frac{1}{a} \cdot \frac{(ax+b)^{n+1}}{n+1} + C \quad (n \neq -1)$

אינטגרציה לפי חלקים: $2. \int \frac{dx}{ax+b} = \frac{1}{a} \cdot \ln|ax+b| + C; \quad 3. \int a^x dx = \frac{a^x}{\ln a} + C \quad \int u \cdot dv = u \cdot v - \int v \cdot du$

4. $\int \sin(ax) dx = -\frac{1}{a} \cos(ax) + C \quad \text{הצבה טריגונומטרית אוניברסלית:}$

5. $\int \cos(ax) dx = \frac{1}{a} \sin(ax) + C \quad \operatorname{tg} \frac{x}{2} = t, \quad x = 2 \operatorname{arctg} t, \quad dx = \frac{2dt}{1+t^2}$

6. $\int \frac{dx}{\cos^2 x} = \operatorname{tg} x + C; \quad 7. \int \frac{dx}{\sin^2 x} = -\operatorname{ctg} x + C; \quad \sin x = \frac{2t}{1+t^2}, \quad \cos x = \frac{1-t^2}{1+t^2}$

8. $\int \frac{dx}{a^2+x^2} = \frac{1}{a} \cdot \operatorname{arctg}\left(\frac{x}{a}\right) + C; \quad 11. \int \frac{dx}{a^2-x^2} = \frac{1}{2a} \ln \left| \frac{x+a}{x-a} \right| + C$

9. $\int \frac{dx}{\sqrt{a^2-x^2}} = \arcsin\left(\frac{x}{a}\right) + C \quad 12. \int \frac{f'(x)dx}{f(x)} = \ln|f(x)| + C; \quad 13. \int \frac{xdx}{x^2+a} = \frac{\ln|x^2+a|}{2} + C$

10. $\int \frac{dx}{\sqrt{x^2+p}} = \ln|x + \sqrt{x^2+p}| + C \quad 14. \int \frac{f'(x)dx}{\sqrt{f(x)}} = 2 \cdot \sqrt{f(x)} + C; \quad 15. \int e^{ax} dx = \frac{1}{a} e^{ax} + C$

16. $\int \operatorname{tg} x dx = -\ln|\cos x| + C; \quad 17. \int \operatorname{ctg} x dx = \ln|\sin x| + C$

21. נוסחאות טריגונומטריות:

$$\sin(x+y) = \sin x \cos y + \cos x \sin y; \quad \cos(x+y) = \cos x \cos y - \sin x \sin y; \quad \sin(2x) = 2 \sin x \cos x;$$

$$\cos(2x) = \cos^2(x) - \sin^2(x); \quad 2 \sin^2(x) = 1 - \cos(2x); \quad 2 \cos^2(x) = 1 + \cos(2x);$$

$$(u = 0.5(x+y), v = 0.5(x-y)) \rightarrow \sin(x) + \sin(y) = 2 \sin(u) \cos(v); \quad \sin(x) - \sin(y) = 2 \sin(v) \cos(u);$$

$$\cos(x) + \cos(y) = 2 \cos(u) \cos(v); \quad \cos(x) - \cos(y) = -2 \sin(u) \sin(v)$$

$$2 \sin x \sin y = \cos(2v) - \cos(2u); \quad 2 \cos x \cos y = \cos(2u) + \cos(2v); \quad 2 \sin x \cos y = \sin(2u) + \sin(2v)$$

בהצלחה

