

תורת המשחקים

תוכן העניינים

1 פרק 1: משחקים בצורה רחבה

2	גרפים ועצים
2	הגדרת צורה הרחבה של משחק
4	משחקים עם ידיעה שלמה והצורה אסטרטגית
10	משחקים עם ידיעה לא שלמה
14	משחק עם מהלכי גורל
17	

2 פרק 2: משחקים בצורה אסטרטגית, שליטה ושיווי משקל נאש

30	הגדרה של משחק בצורה אסטרטגית
30	סימונים
31	מושג השליטה
32	הנחות של רציונליות בתורת המשחקים
33	סילוק חוזר
34	שיווי משקל נאש
35	יחסים בין אסטרטגיות שולטות ושיווי משקל נאש
44	

3 פרק 3: אסטרטגיות רציפות ודואפול

47	אוליגפול
47	

4 פרק 4: משחקי לוח

52	הקס
52	צ'ומפ: המשחק של דייויד גייל
59	שחמט
66	עץ המשחק
68	תת משחק
70	משפט פון נוימן לשחמט
71	משפט פון נוימן לשחמט (הוכחה חלופית)*
72	

5 פרק 5: ערך המקסמין ומשחקים סכום אפס

75	ביטחון: מושג המקסמין
75	משפטים: היחס בין שיווי משקל ואסטרטגית מקסמין
78	משחק שני שחקנים סכום אפס
80	משפט המקסמין
85	משפט השקילות בין שיווי משקל לבין אסטרטגיה אופטימלית
85	

פרק 1: משחקים בצורה רחבה

1.1 גרפים ועצים

הגדרה 1.1 גרף מכוון

גרף מכוון סופי הוא זוג $G = (V, E)$ שבו:

- V הוא קבוצה סופית של הקודקודים של הגרף.
בדרך כלל קודקודים יסומנו $x_0, x_1, x_2, \dots$.
- $E \subseteq V \times V$ הוא קבוצה סופית של הצלעות של הגרף.
אם V הוא הקבוצת הקודקודים של G , ואם קיימת צלע מקודקוד $x_i \in V$ לקודקוד $x_j \in V$, הצלע הזו תסומן $x_i x_j \in E$.

הגדרה 1.2 קודקוד אב וקודקוד בן

יהי $G = (V, E)$ גרף מכוון קשיר. אם קיימת צלע $x_1 x_2 \in E$, כלומר אם קיימת צלע היוצאת מקודקוד x_1 ונכנסת לקודקוד x_2 , אומרים כי:

• x_2 הוא **בן** של הקודקוד x_1 ,

• x_1 הוא **אב** של הקודקוד x_2 .

אם $x \in V$ קודקוד של G . הקבוצת כל הבנים של x תסומן $c(x)$, וקבוצת כל האבות של x תסומן $p(x)$:

$$\begin{aligned} c(x) &\triangleq \text{"קבוצת הבנים של } x\text{"}, \\ p(x) &\triangleq \text{"קבוצת האבות של } x\text{"}. \end{aligned}$$

הגדרה 1.3 עץ מכוון

עץ מכוון הוא שלשה (V, E, x_0) כאשר (V, E) גרף מכוון ו- $x_0 \in V$ הוא קודקוד של G , שנקרא **השורש** של העץ, כך שהתנאים הבאים מתקיימים.

(1) לא קיימות צלעות שנכנסות לשורש x_0 .

(2) לכל קודקוד פרט לשורש, $x \in V, (x \neq x_0)$, קיימת צלע אחת בדיוק שנכנסת אליה.

(3) G לא מכיל מחזורים.

משפט 1.1 קיום אב יחיד לכל בן בעץ

אם (V, E, x_0) הוא עץ אז לכל קודקוד $x \in V$ מתקיים $x = x_0$ או ל- x קיים אב אחד בדיוק.

הוכחה: יהי $T = (V, E, x_0)$ עץ. יהי $x \in V$ קודקוד ונניח ש- $x \neq x_0$. נראה כי ל- x קיים אב ואז נראה כי האב של x הוא יחודי.

$\Leftarrow$ נניח של- x לא קיים אב.

$\Leftarrow$ לא קיימת צלע שנכנסת אליו.

$\Leftarrow$ הגענו לסתירה לכך שבעץ, לכל קודקוד (חוץ מהשורש) קיימת צלע אחת בדיוק שנכנסת אליו.

לכן לכל קודקוד $x \neq x_0$ קיים אב.

הוכחנו קיום אב לכל קודקוד פרט לשורש.

כעת נוכיח כי האב של x הוא יחודי.

נניח שקיים קודקוד x בעץ ולו יש שתי אבות: x' ו- x'' .

$\Leftarrow$ קיימות שתי צלעות שנכנסות אליו: $xx' \in E$ ו- $xx'' \in E$.

$\Leftarrow$ הגענו לסתירה לכך שבעץ לכל קודקוד (חוץ מהשורש) קיימת צלע אחת בדיוק שנכנסת אליו.



משפט 1.2 בעץ קיים מסלול יחיד מהשורש לכל קודקוד

אם (V, E, x_0) הוא עץ אז קיימת מסלול יחיד מהשורש x_0 לכל קודקוד $x \in V$.

הוכחה: נוכיח קיום מסלול מ- x_0 לכל קודקוד x באינדוקציה. נסמן ב- d את האורך של המסלול, כאשר אורך של מסלול מוגדר להיות מספר הקודקודים שהמסלול עובר.

שלב הבסיס: $d = 1$

אם $d = 1$ אז המסלול הוא מ- x_0 לעצמו ולכן הטענה נכונה באופן טריוויאלי.

שלב המעבר

נניח כי הטענה נכונה עבור $d = k$. זאת היא ההנחת האינדוקציה שלנו. נוכיח את הטענה למקרה $d = k + 1$ באופן הבא.

• אם x קודקוד בעץ במרחק $d = k + 1$ מ- x_0

$\Leftarrow$ ל- x קיים אב x' $p(x) = x'$.

$\Leftarrow$ x' במרחק k מ- x_0 .

$\Leftarrow$ לפי ההנחת האינדוקציה קיים מסלול מ- x_0 ל- x' ,

ומכיוון ש- x' הוא האב של x אז קיים מסלול מ- x' ל- x .

$\Leftarrow$ קיים מסלול מ- x_0 ל- x .

הוכחנו קיום מסלול מ- x_0 לכל קודקוד x . כעת נוכיח כי המסלול יחודי באופן הבא.

- נניח בשלילה כי קיים קודקוד x עבורו קיימים שני מסלולים מ- x_0 ל- x .
- ⇐ קיים קודקוד ראשון y שבו המסלולים מסתעפים וקודקוד האחרון y' שלפניו המסלולים היו שונים.
- ⇐ לקודקוד y' נכנסות שתי צלעות שונות.
- ⇐ סתירה לכך שבעץ לכל קודקוד יש בדיוק צלע אחת שנכנסת אליו.

■

משפט 1.3 כל מסלול בעץ הוא יחודי

אם (V, E, x_0) הוא עץ ואם קיים מסלול מקודקוד $x \in V$ לקודקוד $x' \in V$ אז הוא יחודי.

הוכחה: יהיו $x, x' \in V$ שני קודקודים שונים של העץ. נוכיח את הטענה דרך השלילה.

- אם קיימים קודקודים $x, x' \in V$ שביניהם קיימים שני מסלולים שונים.
- ⇐ קיים קודקוד ראשון y שבו המסלולים מסתעפים וקודקוד האחרון y' שלפניו המסלולים היו שונים.
- ⇐ לקודקוד y' נכנסות שתי צלעות שונות.
- ⇐ סתירה לכך שבעץ לכל קודקוד יש בדיוק צלע אחת שנכנסת אליו.

■

1.2 הגדרת צורה הרחבה של משחק

התיאור הכי טבעי של משחק הוא **הצורה הרחבה**.

הגדרה 1.4 חלוקה

תהי B קבוצה לא ריקה. **חלוקה** היא סדרה

$$(B_i)_{i=1}^k = (B_1, B_2, \dots, B_k)$$

המקיימת התנאים הבאים:

(1) לכל $1 \leq i \leq k$ היא תת-קבוצה של B :

$$B_i \subseteq B, \quad 1 \leq i \leq k$$

(2) התתי-קבוצות זרות. כלומר כל חיתוך של כל מספר סופי של תת-קבוצות הוא ריק. כלומר לכל תת-קבוצה $X \subseteq \{1, \dots, k\}$:

$$\bigcap_{x \in X} B_x = \emptyset.$$

(3) האיחוד של כל תתי-קבוצות הוא הקבוצה B :

$$\bigcup_{i=1}^k B_i = B.$$

הגדרה 1.5 משחק בצורה רחבה

משחק בצורה רחבה הוא שביעייה סדורה:

$$\Gamma = (N, V, E, x_0, (V_i)_{i \in N}, O, (u_i)_{i \in N}) .$$

המרכיבים של המשחק, Γ הם מוגדרים באופן הבא.

$$(1) \quad N = \text{קבוצה סופית של שחקנים.}$$

$$(x_0, V, E) \text{ הוא עץ שנקרא עץ המשחק.}$$

$$(2) \quad x_0 = \text{השורש של העץ, שהוא קודקוד שבו השחקן הראשון בתור מקבל ההחלטה הראשונה בין הפעולות המיוצגות ע"י הצלעות שיוצאות ממנה.}$$

$$(3) \quad V = \text{קבוצת הקדקודים של עץ המשחק.}$$

בכל קדקוד שחקן מקבל החלטה בין פעולות.

$$(4) \quad E = \text{קבוצת הצלעות של עץ המשחק.}$$

כל צלע מייצגת פעולה של אותו שחקן שקיבל החלטה בקודקוד שממנו הצלע יצאה.

$$(5) \quad (V_i)_{i \in N} = (V_1, V_2, V_3, \dots) \text{ היא חלוקה של הקבוצת הקודקודים שאינם עלים כך ש:}$$

$$\bullet V_1 = \text{הקבוצה של כל הקדקודים שבהן שחקן 1 מקבל החלטה,}$$

$$\bullet V_2 = \text{הקבוצה של כל הקדקודים שבהן שחקן 2 מקבל החלטה.}$$

במקרה הכללי:

$$\bullet V_j = \text{הקבוצה של כל הקדקודים שבהן שחקן } j \text{ מקבל החלטה.}$$

$$(6) \quad O = \text{קבוצת העלים של העץ.}$$

כלומר $O \subset V$ היא תת-קבוצת קודקודים של העץ שמכילה כל הנקודות סיום של העץ.

$$(7) \quad (u_i)_{i \in N} = (u_1, u_2, \dots) \text{ כאשר } u_i \text{ היא פונקציית התשלום של שחקן } i, \text{ שמתאימה לכל עלה בעץ המשחק תשלום לשחקן } i. \text{ (למטה בהגדרה 1.9 נתן הגדרה שקולה של פונקציית התשלום במונחי אסטרטגיות.)}$$

דוגמה 1.1 (משחק התאמת המטבעות)

אליס בוחרת אחד הצדדים של מטבע, H (עץ) או T (פלי). היא רושמת בחירותה על פתק, חותמת עליו ומעבירה אותו לשופט. אחר כך בוב בוחר h (עץ) או t (פלי), רושם בחירותו על פתק, חותם עליו ומעביר אותו לשופט.

$$\bullet \text{ אם אליס בוחרת } H \text{ ובוב בוחר } h \text{ אז בוב משלם לאליס } 5.$$

$$\bullet \text{ אם אליס בוחרת } H \text{ ובוב בוחר } t \text{ אז בוב משלם לאליס } 7.$$


$$\bullet \text{ אם אליס בוחרת } T \text{ ובוב בוחר } h \text{ אז בוב משלם לאליס } 6.$$

$$\bullet \text{ אם אליס בוחרת } T \text{ ובוב בוחר } t \text{ אז אליס משלמת לבוב } 4.$$

רשמו את המשחק בצורה רחבה.

פתרון:

תהי אליס שחקן I ובוב שחקן II . העץ המשחק הוא מתואר בתרשים למטה:



הצורה הרחבה של המשחק היא:

$$\Gamma = (N, V, E, x_0, (V_I, V_{II}), O, (u_I, u_{II})) ,$$

כאשר הרכיבים של המשחק מפורטים למטה.

(1) קבוצת השחקנים:

$$N = \{\text{אליס}, \text{בוב}\} = \{I, II\} .$$

(2) השורש העץ: x_0 .

(3) קבוצת הקודקודים:

$$V = \{x_0, x_1, x_2, x_3, x_4, x_5, x_6\} .$$

(4) קבוצת הצלעות:

$$E = \{x_0x_1, x_0x_2, x_1x_3, x_1x_4, x_2x_5, x_2x_6\} .$$

(5) קבוצת הקודקודים של אליס (שחקן I):

$$V_I = \{x_0\} .$$

קבוצות הקודקודים של בוב (שחקן II):

$$V_{II} = \{x_1, x_2\} .$$

(6) קבוצת העלים:

$$O = \{x_3, x_4, x_5, x_6\} .$$

(7) הפונקציית התשלום של שחקן I היא:

$$\begin{array}{ll} u_I(x_3) = 5 , & u_{II}(x_3) = -5 , \\ u_I(x_4) = -7 , & u_{II}(x_4) = 7 , \\ u_I(x_5) = -4 , & u_{II}(x_5) = 4 , \\ u_I(x_6) = 6 , & u_{II}(x_6) = -6 . \end{array}$$

הגדרה 1.6 פונקצית הפעולות

הפונקצית הפעולות, $A(x)$ מתאימה לקודקוד x , כל הפעולות האפשריות ששחקן יכול לבחור בקודקוד x .

דוגמה 1.2 (המשך של דוגמה 1.1)

עבור המשחק של דוגמה 1.1:

$$A(x_0) = (H, T) ,$$

$$A(x_1) = (h, t) ,$$

$$A(x_2) = (h, t) .$$

הגדרה 1.7 אסטרטגיה

יהי $\Gamma = (N, V, E, x_0, (V_i)_{i \in N}, O, (u_i)_{i \in N})$ משחק בצורה רחבה, ויהי $V_i = \{x_1, x_2, \dots, x_n\}$ קבוצת הקודקודים של שחקן $i \in N$.

- **אסטרטגיה** של שחקן $i \in N$ היא פונקציה $s_i(x)$ המתאימה לכל קודקוד $x \in V_i$ פעולה ב- $A(x)$. אסטרטגיה יחידה, s_i של שחקן i תסומן כסדרת פעולות בכל קודקוד:

$$s_i = (s_i(x_1), s_i(x_2), \dots, s_i(x_n)) = (a_1, a_2, \dots, a_n) , \quad a_j \in A(x_j) .$$

- **הקבוצת האסטרטגיות** של שחקן $i \in N$ תסומן S_i ותוגדר:

$$S_i = \{ (a_1, a_2, \dots, a_n) \mid a_1 \in A(x_1), \dots, a_n \in A(x_n) \} .$$

כלומר, הקבוצת אסטרטגיות S_i היא אוסף כל האסטרטגיות האפשריות של שחקן i במשחק Γ .

- נניח ששחקן I בוחר באסטרטגיה $s_I \in S_I$, שחקן II בוחר באסטרטגיה $s_{II} \in S_{II}$, ובאופן כללי נניח כי שחקן $i \in N$ בוחר באסטרטגיה $s_i \in S_i$.

וקטור אסטרטגיה של המשחק הוא וקטור של הפונקציות אסטרטגיות של כל השחקנים:

$$s = (s_i)_{i \in N} = (s_I, s_{II}, \dots)$$

הגדרה 1.8 קבוצת ידיעה

יהי $\Gamma = (N, V, E, x_0, (V_i)_{i \in N}, O, (u_i)_{i \in N})$ משחק בצורה רחבה. **הקבוצת ידיעה** של שחקן $i \in N$ תסומן U_i ותוגדר הקבוצת זוגות הבאה:

$$\bigcup_{x \in V_i} (x, A(x)) ,$$

ז"א U_i מכילה כל הזוגות, כאשר כל זוג מכיל קודקוד x והקבוצות הפעולות האפשריות $A(x)$.

דוגמה 1.3 (מטבע וקלפים)

אליס ובוב משחקים משחק עם הכללים הבאים.

- שחקן I (אליס) בוחר אחד הצדדים של מטבע, H (עץ) או T (פלי).
- אחר כך, אם אליס בוחרת H אז שחקן II (בוב) בוחר קלף מלכה (Q) או קלף מלך (K).
- אחרת אם אליס בוחרת T בוב בוחר קלף נסיך (J) או קלף אס (A).

התשלומים של המשחק הם כמפורטים למטה.

- אם אליס בוחרת H ובוב בחר Q אז בוב משלם לאליס ₪50.
- אם אליס בוחרת H ובוב בחר K אז אליס משלם לבוב ₪70.
- אם אליס בוחרת T ובוב בחר J אז בוב משלם לאליס ₪60.
- אם אליס בוחרת T ובוב בחר A אז אליס משלם לבוב ₪40.


סעיף 1) רשמו את המשחק בצורה רחבה.

סעיף 2) רשמו את הקבוצות ידיעה של אליס ושל בוב.

סעיף 3) רשמו את הקבוצות אסטרטגיות של אליס ושל בוב.

פתרון:

סעיף 1)



- סעיף 2) • לשחקן I יש קדקוד אחד x_0 שבו הוא מקבל החלטה בין שתי פעולות H, T .
לכן הקבוצת קודקודים של שחקן I היא

$$V_I = \{ x_0 \}$$

והקבוצות ידיעה של שחקן I הן:

$$U_I = \{ (x_0, (H, T)) \} .$$

- הקבוצת קודקודים של שחקן II היא:

$$V_{II} = \{ x_1 , x_2 \}$$

והקבוצות ידיעה של שחקן II הן:

$$U_{II} = \{ (x_1, (Q, K)) , (x_2, (A, J)) \} .$$

סעיף 3)

$$S_I = \{(a_1) \mid a_1 \in A(x_0)\} = \{(a_1) \mid a_1 \in (H, T)\} = \{(H), (T)\}.$$

$$\begin{aligned} S_{II} &= \{(a_1, a_2) \mid a_1 \in A(x_1), a_2 \in A(x_2)\} \\ &= \{(a_1, a_2) \mid a_1 \in (Q, K), a_2 \in (A, J)\} \\ &= \{(Q, A), (Q, J), (K, A), (K, J)\}. \end{aligned}$$

הגדרה 1.9 פונקצית תשלום

נתון משחק n -שחקנים.

- הפונקציה התשלום של שחקן i , מסומנת u_i , מתאימה לכל וקטור אסטרטגיה $(s_1, s_2, \dots, s_n)$ של המשחק תשלום לשחקן i :


$$u_i(s_1, s_2, \dots, s_n) = \text{"תשלום לשחקן } i \text{"}.$$

- הפונקציה התשלום של המשחק, מסומנת u , מתאימה לכל וקטור אסטרטגיה $(s_1, s_2, \dots, s_n)$ וקטור $(u_1, \dots, u_n)$ כאשר u_i הוא התשלום לשחקן i :

$$u(s_1, s_2, \dots, s_n) = (u_1, \dots, u_n).$$

דוגמה 1.4 (מטבע וקלפים: המשך של דוגמה 1.3)

נתון המשחק בעל עץ המשחק הבא:



סעיף א) רשמו את כל הוקטורי אסטרטגיות של המשחק.

סעיף ב) רשמו את הפונקציה התשלום של כל השחקן והפונקציה התשלום של המשחק.

פתרון:

סעיף א) בדוגמה 1.3 מצאנו אמ הקבוצות אסטרטגיות של שחקן I שחקן II :

$$\begin{aligned} S_I &= \{(H), (T)\}, \\ S_{II} &= \{(Q, A), (Q, J), (K, A), (K, J)\}. \end{aligned}$$

- נניח כי אליס משחקת לפי האסטרטגיה $s_I = H$ ובוב משחק לפי האסטרטגיה $s_{II} = (Q, A)$.
הווקטור אסטרטגיות של המשחק הוא

$$s = (s_I, s_{II}) = (H, (Q, A)) .$$

- אם אליס משחקת לפי האסטרטגיה $s_I = H$ ובוב משחק לפי האסטרטגיה $s_{II} = (Q, J)$.
הווקטור אסטרטגיות של המשחק הוא

$$s = (s_I, s_{II}) = (H, (Q, J)) .$$

- וכן הלאה.

בסה"כ למשחק הזה יש 8 ווקטורי אסטרטגיות:

$$s = (s_I, s_{II}) = \left\{ \begin{array}{l} (H, (Q, A)) \\ (H, (K, A)) \\ (H, (Q, J)) \\ (H, (K, J)) \\ (T, (Q, A)) \\ (T, (K, A)) \\ (T, (Q, J)) \\ (T, (K, J)) \end{array} \right.$$

סעיף ב) הפונקצית תשלום של המשחק הינו

$$\begin{aligned} u(H, (Q, A)) &= (50, -50) , \\ u(H, (Q, J)) &= (50, -50) , \\ u(H, (K, A)) &= (-70, 70) , \\ u(H, (K, J)) &= (-70, 70) , \\ u(T, (Q, A)) &= (60, -60) , \\ u(T, (Q, J)) &= (-40, 40) , \\ u(T, (K, A)) &= (60, -60) , \\ u(T, (K, J)) &= (-40, 40) . \end{aligned}$$



1.3 משחקים עם ידיעה שלמה והצורה אסטרטגית

הגדרה 1.10 משחק עם ידיעה שלמה

- בכל שלב במשחק, כל שחקן מודע לכלל ההחלטות שהתקבלו על ידי השחקנים האחרים בשלבים המוקדמים יותר.

- לפיכך, השחקן יודע בדיוק אילו פעולות ננקטו, ובעת קבלת ההחלטה, הוא יודע בוודאות באיזה צומת הוא נמצא בעץ המשחק.

דוגמה 1.5 (משחק מטבע וקלף עם ידיעה שלמה)

נתבונן על משחק עם הכללים הבאים:

- שחקן I (אליס) בוחר אחד הצדדים של מטבע, H (עץ) או T (פלי).
- אחר כך, אם אליס בוחרת H אז שחקן II (בוב) בוחר קלף מלכה (Q) או קלף מלך (K).
- אחרת אם אליס בוחרת T בוב בוחר קלף נסיך (J) או קלף אס (A).

התשלומים של המשחק:


- אם אליס בוחרת H ובוב בוחר Q אז בוב מקבל ₪ 5 ואליס מפסידה ₪ 10
- אם אליס בוחרת H ובוב בוחר K אז אליס מקבלת ₪ 7 ובוב מקבל ₪ 13
- אם אליס בוחרת T ובוב בוחר J אז בוב מקבל ₪ 6 ואליס מקבלת ₪ 12.
- אם אליס בוחרת T ובוב בוחר A אז אליס מקבלת ₪ 40 ובוב מפסיד ₪ 30

א) רשמו את המשחק בצורה רחבה.

ב) רשמו את המשחק בצורה אסטרטגית.

פתרון:

סעיף א)



- סעיף ב)** • לשחקן I יש קדקוד אחד x_0 בו הוא מקבל החלטה בין שתי פעולות H, T .
ז"א הקבוצת קודקודים של שחקן I היא:

$$V_I = \{x_0\}$$

והקבוצות ידיעה של שחקן I הן:

$$U_I = \{(x_0, (H, T))\} .$$

מכאן הקבוצת האסטרטגיות של שחקן I היא:

$$S_I = \{(H), (T)\} .$$

- לשחקן II יש שני קדקודים x_1, x_2 בהם הוא מקבל החלטה. לכן הקבוצת קודקודים של שחקן II היא:

$$V_{II} = \{x_1, x_2\}$$

והקבוצות ידיעה של שחקן II הן:

$$U_{II} = \{(x_1, (Q, K)), (x_2, (J, A))\} .$$

מכיוון שלשחקן II יש שתי קבוצות ידיעה x_1, x_2 ובכל אחד יש שתי פעולות אפשריות, אז יש לבוב $2 \times 2 = 4$ אסטרטגיות:

$$S_{II} = \{(Q, J), (Q, A), (K, J), (K, A)\} .$$

(נהוג לרשום את האסטרטגיות מלמעלה עד למטה ומשמאל לימין).

הווקטורי האסטרטגיות של המשחק הן:

$$(s_I, s_{II}) = \begin{cases} (H, (Q, A)) \\ (H, (Q, J)) \\ (H, (K, A)) \\ (H, (K, J)) \\ (T, (Q, A)) \\ (T, (Q, J)) \\ (T, (K, A)) \\ (T, (K, J)) \end{cases} .$$


ניתן להציג את הפונקצית התשלומים בצורה אסטרטגית של המשחק בטבלה הבאה:

$I \backslash II$				
	(Q, J)	(Q, A)	(K, J)	(K, A)
H	-10, 5	-10, 5	7, 13	7, 13
T	12, 6	40, -30	12, 6	40, -30



דוגמה 1.6 (מעבר מצורה רחבה לצורה אסטרטגית)

נתון המשחק הבא בצורה רחבה. רשמו אותו בצורה אסטרטגית.

**פתרון:**

במשחק הזה, אליס (שחקן I) פותח עם המהלך הראשון, ואחר כך בוב מבצע המהלך השני, ואז אליס מבצע מהלך שוב.

המשחק הוא משחק עם ידיעה שלמה.

- הקבוצת קודקודים של אליס היא:

$$V_I = \{x_0, x_3, x_4\}$$

והקבוצות ידיעה של אליס הן:

$$U_I = \{(x_0, (A, B)), (x_3, (C, D)), (x_4, (E, F))\}$$

בכל אחד של הקדקודים האלה לאליס יש 2 פעולות אפשריות לכן יהיו לה $2 \times 2 \times 2 = 8$ קבוצות אסטרטגיות:

$$S_I = \{(A, C, E), (A, C, F), (A, D, E), (A, D, F), (B, C, E), (B, C, F), (B, D, E), (B, D, F)\}.$$

- הקבוצת קודקודים של בוב היא:

$$V_{II} = \{x_2\}$$

והקבוצות ידיעה של בוב הן:

$$U_{II} = \{(x_2, (a, b))\}.$$

בקבוצות ידיעה הזאת של בוב יש 2 פעולות אפשריות לכן יהיו לו 2 קבוצות אסטרטגיות:

$$S_{II} = \{(a), (b)\}.$$

מכאן הצורה אסטרטגית בלבד של המשחק הינה:

$I \backslash II$	a	b
(A, C, E)	19, 12	0, 6
(A, C, F)	19, 12	11, 3
(A, D, E)	18, 21	0, 6
(A, D, F)	18, 21	11, 3
(B, C, E)	8, 6	8, 6
(B, C, F)	8, 6	8, 6
(B, D, E)	8, 6	8, 6
(B, D, F)	8, 6	8, 6

■

1.4 משחקים עם ידיעה לא שלמה

הגדרה 1.11 משחק עם ידיעה לא שלמה

משחק עם ידיעה לא שלמה הוא משחק שבו:

- קיים שחקן i כך שאם V_i הקבוצת קודקודים שלו, קיימת תת-קבוצת קודקודים $V'_i \subseteq V_i$ שבה שחקן i לא יודע אילו פעולה ביצע השחקן בקודקוד אב של הקודקודים ב- V'_i .
- לכן, כאשר מגיע תורו של אותו שחקן, הוא אינו יודע באיזה צומת הוא נמצא בתוך עץ המשחק.
- התת-קבוצה V'_i תקרא **קבוצת ידיעה לא שלמה**.


דוגמה 1.7 (משחק מטבע וקלף עם ידיעה לא שלמה)

הכללים של המשחק הם:

- שחקן I (אליס) בוחרת אחד הצדדים של מטבע, H (עץ) או T (פלי).
 - אחר כך, **בלי ידיעה של הבחירה של אליס**, שחקן II (בוב) בוחר קלף מלכה (Q) או קלף מלך (K).
- בשונה לדוגמה הקודמת, שחקן II לא יודע את ההחלטה של שחקן I עד סוף המשחק. התשלומים של המשחק הם:

- אם אליס בוחרת H ובוב בוחר Q אז בוב משלם לאליס 7.
- אם אליס בוחרת H ובוב בוחר K אז אליס משלם לבוב 6.
- אם אליס בוחרת T ובוב בוחר Q אז אליס משלם לבוב 10.
- אם אליס בוחרת T ובוב בוחר K אז בוב משלם לאליס 5.

נרשום את המשחק בצורה רחבה:



- לשחקן I יש קדקוד אחד x_0 בו הוא מקבל החלטה בין שתי פעולות H, T . לכן הקבוצת הקדקודים שלה היא:

$$V_I = \{ x_0 \}$$

והקבוצת הידעיה של אליס הן:

$$U_I = \{ (x_0, (H, T)) \} .$$

לפיכך הקבוצת האסטרטגיות של אליס היא:

$$S_I = \{ (H), (T) \} .$$

- בניגוד לדוגמה הקודמת, בוב (שחקן II) לא יודע איזה אופציה אליס בחרה: H או T . לכן בוב לא יודע באיזה קדקוד הוא נמצא: x_1 או x_2 . מכיוון שהוא לא יודע מה ההחלטה של אליס, בחירת הפעולות הזמינות לו בקדקודים x_1 ו- x_2 זהה. לכן הקבוצת הפעולות שיוצאות מקדקוד x_1 זהה קבוצת הפעולות שיוצאות מקדקוד x_2 :

$$A(x_1) = A(x_2) .$$

אומרים כי הצומת במשחק עם של הקדקודים x_1 ו- x_2 הוא **צומת ללא ידיעה שלמה**. אנחנו רושמים את הקדקודים בצומת ללא ידיעה שלמה כקדקוד אחד. כלומר הקבוצת קודקודים של בוב היא:

$$V_{II} = \{ x_1 x_2 \}$$

והקבוצת ידיעה של בוב היא:

$$U_{II} = \{ (x_1 x_2, (K, Q)) \} .$$

לכן הקבוצת האסטרטגיות של בוב היא:

$$S_{II} = \{ (Q) , (K) \} .$$

נשים לב כי מכל אחד של הקדקודים x_1 ו- x_2 יוצאות אותן קבוצת פעולות. אחרת בוב היה יודע מה ההחלטה של אליס.

כעת נרשום את הצורה האסטרטגית של המשחק:

$I \backslash II$	Q	K
H	7, -7	-6, 6
T	-10, 10	5, -5


משפט 1.4 פעולות שיוצאות מקבוצת ידיעה לא שלמה

אם x, x' הם קודודים של אותה קבוצת ידיעה לא שלמה, אז הקבוצת הפעולות של x ו- x' זהות:

$$A(x) = A(x') .$$

דוגמה 1.8 (משחק עם ידיעה לא שלמה)

נתון המשחק הבא בצורה רחבה. רשמו אותו בצורה אסטרטגית.

**פתרון:**

שימו לב: בדומה לדוגמה הקודמת, הצמתים x_3 ו- x_4 שייכים לאותה קבוצת מידע של אליס, כיוון שהיא אינה מודעת למהלך שבחר בוב בצומת x_2 (כלומר, אינה יודעת אם בוב בחר a או b). מסיבה זו, קבוצת הפעולות הזמינות לאליס חייבת להיות זהה בשני הצמתים הללו. אם היו הפעולות האפשריות ב- x_3 וב- x_4 שונות זו מזו, אליס הייתה יכולה להסיק מתוך קבוצת הפעולות העומדות לרשותה מהי הבחירה שביצע בוב קודם לכן. לדוגמה, אילו היו זמינות לאליס הפעולות E ו- F בצומת x_4 , אך לא ב- x_3 , היא הייתה מזהה בוודאות שהיא נמצאת ב- x_4 (ובכך מסיקה שבוב בחר b). באופן דומה, אילו הייתה לה בחירה בין C ו- D בצומת x_3 בלבד, היא הייתה יודעת שהיא נמצאת ב- x_3 (ומסיקה שבוב בחר a).

- הקבוצת הקודקודים של אליס היא:

$$V_I = \{x_0, x_3, x_4\}$$

והקבוצות הידיעה שלה הן:

$$U_I = \{(x_0 (A, B)), (x_3, x_4 (C, D))\} .$$

בכל אחד של הקדקודים האלה לאליס יש 2 פעולות אפשריות לכן יהיו לה $2 \times 2 = 4$ אסטרטגיות:

$$S_I = \{(A, C), (A, D), (B, C), (B, D)\} .$$

- הקבוצת הקודקודים של בוב היא:

$$V_{II} = \{x_2\}$$

והקבוצות הידיעה של בוב הן:

$$U_{II} = \{(x_2, (a, b))\} .$$

בקבוצת ידיעה הזאת של בוב יש 2 פעולות אפשריות לכן יהיו לו 2 אסטרטגיות:

$$S_{II} = \{(a) , (b)\} .$$

מכאן הצורה אסטרטגית בלבד של המשחק הינה:

$I \backslash II$	a	b
	a	b
(A, C)	19, 12	0, 6
(A, D)	18, 21	11, 3
(B, C)	8, 6	8, 6
(B, D)	8, 6	8, 6

■

1.5 משחק עם מהלכי גורל

במשחקים שבהם עסקנו עד כה, כל מעבר בין מצבי המשחק התבצע על ידי אחד השחקנים. מודל זה הולם משחקים כגון שחמט או דמקה, אך אינו מתאים למשחקים המשלבים אלמנטים של מקריות, כגון משחקי קלפים או קוביות (למשל פוקר או שש-בש), שבהם המעבר בין מצבים מוכתב על ידי תהליך אקראי. מעבר זה יכול לנבוע גם מגורמים חיצוניים בלתי נשלטים, כגון תנאי מזג אוויר, אירועים טבעיים או תנודות בשוק ההון. מעבר מסוג זה מוגדר כמהלך גורל (Chance Move). כדי להרחיב את המודל, נסמן חלק מהצמתים בעץ המשחק (V, E, x_0) כ'צמתי גורל'. הצלעות היוצאות מצמתים אלו מייצגות את התוצאות האפשריות של ההגרלה, כאשר לצד כל צלע מצוינת ההסתברות להתרחשות התוצאה המתאימה.

הגדרה 1.12 משחק בצורה רחבה עם מהלכי גורל

משחק בצורה רחבה עם מהלכי גורל הוא שמינייה סדורה:

$$\Gamma = (N, V, E, x_0, \{V_0, V_1, V_2, V_3, \dots\}, (p_x)_{x \in V_0}, O, u) ,$$

שבה:

- N הוא קבוצה סופית של שחקנים.
- (V, E, x_0) הוא עץ המשחק.
- $(V_i)_{i \in N \cup \{0\}}$ היא חלוקה של קבוצת הקודקודים שאינן עלים.
- לכל קדקוד $p_x, x \in V_0$ היא פונקציית ההסתברות של הפעולות (הצלעות) היוצאות מ- x .
- O היא הקבוצת העלים, המייצגים הקבוצת התוצאות האפשריות.
- u הוא פונקציית התשלומים של המשחק.

הסימונים הם כמקודם בהגדרה 1.5 עם ההבדלים הבאים.


- החלוקה של קבוצת הקודקודים היא עתה $(V_i)_{i \in N \cup \{0\}}$. כלומר, נוספה עתה הקבוצה V_0 שהיא קבוצת הקודקודים שבהם מתבצע מהלכי גורל.
- לכל קודקוד $x_0 \in V_0$ הוקטור p_x הוא ההסתברויות של הצלעות היוצאות מ- x .

דוגמה 1.9 (משחק עם מהלך גורל)

נתון משחק עם הכללים הבאים.

- שחקן בוחר H ("עץ") או T ("פלי").
- אחרי שהשחקן בוחר, הוא מטיל מטבע.
- אם המטבע מראה את בחירתו, הוא מנצח ומקבל 10 ₪.
- אם לא הוא מפסיד 5 ₪.
- שרטטו את המשחק בצורה רחבה.

פתרון:



$\Gamma = (N, V, E, x_0, \{V_1, V_2\}, \{p_{x_1}, p_{x_2}\}, O, u)$.

שחקנים:

$N = \{I\}$

קדקודים:

$V = \{x_0, x_1, x_2, x_3, x_4, x_5, x_6\}$.

צלעות:

$E = \{x_0x_1, x_0x_2, x_1x_3, x_1x_4, x_2x_5, x_2x_6\}$.

שורש העץ (המצב ההתחלתי של המשחק): x_0
קבוצות הקדקודים של שחקן I :

$V_1 = \{x_0\}$

קבוצות הקדקודים של שחקן הגורל:

$V_0 = \{x_1, x_2\}$.

פונקצית ההסתברות של שחקני גורל:

$P_{x_1}(H) = \frac{1}{2}, \quad P_{x_1}(T) = \frac{1}{2}$.

$$P_{x_2}(H) = \frac{1}{2}, \quad P_{x_2}(T) = \frac{1}{2}.$$

קבוצת העלים (תוצאות אפשריות):

$$O = \{x_3, x_4, x_5, x_6\}.$$

הקבוצות הידיעה של שחקן I הן:

$$U_I = \{(x_0, (H, T))\}.$$

הקבוצת האסטרטגיות של שחקן I היא:

$$S_I = \{H, T\}.$$


הווקטורי האסטרטגיות של המשחק הן $s = H$ ו- $s = T$. מכאן הפונקציית התשלום היא:

$$u(H) = \frac{1}{2} \cdot (10) + \frac{1}{2} \cdot (-5) = \frac{5}{2},$$

$$u(T) = \frac{1}{2} \cdot (-5) + \frac{1}{2} \cdot (10) = \frac{5}{2}.$$



דוגמה 1.10 (אסטרטגיות במשחק עם מהלכי גורל)



קבוצת קודקודים של שחקן I היא

$$V_I = \{x_0, x_4\}$$

והקבוצות ידיעה של שחקן I הן:

$$U_I = \{(x_0, (A, B)), (x_4, (C, D))\}.$$

הקבוצת אסטרטגיות של שחקן I היא:

$$S_I = ((A, C), (A, D), (B, C), (B, D)).$$

הקבוצת קודקודים של שחקן II היא:

$$V_{II} = \{x_3\}$$

והקבוצות ידיעה של שחקן II הן:

$$U_{II} = \{(x_3, (a, b))\} .$$

הקבוצת אסטרטגיות של שחקן I היא:

$$S_{II} = \{a, b\} .$$

הווקטורי אסטרטגיות של המשחקן הם:

$$(s_I, s_{II}) = \begin{cases} ((A, C), a) \\ ((A, D), a) \\ ((B, C), a) \\ ((B, D), a) \\ ((A, C), b) \\ ((A, D), b) \\ ((B, C), b) \\ ((B, D), b) \end{cases} .$$

פונקצית התשלום:

$$u((A, C), a) = (0, 0) ,$$

$$u((A, D), a) = (0, 0) ,$$

$$u((B, C), a) = \frac{1}{2} \cdot \frac{1}{3}(5, -1) + \frac{1}{2} \cdot \frac{2}{3}(-2, 5) + \frac{1}{2}(1, 1) = \left(\frac{2}{3}, \frac{7}{6}\right) ,$$

$$u((B, D), a) = \frac{1}{2} \cdot \frac{1}{3}(5, -1) + \frac{1}{2} \cdot \frac{2}{3}(-2, 5) + \frac{1}{2} \cdot \frac{1}{4}(0, 2) + \frac{1}{2} \cdot \frac{1}{2}(-1, 1) + \frac{1}{4} \cdot \frac{1}{4}(1, 1) = \left(-\frac{1}{48}, \frac{33}{16}\right) ,$$

$$u((A, C), b) = (0, 0) ,$$


$$u((A, D), b) = (0, 0) ,$$

$$u((B, C), b) = \frac{1}{2}(2, 0) + \frac{1}{2}(1, 1) = \left(\frac{3}{2}, \frac{1}{2}\right) ,$$

$$u((B, D), b) = \frac{1}{2}(2, 0) + \frac{1}{2} \cdot \frac{1}{4}(0, 2) + \frac{1}{2} \cdot \frac{1}{2}(-1, 1) + \frac{1}{4} \cdot \frac{1}{4}(1, 1) = \left(-\frac{11}{16}, \frac{9}{16}\right) .$$

דוגמה 1.11 (מעבר מצורה רחבה לצורה אסטרטגית משחק)

נתון המשחק הבא בצורה רחבה. רשמו אותו בצורה אסטרטגית.



פתרון:

המשחק הוא משחק עם ידיעה לא שלמה.

לאליס יש 5 קבוצות ידיעה:

$$U_I = \{(x_0, (A, B, C)) , (x_4 x_5, (D, E)) , (x_6, (F, G)) , (x_7 x_8 x_9, (H, I)) , (x_{10}, (J, K, L)) , (x_{11}, (M, N))\} .$$

לכן יהיו לאליס $3 \times 2 \times 2 \times 2 \times 3 \times 2 = 144$ אסטרטגיות:

$$S_I = \{(A, D, F, H, J, M) , (B, D, F, H, J, M) , (C, D, F, H, J, M) , \dots , (C, E, G, I, L, N)\} .$$

לבוב יש 3 קבוצות ידיעה:

$$U_{II} = \{(x_1, (a, b, c)) , (x_2, (d, e, f)) , (x_3, (g, h))\} .$$


לכן לבוב יהיו: $3 \times 3 \times 2 = 18$ אסטרטגיות:

$$S_{II} = \{(a, d, g) , (b, d, g) , \dots , (c, f, h)\} .$$


■

דוגמה 1.12 (מעבר מצורה רחבה לצורה אסטרטגית משחק)

רשמו את המשחק הבא בצורה אסטרטגית.



פתרון:



קבוצת אסטרטגיות של שחקן 1:

$$S_1 = \{(L, K), (M, K), (R, K), (L, N), (M, N), (R, N)\}.$$

קבוצת אסטרטגיות של שחקן 2:

$$S_2 = \{(l, r)\}.$$


מכאן הצורה אסטרטגית של המשחק היא:

$I \backslash II$	l	r
(L, K)	0, 2	0, 2
(M, K)	2, 1	1, 2
(R, K)	8, 1	3, 9
(L, N)	0, 2	0, 2
(M, N)	1, 8	1, 2
(R, N)	8, 1	3, 9


■

דוגמה 1.13 (משחק עם ידיעה לא שלמה עם מהלך גורל)

רשמו את המשחק הבא בצורה אסטרטגית.



פתרון:



קבוצות ידיעה של שחקן I :

$$U_I = \{(x_1x_2, (T, B))\} .$$

קבוצות אסטרטגיות של שחקן I :

$$S_I = \{(T), (B)\} .$$

קבוצות ידיעה של שחקן II :

$$U_{II} = \{(x_3x_4, (a, b)) , (x_5x_6, (c, d))\} .$$

קבוצות אסטרטגיות של שחקן II :

$$S_{II} = \{(a, c) , (a, d) , (b, c) , (b, d)\} .$$

צורה אסטרטגית של המשחק:

$I \backslash II$	(a, c)	(a, d)	(b, c)	(b, d)
T	$\frac{1}{2}(8, 6) + \frac{1}{2}(8, 0)$	$\frac{1}{2}(8, 6) + \frac{1}{2}(0, 6)$	$\frac{1}{2}(4, 10) + \frac{1}{2}(8, 0)$	$\frac{1}{2}(4, 10) + \frac{1}{2}(0, 6)$
B	$\frac{1}{2}(10, 4) + \frac{1}{2}(8, 4)$	$\frac{1}{2}(10, 4) + \frac{1}{2}(4, 2)$	$\frac{1}{2}(6, 6) + \frac{1}{2}(8, 4)$	$\frac{1}{2}(6, 6) + \frac{1}{2}(4, 2)$

$I \backslash II$	(a, c)	(a, d)	(b, c)	(b, d)
T	$(4, 3)$	$(4, 6)$	$(6, 5)$	$(2, 8)$
B	$(9, 6)$	$(7, 3)$	$(7, 5)$	$(5, 4)$

הגדרה 1.13 פונקצית האינדיקטור של מספרים זוגיים ואי-זוגיים

הפונקציה האינדיקטור של מספרים זוגיים תסומן $\mathbb{1}_{\text{even}}(n)$ ותוגדר:

$$\mathbb{1}_{\text{even}}(n) = \begin{cases} 1 : & n \text{ זוגי} \\ 0 : & n \text{ אי-זוגי} \end{cases}$$

דרך אחת לרשום $\mathbb{1}_{\text{even}}(n)$ במפורשות היא:

$$\mathbb{1}_{\text{even}}(n) = 1 - n \bmod 2 .$$

הפונקציה האינדיקטור של מספרים אי-זוגיים תסומן $\mathbb{1}_{\text{odd}}(n)$ ותוגדר:

$$\mathbb{1}_{\text{odd}}(n) = \begin{cases} 0 : & n \text{ זוגי} \\ 1 : & n \text{ אי-זוגי} \end{cases}$$

דרך אחת לרשום $\mathbb{1}_{\text{odd}}(n)$ במפורשות היא:

$$\mathbb{1}_{\text{odd}}(n) = n \bmod 2 .$$

דוגמה 1.14 (משחק מרבה הרגליים)

במשחק מרבה הרגליים שני שחקנים, לכל שחקן יש קופה שבה מצטבר כסף במהלך המשחק. בתחילת המשחק בקופתו של שחקן I 1,000 שקלים וקופתו של שחקן II ריקה. כל שחקן בתורו יכול להפסיק (q) ,

ואז כל שחקן מקבל את הסכום הנמצא בקופתו, או להמשיך (c) במשחק. אם הוא ממשיך, עליו להעביר 1,000 ₪ לשחקן השני, ומנהל המשחק מוסיף עוד 2,000 ₪ לשחקן השני. אם אף שחקן לא הפסיק את המשחק במהלך 100 התורות הראשונים, המשחק מסתיים, וכל שחקן מקבל את הסכום הנמצא בקופתו.

(א) רשמו את העץ של המשחק.


(ב) מצאו את הקבוצת האסטרטגיות של שחקן I ושל שחקן II .

(ג) רשמו את הפונקציית התשלומים כפונקציה של האסטרטגיות של השחקנים.

פתרון:

סעיף א)

עץ המשחק למשחק מרבה הרגליים



התשלומים באלפי ש"ח.

סעיף ב) • הקבוצת הקדקודים של שחקן I :

$$V_I = \{x_1, x_3, \dots, x_{99}\} = \{x_i \mid 1 \leq i \leq 100, i \bmod 2 = 1\}.$$

• הקבוצת הידיעה של שחקן I :

$$U_I = \{(x_1, (c_1, q_1)), (x_3, (c_3, q_3)), \dots, (x_{99}, (c_{99}, q_{99}))\} = \{(x_i, (c_i, q_i)) \mid 1 \leq i \leq 100, i \bmod 2 = 1\}.$$

• הקבוצת הקדקודים של שחקן II :

$$V_{II} = \{x_2, x_4, \dots, x_{100}\} = \{x_i \mid 1 \leq i \leq 100, i \bmod 2 = 0\}.$$

• הקבוצת הידיעה של שחקן II :

$$U_{II} = \{(x_2, (c_2, q_2)), (x_4, (c_4, q_4)), \dots, (x_{100}, (c_{100}, q_{100}))\} = \{(x_i, (c_i, q_i)) \mid 1 \leq i \leq 100, i \bmod 2 = 0\}.$$

• הקבוצת האסטרטגיות של שחקן I היא:

$$S_I = \{(a_1, a_3, \dots, a_{99}) \mid a_i \in \{c_i, q_i\}\}.$$

לדוגמה: $s_1 = (q_1, c_3, c_5, \dots, c_{99}) \in S_I$ ו- $s'_1 = (q_1, q_3, c_5, \dots, c_{99}) \in S_I$ וכן הלאה.

- הקבוצת האסטרטגיות של שחקן II היא:

$$S_{II} = \{(a_2, a_4, \dots, a_{100}) \mid a_i \in \{c_i, q_i\}\}.$$

ו- $s_2 = (q_2, c_4, c_6, \dots, c_{100}) \in S_{II}$ וכן הלה.

סעיף ג) ראשית נרשום את הפונקצית התשלומים של כל שחקן כפונקציה של הנקודות סיום $\{y_i\}$ ($1 \leq i \leq 100$).

i	$u_1(y_i)$	$u_2(y_i)$
1	1	0
2	0	3
3	3	2
4	2	5
5	5	4
6	4	7
7	7	6
8	6	9
$\vdots$		
98	96	99
99	99	98
100	98	101

מכאן הנוסחה המגדירה את הפונקציה התשלום של כל שחקן בכל נקודת סיום y_i תלויה אם i זוגי או אי-זוגי:

$$u_1(y_i) = \begin{cases} i : & i \text{ אי-זוגי} \\ i-2 : & i \text{ זוגי} \end{cases}, \quad u_2(y_i) = \begin{cases} i-1 : & i \text{ אי-זוגי} \\ i+1 : & i \text{ זוגי} \end{cases}.$$

כעת נבטא את הפונקציות התשלומים כפונקציות של האסטרטגיות של השחקנים. נניח כי שחקן I משחק האסטרטגיה:

$$s_I = (a_1, a_3, \dots, a_{99}), \quad a_i \in \{c_i, q_i\}$$

ושחקן II משחק האסטרטגיה:

$$s_{II} = (a_2, a_4, \dots, a_{100}), \quad a_i \in \{c_i, q_i\}.$$

המשחק מסתיים בקדקוד y_i אם ורק אם:

$$(\forall j < i : a_j = c_j) \quad \wedge \quad a_i = q_i.$$

ניתן לרשום את הפונקציה השתלום של כל שחקן במונחי הפונקציה האינדיקטור של מספרים זוגיים והפונקציה האינדיקטור של מספרים אי-זוגיים (ראו הגדרה 1.13 למעלה) באופן הבא:

$$u_1(y_i) = i \mathbb{1}_{\text{odd}}(i) + (i-2) \mathbb{1}_{\text{even}}(i), \quad u_2(y_i) = (i-1) \mathbb{1}_{\text{odd}}(i) + (i+1) \mathbb{1}_{\text{even}}(i).$$

נסמן: $m = \min(\{i \mid a_i = q_i\} \cup \{101\})$ אז

$$u_I(s_I, s_{II}) = m \mathbb{1}_{\text{odd}}(m) + (m-2) \mathbb{1}_{\text{even}}(m), \quad u_{II}(s_I, s_{II}) = (m-1) \mathbb{1}_{\text{odd}}(m) + (m+1) \mathbb{1}_{\text{even}}(m).$$

$$\begin{aligned} u_I(s_I, s_{II}) &= m(m \bmod 2) + (m-2)(1 - m \bmod 2) \\ &= 2(m \bmod 2) + m - 2, \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} u_{II}(s_I, s_{II}) &= (m-1)(m \bmod 2) + (m+1)(1 - m \bmod 2) \\ &= -2(m \bmod 2) + m + 1. \end{aligned}$$

דוגמה 1.15 (דו-קרב אדום-שחור (Red-Black Dual))

במשחק זה משתתפים שני שחקנים. בהתחלה בקופה המרכזית יש 10₪ . ולכל שחקן יש צ'יפ אישי בשווי 5₪ . המשחק משוחק לפי הכללים הבאים:

(1) **הגרלה:** קלף אחד נשלף באקראי (בהסתברות $\frac{1}{2}$ לכל צבע). **רק שחקן I רואה את הקלף.** שחקן II אינו יודע איזה קלף נשלף.

(2) **תור שחקן I:** שחקן I בוחר אחת משתי אפשרויות:

- **לפרוש (F):** המשחק מסתיים. שחקן II זוכה בקופה המרכזית (10₪). כל שחקן שומר את הצ'יפ האישי שלו.

- **להעלות (R):** שחקן I מכניס את הצ'יפ שלו (5₪) לקופה.

(3) **תור שחקן II:** (מתקיים רק אם שחקן I בחר R). שחקן II בוחר:

- **לפרוש (F):** המשחק מסתיים. שחקן I זוכה בקופה המרכזית (10₪) ולוקח חזרה את הצ'יפ שלו.

- **להשוות (C):** שחקן II מכניס גם הוא את הצ'יפ שלו (5₪) לקופה (כעת בקופה 20₪ בסך הכל).

(4) **חשיפה:** אם שחקן II השווה, שחקן I מציג את הקלף:

- **אדום:** שחקן I מנצח וגורף את כל ה- 20₪ .

- **שחור:** שחקן II מנצח וגורף את כל ה- 20₪ .

הערה: התשלומים בעץ ובטבלה ייצגו את הרווח הנקי של כל שחקן (השינוי במצבו הכלכלי לעומת תחילת המשחק).

(א) שרטטו את עץ המשחק. הקפידו לסמן בבירור את מהלך הטבע, את קבוצות הידיעה, ואת התשלומים (רווח נקי) בסוף כל מסלול.

(ב) הגדירו במפורש את קבוצת האסטרטגיות S_I של שחקן I, ואת קבוצת האסטרטגיות S_{II} של שחקן II.

(ג) רשמו את פונקציית התשלומים התוחלתית של שחקן I, כלומר $u_1(s_I, s_{II})$, עבור כל שילוב של אסטרטגיות (כמטריצת תשלומים או כפונקציה מפורשת).

פתרון:

סעיף א) עץ המשחק:

נחשב תחילה את תשלומי הרווח הנקי (u_1, u_2) בכל אחת מהתוצאות:

- I פורש (F):

הקופה המרכזית מגיעה ל-II. רווחים: $(0, 10)$.


- I מעלה (R) ו-II פורש (F):

הקופה המרכזית מגיעה ל-I (הוא לוקח בחזרה את ה-5 שלו ולכן אינו מפסיד אותם). רווחים: $(10, 0)$.

- I מעלה (R), II משווה (C), והקלף אדום:

I לוקח את כל ה-20. הוא השקיע 5, ולכן הרוויח 15. II הפסיד את ה-5 שלו. רווחים: $(15, -5)$.

- I מעלה (R) , II משווה (C) , והקלף שחור:
 II לוקח הכל. הרוויח 15, ו- I הפסיד את ה-5 שלו. רווחים: $(-5, 15)$.



סעיף ב) קבוצות האסטרטגיות:

- לשחקן I יש שתי קבוצות ידיעה (הוא יודע אם הקלף אדום או שחור). לכן, כל אסטרטגיה שלו מורכבת מזוג החלטות: (פעולה אם אדום, פעולה אם שחור).

$$S_I = \{(F, F), (F, R), (R, F), (R, R)\}$$

לדוגמה: האסטרטגיה (R, F) משמעותה להעלות אם הקלף אדום, ולפרוש אם הקלף שחור.

- לשחקן II יש קבוצת ידיעה אחת בלבד (הוא נדרש להחליט רק לאחר ששחקן I בחר להעלות, מבלי לדעת את צבע הקלף). לכן, אסטרטגיה שלו היא פעולה יחידה:

$$S_{II} = \{f, c\}$$

סעיף ג) פונקציית התשלומים התוחלתית של שחקן I (u_1) ושל שחקן II (u_2):

כדי לחשב את התוחלת של שחקן I עבור כל פרופיל אסטרטגיות, עלינו לשקלל את ההסתברויות של שני מהלכי הטבע ($\frac{1}{2}$ אדום, $\frac{1}{2}$ שחור).

נדגים חישוב עבור הפרופיל $((R, R), C)$ (שחקן I "מבלף" תמיד, שחקן II תמיד משווה):

$$u_1((R, R), c) = \frac{1}{2} \cdot 15 + \frac{1}{2} \cdot (-5) = 7.5 - 2.5 = 5$$

להלן מטריצת התשלומים המלאה המייצגת את תוחלת הרווח של שחקן I , $u_1(s_I, s_{II})$:

$s_I \backslash s_{II}$	f	c
(F, F)	0, 10	5, 5
(F, R)	5, 5	-2.5, 12.5
(R, F)	5, 5	7.5, 2.5
(R, R)	10, 0	5, 5

הערה: זהו משחק סכום-קבוע, שכן סכום הרווחים הנקיים של שני השחקנים יחד מסתכם תמיד ל-10 (סכום הקופה המרכזית ההתחלתית). לכן, התשלום של שחקן II ניתן לחישוב פשוט כ- $u_2 = 10 - u_1$.



פרק 2: משחקים בצורה אסטרטגית, שליטה ושיווי משקל נאש

2.1 הגדרה של משחק בצורה אסטרטגית

הגדרה 2.1 משחק בצורה אסטרטגית

משחק בצורה אסטרטגית (או משחק בצורה נורמלית) הוא שלושה סדורה

$$G = (N, (S_i)_{i \in N}, (u_i)_{i \in N})$$

שבה

(1) $N = \{1, 2, \dots, n\}$ היא קבוצת שחקנים סופית.

(2) לכל שחקן $i \in N$, S_i היא קבוצת האסטרטגיות של שחקן i .

(3) נסמן ב-

$$S = S_1 \times S_2 \times \dots \times S_n$$


אצ קבוצת כל וקטורי האסטרטגיות. לכל שחקן $i \in N$:

$$u_i : S \rightarrow \mathbb{R}$$

היא פונקציה המתאימה לכל וקטור אסטרטגיות $s = (s_i)_{i \in N}$ תשלום לשחקן i .

דוגמה 2.1 (משחק של מטבע וקלף משחק)

נתון את המשחק הבא בצורה רחבה:



רשמו את המשחק בצורה אסטרטגית.

פתרון:

לשחקן I יש קדקוד אחד x_0 בו הוא מקבל החלטה בין שתי פעולות H, T .
אז לשחקן I יש קבוצה ידיעה אחת:

$$U_I = \{(x_0, (H, T))\}$$

ולכן הקבוצת האסטרטגיות של שחקן I היא:

$$S_I = \{H, T\}.$$

לשחקן II יש שני קדקודים: x_1, x_2 בהם הוא מקבל החלטה. אז הקבוצות ידיעה של שחקן II הן:

$$U_{II} = \{(x_1, (Q, K)), (x_2, (J, A))\}.$$

מכיוון שלשחקן II יש שתי קבוצות ידיעה x_1, x_2 ובכל קבוצה ידיעה יש בדיוק שתי פעולות אפשריות, אז יש לבוב $2 \times 2 = 4$ אסטרטגיות. בפרט הקבוצת אסטרטגיות של בוב היא:

$$S_{II} = \{(Q, J), (Q, A), (K, J), (K, A)\}.$$

(נהוג לרשום את האסטרטגיות מלמעלה עד למטה ומשמאל לימין). אפשר לרשום את הצורה האסטרטגית של המשחק בצורת טבלה:

$I \backslash II$	(Q, J)	(Q, A)	(K, J)	(K, A)
H	-10, 5	-10, 5	7, 13	7, 13
T	12, 6	40, -30	12, 6	40, -30

מכאן הצורת אסטרטגית הפורמלית של המשחק היא:

$$G = (N, (S_I, S_{II}), (u_I, u_{II}))$$

כאשר

- הקבוצת שחקנים היא

$$N = \{\text{בוב, אליס}\} = \{I, II\}.$$

- הקבוצות האסטרטגיות של המשחק הן $S = (S_I, S_{II})$, כאשר הקבוצת אסטרטגיות של שחקן I היא:

$$S_I = \{H, T\}$$

והקבוצת אסטרטגיות של שחקן II היא:

$$S_{II} = \{(Q, J), (Q, A), (K, J), (K, A)\}.$$

- והפונקציות התשלומים של שחקן II היא:

$$\begin{aligned} u_I(H, (Q, J)) &= -10, & u_I(T, (Q, J)) &= 12, \\ u_I(H, (Q, A)) &= -10, & u_I(T, (Q, A)) &= 40, \\ u_I(H, (K, J)) &= 7, & u_I(T, (K, J)) &= 12, \\ u_I(H, (K, A)) &= 7, & u_I(T, (K, A)) &= 40, \end{aligned}$$

והפונקציות התשלומים של שחקן I היא:

$$\begin{aligned} u_{II}(H, (Q, J)) &= 5, & u_{II}(T, (Q, J)) &= 6 \\ u_{II}(H, (Q, A)) &= 5, & u_{II}(T, (Q, A)) &= -30, \\ u_{II}(H, (K, J)) &= 13, & u_{II}(T, (K, J)) &= 6, \\ u_{II}(H, (K, A)) &= 13, & u_{II}(T, (K, A)) &= -30. \end{aligned}$$



הגדרה 2.2

תהי $N = \{1, \dots, n\}$ קבוצת סופית, ולכל $i \in N$ תהי X_i קבוצה כלשהי. נסמן

$$X = \prod_{i \in N} X_i = X_1 \times X_2 \times \dots \times X_n$$

את המכפלה הקרטיזית של כל הקבוצות X_i .
לכל $i \in N$ נגדיר

$$X_{-i} = \prod_{\substack{j \in N \\ j \neq i}} X_j = X_1 \times X_2 \times \dots \times X_{i-1} \times X_{i+1} \times \dots \times X_n$$

את המכפלה הקרטיזית של כל הקבוצות X_j למעט הקבוצה X_i .
במילים אחרות,

$$X_{-i} = \{(x_1, x_2, \dots, x_{i-1}, x_{i+1}, \dots, x_n) \mid x_j \in X_j, \forall j \neq i\}$$

איבר ב- X_{-i} מסומן ב-

$$x_{-i} = (x_1, x_2, \dots, x_{i-1}, x_{i+1}, \dots, x_n) .$$

זהו הווקטור ה- $(n-1)$ ממדי הנוצר מ- $(x_1, \dots, x_n) \in X$ על ידי השמטת הקואורדינטה i .

2.3 מושג השליטה

הגדרה 2.3 אסטרטגיה נשלטת חזק במשחק n שחקנים

נתון משחק n -שחקנים: $G = (N, (S_i)_{i \in N}, (u_i)_{i \in N})$.
אם קיימות אסטרטגיות $s_i, t_i \in S_i$ של שחקן i כך שלכל אסטרטגיות $s_{-i} \in S_{-i}$ של שאר השחקנים מתקיים:

$$u_i(s_i, s_{-i}) < u_i(t_i, s_{-i}) ,$$

אז אומרים כי s_i נשלטת חזק t_i (או t_i שולטת חזק על s_i). במילים אחרות, אם קיימות $s_i, t_i \in S_i$ כך שלכל וקטור אסטרטגיות $(s_1, \dots, s_{i-1}, s_{i+1}, \dots, s_n)$ של שאר השחקנים מתקיים

$$u_i(s_1, \dots, s_{i-1}, s_i, s_{i+1}, \dots, s_n) < u_i(s_1, \dots, s_{i-1}, t_i, s_{i+1}, \dots, s_n)$$

אז אומרים כי t_i נשלטת חזק ע"י s_i . סימון:

$$s_i \prec t_i .$$

למה 2.1 אסטרטגיה נשלטת חזק במשחק 2 שחקנים

נתון משחק 2-שחקנים $G = (N, (S_1, S_2), (u_1, u_2))$ כאשר $N = \{1, 2\}$ הקבוצת שחקנים.
• אם קיימות אסטרטגיות $s_1, t_1 \in S_1$ של שחקן 1 כך שלכל אסטרטגיה $s_2 \in S_2$ של שחקן 2 מתקיים:

$$u_1(s_1, s_2) < u_1(t_1, s_2)$$

אז אומרים כי s_1 נשלטת חזק ע"י t_1 . סימון: $s_1 \prec t_1$.

• באותה מידה, אם קיימות אסטרטגיות $s_2, t_2 \in S_2$ של שחקן 2 כך שלכל אסטרטגיה $s_1 \in S_1$ של שחקן 1 מתקיים:

$$u_2(s_1, s_2) < u_2(s_1, t_2)$$

אז אומרים כי s_2 נשלטת חזק ע"י t_2 . סימון: $s_2 \prec t_2$.

דוגמה 2.2 (אסטרטגיות נשלטות חזק)

נתון המשחק הבא בצורה אסטקטגית:

$I \backslash II$	L	M	R
T	1, 0	1, 2	4, 1
B	0, 3	0, 1	2, 0

(א) מצאו אסטרטגיה הנשלטת חזק של שחקן I .

(ב) מצאו אסטרטגיה הנשלטת חזק של שחקן II .

פתרון:

(א)

$$0 = u_I(B, L) < u_I(T, L) = 1 ,$$

$$0 = u_I(B, M) < u_I(T, M) = 1 ,$$

$$2 = u_I(B, R) < u_I(T, R) = 4 .$$

לכן אסטרטגיה B נשלטת חזק על ידי T . סימון

$$B \prec T .$$

(ב)

$$1 = u_{II}(T, R) < u_{II}(T, M) = 2 ,$$

$$0 = u_{II}(B, R) < u_{II}(B, M) = 1 .$$

לכן אסטרטגיה R נשלטת חזק על ידי M :

$$R \prec M .$$



2.4 הנחות של רציונליות בתורת המשחקים

משפט 2.1 הנחות של רציונליות בתורת המשחקים

(1) שחקן רציונלי לא ישתמש באסטרטגיה נשלטת חזק.

(2) כל השחקנים במשחק רציונליים.

(3) העובדה שכל השחקנים רציונליים היא ידיעה משותפת בין כל השחקנים.

2.5 סילוק חוזר

תחת הנחות של משפט 2.1, ניתן לסלק אסטרטגיות נשלטות חזק, ולהגיע לפתרון של המשחק.

דוגמה 2.3 (סילוק חוזר)

נתון המשחק הבא:

$I \backslash II$	L	M	R
T	1, 0	1, 2	0, 1
B	0, 3	0, 1	2, 0

מצאו את הפתרון באסטרטגיות שולטות חזק, והתשלום הסופי של המשחק.

פתרון:

$I \backslash II$	L	M	R
T	1, 0	1, 2	0, 1
B	0, 3	0, 1	2, 0

 $\xrightarrow{R \prec M}$

$I \backslash II$	L	M
T	1, 0	1, 2
B	0, 3	0, 1

 $\xrightarrow{B \prec T}$

$I \backslash II$	L	M
T	1, 0	1, 2

 $\xrightarrow{L \prec M}$

$I \backslash II$	M
T	1, 2

M באסטרטגיה ישתמש II שחקן, T באסטרטגיה ישתמש I שחקן רציונליים, שחקנים של הכללים לפי לכן יהיה: הסופי והתשלום

$$u_I(T, M) = 1, \quad u_{II}(T, M) = 2.$$

■

דוגמה 2.4 (דילמה האסיר)

משחק פשוט מאוד, ויחד עם זאת מהרבה בחינות, הוא המשחק הידוע בשם "דילמה האסיר". המשחק מופיע בספרות בצורת הסיפור הבא.

שני עבריינים אלס (שחקן 1) ובוב (שחקן 2) ביצעו פשע חמור ונעצרו. בהעדר כל הוכחות אחרות, הדרך היחידה שבה יכולה המשטרה להשיג הרשעה על עבירה זו היא שאחד העצורים (או שניהם) יודה בביצוע המעשה. בחקירתם העמידה המשטרה כל אחד מהעצורים בפני ההחלטה הבאה:

- אם אלס מלשינה ובוב שותק $\Leftarrow$ אלס יוצאת חופשי ובוב מקבל 10 שנים מאסר.
- אם בוב מלשין ואלס שותק $\Leftarrow$ בוב יוצא חופשי ואלס מקבלת 10 שנים מאסר.
- אם שניהם שותקים $\Leftarrow$ יש בידי המשטרה ראיות להרשעתם בעבירות פחותות (למשל, העלמת מס) שמוביל למאסר של שנה אחת לכל אחד.
- אם שניהם מלשינים $\Leftarrow$ המשטרה מבקשת להתחשב בשיתוף הפעולה שלהם ולגזור את עונשם ל-6 שנות מאסר לכל אחד.

רשמו את המשחק בצורה אסטרטגית ומצאו את הפתרון באסטרטגיות שולטות חזק.

פתרון:

נסמן:

C_1 = האסטרטגיה שאלים "מלשנה".

D_1 = האסטרטגיה שאלים "שותקת".

C_2 = האסטרטגיה שבו "מלשין".

D_2 = האסטרטגיה שבו "שותק".

המשחק בצורה אסטרטגית הינו:

1 \ 2 אלים	C_2	D_2
C_1	-6, -6	0, -10
D_1	-10, 0	-1, -1

1 \ 2	C_2	D_2
C_1	-6, -6	0, -10
D_1	-10, 0	-1, -1

 $\xrightarrow{D_2 < C_2}$

1 \ 2	C_2
C_1	-6, -6
D_1	-10, -10

 $\xrightarrow{D_1 < C_1}$

1 \ 2	C_2
C_1	-6, -6

לכן לפי הכללים של שחקנים רציונליים, שחקן I ישתמש באסטרטגיה C_1 , שחקן 2 ישתמש באסטרטגיה C_2 והתשלום הסופי יהיה:

$$u_1(C_1, C_2) = -6, \quad u_2(C_1, C_2) = -6.$$

כפי שניתן לראות, עבור שני השחקנים האסטרטגיה "מלשין" שולטת חזק על האסטרטגיה "שותק". לכן תהליך סילוק אסטרטגיות נשלטות מוביל לפתרון שבו שני האסירים מלשינים, והתוצאה היא 6 שנות מאסר לשניהם. העניין במשחק זה הוא בכך שאם שני השחקנים לא מלשינים (שותקים), תוצאת המשחק תהיה שנת מאסר אחת לשניהם, העדיפה לשני השחקנים. כלומר, הפתרון הנגזר מההנחות הרציונליות הנראות סבריות מאוד, אינו "יעיל": יש דרך ששני השחקנים יכולו לקבל תוצאה עדיפה לשניהם והיא לשתוק:

$$s = (C_1, C_2).$$

לרוע מזלם, תוצאה זו אינה יציבה, שכן כל אחד מהם יכול לסטות (ולהלשין) ולקבל תוצאה עוד יותר טובה עבורו: שחרור במקום 6 שנות מאסר (על חשבון שחקן השני שיקבל 10 שנות מאסר). ■

2.6 שיווי משקל נאש

הגדרה 2.4 תשובה טובה ביותר במשחק n שחקנים

נתון משחק n שחקנים: $G = (N, (S_i)_{i \in N}, (u_i)_{i \in N})$.

אם קיימת אסטרטגיה $s_i \in S_i$ של שחקן i וקיימת וקטור אסטרטגיות $s_{-i} \in S_{-i}$ של שאר השחקנים כך ש:

$$u_i(s_i, s_{-i}) = \max_{t_i \in S_i} u_i(t_i, s_{-i})$$

אז אומרים כי s_i היא **התשובה הטובה ביותר** של שחקן i בתגובה לווקטור אסטרטגיות s_{-i} של שאר השחקנים. במילים אחרות, האסטרטגיה s_i של שחקן i היא תשובה טובה ביותר בתגובה לאסטרטגיות $(s_1, s_2, \dots, s_{i-1}, s_{i+1}, \dots, s_n)$ של שאר השחקנים אם אסטרטגיה s_i נותנת לשחקן i התשלום המקסימלי

מתוך כל האסטרטגיות האחרות $t_i \in S_i$ של שחקן i :

$$u_i(s_1, s_2, \dots, s_{i-1}, s_i, s_{i+1}, \dots, s_n) = \max_{t_i \in S_i} u_i(s_1, s_2, \dots, s_{i-1}, t_i, s_{i+1}, \dots, s_n) .$$

למה 2.2 תשובה טובה ביותר במשחק 2 שחקנים

נתון משחק 2 שחקנים: $G = (\{1, 2\}, (S_1, S_2), (u_1, u_2))$

- אם קיימת אסטרטגיה $s_1 \in S_1$ של שחקן 1 וקיימת אסטרטגיה $s_2 \in S_2$ של שחקן 2 כך שמתקיים

$$\forall t_1 \in S_1 : u_1(s_1, s_2) = \max_{t_1 \in S_1} u_1(t_1, s_2)$$

אז אומרים כי s_1 היא **תשובה טובה ביותר** של שחקן 1 בתגובה לאסטרטגיה s_2 של שחקן 2.
דרך שקולה לציין התנאי הזה היא:

$$\forall t_1 \in S_1 : u_1(s_1, s_2) \geq u_1(t_1, s_2) .$$

- אם קיימת אסטרטגיה $s_2 \in S_2$ של שחקן 2 וקיימת אסטרטגיה $s_1 \in S_1$ של שחקן 1 כך שמתקיים

$$\forall t_2 \in S_2 : u_2(s_1, s_2) = \max_{t_2 \in S_2} u_2(s_1, t_2)$$

אז אומרים כי s_2 היא **תשובה טובה ביותר** של שחקן 2 בתגובה לאסטרטגיה s_1 של שחקן 1.
דרך שקולה לציין התנאי הזה היא:

$$\forall t_2 \in S_2 : u_2(s_1, s_2) \geq u_2(s_1, t_2) .$$

דוגמה 2.5 (תשובה טובה ביותר)

נתון המשחק שני שחקנים הבא:

$II \backslash I$	a	b	c	d
α	0, 5	1, 2	2, 2	3, 4
β	8, 4	7, 0	6, -1	5, 2
γ	0, 3	2, 2	0, 1	-1, 3
δ	5, 2	3, 1	2, 2	4, 5

- אם שחקן I משחק לפי האסטרטגיה α אזי התשובה הטובה ביותר של שחקן II היא אסטרטגיה a .
- אם שחקן I משחק לפי האסטרטגיה δ אזי התשובה הטובה ביותר של שחקן II היא אסטרטגיה d .
- אם שחקן II משחק לפי האסטרטגיה b אזי התשובה הטובה ביותר של שחקן I היא אסטרטגיה β .
- אם שחקן II משחק לפי האסטרטגיה c אזי התשובה הטובה ביותר של שחקן I היא אסטרטגיה β .

הגדרה 2.5 שיווי משקל נאש

נתון משחק n שחקנים: $G = (N, (S_i)_{i \in N}, (u_i)_{i \in N})$. אם קיים וקטור אסטרטגיות $s^* = (s_1^*, \dots, s_n^*)$ כך שלכל שחקן $i \in N$ ולכל אסטרטגיה $s_i \in S_i$ של שחקן i מקתיים:

$$u_i(s^*) \geq u_i(s_i, s_{-i}^*)$$

אז אומרים כי s^* הוא **שיווי משקל נאש** של המשחק.

המשמעות של שיווי משקל, נניח שכל שחקן $i \in N$ משחק לפי האסטרטגיה s_i^* של השיווי משקל: $s^* = (s_1^*, \dots, s_n^*)$. אזי התשלום לכל שחקן $i \in N$ יהיה $u_i(s^*)$. כעת נניח ששחקן אחד $j \in N$ בוחר לשחק לפי אסטרטגיה אחרת $s_j \neq s_j^*$, אשר לא בווקטור אסטרטגיות s^* . אז התשלום לשחקן j יהיה פחות מהתשלום שהוא היה מקבל אם הוא היה משחק לפי האסטרטגיה $s_j^* \in s^*$ של השיווי משקל s^* . כלומר:

$$u_j(s_1^*, \dots, s_{j-1}^*, s_j^*, s_{j+1}^*, \dots, s_n^*) \geq u_j(s_1^*, \dots, s_{j-1}^*, s_j, s_{j+1}^*, \dots, s_n^*) .$$

וקטור התשלום $u(s^*)$ נקרא **תשלום שיווי משקל** של המשחק.

למה 2.3 שיווי משקל נאש במשחק 2 שחקנים

נתון משחק 2 שחקנים: $G = (\{1, 2\}, (S_1, S_2), (u_1, u_2))$. אם קיים ווקטור אסטרטגיות, $s^* = (s_1^*, s_2^*)$ של המשחק כך שלכל אסטרטגיה $s_1 \in S_1$ של שחקן 1 ולכל אסטרטגיה $s_2 \in S_2$ התנאים הבאים מתקיימים:

$$\forall s_1 \in S_1 : u_1(s_1^*, s_2^*) \geq u_1(s_1, s_2^*) ,$$

$$\forall s_2 \in S_2 : u_2(s_1^*, s_2^*) \geq u_2(s_1^*, s_2) ,$$

אז אומרים כי $s^* = (s_1^*, s_2^*)$ הוא **שיווי משקל של המשחק**.

דוגמה 2.6 (שיווי משקל נאש במשחק 2 שחקנים)

נתון המשחק הבא בצורה אסטרטגית:

2 \ 1	x	y	z
1			
a	2, 1	0, 0	1, 2
b	0, 3	2, 2	3, 1
c	1, 1	3, 2	2, 2

מצאו את השיווי המשקל של המשחק.

פתרון:


2 \ 1	x	y	z
1			
a	2, 1	0, 0	1, 2
b	0, 3	2, 2	3, 1
c	1, 1	3, 2	2, 2

לכן ווקטור אסטרטגיות של שיווי משקל נאש הינו


$$(s_1^*, s_2^*) = (c, y) .$$



דוגמה 2.7 (שיווי משקל משחק 2 שחקנים)



פתרון:



קבוצת אסטרטגיות של שחקן I:

$$S_I = \{(L, K), (M, K), (R, K), (L, N), (M, N), (R, N)\}.$$

קבוצת אסטרטגיות של שחקן II:

$S_{II} = \{l, r\}$

מכאן הצורה אסטרטגית של המשחק היא:

$I \backslash II$	l	r
	l	r
(L, K)	0, 2	0, 2
(M, K)	2, 1	1, 2
(R, K)	8, 1	3, 9
(L, N)	0, 2	0, 2
(M, N)	1, 8	1, 2
(R, N)	8, 1	3, 9

נשתמש בשיטת תשובה טובה ביותר כדי למצוא את השיווי משקל של המשחק:

$I \backslash II$	l	r
	l	r
(L, K)	0, 2	0, 2
(M, K)	2, 1	1, 2
(R, K)	8, 1	3, 9
(L, N)	0, 2	0, 2
(M, N)	1, 8	1, 2
(R, N)	8, 1	3, 9

לכן הווקטורי האסטרטגיות הבאים הם השיווי המשקל של המשחק:

$(s_1^*, s_2^*) = ((R, N), r)$,
 $(s_1^*, s_2^*) = ((R, K), r)$.



דוגמה 2.8 (מלחמת המינים)

המשחק המשחק הבא נקרא "מלחמת המינים" (battle of the sexes). שמו של המשחק בא מהתיאור הבא. זוג מתכנן בילוי למוצא שבת. האפשרויות העומדות לרשותם הן קונצרט (C) או צפייה במשחק כדורגל (F). הגבר (שחקן I) מעדיף צפייה במשחק הכדורגל, בעוד האישה (שחקן II) מעדיפה את הקונצרט, אך שניהם מעדיפים להיות יחד גם אם הבילוי המשותף הוא הפחות עדיף בעיניהם. השחקן בצורה אסטרטגית מתואר למטה. מצאו את כל שיווי משקל.

$I \backslash II$	C	F
	C	F
C	1, 2	0, 0
F	0, 0	2, 1

פתרון:

$I \backslash II$	C	F
C	$\underline{1}, \underline{2}$	$0, 0$
F	$0, 0$	$\underline{2}, \underline{1}$

■

דוגמה 2.9 (משחק תיאום)

המשחק המתואר בטבלה למטה שייך למשפחה של משחקים הנקראים "משחקי תיאום" (coordination games).

$I \backslash II$	a	b
A	$\underline{1}, \underline{1}$	$0, 0$
B	$0, 0$	$\underline{3}, \underline{3}$

מצאו את כל שיווי משקל במשחק.

פתרון:

הווקטורי אסטרטגיות אשר שיווי משקל הינם: $s^* = (A, a)$ ו- $s^* = (B, b)$.


■

דוגמה 2.10 (נתיב אופטימלי)

מתל אביב לירושלים מוליכים שני כבישים:

- 1) כביש צפוני דרך מודיעין
- 2) כביש דרומי דרך בית שמש.


זמן הנסיעה בכל כביש תלוי במספר x של הכמוניות הנוסעות בדקה באותו הכביש, והוא נתון בתרשים הבא.



כך, זמן הנסיעה מתל אביב למודיעין הוא $1 + x$, כאשר x הוא מספר המכוניות לדקה הנוסעות בכביש, וזמן הנסיעה ממודיעין לירושלים הוא $51 + 0.1x$.

כאשר x הוא מספר המכונות לדקה הנסועות בכביש. כל נהג בוחר באיזה כביש לנסוע לירושלים, ומטרתו הנהג היא למזער את משך הזמן הנסיעה. השכם בבוקר יוצאות 60 מכוניות לדקה מתל אביב לירושלים (הנוסעים מתל אביב לירושלים משכימי קום, כך שרק הם נוסעים בכביש בשעה זו).

- (1) הציגו את המשחק בצורה אסטרטגית, שבו הבחירה של כל נהג היא המסלול שאותו יבחר.
- (2) מה הם כל שיווי המשקל נאש? בשיווי משקל אלה, כמה זמן אורכת הנסיעה מתל אביב לירושלים בשעת בוקר מוקדמת?
- (3) כחלק מפרויקט כביש חוצה ישראל ממודיעין לבית שמש, שזמן הנסיעה בו הוא $10 + 0.1x$, (ראו תשים למטה).



ככיש זה הוא חד סטרי, והתנועה בו היא ממודיעין לבית שמש ולא בכיוון הפוך. מצאו שיווי משקל נאש במשחק המתאים למצב זה. בשיווי משקל שמצאתם, כמה זמן לוקחת הנסיעה מתל אביב לירושלים בשעות הבוקר המוקדמות?

- (4) האם בניית כביש נוסף מבית שמש למודיעין שזמן הנסיעה בו הוא $10 + 0.1x$ תשנה את המצב?

פתרון:

סעיף 1 יהי $G = (N, (S_i)_{i \in N}, (u_i)_{i \in N})$ המשחק בצורה אסטרטגית. אזי:

- $N = \{1, \dots, 60\}$. כלומר כל אחד של ה-60 נהגים שחקן במשחק G .
- לכל שחקן $i \in N$, הקבוצת אסטרטגיות היא $S_i = \{B, M\}$ כאשר:
 $B =$ נסע דרך בית שמש
 $M =$ נסע דרך מודיעין.
- לכל וקטור אסטרטגיות $s = (s_1, \dots, s_i, \dots, s_{60})$ של המשחק נגדיר הפונקציה התשלום של שחקן i להיות מינוס הזמן הנסיעה מתל אביב לירושלים כפונקציה של הוקטור אסטרטגיות זהו:

$$u_i(s_1, \dots, s_i, \dots, s_{60}) = -(\text{זמן שארך בנסיעה של שחקן } i \text{ מתל אביב לירושלים})$$

הסיבה לסימן מינוס היא שאנחנו רוצים לכמת ע"י הפונקציה התשלום הזמן שעולה לשחקן i לסוע מתל אביב לירושלים. הפונקציה התשלום נותנת את "הרווח לשחקן i ", אז מכיוון שהזמן שארך בנסיעה

הוא בעצם הפסד זמן, אז במקרה כזה הפונקציה השתלום מוגדר כמינוס הזמן שארך, כלומר ה"הפסד זמן" לשחקן i .

אם k מספר המכוניות הנוסעות דרך מודיעין אזי:

$$u_i(s_1, \dots, s_i, \dots, s_{60}) = \begin{cases} -(52 + 1.1k) & : s_i = M, \\ -(52 + 1.1(60 - k)) & : s_i = B. \end{cases}$$

סעיף 2 ראשית נרשום את הפונקציה התשלום של שחקן i ($1 \leq i \leq 60$) באופן הבא:

$$u_i(k) = \begin{cases} T_1(k) & : s_i = M, \\ T_2(k) & : s_i = B. \end{cases}$$

כאשר

$$T_1(k) = -(52 + 1.1k) \bullet$$

$$T_2(k) = -(52 + 1.1(60 - k)) \bullet$$

יהי הוקטור אסטרטגיות $s^* = (s_1^*, \dots, s_i^*, \dots, s_{60}^*)$ שיווי משקל נאש של המשחק. יהי k^* מספר המכוניות הנוסעות דרך מודיעין עבור הוקטור אסטרטגיות s^* הזה. ניתן להוכיח כי:

$$T_1(k^*) = T_2(k^*) .$$

ראשית נוכיח שקיים פתרון לשוויון:

$$T_1(k^*) = T_2(k^*) \implies -(52 + 1.1k^*) = -(52 + 1.1(60 - k^*)) \implies k^* = 30 .$$

כעת נוכיח דרך השלילה שאם k^* הוא הערך של k בשיווי משקל אז בהכרח $T_1(k^*) = T_2(k^*)$.

נוכיח בשלילה כי $T_1(k^*) \neq T_2(k^*)$.

• אם $T_1(k^*) < T_2(k^*)$ אז:

$$-(52 + 1.1k^*) < -(52 + 1.1(60 - k^*)) \implies k^* > 30 \implies k^* \geq 31 .$$

• מכאן נובע ש-

$$T_2(k^* - 1) - T_1(k^*) = -(52 + 1.1(61 - k^*)) + 52 + 1.1k^* = 1.1(2k^* - 61) \geq 1.1 > 0$$

• ז"א $T_2(k^* - 1) > T_1(k^*)$

• קיים שחקן i עבורו: $u_i(s'_i, s_{-i}^*) > u_i(s^*)$.

• הגענו לסתירה לכך ש- s^* שיווי משקל של המשחק.

• אם $T_1(k^*) > T_2(k^*)$ אז:

$$-(52 + 1.1k^*) > -(52 + 1.1(60 - k^*)) \implies k^* < 30 \implies k^* \leq 29 .$$

• מכאן נובע ש-

$$T_1(k^* + 1) - T_2(k^*) = -(52 + 1.1(k^* + 1)) + (52 + 1.1(60 - k^*)) = 1.1(-2k^* + 61) \geq 3.3 > 0$$

• ז"א $T_1(k^* + 1) > T_2(k^*)$

• לכן קיים שחקן i עבורו: $u_i(s'_i, s_{-i}^*) > u_i(s^*)$.

• הגענו לסתירה לכך ש- s^* שיווי משקל של המשחק.

לפיכך בכל ווקטור אסטרטגיה של המשחק שהוא שיווי משקל נאש מתקיים:

$$k^* = 30.$$

התוצאה מכך היא ש:

$$u_i(s^*) = -85$$

כלומר בשיווי משקל, הזמן של הנסיעה בשני המסלולים הוא 85 דקות.

סעיף 3 מאותה סיבה לסעיף הקודם, בשיווי משקל נאש הזמן של הנסיעה בכל אחד של השלוש מסלולים שווה, כי אחרת קיים שחקן עם סטיעה כדאית, בסתירה להגדרה של שיווי משקל נאש.

נסמן:

$$M = \text{נוסע דרך מודיעין,}$$

$$BM = \text{נוסע דרך מודיעין ובית שמש בכביש החדש,}$$

$$B = \text{נוסע דרך בית שמש.}$$

יהי

• y = מספר מכוניות הנוסעות דרך מודיעין ולא בכביש החדש.

• z = מספר מכוניות הנוסעות דרך מודיעין וגם דרך בית שמש בכביש החדש.

• המספר המכוניות הנוסעות דרך בית שמש במסלול השלישי הוא $60 - y - z$.

$$u_i(s_1, \dots, s_i, \dots, s_{60}) = u_i(x, y) = \begin{cases} T_1(y, z) & : s_i = M \\ T_2(y, z) & : s_i = MB \\ T_3(y, z) & : s_i = B \end{cases}$$

$$T_1(y, z) = -(1 + y + z + 51 + 0.1y) \bullet$$

$$T_2(y, z) = -(1 + y + z + 10 + 0.1z + 1 + 60 - y) \bullet$$

$$T_3(y, z) = -(51 + 0.1(60 - y - z) + 1 + 60 - y) \bullet$$

ניתן להוכיח כי בשיווי משקל:

$$T_1(y^*, z^*) = T_2(y^*, z^*) = T_3(y^*, z^*) .$$

ראשית נוכיח כי קיים פתרון לשוויון הזה:

$$\begin{aligned} & -(1 + y^* + z^* + 51 + 0.1y^*) \\ &= -(1 + y^* + z^* + 10 + 0.1z^* + 1 + 60 - y^*) \\ &= -(51 + 0.1(60 - y^* - z^*) + 1 + 60 - y^*) . \end{aligned}$$

הפתרון הוא

$$y^* = 20, \quad z^* = 20 .$$

אפשר להוכיח, דרך השלילה כי $T_1(y^*, z^*) = T_2(y^*, z^*) = T_3(y^*, z^*)$ באופן דומה לסעיף הקודם. למשל, נוכיח בשלילה כי $T_1(y^*, z^*) \neq T_2(y^*, z^*)$.

• אם $T_1(y^*, z^*) < T_2(y^*, z^*)$ אז:

$$-(1 + y^* + z^* + 51 + 0.1y^*) < -(1 + y^* + z^* + 10 + 0.1z^* + 1 + 60 - y^*) \implies 1.1y^* - 0.1z^* > 20 \geq 19.$$

• מכאן נובע ש-

$$T_2(y^* + 1, z^* - 1) - T_1(y^*, z^*) = -18.9 - 0.1z^* + 1.1y^* \geq 0.1 > 0$$

• אז $T_2(y^* + 1, z^* - 1) > T_1(y^*, z^*)$

• קיים שחקן i עבורו: $u_i(s'_i, s_{-i}^*) > u_i(s^*)$.

• הגענו לסתירה לכך ש- s^* שיווי משקל של המשחק.

לכן בשיווי משקל, בכל אחד של השלוש מסלולים, המספר המכוניות שווה, ושווה ל- 20.

סעיף 4 במשחק החדש עם הנתיב הנוסף:

$$u_i(s^*) = -94.$$

ז"א בשיווי משקל, הזמן של הנסיעה בשלוש המסלולים הוא 94 דקות.

המסקנה היא הוספת הכביש החדש לא משפר את הזמן הנסיעה המינימלי.



2.7 יחסים בין אסטרטגיות שולטות ושיווי משקל נאש

משפט 2.2 שיווי משקל הוא תשובה טובה ביותר לכל שחקן

נתון משחק n שחקנים: $G = (N, (S_i)_{i \in N}, (u_i)_{i \in N})$. אם לכל שחקן $i \in N$ האסטרטגיה $s_i^* \in S_i$ היא תשובה טובה ביותר לוקטור אסטרטגיות $s_{-i}^* = (s_1^*, s_2^*, \dots, s_{i-1}^*, s_{i+1}^*, \dots, s_n^*)$ אז הווקטור אסטרטגיות $s^* = (s_1^*, \dots, s_n^*)$ הוא **שיווי משקל** של המשחק G .



הוכחה: תרגיל בית.

דוגמה 2.11 ()

נתון המשחק הבא:

$I \backslash II$	α	β	γ
A	1, 1	0, 1	5, 6
B	7, 3	2, 8	9, -9
C	3, 2	1, 8	17, 1

א מצאו את השיווי משקל נאש של המשחק.

ב מצאו את הפתרון באסטרטגיות שולטות.

פתרון:

סעיף א) השיווי משקל הוא: $(s_1^*, s_2^*) = (B, \beta)$.

סעיף ב) הפתרון באסטרטגיות שולטות הוא $(s_1^*, s_2^*) = (B, \beta)$.

משפט 2.3

נתון משחק n שחקנים: $G = (N, (S_i)_{i \in N}, (u_i)_{i \in N})$. אם הווקטור אסטרטגיות $s^* = (s_1^*, \dots, s_n^*)$ הוא שיווי משקל נאש, אז s^* הוא פתרון למשחק G באסטרטגיות השולטות חזק.

הוכחה:

נוכיח את הטענה דרך השלילה.

נניח בשלילה כי $s^* = (s_1^*, \dots, s_n^*)$ הוא שיווי משקל נאש של המשחק G אבל הוא לא פתרון באסטרטגיות שולטות חזק.

$\Leftarrow$ קיימת אסטרטגיה ראשונה s_i^* מבין האסטרטגיות $s_1^*, \dots, s_n^*$ של s^* שמסולקת בתהליך סילוק חוזר.

$\Leftarrow$ קיימת אסטרטגיה $t_i \in S_i$ ששולטת על $s_i^* \in S_i$.

$\Leftarrow$ קיימת אסטרטגיה $t_i \in S_i$ כך שלכל אסטרטגיות $s_1, \dots, s_{i-1}, s_{i+1}, \dots, s_n \in S_{-i}$ אשר עדיין נשארות בתהליך:

$$u_i(s_1, \dots, s_i^*, \dots, s_n) < u_i(s_1, \dots, t_i, \dots, s_n) \quad . \quad (\#1)$$

$\Leftarrow$ בפרט, מכיוון שהאסטרטגיות $s_1^*, \dots, s_{i-1}^*, s_{i+1}^*, \dots, s_n^*$ עדיין נשארות בתהליך אחרי סילוק של האסטרטגיה s_i^* , אז לפי (#1) מתקיים

$$u_i(s_1^*, \dots, s_i^*, \dots, s_n^*) < u_i(s_1^*, \dots, t_i, \dots, s_n^*) \quad . \quad (\#2)$$

$\Leftarrow$ סתירה לכך ש $s^* = (s_1^*, \dots, s_n^*)$ הוא שיווי משקל נאש של המשחק G .

משפט 2.4

נתון משחק n שחקנים: $G = (N, (S_i)_{i \in N}, (u_i)_{i \in N})$. אם הווקטור אסטרטגיות $s^* = (s_1^*, \dots, s_n^*)$ הוא הפתרון היחיד למשחק G באסטרטגיות שולטות חזק, אז s^* הוא השיווי משקל של המשחק.

הוכחה:

נוכיח את הטענה בדרך השלילה באופן הבא.

אם קיים ווקטור אסטרטגיות $s^* = (s_1^*, \dots, s_n^*)$ שהוא השורד היחיד של תהליך סילוק חוזר של אסטרטגיות נשלטות חזק, אך אינו שיווי משקל נאש.

$\Leftarrow$ קיים שחקן i שיש לו סטייה כדאית.

$\Leftarrow$ קיימת לשחקן i אסטרטגיה טובה יותר מ- s_i^* נגד s_{-i}^* .

$\Leftarrow$ בגלל שקבוצת האסטרטגיות S_i היא סופית, קיימת לשחקן i אסטרטגיה שהיא "תשובה טובה ביותר" מוחלטת נגד s_{-i}^* .

נסמן אסטרטגיה זו ב- $\bar{s}_i$.

$\Leftarrow$ לכל אסטרטגיה אחרת $t_i \in S_i$ מתקיים:

$$u_i(\bar{s}_i, s_{-i}^*) \geq u_i(t_i, s_{-i}^*) \quad (*)$$

מצד שני מכיוון ש- s_i^* היא האסטרטגיה היחידה ששורדת סילוק חוזר, וגם $\bar{s}_i \neq s_i^*$, אזי $\bar{s}_i$ מסולקת בשלב מסויים בסילוק חוזר.

נניח שהיא מסולקת בשלב k .

$\Leftarrow$ קיימת אסטרטגיה t_i ששולטת חזק על $\bar{s}_i$, כלומר:

$$\exists t_i \in S_i : \quad \forall s_{-i} \in S_{-i} : \quad u_i(t_i, s_{-i}) > u_i(\bar{s}_i, s_{-i}) .$$

$\Leftarrow$ בפרט מכיוון שהוקטור אסטרטגיות s_{-i}^* שורד סילוק חוזר:

$$\exists t_i \in S_i : \quad u_i(t_i, s_{-i}^*) > u_i(\bar{s}_i, s_{-i}^*)$$

$\Leftarrow$ סתירה לשמוואה (*).



פרק 3: אסטרטגיות רציפות ודואפול

3.1 אוליגופול

הגדרה 3.1 פונקצית התשלום בתחרות שוק (אוליגופול)

במשחק של תחרות בשוק מסחרי עם n שחקנים, הפונקצית התשלום של שחקן $i \in N$ היא:

$$u_i(s_1, \dots, s_n) = \pi_i(s_1, \dots, s_n) - \kappa_i(s_1, \dots, s_n) .$$

כאשר:

- $s = (s_1, \dots, s_n)$ הוקטור אסטרטגיות של המשחק.
- π_i פונקצית הרווח ברוטו של שחקן i .
בהינתן וקטור אסטרטגיות $s = (s_1, \dots, s_n)$ של המשחק, $\pi_i(s_1, \dots, s_n)$ נותנת את הרווח ברוטו לשחקן i .
- κ_i פונקצית העלות של שחקן i .
בהינתן וקטור אסטרטגיות $s = (s_1, \dots, s_n)$ של המשחק, $\pi_i(s_1, \dots, s_n)$ נותנת את העלות לשחקן i .

משחק קורנוט (Cournot)

- משחק קורנוט הוא משחק n שחקנים המתחרים בשוק מסחרי שבו האסטרטגיה של כל שחקן $i \in N$ הוא הכמות ששחקן i מייצר:

$$s_i = q_i \in [0, \infty) .$$

- הפונקצית הרווח ברוטו היא:

$$\pi_i(q_1, \dots, q_n) = q_i P(q_1, \dots, q_n) ,$$

כאשר

$$P(q_1, \dots, q_n) = a - Q = a - (q_1 + \dots + q_n)$$

היא הפונקצית המחיר הספציפית של שחקן i ו- a הוא הפרמטר הביקוש של המוצר בשוק הנתון. הפרמטר הזה מכמת את הביקוש של המוצר בשוק.

- הפונקצית העלות היא:

$$\kappa_i(q_1, \dots, q_n) = c_i(q_1, \dots, q_n) q_i$$

כאשר $c_i(q_1, \dots, q_n)$ הוא הפונקצית העלות הספציפית של שחקן i .

משחק ברטראנד (Bertrand)

- משחק ברטראנד הוא משחק n שחקנים המתחרים בשוק מסחרי שבו האסטרטגיה של כל שחקן $i \in N$ הוא המחיר של המוצר הנבחר ע"י שחקן i :

$$s_i = p_i \in [0, \infty) .$$

• הפונקציות הרווח ברוטו היא:

$$\pi_i(p_1, \dots, p_n) = q_i(p_1, \dots, p_n) p_i,$$

כאשר

$$q_i(p_1, \dots, p_n)$$

היא הפונקציות הכמות הספציפית של שחקן i .

• הפונקציות העלות היא:

$$\kappa_i(p_1, \dots, p_n) = c_i(p_1, \dots, p_n) q_i(p_1, \dots, p_n)$$

כאשר $c_i(p_1, \dots, p_n)$ הוא הפונקציות העלות הספציפית של שחקן i .

דוגמה 3.1 (תחרות דואפול על פי קורנוט)

שני יצרניים 1 ו-2 מייצרים אותו מוצר ומתחרים על שוק הקונים הפוטנציאליים. היצרנים מחליטים סימולטנית על הכמות שהם ייצרו, וההיצע הכולל קובע את מחיר המוצר, שהוא זהה לשני היצרנים. נסמן ב- q_1 וב- 2 את הכמויות שמייצרים היצרנים 1 ו-2 בהתאמה. אזי הכמות הכוללת של מוצרים בשוק היא $q_1 + q_2$. נניח כי המחיר של יחידה שווה ל-

$$2 - q_1 - q_2.$$

עלות הייצור של יחידה ליצרן הראשון היא $c_1 > 0$ וליצרן השני היא $c_2 > 0$. האם קיים שיווי משקל במשחק זה, ואם כן, מה הוא?

פתרון:

זהו משחק שני שחקנים (היצרנים 1 ו-2) שבו קבוצת האטסטרטגיות של כל שחקן היא $[0, \infty)$. אם שחקן 1 בוחר באסטרטגיה q_1 ושחקן 2 בוחר באסטרטגיה q_2 , התשלום לשחקן 1 הוא

$$u_1(q_1, q_2) = q_1(2 - q_1 - q_2) - q_1 c_1 = q_1(2 - c_1 - q_1 - q_2), \quad (*)$$

והתשלום לשחקן 2 הוא

$$u_2(q_1, q_2) = q_2(2 - q_1 - q_2) - q_2 c_2 = q_2(2 - c_2 - q_1 - q_2). \quad (\#)$$

התשובה הטובה ביותר של שחקן 1 בתגובה לאסטרטגיה q_2 של שחקן 2 היא הערך של q_1 שממקסם את $u_1(q_1, q_2)$. הפונקציה $u_1(q_1, q_2)$ היא פונקציה ריבועית עם נקודת מקסימום בנקודה שבה הנגזרת מתאפסת:

$$\frac{\partial u_1(q_1, q_2)}{\partial q_1} = 0.$$

על ידי גזירה של אגף ימין של משוואה (*) נקבל את התנאי $2 - c_1 - 2q_1 - q_2 = 0$, כלומר:

$$q_1 = \frac{2 - c_1 - q_2}{2}. \quad (1*)$$

באותו אופן, התשובה הטובה ביותר של שחקן 2 בתגובה לאסטרטגיה q_1 של שחקן 1 היא הערך של q_2 שבו לפונקציה $u_2(q_1, q_2)$ יש נקודת מקסימום.

$$\frac{\partial u_2(q_1, q_2)}{\partial q_2} = 0 \implies q_2 = \frac{2 - c_2 - q_1}{2}. \quad (2*)$$

פתרון המשוואות (1*) ו- (2*) נותן

$$q_1^* = \frac{2 - 2c_1 + c_2}{3}, \quad q_2^* = \frac{2 - 2c_2 + c_1}{3}.$$

זה אמנם שיווי משקל וזהו שיווי משקל היחיד של המשחק. התשלומים של השחקנים בשיווי משקל זה הם

$$u_1(q_1^*, q_2^*) = \left(\frac{2 - 2c_1 + c_2}{3} \right)^2 = (q_1^*)^2, \quad u_2(q_1^*, q_2^*) = \left(\frac{2 - 2c_2 + c_1}{3} \right)^2 = (q_2^*)^2.$$

כעת נוכיח כי הצמד אסטרטגיות (q_1^*, q_2^*) מהווה נקודת שיווי משקל. יש להוכיח כי q_1^* תשובה טובה ביותר לשחקן 1 ביחס ל- q_2^* ולהפך.

$$u(q_1, q_2^*) = q_1(2 - c_1 - q_1 - q_2^*) = -q_1^2 + (2 - c_1 - q_2^*)q_1.$$

לכן $u(q_1, q_2^*)$ פולינום מסדר 2 של q_1 , כאשר המקדם של q_1^2 הוא -1. לכן המקסימום המתקבל הוא

$$q_1 = \frac{(2 - c_1 - q_2^*)}{2} = \frac{(2 - c_1 - \frac{2 - 2c_2 + c_1}{3})}{2} = q_1^*.$$

בפרט q_1^* תשובה טובה ביותר של שחקן 2 ביחס ל- q_2^* .

דוגמה 3.2 (תחרות דואפול על פי קורנוט)

שני יצרניים 1 ו-2 מייצרים אותו מוצר ומתחרים על שוק הקונים הפוטנציאליים. יהי q_1 כמות המוצר שיצרן 1 מייצר ו- q_2 כמות המוצר שיצרן 2 מייצר. הכמות הכוללת של מוצרים בשוק היא

$$Q = q_1 + q_2.$$

יהי $P(Q)$ המחיר של יחידה של המוצר בשוק:

$$P(Q) = \begin{cases} a - Q & Q < a \\ 0 & Q \geq a \end{cases}.$$

הפרמטר a נקרא **פרמטר הביקוש**. הפרמטר הזה מכמת את הביקוש של המוצר בשוק. נניח כי עלות הייצור של יחידה ליצרן 1 ועלות הייצור של יחידה וליצרן 2 נתונות על ידי

$$\kappa_1(q_1) = cq_1, \quad \kappa_2(q_2) = cq_2,$$

כאשר c הוא מספר קבוע. מצאו את השיווי משקל של המשחק.

פתרון:

זהו משחק שני שחקנים. נקרא לשחקן 1 אליס ולשחקן 2 בוב. הכמות q_1 אשר אליס בוחרת היא האסטרטגיה שלה. וכמו כן הכמות q_2 אשר בוב בוחר היא האסטרטגיה שלו. q_1 מקבל כל ערך בתחום $[0, \infty)$, או במילים אחרות $q_1 \in [0, \infty)$, ובאותה מידה $q_2 \in [0, \infty)$.

אם שחקן 1 בוחר באסטרטגיה q_1 ושחקן 2 בוחר באסטרטגיה q_2 , התשלום לשחקן 1 הוא

$$u_1(q_1, q_2) = q_1(a - q_1 - q_2) - q_1c = q_1(a - c - q_1 - q_2),$$

והתשלום לשחקן 2 הוא

$$u_2(q_1, q_2) = q_2(a - q_1 - q_2) - q_2c = q_2(a - c - q_1 - q_2).$$

ווקטור אסטרטגיות (s_1^*, s_2^*) הוא שיווי משקל אם הוא תשובה טובה ביותר לכל שחקן:

$$u_1(q_1^*, q_2^*) = \max_{0 \leq q_1 < \infty} u_1(q_1, q_2^*) = \max_{0 \leq q_1 \leq \infty} [q_1(a - c - q_1 - q_2^*)]$$

-1

$$u_2(q_1^*, q_2^*) = \max_{0 \leq q_2 < \infty} u_2(q_1^*, q_2) = \max_{0 \leq q_2 \leq \infty} [q_2(a - c - q_1^* - q_2)] .$$

המקסימום של $u_1(q_1, q_2^*)$ לפי q_1 מתקבל בנקודה שבה הנגזרת מתאפסת:

$$\frac{\partial u_1(q_1, q_2^*)}{\partial q_1} = a - c - 2q_1 - q_2^* \stackrel{!}{=} 0 \implies q_1^* = \frac{a - c - q_2^*}{2} .$$

ובאותה מידה המקסימום של $u_2(q_1^*, q_2)$ לפי q_2 מתקבל בנקודה שבה הנגזרת מתאפסת:

$$\frac{\partial u_2(q_1^*, q_2)}{\partial q_2} = a - c - q_1^* - 2q_2 \stackrel{!}{=} 0 \implies q_2^* = \frac{a - c - q_1^*}{2} .$$

לפיכך, אם הצמד כמויות (q_1^*, q_2^*) שיווי משקל אז הכמויות חייבות לקיים את התנאים הבאים:

$$q_1^* = \frac{1}{2}(a - q_2^* - c) , \quad q_2^* = \frac{1}{2}(a - q_1^* - c) .$$

הפתרון למערכת זו הינו

$$q_1^* = q_2^* = \frac{a - c}{3} .$$

■

דוגמה 3.3 (תחרות דואפול על פי ברטראנד)

שני יצרניים 1 ו-2 מייצרים אותו מוצר ומתחרים על שוק הקונים הפוטנציאליים. יהי q_1 כמות המוצר שיצרן 1 מייצר ו- q_2 כמות המוצר שיצרן 2 מייצר. שחקן 1 בוחר במחיר של המוצר שלו להיות p_1 ליחידה, ושחקן 2 בוחר במחיר של המוצר שלו להיות p_2 ליחידה. הכמות q_1 ששחקן 1 צריך לייצר נקבע על ידי הפונקציה המחיר הספציפית

$$q_1(p_1, p_2) = a - p_1 + bp_2$$

כאשר $b > 0$ והכמות q_2 ששחקן 2 צריך לייצר נקבע על ידי הפונקציה המחיר הספציפית

$$q_2(p_1, p_2) = a - p_2 + bp_1 .$$

מצאו את השיווי משקל של המשחק.

פתרון:

נניח כי אליס שחקן 1 ובוב שחקן 2. במשחק זה המחיר שאליס בוחרת, p_1 הוא האסטרטגיה שלה והמחיר שבו בוב, p_2 הוא האסטרטגיה שלו. הערכים האפשריים של p_1 הם מ-0 עד ∞ , כלומר $p_1 \in [0, \infty]$ ובאותה מידה $p_2 \in [0, \infty]$.

אם אליס (שחקן 1) בוחרת באסטרטגיה p_1 ובוב (שחקן 2) בוחר באסטרטגיה p_2 , אז אליס מקבלת את התשלום

$$u_1(p_1, p_2) = p_1 q_1 - c q_1 = (p_1 - c)(a - p_1 + b p_2)$$

ובוב מקבל את התשלום

$$u_2(p_1, p_2) = p_2 q_2 - c q_2 = (p_2 - c)(a - p_2 + b p_1)$$

הווקטור אסטרטגיות (p_1^*, p_2^*) יהיה שיווי משקל אם התנאים הבאים מתקיימים:

$$u_1(p_1^*, p_2^*) = \max_{0 \leq p_1 < \infty} u_1(p_1, p_2^*) = \max_{0 \leq p_1 < \infty} [(p_1 - c)(a - p_1 + bp_2^*)]$$

-1

$$u_2(p_1^*, p_2^*) = \max_{0 \leq p_2 < \infty} u_1(p_1^*, p_2) = \max_{0 \leq p_2 < \infty} [(p_2 - c)(a - p_2 + bp_1^*)]$$

המקסימום של $u_1(p_1, p_2^*)$ ביחס p_1 מתקבל בנקודה שבה הנגזרת מתאפסת:

$$\frac{\partial u_1(p_1, p_2^*)}{\partial p_1} = a - 2p_1 + bp_2^* + c \stackrel{!}{=} 0 \Rightarrow p_1^* = \frac{a + c + bp_2^*}{2},$$

והמקסימום של $u_2(p_1^*, p_2)$ ביחס p_2 מתקבל בנקודה שבה הנגזרת מתאפסת:

$$\frac{\partial u_2(p_1^*, p_2)}{\partial p_2} = a - 2p_2 + bp_1^* + c \stackrel{!}{=} 0 \Rightarrow p_2^* = \frac{a + c + bp_1^*}{2}.$$

לפיכך, אם הווקטור אסטרטגיות (p_1^*, p_2^*) נקודת שיווי משקל של המשחק אז המחירים p_1^*, p_2^* חייבים לקיים את התנאים

$$p_1^* = \frac{a + c + bp_2^*}{2}, \quad p_2^* = \frac{a + c + bp_1^*}{2}.$$

הפתרון למערכת זו הינו

$$p_1^* = p_2^* = \frac{a + c}{2 - b}.$$




פרק 4: משחקי לוח

4.1 הקס


הקס הוא משחק אסטרטגיה מופשט לשני שחקנים המשוחק על לוח מעוין של משושים, לרוב בגודל של 11 על 11. השחקנים מסומנים בדרך כלל כאדום וכחול. כל שחקן שולט על שתי צלעות נגדיות של המעוין. אדום שולט על הצלעות N, S וכחול שולט בצלעות E, W . המשחק מתנהל באופן הבא.

- כחול פותח את המשחק.
- כל שחקן בתורו בוחר משושה פנוי ומניח עליו אבן בצבע שלו.
- שחקן המצליח לחבר את שתי הצלעות שהוא שולט עליהן ע"י משלול המורכב ממשושים בצבע שלו מוכרז כ"מנצח".
- אם אף שחקן אינו מצליח לקשר את הצלעות השייכות לו ע"י מטבעותיו, התוצאה נחשבת תיקו.
- בלוח שבתרשים 1 כחול ניצח.



איור 1: משחק שלם של הקס על לוח 11×11 . הכחול ניצח על ידי חיבור הצד השמאלי (מערב - W) לצד הימני (מזרח - E).

דרך אחרת להציג את הלוח הקס היא ע"י הגרף בתרשים 2. אף על פי שהגרף לא נראה בדיוק כמו הלוח הקס בתרשים 1, למעשה קיים איזומורפיזם בין הלוח הקס לבין הרף הקס. ההגדרה הפורמלית של הגרף הקס ניתנת בהגדרה 4.1.



איור 2: אותו משחק הקס כמו באיור 1, מיוצג על לוח ההקס הריבועי.

הגדרה 4.1 גרף ריבועי של המשחק הקס

(1) נתון לוח של משחק הקס $n \times n$. **גרף ריבועי של משחק הקס** הוא גרף לא מכוון צבוע

$$H = (c(V), E)$$

כאשר V קבוצת הקדקודים, E קבוצת הצלעות ו- $c(V)$ קבוצת הקדקודים הצבועים, שמוגדרים כך:

- כל קדקוד $u \in V$ הוא זוג שלמים $u = (a, b)$ כאשר $1 \leq a, b \leq n$. הקבוצת הקדקודים הוא

$$V = \{(a, b) \mid a, b \in \mathbb{N}^+, 1 \leq a, b \leq n\}.$$

- $c(V)$ מסמן את הקבוצת הקדקודים הצבועים שמוגדרת:

$$c(V) = \{(u, c(u)) \mid u \in V\}$$

כאשר c **פונקציית הצביעה** שמוגדרת:

$$c(u) = \begin{cases} 0 : & \text{קדקוד } u \text{ לא צבוע} \\ 1 : & \text{קדקוד } u \text{ צבוע אדום} \\ 2 : & \text{קדקוד } u \text{ צבוע כחול} \end{cases}$$

(2) שני קדקודים $u_1 = (a_1, b_1)$ ו- $u_2 = (a_2, b_2)$ **מסודרים** אם

$$a_1 < a_2, b_1 < b_2, \quad \text{או} \quad a_1 > a_2, b_1 > b_2.$$

(3) שני קדקודים $u_1 = (a_1, b_1)$ ו- $u_2 = (a_2, b_2)$ **סמוכים** אם הם מסודרים וגם

$$\max\{|a_1 - a_2|, |b_1 - b_2|\} = 1.$$

(4) קיימת צלע אחת בדיוק בין כל זוג קדקדוים סמוכים.

(5) נגדיר התתי-קבוצות הבאים:

$$N = \{(n, i) \in V \mid 1 \leq i \leq n\}, \quad S = \{(1, i) \in V \mid 1 \leq i \leq n\}, \\ E = \{(n, i) \in V \mid 1 \leq i \leq n\}, \quad W = \{(n, i) \in V \mid 1 \leq i \leq n\}.$$

(6) יהי $H_i = (c_i(V), E)$ גרף ריבועי כלשהו לאחר תור i של משחק הקס.

- **אסטרטגיה של אדום** היא פונקציה המתאימה לכל H_i לכל i אי-זוגי, גרף חדש H_{i+1} כך שניתן להגיע מ- H_i ל- H_{i+1} באמצעות מהלך אחד של אדום.
- **אסטרטגיה של כחול** היא פונקציה המתאימה לכל H_i לכל i זוגי, גרף חדש H_{i+1} כך שניתן להגיע מ- H_i ל- H_{i+1} באמצעות מהלך אחד של כחול.

(7) **שרשרת קדקודים** באורך m היא סדרת קדקודים צבועים

$$U = \{(u_1, c(u_1)), (u_2, c(u_2)), \dots, (u_k, c(u_k))\} \subset V$$

כך שלכל $1 \leq i < k$ הקדקודים u_i, u_{i+1} סמוכים וגם כל קדקוד בשרשרת הוא צבוע עם אותו צבע:

$$\forall u_i \in U : (c(u_i) = 1 \vee c(u_i) = 2).$$

(8) תהי $U = \{(u_1, c(u_1)), \dots, (u_k, c(u_k))\}$ שרשרת.

א U שרשרת מנצחת של שחקן אדום אם:

$$(\forall (u_i, c(u_i)) \in U : c(u_i) = 1) \wedge (u_1 \in N \wedge u_k \in S).$$

ב U שרשרת מנצחת של שחקן כחול אם:

$$(\forall (u_i, c(u_i)) \in U : c(u_i) = 2) \wedge (u_1 \in E \wedge u_k \in W).$$

(9) **יצירת שרשרת ע"י אסטרטגיה:**

- אסטרטגיה $s_R \in S_R$ יוצרת שרשרת U אם קיים i אי-זוגי כך ש: $s_R(H_i) = H_{i+1}$ כאשר $H_{i+1} = (c_i(V), E)$ כך ש: $U \subset c_i(V)$.
- אסטרטגיה $s_B \in S_B$ יוצרת שרשרת U אם קיים i זוגי כך ש: $s_B(H_i) = H_{i+1}$ כאשר $H_{i+1} = (c_i(V), E)$ כך ש: $U \subset c_i(V)$.

(10) **אסטרטגיה מנצחת:**

- s_R נקראת אסטרטגיה מנצחת של אדום אם היא יוצרת שרשרת מנצחת של אדום.
- s_B נקראת אסטרטגיה מנצחת של כחול אם היא יוצרת שרשרת מנצחת של כחול.

(11) **לוח ריבועי של משחק הקס** $H = (c(V), E)$ הוא **שלם** אם

$$\nexists (u, c(u)) \in c(V) : c(u) = 0.$$

משפט 4.1 למת האבן הנוספת

יהי $G = (\{R, B\}, \{S_R, S_B\}, \{u_R, u_B\})$ משחק הקס.

- יהי G_R אותו משחק של G אלא שבתחילת המשחק אבן אדומה מונחת במשושה שרירותי על הלוח. אם קיימת אסטרטגיה המבטיחה נצחון לשחקן אדום במשחק G אז קיימת אסטרטגיה המבטיחה נצחון לשחקן אדום במשחק G_R .
- יהי G_B אותו משחק של G אלא שבתחילת המשחק אבן כחולה מונחת במשושה שרירותי על הלוח. אם קיימת אסטרטגיה המבטיחה נצחון לשחקן כחול במשחק G אז קיימת אסטרטגיה המבטיחה נצחון לשחקן כחול במשחק G_B .

הוכחה:

- יהי G משחק הקס שבו בתחילת המשחק הלוח ריק, ויהי G_R משחק הקס שבו בתחילת המשחק אבן אדומה אחת מונחת על הלוח הקס בקדקוד $x = (a, b)$ כאשר $1 \leq a, b \leq n$.
- תהי s_R אסטרטגיה של שחקן R היוצרת שרשרת אדומה U_R במשחק G .
- * אם $x \in U_R$, כלומר אם משושה x הוא אחד של המשושים בשרשרת U_R אדומה, אז בתורו שבו שחקן R מניח אבן על משושה x , הוא מניח אבן במשושה אחר כלשהו.
- * אחרת אם $x \notin U_R$ אז בתורו שבו שחקן R מניח אבן על משושה x , הוא מניח אבן על משושה x פשוט.

$\Leftarrow$ השרשרת אדומה U_R לא משתנה בכלל בגלל האבן הנוספת.

$\Leftarrow$ קיימת לשחקן R אסטרטגיה s'_R היוצרת אותה שרשרת U_R במשחק G_R .

$\Leftarrow$ אם U_R שרשרת מנצחת במשחק G אז U_R שרשרת מנצחת במשחק G_R גם.

$\Leftarrow$ אם קיימת אסטרטגיה s_R המבטיחה נצחון לשחקן R במשחק G אז קיימת אסטרטגיה s'_R המבטיחה נצחון לשחקן R במשחק G_R .

$\Leftarrow$ אבן נוספת לא מזיקה את שחקן R .

ההוכחה לטענה השנייה של שחקן B היא זהה. ■

משפט 4.2 משפט הפירוק של גרפים

כל גרף סופי $\Gamma = (V, E)$ שבו דרגת כל צומת היא לכל היותר 2, ניתן לפירוק לאוסף של תת-גרפים זרים, שכל אחד מהם הוא:

(א) צומת מבודד,

(ב) מעגל פשוט,

(ג) מסלול פשוט.

הוכחה: ההוכחה מתבצעת באינדוקציה על מספר הצלעות בגרף. נסמן גרף בעל m קשתות כ- Γ_m .

שלב הבסיס ($m = 0$):

לגרף Γ_0 אין קשתות, ולכן כל צמתיו מבודדים והפירוק מתקיים באופן טריוויאלי.

שלב המעבר:

נניח כי הטענה נכונה לכל גרף עם k קשתות.
נראה כי הטענה מתקיימת בגרף Γ_{k+1} בעל $k+1$ קשתות באופן הבא.

• יהי Γ_{k+1} גרף בעל $k+1$ צלעות.

$\Leftarrow$ אם נסיר צלע שרירותית (u, v) מ- Γ_{k+1} אז הגרף המתקבל הוא Γ_k שמקיים את הנחת האינדוקציה.

$\Leftarrow$ לאחר הסרת הצלע, דרגתם של הצמתים u ו- v יורדת ל-1 לכל היותר, ולכן אינם יכולים להיות חלק ממעגל Γ_k .

• כעת נחזיר את הצלע (u, v) כדי לשחזר את Γ_{k+1} .

$\Leftarrow$ התת-הגרפים היחידים המושפעים מהשינוי הם אלו המכילים את הקדקודים u או v :

(1) אם u ו- v היו במסלולים **נפרדים**, אז הוספת הצלע מחברת אותם למסלול אחד ארוך יותר או יוצרת מעגל.


(2) אם אחד מהם (או שניהם) היה מבודד, הוספת הצלע הופכת אותם למסלול.

$\Leftarrow$ בכל המקרים, התוצאה היא שנקבל אוסף זר של צמתים מבודדים, מסלולים פשוטים ומעגלים פשוטים.

$\Leftarrow$ הטענה מתקיימת גם עבור Γ_{k+1} .

■

לפני ההוכחה של משפט הקס, נחליף סימנים. לצורך פשטות, במקום לסמן משושים צבועים ע"י אדום וכחול, נסמן משושים כבועים ע"י X ו- O בהתאמה כמתואר בתרשים 3.



איור 3: הגרף הקס G .

- לשם פשטות, נחליף את הצבעים אדום וכחול במשחק ב- X ים ו- O ים, בהתאמה.
- נציג את לוח המשחק כגרף $\Gamma = (V, E)$, עם קבוצת צמתים V וקבוצת צלעות E .
- * כל קודקוד של משבצת משושה בלוח הוא צומת ב- V .
- * כל צלע של משבצת משושה בלוח היא צלע ב- E .
- ניצור ארבעה צמתים נוספים: u_3, u_4, u_2, u_1 . כל אחד מחובר לאחת מארבע הפינות של גרף הליבה.
- הצלעות המחברות u_3, u_4, u_2, u_1 לגרף הליבה נקראות e_3, e_4, e_2, e_1 בהתאמה.
- תחום- X מוגדר משבצת המסומנת ב- X או אחד מהאזורים המסומנים ב- N או S .
- באופן דומה, תחום- O מוגדר משבצת המסומנת ב- O או אחד מהאזורים המסומנים ב- E או W .
- לכן, הצלעות e_4, e_3, e_2, e_1 מונחות בין תחום- X לתחום- O מכיוון שהאזורים N, S, E, W , נחשבים גם הם, תחומים.

משפט 4.3 משפט הקס

אם כל משבצת על לוח הקס מסומנת או ב- X או ב- O , אז קיים מסלול- X המחבר את הצדדים N ו- S או שקיים מסלול- O המחבר את הצדדים E ו- W .

הוכחה:

כדי להוכיח את משפט הקס, מספיק להראות ששניים מתוך הקדקודים u_1, u_2, u_3, u_4 בהכרח מחוברים על ידי מסלול פשוט. לכן המשושים הנמצאים על מסלול פשוט זה מהווים שרשרת מנצחת.

- יהי $\Gamma = (V, E)$ הגרף הקס של המשחק.
- תהי $E' \subset E$ תת קבוצת צלעות כך ש- $e \in E'$ אם ורק אם e נמצאת על הגבול בין תחומים שונים: X ו- O .
- לפיכך, רק צלעות המונחות על קו התפר בין משבצות המסומנות ב- X וב- O נכללות, והצלעות u_1, u_2, u_3, u_4 .
- יהי $\Gamma' = (V, E')$.

- * כל קדקוד שבצומת בין משושים של אותו סימן יהיה מדרגה 0.
- * כל קדקוד סמוך לשני משושים של אותו סימן ואחד של הסימן ההפוך יהיה מדרגה 2.
- * קודקודי השפה u_1, u_2, u_3, u_4 הם כולם בעלי דרגה 1 ב- G' , ורק הם בעלי דרגה 1.
- * לכן, לכל קדקודים של G' יש דרגות של 0, 1 או 2.
- ממשפט הפירוק של גרפים, כל גרף שבו כל הצמתים הם בעלי דרגה לכל היותר 2 מורכב מאיחוד זר של:
 - * קדוקדים מבודדים,
 - * מעגלים פשוטים ו-
 - * מסלולים פשוטים.

• מכיוון שרק קודקודי השפה u_1, u_2, u_3, u_4 הם בעלי דרגה אחת, הם חייבים להיות נקודות הקצה של מסלולים פשוטים כלשהם.

• מכיוון ש- Γ' מתפרק לתת-גרפים זרים, כל מסלול שמתחיל באחד הקדקודים u_1, u_2, u_3, u_4 לא יכול ליצור מעגל.

- לכן, בהכרח קיימים שני מסלולים פשוטים ב- Γ' המחברים זוגות מבין u_1, u_2, u_3 ו- u_4 . בפרט, מסלולים אלו יוצרים את קו התפר המפריד בין תחומים של X ושל O , והמשושים הסמוכים לקו תפר כזה מהווים שרשרת מנצחת עבור אחד השחקנים.
- לדוגמה, בתרשים 3, הצלעות והצמתים המודגשים שייכים ל- Γ' , ומראים שני מסלולים פשוטים זרים - האחד מחבר את u_1 ל- u_4 , והשני מחבר את u_2 ל- u_3 . מסלולים אלה מגדירים שרשרת מנצחת עבור שחקן ה- O .
- לפיכך, ללא שום קשר לקונפיגורציה של X ו- O על הלוח, תמיד חייב להיות מסלול מנצח לאחד משני השחקנים.



משפט 4.4 משפט קיום מנצח אחד בדיוק במשחק הקס

בגל משחק הקס יש בדיוק מנצח אחד.

במילים אחרות: משחק הקס לא יכול להסתיים בתיקו.

הוכחה: נוכיח את הטענה דרך השלילה.

- נניח בשלילה כי יתכן שמשחק הקס יסתיים בתיקו.
- ⇒ אף שחקן לא יצליח לבנות שרשרת מנצחת והמשחק ימשיך עד יש אבן על כל משושה של הלוח.
- ⇒ המשחק ימשיך עד שהלוח משושה של המשחק קס הוא שלם.
- יהי $\Gamma = (V, E)$ הגרף משושה של משחק הקס שלם. ותהי $V' = \{u_1, u_2, u_3, u_4\} \subset V$ הקדקודים בפינות של Γ .
- ⇒ ממשפט הקס, קיימים שני מסלולים פשוטים, אחד בין הקדקודים של זוג אחד מתוך V' והשני בין הקדקודים של הזוג השני.
- ⇒ קיים קו שחוסם שרשרת מנצחת של שחקן אדום, ומבטיחה שרשרת מנצחת כחולה, או קיים קו שחוסם שרשרת מנצחת של שחקן כחול ומבטיחה שרשרת מצצחת אדומה.
- ⇒ ממשפט הפירוק של גרפים, השני מסלולים לא חוצים אחד את השני.
- ⇒ השני מסלולים לא חוסמים גם שרשרת מנצחת אדומה וגם שרשרת מנצחת כחולה.
- ⇒ בהכרח, בלוח הקס שלם קיים שרשרת מנצחת אדומה או שרשרת מנצחת כחולה אבל לא שניהן.
- ⇒ בדיוק שחקן אחד ינצח.
- ⇒ סתחרה לכך שהמשחק יכול להסתיים בתיקו.



משפט 4.5 בכל משחק הקס שחקן הראשון בתור מנצח

בכל משחק הקס, לשחקן הראשון בתור (שחקן אדום) קיים אסטרטגיה מנצחת מובטחת.

הוכחה: נוכיח את הטענה דרך השלילה באמצעות

"טיעון גניבת האסטרטגיה" במשחק הקס.

באמצעות משפט הקס, ג'ון נאש הראה שלשחקן הראשון בהקס תמיד יש אסטרטגיה מנצחת. הטיעון מתבצע בדרך השלילה ומסתמך על גישת גניבת אסטרטגיה באופן הבא.

- יהי R השחקן הראשון בתור ויהי B השחקן השני בתור.
- נניח שלשחקן השני יש אסטרטגיה מנצחת מובטחת, s_B .
- נניח שבתור הראשון שחקן הראשון מניח אבן אדומה במשושה שרירותי x ויהי G_R התת משחק המתקבל לאחר מכן, שבו אבן אדומה מונחת על משושה x .
- במשחק G_R שחקן B הוא השחקן הראשון בתור ושחקן R הוא השחקן השני.
- שחקן R יכול "לגנוב" ולעקוב אחרי האסטרטגיה המנצחת המשווערת s_B של שחקן השני כאילו הוא השחקן השני.
- אם האסטרטגיה s_B המנצחת דורשת אי פעם מהלך במשבצת x שכבר תפוסה, השחקן הראשון R יכול פשוט לבחור משבצת שרירותית אחרת מכיוון שלפי למת האבן הנוספת 4.1 נוכחות של כלי נוסף על הלוח לעולם לא יכולה לגרום נזק.
- ממשפט 4.4 בדיוק שחקן אחד ינצח המשחק, וגם שחקן R משחק האסטרטגיה המנצחת המובטחת s_B , אז בהכרח שחקן R ינצח המשחק.
- זו בסתירה לכך שלשחקן B יש אסטרטגיה מנצחת מובטחת s_B .


■

4.2 צ'ומפ: המשחק של דייויד גייל

המשחק הבא הומצא על ידי דייויד גייל וידוע בשם צ'ומפ (Chomp).

הגדרה 4.2 משחק צ'ומפ

- המשחק צ'ומפ מתנהל על לוח משבצות ריבועי בגודל $n \times m$.
- המשבצות מסומנות בעזרת זוג הקואורדינטות (i, j) כאשר $1 \leq i \leq n$ ו- $1 \leq j \leq m$.
- i מסמן את הקואורדינטה האופקית
- j מסמן את הקואורדינטה האנכית.
- בתשרים מתואר לוח המשחק עבור $n = m = 8$.



כל שחקן חייב לכבוש בתורו משבצת בכפוף לתנאי הבא:

- אם בשלב מסוים נכבשה המשבצת (i_0, j_0) , לא ניתן יותר לכבוש שום משבצת הנמצאת צפון-מזרחית ממנה.
- ז"א מסולקות מהלוח כל המשבצות (i, j) המקיימות $i \geq i_0$ ו- $j \geq j_0$.
- במשחק בתשרים למשל, נכבשה המשבצת $(4, 7)$, ולכן סולקן מהלוח כל המשבצות המוצללות.
- שחקן I הוא הפותח במשחק. השחקן הכובש את המשבצת $(1, 1)$ הוא המפסיד.

המשחק שבדוגמה 4.1 אף הוא המשחק צ'ומפ של גייל עבור $n = m = 2$.


דוגמה 4.1 (משחק צ'ומפ 2×2)

נתון משחק צ'ומפ 2×2 .


(1) רשמו את המשחק בצורה רחבה.

(2) רשמו את המשחק בצורה אסטרטגית.

פתרון:



סעיף 1)



סעיף 2)

$$G = (N = \{I, II\}, \{S_I, S_{II}\}, \{u_I, u_{II}\}) .$$



משפט 4.6 משחק צ'ומפ לא יכול להסתיים בתיקו

משחק צ'ומפ על לוח $m \times n$ לא יכול להסתיים בתיקו.

הוכחה:

- נניח בשליחה כי ייתכן המשחק יסתיים בתיקו.
- ייתכן המשחק יסתיים במצב שבו והמשבצת $(1, 1)$ לא נכבשת.
- נגדיר הסדרה $(a_n)_{n=1}^{\infty}$ כאשר $a_n = (i_n, j_n)$ אם ורק אם המשבצת (i_n, j_n) נכבשת במהלך n .
- $\Leftarrow$ לכל $a_n = (i_n, j_n)$ בסדרה:

$$\neg [(i_n \geq i_{n-1}) \wedge (j_n \geq j_{n-1})] .$$
- $\Leftarrow$ לכל $a_n = (i_n, j_n)$ בסדרה:

$$(i_n < i_{n-1}) \vee (j_n < j_{n-1}) .$$
- $\Leftarrow$ קיים טבעי N עבורו הסדרה מסתיימת: $a_N = (1, 1)$.
- $\Leftarrow$ בהכרח במהלך האחרון של המשחק שחקן כובש את המשבצת $(1, 1)$.
- $\Leftarrow$ סתירה לכך שיייתכן כי המשחק יסתיים במצב שבו המשבצת לא נכבשת.
- ניתן להוכיח את הטענה שקיים טבעי N עבורו הסדרה מסתיימת ב- $a_N = (1, 1)$ דרך השלילה.
- נניח בשלילה כי לא קיים טבעי N כך שהסדרה a_n מסתיימת כאשר $n = N$.
- תהי b_n הסדרה שמוגדרת באופן הבא:
- $$a_n = (i_n, j_n) \Rightarrow b_n = \min(i_n, j_n) .$$
- $\Leftarrow$ מכיוון ש- $i_n < i_{n-1}$ או $j_n < j_{n-1}$ אזי $b_n < b_{n-1}$.
- $\Leftarrow$ מכיוון ש- a_n לא מסתיימת אז b_n לא מסתיימת.
- $\Leftarrow$ קיים m טבעי עבורו $b_m < 1$.
- $\Leftarrow$ קיים m טבעי עבורו $a_m = (i_m, j_m)$ כך ש- $i_m < 1$ או $j_m < 1$.
- $\Leftarrow$ סתירה לכך ש- $1 \leq i_n, j_n \leq n$.




משפט 4.7 אסטרטגיה מנצחת במשחק צ'ומפ

במשחק צ'ומפ על לוח ריבועי $n \times n$ האסטרטגיה הבאה הינה אסטרטגיה מנצחת לשחקן I .

- בתור הראשון שחקן I כובש את המשבצת $(2, 2)$.
- מכאן ואילך, שחקן I משחק באופן סימטרי לשחקן II .
- ז"א אם שחקן II כובש את המשבצת (i, j) , אז שחקן I , במהלך שלאחר מכן, יכבוש את המשבצת (j, i) .

הוכחה:



• נניח בשלילה כי האסטרטגיה הזו אינה אסטרטגיה מנצחת לשחקן I .

⇐ אסטרטגיה הזו היא אסטרטגיה מנצחת לשחקן II .

• יהי k טבעי המונה המהלך של המשחק, כך ש:

* $k = 0$ המהלך הראשון שבו שחקן I כובש משבצת $(2, 2)$,

* $k = 1$ המהלך הבא שבו שחקן II כובש משבצת,

* $k = 2$ המהלך לאחר מכן שבו שחקן I כובש משבצת, וכן הלאה.

• נגדיר סדרה $a_0, a_1, a_2, \dots$ כאשר: $a_0 = (2, 2)$ ולכל $m > 0$:

$$a_m = \begin{cases} \{(i_m, 1), (1, i_m)\} & : \text{שחקן } II \text{ כובש } (i_m, 1) \text{ במהלך } 2m - 1 \\ \{(1, i_m), (i_m, 1)\} & : \text{שחקן } II \text{ כובש } (1, i_m) \text{ במהלך } 2m \end{cases}$$

ז"א לכל $m > 0$, האיבר a_m מסמן זוג משבצות כאשר הראשונה נכבשת ע"י שחקן II במהלך $k = 2m - 1$ והשנייה נכבשת ע"י שחקן I במהלך $k = 2m$ שלאחר מכן.

• תהי b_m הסדרה מוגדרת:

$$b_m = i_m \iff [a_m = \{(i_m, 1), (1, i_m)\} \vee a_m = \{(1, i_m), (i_m, 1)\}]$$

• על פי האסטרטגיה, $b_m \Leftarrow 1 \leq i_m < i_{m-1} \leq n$ סדרה יורדת מונוטונית וחסומה $b_m \Leftarrow$ מתכנסת.

• בנוסף המשחק מסתיים כאשר שחקן כובש המשבצת $(1, 1)$.

⇐ קיים N כך שהסדרה מסתיימת כאשר $a_N = \{(1, 1), (1, 1)\}$.

⇐ ז"א קיים טבעי N כך שבמהלך $k = 2N - 1$, שחקן II כובש משבצת $(1, 1)$.


⇐ שחקן II בהכרח מפסיד, בסתירה לכך שהאסטרטגיה של המשפט היא אסטרטגיה מנצחת לשחקן II .

משפט 4.8


במשחק צ'ומפ על לוח $m \times n$, אם לשחקן II אסטרטגיה מנצחת אז גם לשחקן I יש אסטרטגיה מנצחת.

הוכחה:

- נניח כי לשחקן II יש אסטרטגיה מנצחת s_2 .
- אסטרטגיה זו מבטיחה ניצחון כנגד כל אסטרטגיה של שחקן I .
- בפרט, היא מנצחת גם אם שחקן I יבחר לכבוש את המשבצת (m, n) במהלך הפתיחה (המשבצת הימנית-העליון).



- נניח כי במהלך התשובה המומלץ לשחקן II לפי האסטרטגיה s_2 הוא כובש המשבצת (i_0, j_0) .
- מכאן ואילך מתפתח משחק חדש על הלוח המתואר בתרשים למטה.



- במשחק זה שחקן I מבצע מהלך הפתיחה, ושחקן II שמשחק לפי האסטרטגיה s_2 , מבטיח לעצמו ניצחון במשחק החדש.
- כלומר, השחקן שמצבע את מהלך הפתיחה במשחק זה הוא השחקן המפסיד.
- אולם שחקן I יכול לדאוג שמצב הלוח יהיה המצב בתרשים כאשר שחקן II הוא הפותח, וזאת ע"י בחירה של המשבצת (i_0, j_0) במהלך הראשון.
- לסיכום, פתיחה של I ב- (i_0, j_0) והמשך על פי האסטרטגיה s_2 היא אסטרטגיה מנצחת של שחקן I במשחק המקורי.

משפט 4.9

במשחק צ'ומפ על לוח $m \times n$, יש לשחקן I הפותח המשחק אסטרטגיה מנצחת.


הוכחה:

- משפט 4.6 $\Leftarrow$ המשחק אינו יכול להסתיים בתיקו.
- נניח בשלילה כי לשחקן II יש אסטרטגיה מנצחת.
- משפט 4.8 $\Leftarrow$ לשחקן I יש אסטרטגיה מנצחת.
- $\Leftarrow$ סתירה לכך לשחקן II יש אסטרטגיה מנצחת.
- $\Leftarrow$ לשחקן I הפותח המשחק אסטרטגיה מנצחת.

4.3 שחמט

הגדרה 4.3 הכללים של שחמט

- שחמט הוא משחק שני שחקנים: שחור ולבן.
- המשחק משוחק על לוח 8×8 . במצב ההתחלתי לשחקן לבן יש 16 כלים לבנים ולשחקן שחור יש 16 כלים שחורים מונחים על הלוח בקונפיגורציה המתוארת בתרשים למטה.



- (1)  מלך (King):

נע משבצת אחת לכל כיוון (קדימה, אחורה, ימינה, שמאלה או באלכסון).

- (2)  מלכה (Queen):

נעה מספר בלתי מוגבל של משבצות פנויות לכל כיוון (לאורך השורות, העמודות או האלכסונים).

- (3)  צריח (Rook):

נע מספר בלתי מוגבל של משבצות פנויות לאורך השורות או העמודות (קדימה, אחורה, ימינה ושמאלה).

- (4)  רץ (Bishop):

נע מספר בלתי מוגבל של משבצות פנויות באלכסון בלבד.

- (5)  פרש (Knight):

נע בצורת האות "L" (שתי משבצות לכיוון אחד, ולאחר מכן משבצת אחת הצידה בזווית ישרה). זהו הכלי היחיד שמסוגל "לדלג" מעל כלים אחרים (משלו או של היריב).

- (6)  רגלי / חייל (Pawn):

נע משבצת אחת קדימה. בתורו הראשון בלבד, הוא יכול לנוע שתי משבצות קדימה. הוא מכה (אוכל) כלי יריב אך ורק משבצת אחת באלכסון קדימה.

- למשחק יש שלוש תוצאות אפשריות:

- (1) ניצחון ללבן אם המלך השחור מאוים ואין מהלך מנטרל את האיום.

(2) ניצחון לשחור אם המלך הלבן מאוים ואין מהלך מנטרל את האיום.

(3) תיקו אם:

- (א) תורו של שחור לשחק אך אין לו אף מהלך חוקי והמלך שלו אינו מוים,
- (ב) תורו של לבן לשחק אך אין לו אף מהלך חוקי והמלך שלו אינו מוים,
- (ג) מצב הלוח אינו מאפשר ניצחון של אחד השחקנים.

הגדרה 4.4 מצב משחק שחמט

- נסמן ב- X את אוסף כל מבצי הלוח האפשריים בשחמט.
- מצב הלוח $x \in X$ כולל את זהות הכלים שעל הלוח ואת מיקומם.
- **מצב המשחק** במשחק השחמט הוא סדרה סופית $(x_0, x_1, x_2, \dots, x_n)$ של מצבי לוח ב- X המקיימת:
 - (1) x_0 הוא מצב הלוח ההתחלתי
 - (2) לכל $k < n$ זוגי, ניתן להגיע מ- x_k ל- x_{k+1} באמצעות מהלך אחד של לבן.
 - (3) לכל $k < n$ אי-זוגי, ניתן להגיע מ- x_k ל- x_{k+1} באמצעות מהלך אחד של שחור.
- נסמן ב- H את קבוצת כל מצבי המשחק.

נניח ששחקן רוצה לבנות תוכנית כיצד לשחק בכל מצב משחק שבו תורו לשחק. למשל שחקן רוצה לתכנת מחשב לשחק שחמט. עליו לומר למחשב כיצד לשחק בכל מצב משחק שבו תורו לשחק. תוכנית מלאה כזו להתנהגות במשחק נקראת אסטרטגיה.

הגדרה 4.5 אסטרטגיה

- **אסטרטגיה של לבן** היא פונקציה s_W המתאימה לכל מצב משחק $(x_0, x_1, x_2, \dots, x_k)$ עם k זוגי מצב לוח x_{k+1} כך שניתן להגיע מ- x_k ל- x_{k+1} באמצעות מהלך אחד של לבן. בצורה מתמטית:

$$s_W(x_0, x_1, \dots, x_k) = x_{k+1}, \quad k \text{ זוגי.}$$

- **אסטרטגיה של שחור** היא פונקציה s_B המתאימה לכל מצב משחק $(x_0, x_1, x_2, \dots, x_k)$ עם k אי-זוגי מצב לוח x_{k+1} כך שניתן להגיע מ- x_k ל- x_{k+1} באמצעות מהלך אחד של שחור. בצורה מתמטית:

$$s_B(x_0, x_1, \dots, x_k) = x_{k+1}, \quad k \text{ אי-זוגי.}$$

זוג האסטרטגיות (s_W, s_B) קובע את מהלך המשחק באופן הבא. במהלך הפתיחה לבן משחק את המהלך המוביל למצב הלוח

$$x_1 = s_W(x_0).$$

כעת שחור משחק את המהלך המוביל למצב הלוח

$$x_2 = s_B(x_0, x_1).$$

אז לבן משחק את המהלך המוביל למצב הלוח

$$x_3 = s_W(x_0, x_1, x_2).$$

וכן הלאה.

באופן כללי, מצבי הלוח נקבעים בצורה רקורסיבית:

$$x_{2k+1} = s_W(x_0, x_1, \dots, x_{2k}), \quad x_{2k+2} = s_B(x_0, x_1, \dots, x_{2k}, x_{2k+1})$$

לכל $k = 0, 1, 2, \dots$

מהלך המשחק כולו (עד לסיום המשחק) נקרא תחרות (play).

כל תחרות מסתיימת בניצחון ללבון, ניצחון לשחור או תיקו. אסטרטגיה של לבן נקראת מנצחת אם היא מבטיחה שהוא ינצח. ז"א הוא ינצח כנגד כל אסטרטגיה של שחור.

הגדרה 4.6 אסטרטגיה מנצחת

- אסטרטגיה s_W היא **אסטרטגיה מנצחת** עבור לבן אם לכל אסטרטגיה s_B של שחור התחרות הנקבעת על ידי זוג האסטרטגיות (s_W, s_B) מסתיימת בניצחון ללבן.
- אסטרטגיה s_B היא **אסטרטגיה מנצחת** עבור שחור אם לכל אסטרטגיה s_W של לבן התחרות הנקבעת על ידי זוג האסטרטגיות (s_W, s_B) מסתיימת בניצחון שחור.


הגדרה 4.7 אסטרטגיה המבטיחה לפחות תיקו

- אסטרטגיה s_W של לבן **מבטיחה לפחות תיקו** אם לכל אסטרטגיה s_B של שחור התחרות הנקבעת על ידי זוג האסטרטגיות (s_W, s_B) מסתיימת בניצחון ללבן או בתיקו.
- אסטרטגיה s_B של שחור **מבטיחה לפחות תיקו** אם לכל אסטרטגיה s_W של לבן התחרות הנקבעת על ידי זוג האסטרטגיות (s_W, s_B) מסתיימת בניצחון שחור או בתיקו.

אם s_W היא אסטרטגיה מנצחת עבור לבן, אז לשחקן לבן שישחק לפיה מובטח לנצח במשחק, אפילו אם הוא מתמודד מול אלוף העולם בשחמט.

4.4 עץ המשחק

ניתן להציג קבוצת מצבי המשחק באמצעות **עץ המשחק**.



איור 4:

- כל קדקוד בעץ מתאר מצב לוח x_i אפשרי במשחק.
- נסמן את קבוצת קדקודי עץ המשחק גם כן באות H .
- השורש של העץ הוא המצב לוח ההתחלתי, x_0 .
- לכל קדקוד x , **הבנים** של x הם קבוצת המצבי לוח שאליהם ניתן לעבור מ- x בצעד אחד.
- לדוגמה, במהלך הפתיחה יכול לבן להזיז כל אחד משמונה חייליו משבצת אחת או שתיים, או את אחד משני פרשיו. בסך הכל יש ללבן במצב ההתחלתי 20 מהלכים אפשריים, ולכן לשורש יש 20 בנים.
- כל קדקוד שאליו ניתן להגיע מ- x על ידי סדרה של מהלכים נקרא **צאצא** של x .
- כל **ענף** של העץ מתאים למצב סיום של המשחק עבורו יש 3 אפשרויות:
 - (1) מצב שבו לבן ניצח,
 - (2) שחור ניצח,
 - (3) או שמוכרז תיקו.

4.5 תת משחק

הגדרה 4.8 תת משחק

- לכל קדקוד $x \in H$ ניתן להסתכל בתת-עץ המתחיל ב- x .
- זהו עץ ששורשו x והוא מתקבל מעץ המשחק על ידי סילוק כל הקדקודים שאינם צאצאים של x .
- תת-עץ זה מתאים למשחק שנסמן ב- $\Gamma(x)$ ונקרא **תת-משחק** המתחיל ב- x .
- נסמן ב- n_x את מספר הקדקודים ב- $\Gamma(x)$.
- המשחק $\Gamma(x_0)$ הוא המשחק המתחיל במצב ההתחלתי של המשחק, ולכן זהו משחק השחמט הרגיל.
- נניח ש- y בן של x , אזי $\Gamma(y)$ הוא תת-עץ של $\Gamma(x)$ שאינו מכיל את x ולכן $n_x > n_y$.
- כמו כן, אם $n_x = 1$ אז ורק אם x הוא מצב סיום של המשחק, ולכן השחקנים אינם מבצעים מסעים בתת-משחק זה.
- האסטרטגיה שאותה לוקח שחקן במקרה כזה, שבו הוא אינו מבצע אף מסע, נסמן ב- s_0 .
- נסמן את אוסף כל המשחקים המוגדרים על ידי התתי-עצים של משחק השחמט ב-

$$F = \{\Gamma(x) \mid x \in H\} \quad (4.1)$$

4.6 משפט פון נוימן לשחמט

כלל 4.1 כלל השלילה של מכמתים

- אם לא נכון ש "לכל $x \in X$ מתקיים המאורע A " אזי בהכרח קיים $x \in X$ שעבורו המאורע A אינו מתקיים:

$$\neg (\forall x (A)) = \exists x (\neg A) . \quad (4.2)$$

- אם לא נכון ש "קיים $x \in X$ שעבורו מתקיים המאורע A " אזי בהכרח לכל $x \in X$ המאורע A אינו מתקיים.

$$\neg (\exists x (A)) = \forall x (\neg A) . \quad (4.3)$$

משפט 4.10 משפט פון נוימן לשחמט

במשחק השחמט נכונה אחת ורק אחת מהאפשרויות הבאות.

- (1) ללבן יש אסטרטגיה מנצחת.
- (2) לשחור יש אסטרטגיה מנצחת.
- (3) לכל אחד משני השחקנים יש אסטרטגיה המבטיחה לפחות תיקו.

הוכחה:

- משחק השחמט הוא משחק סופי. ז"א קיים מספר טבעי N מספיק גדול כך שהמשחק מסתיים לאחר לכל היותר $2N$ מהלכים (N מהלכים של לבן ו- N מהלכים של שחור).
- נניח לשם פשטות כי המשחק מסתיים לאחר בדיוק $2N$ מהלכים.
- לכל $1 \leq k \leq N$:

* נסמן ב- a_k את המסע שמבצע לבן בתור ה- k שלו,

* ונסמן ב- b_k את המסע שמבצע שחור בתור ה- k שלו.

- נסמן ב- W את המאורע שלבן ניצח במשחק (לאחר $2N$ מהלכים).

$\Leftarrow W$ הוא המאורע שהמשחק מסתיים בתיקו או בניצחון שחור.

- הטענה "ללבן יש אסטרטגיה מנצחת" ניתן לרשום בצורה הבאה:

$$\exists a_1 \forall b_1 \exists a_2 \forall b_2 \exists a_3 \dots \exists a_N \forall b_N (W) . \quad (4.4)$$

$\Leftarrow$ הטענה "לא קיימת ללבן אסטרטגיה מנצחת" ניתן לרשום כך:

$$\neg (\exists a_1 \forall b_1 \exists a_2 \forall b_2 \exists a_3 \dots \exists a_N \forall b_N (W)) . \quad (4.5)$$

- על ידי הפעלה חוזרת של משוואות (4.2) ו- (4.3) נקבל כי פסוק זה שווה לפסוק

$$\begin{aligned} \neg (\exists a_1 \forall b_1 \exists a_2 \forall b_2 \exists a_3 \dots \exists a_N \forall b_N (W)) &= \forall a_1 (\neg (\forall b_1 \exists a_2 \forall b_2 \exists a_3 \dots \exists a_N \forall b_N (W))) \\ &= \forall a_1 \exists b_1 (\neg (\exists a_2 \forall b_2 \exists a_3 \dots \exists a_N \forall b_N (W))) \\ &\vdots \\ &= \forall a_1 \exists b_1 \forall a_2 \exists b_2 \dots \forall a_N \exists b_N (\neg W) \end{aligned} \quad (4.6)$$

- המשוואה (4.6) אומרת שלשחור יש אסטרטגיה המבטיחה לפחות תיקו.
 - כלומר, הוכחנו כי אם ללבן אין אסטרטגיה מנצחת, אזי לשחור יש אסטרטגיה המבטיחה לפחות תיקו.
 - באופן דומה, ניתן להוכיח כי אם לשחור אין אסטרטגיה מנצחת, אזי ללבן יש אסטרטגיה המבטיחה לפחות תיקו.
- ⇐ אחת משלוש האפשרויות המצוינות במשפט 4.10 בהכרח מתקיימת.



4.7 משפט פון נוימן לשחמט (הוכחה חלופית)*

משפט 4.11 משפט פון נוימן לשחמט

במשחק השחמט נכונה אחת ורק אחת מהקביעות הבאות.

- (1) ללבן יש אסטרטגיה מנצחת.
- (2) לשחור יש אסטרטגיה מנצחת.
- (3) לכל אחד משני השחקנים יש אסטרטגיה המבטיחה לפחות תיקו.

הערות

- אם (1) מתקיים, כלומר ללבן יש אסטרטגיה מנצחת, s_W .
⇐ שחקן שישחק בתפקיד הלבן ויפעל לפי אסטרטגיה s_W ינצח במשחק, בלי להתחשב למה יריבו עושה.
- אם (2) מתקיים, כלומר לשחור יש אסטרטגיה מנצחת, s_B .
⇐ שחקן שישחק בתפקיד השחור ויפעל לפי אסטרטגיה s_B ינצח במשחק, בלי להתחשב למה יריבו עושה.
- אם (3) מתקיים, יש ללבן אסטרטגיה s_W המבטיחה לפחות תיקו ויש לשחור אסטרטגיה s_B המבטיחה לפחות תיקו.
⇐ לשחקן לבן שישחק לפי האסטרטגיה s_W מובטח שישג לפחות תיקו, בלי להתחשב במה יריבו עושה, ולשחקן שחור שישחק לפי האסטרטגיה s_B מובטח שישג לפחות תיקו, בלי להתחשב במה יריבו עושה,

מסקנה שנובעת ממשפט 4.10 היא שתוצאת המשחק היא לא מקרית, אלא שחקן אחד יכול לכפות ניצחון או תיקו על יריבו.

המשפט 4.10 מבטיח כי אחת משלוש האפשרויות מתקיימת. לא יכולה להתקיים יותר מאפשרות אחת מבין השלוש, כי כל אפשרות סותרת את שתי האפשרויות האחרות. לדוגמה, לא ייתכן שגם ללבן יש אסטרטגיה מנצחת וגם לשחור יש אסטרטגיה מנצחת.

משפט 4.12 משפט פון נוימן לשחמט (ניסוח חילופי)

בכל משחק במשפחה F מתקיימת אחת ורק אחת מהאפשרויות הבאות

- (1) ללבן יש אסטרטגיה מנצחת.
- (2) לשחור יש אסטרטגיה מנצחת.
- (3) לכל אחד משני השחקנים יש אסטרטגיה המבטיחה לפחות תיקו.

הוכחה:

אינדוקציה על n_x , מספר הקדקודים בתת-עץ $\Gamma(x)$.

שלב הבסיס: $n_x = 1$.

במקרה זה x הוא קדקוד סיום.

- אם המלך הלבן מאוים וללבן אין מהלך המנטרל איום זה $\Leftarrow$ השחור ניצח $\Leftarrow$ האסטרטגיה s_0 היא אסטרטגיה מנצחת לשחור.
- אם המלך השחור מאוים ולשחור אין מהלך המנטרל איום זה $\Leftarrow$ הלבן ניצח $\Leftarrow$ האסטרטגיה s_0 היא אסטרטגיה מנצחת ללבן.
- אחרת, המשחק מסתיים בתיקו ולכן אסטרטגיה s_0 מבטיחה תיקו הן ללבן והן לשחור.

שלב האינדוקציה: $n_x > 1$.

נניח כי לכל קדקוד y המקיים $n_y < n_x$ אחת ורק אחת מהאפשרויות (1), (2), (3) מתקיימת בתת-משחק $\Gamma(y)$ (ההנחת האינדוקציה).

בלי הגבלת הכלליות נניח כי במשחק $\Gamma(x)$ לבן משחק ראשון.

לכל מצב לוח y שאליו ניתן להגיע מ- x מתקיים

$$n_y < n_x,$$

ולכן בתת-משחק $\Gamma(y)$ מתקיימת הנחת האינדוקציה.

נסמן ב- $C(x)$ את אוסף כל מצבי המשחק ש אליהם ניתן להגיע מ- x במהלך אחד של לבן.

(1) אם קיים $y \in C(x)$ כך שב- $\Gamma(y)$ יש ללבן אסטרטגיה מנצחת, אז אפשרות (1) במשפט 4.12 מתקיימת עבור $\Gamma(x)$.

אסטרטגיה מנצחת ללבן ב- $\Gamma(x)$ היא לשחק במהלך הראשון את המהלך המוביל למצב הלוח y , ומהמהלך השני ואילך יפעל לפי אסטרטגיה מנצחת ב- $\Gamma(y)$.

(2) אם קיים $y \in C(x)$ כך שב- $\Gamma(y)$ יש לשחור אסטרגיה מנצחת, אז אפשרות **(2)** במשפט 4.12 מתקיימת עבור $\Gamma(x)$:

שחור יכול לנצח על ידי כך שיראה מה הוא מצב הלוח y לאחר המהלך הראשון של לבן, ומהמהלך השני ואילך יפעל לפי אסטרטגיה מנצחת במשחק $\Gamma(y)$.

(3) אם לא מקרה **(1)** מתקיים ולא מקרה **(2)** מתקיים:

(א) אם מקרה **(1)** אינו מתקיים, ולכן לכל $y \in C(x)$ אין ללבן אסטרגיה מנצחת ב- $\Gamma(y)$. מכיוון שהנחת האינדוקציה מתקיימת לכל קדקוד $y \in C(x)$, ב- $\Gamma(y)$ קיים לשחור אסטרגיה מנצחת, או שלשני השחקנים יש אסטרגיה המבטיחה לפחות תיקו.

(ב) אם מקרה **(2)** אינו מתקיים, ולכן קיים קדקוד $y_0 \in C(x)$ כך שלשחור אין אסטרגיה מנצחת ב- $\Gamma(y_0)$. מהנקודה הקודמת גם ללבן אין אסטרטגיה מנצחת ב- $\Gamma(y_0)$. לכן מהנחת האינדוקציה ב- $\Gamma(y_0)$ יש לשני השחקנים אסטרגיה המבטיחה לפחות תיקו.



פרק 5: ערך המקסמין ומשחקים סכום אפס

5.1 ביטחון: מושג המקסמין

מושג השיווי המשקל, על כל יתרונותיו, אינו מתאר תמיד את ההתנהגות הצפויה של שחקנים רציונליים, אפילו במקרים ששיווי המשקל קיים והוא יחיד. נתבונן למשל במשחק המתואר למטה. אליס (שחקן I) ובוב (שחקן II) משחקים את המשחק הבא:

II בוב I אליס	L	R
T	2, 1	2, -20
M	3, 0	-10, 1
B	-100, 2	3, 3

נסמן את כל התשובות הטובות ביותר של השחקנים:

II בוב I אליס	L	R
T	2, <u>1</u>	2, -20
M	<u>3</u> , 0	-10, <u>1</u>
B	-100, 2	<u>3</u> , <u>3</u>

- מכאן השיווי משקל היחיד במשחק זה הוא $s^* = (B, R)$ עם תשלום $(3, 3)$.
אך בחירות השחקנים של אסטרטגיות אלו מסוכנות!
- אליס עשויה להסס מאוד לבחור B , מחשש שמא בוב (שחקן II) יבחר L (אם משום שאינו רציונלי, אם בטעות, או מכל סיבה אחרת).
- כיוון שהתשלום של (B, L) קטסטרופלי בשביל אליס, ייתכן שהיא תשחק לפי אסטרטגיה T המבטיחה לה תשלום 2 (במקום 3 בשיווי משקל) אבל כך אין סיכון להפסיד 100.
- אם בוב (שחקן II) ער להיסוס זה וחושב שיש סיכוי שאליס תבחר T הוא יחשוש מלבחור את אסטרטגיה שיווי המשקל R ולהסתכן להפסיד 20.
- לאור זה ייתכן מאוד ששוב ישחק לפי אסטרטגיה L .
- למעשה, אסטרטגיה T של אליס מבטיחה לה התשלום הטובה ביותר שניתן לקבל מבלי "לסמוך" על הרציונליות של שחקן II , ובהנחות הפסימיות ביותר על ההתנהגותו של בוב (שחקן II).

באופן כללי, נתון משחק שני שחקנים $G = (N = \{I, II\}, \{S_I, S_{II}\}, \{u_I, u_{II}\})$ נניח כי שחקן I משחק אסטרטגיה $s_1 \in S_I$. התשלום הנמוך ביותר שהוא עלול לקבל הוא

$$\min_{t_2 \in S_{II}} u_1(s_1, t_2) .$$

שחקן 1 יכול לבחור באסטרטגיה s_1 הממקסמת ערך זה. כלומר, בלי לסמוך על הרציונליות של שאר השחקנים הוא יכול להבטיח לעצמו

$$v_1 = \max_{s_1 \in S_I} \min_{t_2 \in S_{II}} u_1(s_1, t_2) .$$

הגודל v_1 נקרא **ערך המקסמין** של שחקן 1 או **רמת הביטחון** של שחקן 1. אסטרטגיה s_1 המבטיחה ערך זה נקראת **אסטרטגיה מקסמין**.

באותה מידה, התשלום המקסימלי של שחקן 2 יכול להבטיח לעצמו בלי לסמוך על הרציונליות של שאר השחקנים הוא הערך המקסימין של שחקן 2, מוגדר:

$$v_2 = \max_{s_2 \in S_{II}} \min_{t_1 \in S_I} u_2(t_1, s_2) .$$

הגדרה 5.1 ערך המקסימין במשחק שני שחקנים

יהי $G = (N = \{I, II\}, \{S_I, S_{II}\}, \{u_I, u_{II}\})$ משחק שני שחקנים.

• הערך המקסימין של שחקן I מסומן $\underline{v}_1$ ומוגדר:

$$\underline{v}_1 = \max_{s_1 \in S_I} \min_{t_2 \in S_{II}} u_1(s_1, t_2) .$$

• הערך המקסימין של שחקן II מסומן $\underline{v}_2$ ומוגדר:

$$\underline{v}_2 = \max_{s_2 \in S_{II}} \min_{t_1 \in S_I} u_2(t_1, s_2) .$$

הגדרה 5.2 ערך המקסימין במשחק n שחקנים

יהי $G = (N, (S_i)_{i \in N}, (u_i)_{i \in N})$ משחק n שחקנים. הערך המקסימין של שחקן i מסומן $\underline{v}_i$ ומוגדר:

$$\underline{v}_i = \max_{s_i \in S_i} \min_{t_{-i} \in S_{-i}} u_i(s_i, t_{-i}) .$$

דוגמה 5.1 (ערך המקסימין)

מצאו את הערך המקסימין של כל השחקנים במשחק הבא:

$\begin{matrix} II \\ I \end{matrix}$	L	R
T	2, 1	2, -20
M	3, 0	-10, 1
B	-100, 2	3, 3

פתרון:

$\begin{matrix} II \\ I \end{matrix}$	L	R	$\min_{s_2 \in S_{II}} u_1(s_1, s_2)$
T	2, 1	2, -20	2
M	3, 0	-10, 1	-10
B	-100, 2	3, 3	-100

$$\underline{v}_1 = \max_{s_1 \in S_I} \min_{s_2 \in S_{II}} u_1(s_1, s_2) = 2 .$$

$I \backslash II$	L	R
T	2, 1	2, -20
M	3, 0	-10, 1
B	-100, 2	3, 3
$\min_{s_1 \in S_I} u_2(s_1, s_2)$	0	-20

$$v_2 = \max_{s_2 \in S_{II}} \min_{s_1 \in S_I} u_2(s_1, s_2) = 0.$$

ערך המקסמין של שחקן- I הוא 2, ואסטרטגית המקסמין המבטיחה תשלום זה היא T .

ערך המקסמין של שחקן- II הוא 0, ואסטרטגית המקסמין המבטיחה תשלום זה היא L .

נהוג לרשום את התשלומים המינימליים בטבלה אחת:

$I \backslash II$	L	R	$\min_{s_2 \in S_{II}} u_1(s_1, s_2)$
T	2, 1	2, -20	2
M	3, 0	-10, 1	-10
B	-100, 2	3, 3	-100
$\min_{s_1 \in S_I} u_2(s_1, s_2)$	0	-20	$\underline{v}_1 = 2$ $\underline{v}_2 = 0$

בתרשים זה, מימין בכל שורה מופיע התשלום הנמוך ביותר לשחקן I אם היא בוחרת באסטרטגיה המתאימה לשורה זה. ומתחת לכל עמודה מופיע התשלום הנמוך ביותר לשחקן II , אם הוא בוחר באסטרטגיה המתאימה לעמודה זו. בפינה הימנית תחתונה של התרשים, באדום מופיעים המקסמין של השחקנים.

שימו לב: אם שני השחקנים בוחרים באסטרטגיות המקסמין שלהם, אז הווקטור אסטרטגיות של המשחק הוא (T, L) והתשלומים הם $(2, 1)$. שחקן 2 מקבל תשלום 1, אשר גבוהה יותר מהמקסמין שלו $(\underline{v}_2 = 0)$.



דוגמה 5.2 (ערך המקסמין)

נתון משחק עם שני שחקנים בצורה אסטרטגית כמתואר בטבלה.

$I \backslash II$	L	R
T	3, 1	0, 4
B	2, 3	1, 1

(א) מצאו אסטרטגיה מקסמין של שחקן I והרמת הביטחון שלו.

(ב) מצאו אסטרטגיה מקסמין של שחקן II והרמת הביטחון שלו.

(ג) מהם התשלומים לשני השחקנים אם שניהם בוחרים באסטרטגיות המקסמין שלהם.

פתרון:

(א)

$I \backslash II$	L	R	$\min_{s_2 \in S_{II}} u_1(s_1, s_2)$
	T	B	
T	3, 1	0, 4	0
B	2, 3	1, 1	1

$$v_1 = \max_{s_1 \in S_I} \min_{s_2 \in S_{II}} u_1(s_1, s_2) = 1 .$$

ערך המקסמין של שחקן 1 הוא 1 ואסטרטגית המקסמין שלו היא B .

(ב)

$I \backslash II$	L	R	$\min_{s_1 \in S_I} u_2(s_1, s_2)$
	T	B	
T	3, 1	0, 4	
B	2, 3	1, 1	
	1	1	

$$v_2 = \max_{s_2 \in S_{II}} \min_{s_1 \in S_I} u_2(s_1, s_2) = 1 .$$

ערך המקסמין של שחקן 2 הוא 1. גם L וגם R הן אסטרטגיות מקסמין.

(ג)

$I \backslash II$	L	R	$\min_{s_2 \in S_{II}} u_1(s_1, s_2)$
	T	B	
T	3, 1	0, 4	0
B	2, 3	1, 1	1
$\min_{s_1 \in S_I} u_2(s_1, s_2)$	1	1	$v_1 = 1$ $v_2 = 1$

לכן כאשר שחקן 1 בוחר באסטרטגיה המקסמין שלו, B , וכאשר שחקן 2 בוחר באסטרטגיה המקסמין שלו (L או R) התשלום עשוי להיות $u(B, R) = (1, 1)$ או $u(B, L) = (2, 3)$. עבור (B, R) , בהתאם לאסטרטגית המקסמין שיבחר שחקן II .

5.2 משפטים: היחס בין שיווי משקל ואסטרטגית מקסמין

משפט 5.1

יהי $G = (N, (S_i)_{i \in N}, (u_i)_{i \in N})$ משחק n שחקנים. אם s_i^* אסטרטגיה של שחקן i שולטת (לא בהכרח חזק) על כל שאר האסטרטגיות $t_i \in S_i$ אז:

(א) s_i^* היא אסטרטגיית מקסמין של שחקן i .

(ב) s_i^* היא תשובה טובה ביותר של שחקן i לכל ווקטור אסטרטגיות של שאר השחקנים.

(א) תהי s_i^* אסטרטגיה ששולטת (לא בהכרח חזק) על כל שאר האסטרטגיות של שחקן i .
תהי $s_i \in S_i$ כל אסטרטגיה של שחקן i ותהי $t_{-i} \in S_{-i}$ קבוצת אסטרטגיות של שאר השחקנים כך ש:

$$u_i(s_i^*, t_{-i}) = \min_{s_{-i} \in S_{-i}} u_i(s_i^*, s_{-i}) .$$

אז

$$\min_{s_{-i} \in S_{-i}} u_i(s_i^*, s_{-i}) = u_i(s_i^*, t_{-i}) \geq u_i(s_i, t_{-i}) \geq \min_{s_{-i} \in S_{-i}} u_i(s_i, s_{-i}) .$$

לפיכך לכל $s_i \in S_i$ מקתיים:

$$\min_{s_{-i} \in S_{-i}} u_i(s_i^*, s_{-i}) \geq \min_{s_{-i} \in S_{-i}} u_i(s_i, s_{-i}) .$$

במילים אחרות:

$$\min_{s_{-i} \in S_{-i}} u_i(s_i^*, s_{-i}) = \max_{s_i \in S_i} \min_{s_{-i} \in S_{-i}} u_i(s_i, s_{-i}) = v_i .$$

לפיכך s_i^* היא אסטרטגיה מקסמין של שחקן i .

(ב) שולטת חלש על כל שאר האסטרטגיות, אז לכל $s_{-i} \in S_{-i}$ מתקיים

$$u_i(s_i, s_{-i}) \leq u_i(s_i^*, s_{-i}) .$$

מכאן s_i^* היא תשובה טובה ביותר של שחקן i לכל ווקטור אסטרטגיות s_{-i} של שאר השחקנים.

משפט 5.2

יהי $G = (N, (S_i)_{i \in N}, (u_i)_{i \in N})$ משחק n שחקנים. אם לכל שחקן i יש אסטרטגיה s_i^* ששולטת (לא בהכרח חזק) על כל שאר האסטרטגיות שלו, אז התנאים הבאים מתקיימים.

(א) הווקטור אסטרטגיות $(s_1^*, \dots, s_n^*)$ הוא שיווי משקל של המשחק.

(ב) לכל שחקן i , s_i^* היא אסטרטגית מקסמין של שחקן i .

הוכחה:

(א) נניח כי $(s_1^*, \dots, s_n^*)$ ווקטור אסטרטגיות כך ש- s_i^* שולטת על כל שאר האסטרטגיות של שחקן i .
אז לפי משפט 5.1 (חלק ב') למעלה, s_i^* היא תשובה טובה ביותר של שחקן i לכל ווקטור אסטרטגיות s_{-i} של שאר השחקנים. ז"א

$$u_i(s_i^*, s_{-i}) \geq u_i(s_i, s_{-i})$$

לכל שחקן i . לפיכך הווקטור אסטרטגיות $s^* = (s_1^*, \dots, s_n^*)$ הוא נקודת שיווי משקל.

(ב) לפי משפט 5.1 (חלק א'), s_i^* היא אסטרטגית מקסמין של שחקן i .

לפיכך הווקטור אסטרטגיות $s^* = (s_1^*, \dots, s_n^*)$ הוא ווקטור אסטרטגיות מקסמין.

5.1 למה

יהי $G = (N, (S_i)_{i \in N}, (u_i)_{i \in N})$ משחק n שחקנים. אם לכל שחקן קיימת אסטרטגיה s_i^* ששולטת חזק על כל שאר האסטרטגיות שלו, אז התנאים הבאים מתקיימים:

(א) הווקטור אסטרטגיות $(s_1^*, \dots, s_n^*)$ הוא שיווי המשקל היחיד של המשחק.

(ב) הווקטור אסטרטגיות $(s_1^*, \dots, s_n^*)$ הוא הווקטור אסטרטגיות מקסמין היחיד של המשחק.

הוכחה: תרגיל בית.

5.3 משפט

יהי $G = (N, (S_i)_{i \in N}, (u_i)_{i \in N})$ משחק n שחקנים. אם s^* היא שיווי משקל אז לכל שחקן $i \in N$ מתקיים:

$$u_i(s^*) \geq \underline{v}_i.$$

הוכחה: לכל אסטרטגיה $s_i \in S_i$,

$$u_i(s_i, s_{-i}^*) \geq \min_{s_{-i} \in S_{-i}} u_i(s_i, s_{-i}).$$

לפי ההגדרה של שיווי משקל, $u_i(s^*) = \max_{s_i \in S_i} u_i(s_i, s_{-i}^*)$.

לכן:

$$u_i(s^*) = \max_{s_i \in S_i} u_i(s_i, s_{-i}^*) \geq \max_{s_i \in S_i} \min_{s_{-i} \in S_{-i}} u_i(s_i, s_{-i}) = \underline{v}_i.$$

5.3 משחק שני שחקנים סכום אפס

הגדרה 5.3 משחק שני שחקנים סכום אפס

יהי $G = (\{I, II\}, \{S_I, S_{II}\}, \{u_1, u_2\})$ משחק שני משחקים. אומרים כי G משחק סכום אפס אם לכל ווקטור אסטרטגיות (s_1, s_2) מתקיים:

$$\forall s_1 \in S_I \quad \forall s_2 \in S_{II} : \quad u_1(s_1, s_2) + u_2(s_1, s_2) = 0.$$

במילים אחרות, משחק שני שחקנים סכום אפס הוא מערכת סגורה מבחינת התשלומים: כל ששחקן אחד מרוויח השחקן השני מפסיד.

ברור אם כן שבמשחק כזה האינטרטסטים של שני השחקנים מנוגדים לחלוטין.

דוגמה 5.3 (משחק שני שחקנים סכום אפס)

נתון משחק שני שחקנים סכום אפס הבא.

$I \backslash II$	L	C	R
T	3, -3	-5, 5	-2, 2
M	1, -1	4, -4	1, -1
B	6, -6	-3, 3	-5, 5

מצאו את האסטרטגיה מקסימין של כל שחקן.

פתרון:

1 \ 2	L	C	R	$\min_{s_2 \in S_{II}} u_1(s_1, s_2)$
T	3, -3	-5, 5	-2, 2	-5
M	1, -1	4, -4	1, -1	1
B	6, -6	-3, 3	-5, 5	-5
$\min_{s_1 \in S_I} u_2(s_1, s_2)$	-6	-4	-1	$\underline{v}_1 = 1$ $\underline{v}_2 = -1$

■ אסטרטגיות המקסימין: $s^* = (M, R)$.

הגדרה 5.4 פונקצית תשלום של משחק שני שחקנים סכום אפס

יהי $G = (\{I, II\}, \{S_I, S_{II}\}, \{u_1, u_2\})$ משחק שני משחקים סכום אפס. לכל $s_1 \in S_I$ ולכל $s_2 \in S_{II}$, הפונקצית ההתשלום של המשחק מסומנת $U(s_1, s_2)$ ומוגדרת:

$$U(s_1, s_2) \triangleq u_1(s_1, s_2) = -u_2(s_1, s_2) .$$

דוגמה 5.4 (המשך של דוגמה 5.3)

הטבלה למטה מראה את פונקצית התשלום של המשחק סכום אפס בדוגמה הקודמת, לכל ווקטור אסורוגיות של המשחק.

I \ II	L	C	R
T	3	-5	-2
M	1	4	1
B	6	-3	-5

למשל:

$$U(M, L) = 1 .$$

הגדרה 5.5 מטריצת המשחק של משחק שני שחקנים סכום אפס

יהי $G = (\{I, II\}, \{S_I, S_{II}\}, \{u_1, u_2\})$ משחק שני משחקים סכום אפס. יהי U פונקצית התשלום של המשחק.

אם

$$S_I = \{s_I^1, s_I^2, \dots, s_I^m\}$$

ואם

$$S_{II} = \{s_{II}^1, s_{II}^2, \dots, s_{II}^n\}$$

אז המטריצת המשחק היא מטריצה $A \in \mathbb{R}^{m \times n}$ מוגדרת:

$$\forall i (1 \leq i \leq m) : \quad \forall j (1 \leq j \leq n) : \quad A_{ij} = U(s_I^i, s_{II}^j) .$$

דוגמה 5.5 (המשך של דוגמה 5.3)

מטריצת המשחק של המשחק בדוגמה הקודמת הינה

$$A = \begin{pmatrix} 3 & -5 & -2 \\ 1 & 4 & 1 \\ 6 & -3 & -5 \end{pmatrix}.$$

משפט 5.4 המקסמין והמינמקס של משחק

יהי $G = (\{I, II\}, \{S_I, S_{II}\}, \{u_1, u_2\})$ משחק שני משחקים סכום אפס.

- ערך המקסמין של שחקן I נתון על ידי

$$\underline{v}_1 = \max_{s_1 \in S_I} \min_{s_2 \in S_{II}} u_1(s_1, s_2) = \max_{s_1 \in S_I} \min_{s_2 \in S_{II}} U(s_1, s_2).$$

זוהי רמת הביטחון של שחקן 1 במשחק: התשלום המקסימלי שהוא יכול להבטיח לעצמו.

- הערך המקסמין של שחקן II הוא

$$\begin{aligned} \underline{v}_2 &= \max_{s_2 \in S_{II}} \min_{s_1 \in S_I} u_2(s_1, s_2) \\ &= \max_{s_2 \in S_{II}} \min_{s_1 \in S_I} [-U(s_1, s_2)] \\ &= \max_{s_2 \in S_{II}} [-\max_{s_1 \in S_I} U(s_1, s_2)] \\ &= -\min_{s_2 \in S_{II}} \max_{s_1 \in S_I} U(s_1, s_2). \end{aligned}$$

- הערך המקסמין של המשחק מסומן $\underline{v}$ ומוגדר:

$$\underline{v} \triangleq \max_{s_1 \in S_I} \min_{s_2 \in S_{II}} U(s_1, s_2).$$

- הערך המינמקס של המשחק מסומן $\bar{v}$ ומוגדר:

$$\bar{v} \triangleq \min_{s_2 \in S_{II}} \max_{s_1 \in S_I} U(s_1, s_2)$$

- המשמעות:

\$ שחקן I יכול להבטיח שיקבל לפחות $\underline{v}$.

\$ שחקן II יכול להבטיח שישלם לכל היותר $\bar{v}$.

- \$ אסטרטגיה של שחקן 1 המבטיחה את $\underline{v}$ נקראת אסטרטגיה מקסמין.
- \$ אסטרטגיה של שחקן 2 המבטיחה את $\bar{v}$ נקראת אסטרטגיה מינמקס.

דוגמה 5.6 (המקסמין ומינמקס של משחק שני שחקנים סכום אפס)

יהי $G = (\{I, II\}, \{S_I, S_{II}\}, \{u_1, u_2\})$ משחק שני משחקים סכום אפס בעל הפונקצית התשלום הבאה:

$I \backslash II$	L	R
T	$3, -3$	$-2, 2$
B	$-1, 1$	$5, -5$

מצאו את המקסמין, המינמקס האסטרטגיה מקסמין והאסטרטגיה מינמקס של המשחק.

פתרון:

הפונקציה התשלום של המשחק היא:

$I \backslash II$	L	R
T	3	-2
B	-1	5

נחשב את המקסמין והמינמקס על פי הטבלא של הפונקציה תשלום:

$I \backslash II$	L	R	$\min_{s_2 \in S_{II}} U$
T	3	-2	-2
B	-1	5	-1
$\max_{s_1 \in S_I} U$	3	5	$\bar{v} = 3$
			$\underline{v} = -1$

$$\underline{v} = \max_{s_1 \in S_I} \min_{s_2 \in S_{II}} U = -1 ,$$

$$\bar{v} = \max_{s_2 \in S_{II}} \min_{s_1 \in S_I} U = 3 .$$

האסטרטגיה המקסמין של שחקן 1 היא B .
האסטרטגיה המינמקס של שחקן 2 היא L .



דוגמה 5.7 (המקסמין ומינמקס של משחק שני שחקנים סכום אפס)

מצאו את ערך המקסמין, ערך המינמקס, אסטרטגיה מקסמין ואסטרטגיה מינמקס של המשחק סכום אפס הבא:

$I \backslash II$	L	R
T	-2	5
B	3	0

פתרון:

הפונקציה התשלום כבר נתון בשאלה. נחשב את המקסמין והמינמקס על פי הטבלא של הפונקציה תשלום:

$I \backslash II$	L	R	$\min_{s_2 \in S_{II}} u(s_1, s_2)$
T	-2	5	-2
B	3	0	0
$\max_{s_1 \in S_I} u(s_1, s_2)$	3	5	$\underline{v} = 0$ $\bar{v} = 5$

ערך המקסמין של המשחק הוא $\underline{v} = \max_{s_1 \in S_I} \min_{s_2 \in S_{II}} u(s_1, s_2) = 0$.
 ערך המינימקס של המשחק הוא $\bar{v} = \min_{s_2 \in S_{II}} \max_{s_1 \in S_I} u(s_1, s_2) = 3$.
 אסטרטגיה המקסמין היא: B .
 אסטרטגיה המינימקס היא: L .

משמעות:

שחקן 1 אינו יכול להבטיח יותר מ-0 ואסטרטגיה המקסמין היא B .

שחקן 2 אינו יכול להבטיח (שישלם) פחות מ-3 ואסטרטגיה המינימקס היא L .

הגדרה 5.6 ערך המשחק ואסטרטגיות אופטימליות

יהי $G = (\{I, II\}, \{S_I, S_{II}\}, \{u_1, u_2\})$ משחק שני משחקים סכום אפס. אם $\underline{v} = \bar{v}$ אז אומרים כי הגודל

$$v \triangleq \underline{v} = \bar{v}$$

הוא הערך של המשחק.

במקרה זה הווקטור הווקטור אסטרטגיות אשר מבטיח הערך של המשחק נקרא ווקטור אסטרטגיות אופטימלי.

דוגמה 5.8 (משחק סכום אפס אשר יש לו ערך)

נתון המשחק שני שחקנים סכום אפס הבא.

$I \backslash II$	L	C	R
T	3	-5	-2
M	1	4	1
B	6	-3	-5

נחשב את המקסמין והמינימקס שלו:

$I \backslash II$	L	C	R	$\min_{s_2 \in S_{II}} u(s_1, s_2)$
T	3	-5	-2	-5
M	1	4	1	1
B	6	-3	-5	-5
$\max_{s_1 \in S_I} u(s_1, s_2)$	6	4	1	$\underline{v} = 1$ $\bar{v} = 1$

$$\bar{v} = 1 = \underline{v}$$

לכן הערך המשחק הוא $v = 1$.

הוקטור אסטרטגיות האופטימלי הוא : $s^* = (s_1^*, s_2^*) = (M, R)$.

שחקן 1 יכול להבטיח שיקבל לפחות 1 באמצעות האסטרטגיה האופימלית M .

שחקן 2 יכול להבטיח שישלם לכל היותר 1 באמצעות האסטרטגיה האופימלית R .

נשים לב $s = (M, R)$ גם שיווי משקל נאש של המשחק.

5.4 משפט המקסמין

משפט 5.5 משפט המקסמין

יהי $G = (\{I, II\}, \{S_I, S_{II}\}, \{u_1, u_2\})$ משחק שני משחקים סכום אפס. אם $\underline{v}$ הערך המקסמין ואם $\bar{v}$ הערך המינמקס אז

$$\underline{v} \leq \bar{v}.$$

הוכחה: תהי A המטריצה של המשחק. אז

$$\underline{v} = \max_i \min_j A_{ij}, \quad \bar{v} = \min_j \max_i A_{ij}.$$

נשים לב כי לכל i , מתקיים $\min_j A_{ij} \leq A_{ij}$,

ולכל j , מתקיים $\max_i A_{ij} \geq A_{ij}$. מכאן

$$\min_j A_{ij} \leq A_{ij} \leq \max_i A_{ij}$$

ולכן

$$\min_j A_{ij} \leq \max_i A_{ij} \quad (*)$$

נשים לב כי הצד ימין לא תלוי על i . ז"א משוואה (*) מתקיימת לכל i . בפרט, ניתן לקחת את ה- i אשר ממקסם את הצד ימין והרי נקבל

$$\max_i \min_j A_{ij} \leq \max_i A_{ij} \quad (\#)$$

כעת נשים לב כי הצד שמאל לא תלוי על j . ז"א משוואה (#) מתקיימת לכל j . בפרט, ניתן לקחת את ה- j אשר ממזער את הצד ימין והרי נקבל

$$\max_i \min_j A_{ij} \leq \min_j \max_i A_{ij}$$

מש"ל. ■

5.5 משפט השקילות בין שיווי משקל לבין אסטרטגיה אופטימלית

משפט 5.6

יהי $G = (\{I, II\}, \{S_I, S_{II}\}, \{u_1, u_2\})$ משחק שני משחקים סכום אפס. אם קיים ערך v של המשחק G , ואם $s^* = (s_1^*, s_2^*)$ וקטור אסטרטגיות אופטימליות, אז $s^* = (s_1^*, s_2^*)$ הוא שיווי משקל וגם $u(s^*) = (v, -v)$.

הוכחה: אם נניח ש- s_1^* היא אסטרטגיה אופטימלית לשחקן 1 במשחק שערכו v אז $\min_{s_2 \in S_{II}} u(s_1^*, s_2) = v$, ולכן לכל $s_2 \in S_{II}$ מתקיים

$$u(s_1^*, s_2) \geq v.$$

באותה מידה אם נניח ש- s_2^* היא אסטרטגיה אופטימלית לשחקן 2 במשחק שערכו v אז $\max_{s_1 \in S_I} u(s_1, s_2^*) = v$, ולכן לכל $s_1 \in S_I$ מתקיים

$$u(s_1, s_2^*) \leq v.$$

לסיכום, אם s_1^*, s_2^* אסטרטגיות אופטימליות אז

$$u(s_1^*, s_2) \geq v \quad \forall s_2 \in S_{II}, \quad (*)1$$

$$u(s_1, s_2^*) \leq v \quad \forall s_1 \in S_I. \quad (*)2$$

על ידי הצבת s_2^* במשוואה $(*)1$, נקבל כי $u(s_1^*, s_2^*) \geq v$.

על ידי הצבת s_1^* במשוואה $(*)2$, נקבל כי $u(s_1^*, s_2^*) \leq v$.

לכן

$$v = u(s_1^*, s_2^*).$$

נציב זאת במשוואות $(*)1$ ו- $(*)2$ ונקבל

$$u(s_1^*, s_2) \geq u(s_1^*, s_2^*) \Rightarrow -u_2(s_1^*, s_2) \geq -u_2(s_1^*, s_2^*) \Rightarrow u_2(s_1^*, s_2^*) \geq u_2(s_1^*, s_2).$$

$$\forall s_2 \in S_{II} \text{ ו-}$$

$$u(s_1, s_2^*) \leq u(s_1^*, s_2^*) \Rightarrow u_1(s_1, s_2^*) \leq u_1(s_1^*, s_2^*) \Rightarrow u_1(s_1^*, s_2^*) \geq u_1(s_1, s_2^*).$$

$$\forall s_1 \in S_I.$$

לכן (s_1^*, s_2^*) הוא שיווי משקל עם תשלום $(v, -v)$.

משפט 5.7

במשחק שני שחקנים סכום אפס, אם $s^* = (s_1^*, s_2^*)$ הוא שיווי משקל, אזי יש למשחק ערך $v = u(s_1^*, s_2^*)$ והאסטרטגיות $s^* = (s_1^*, s_2^*)$ הן אסטרטגיות אופטימליות.

הוכחה: מכיוון ש- (s_1^*, s_2^*) הוא שיווי משקל, שום שחקן אינו יכול להרוויח על ידי סטייה:

$$u_1(s_1, s_2^*) \leq u_1(s_1^*, s_2^*) \Rightarrow u(s_1, s_2^*) \leq u(s_1^*, s_2^*) \quad \forall s_1 \in S_I, \quad (\#1)$$

$$u_2(s_1^*, s_2) \leq u_2(s_1^*, s_2^*) \Rightarrow -u_2(s_1^*, s_2) \geq -u_2(s_1^*, s_2^*) \Rightarrow u(s_1^*, s_2) \geq u(s_1^*, s_2^*) \quad \forall s_2 \in S_{II}. \quad (\#2)$$

נסמן $v = u(s_1^*, s_2^*)$ ונוכיח כי v אמנם ערך המשחק.

ממשוואה $(\#2)$ נקבל

$$u(s_1^*, s_2) \geq v \quad \forall s_2 \in S_{II} \Rightarrow \min_{s_2 \in S_{II}} u(s_1^*, s_2) \geq v \Rightarrow \max_{s_1 \in S_I} \min_{s_2 \in S_{II}} u(s_1, s_2) \geq v \Rightarrow \underline{v} \geq v.$$

ממשוואה $(\#1)$ נקבל

$$u(s_1, s_2^*) \leq v \quad \forall s_1 \in S_I \Rightarrow \max_{s_1 \in S_I} u(s_1, s_2^*) \leq v \Rightarrow \min_{s_2 \in S_{II}} \max_{s_1 \in S_I} u(s_1, s_2) \leq v \Rightarrow \bar{v} \leq v.$$

מכיוון ש- $\underline{v} \leq \bar{v}$ מתקיים תמיד אזי

$$v \leq \underline{v} \leq \bar{v} \leq v .$$

ולפיכך בהכרח

$$\underline{v} = v = \bar{v} .$$

הגדרה 5.7 נקודת אוכף

במשחק שני שחקנים סכום אפס, זוג אסטרטגיות (s_1^*, s_2^*) נקרא **נקודת אוכף** של הפונקציה $u : S_1 \times S_2 \rightarrow \mathbb{R}$ אם

$$\begin{aligned} u(s_1^*, s_2^*) &\geq u(s_1, s_2^*) & \forall s_1 \in S_I , \\ u(s_1^*, s_2^*) &\leq u(s_1^*, s_2) & \forall s_2 \in S_{II} . \end{aligned}$$

במילים אחרות, $u(s_1^*, s_2^*)$ הוא המספר הגדול ביותר בעמודה s_2^* והקטן ביותר בשורה s_1^* .

אם אנחנו רושמים את $u(s_1, s_2)$ בהצגת מטריצה:

$$A_{ij} = u(s_{1,i}, s_{2,j})$$

אז הזוג אסטרטגיות (s_i^*, s_j^*) הוא נקודת אוכף אם

$$\begin{aligned} A_{i^*j^*} &\geq A_{ij^*} \quad \forall i , \\ A_{i^*j^*} &\leq A_{i^*j} \quad \forall j . \end{aligned}$$

משפט 5.8 יחס בין נקודת אוכף וקטור אסטרטגיות

במשחק שני שחקנים סכום אפס. $u(s_1^*, s_2^*)$ היא נקודת אוכף אם ורק אם

- s_1^* היא אסטרטגיה אופטימלית לשחקן 1,
- s_2^* היא אסטרטגיה אופטימלית לשחקן 2.

במקרה זה $u(s_1^*, s_2^*)$ הוא ערך המשחק.

ניסוח חלופי של המשפט:

$$\left. \begin{aligned} A_{i^*j^*} &\geq A_{ij^*} \quad \forall i \\ A_{i^*j^*} &\leq A_{i^*j} \quad \forall j \end{aligned} \right\} \Rightarrow \max_i \min_j A_{ij} = \min_j \max_i A_{ij} = v$$

הוכחה: יהי G משחק שני שחקנים סכום אפס. נניח כי (s_1^*, s_2^*) נקודת אוכף:

$$u(s_1^*, s_2^*) \geq u(s_1, s_2^*) \quad \forall s_1 \in S_I , \quad (1^*)$$

$$u(s_1^*, s_2^*) \leq u(s_1^*, s_2) \quad \forall s_2 \in S_{II} . \quad (2^*)$$

(1*) מתקיים אם ורק אם

$$u(s_1^*, s_2^*) \geq \max_{s_1 \in S_I} u(s_1, s_2^*) \geq \min_{s_2 \in S_{II}} \max_{s_1 \in S_I} u(s_1, s_2) = \bar{v} .$$

(2*) מתקיים אם ורק אם

$$u(s_1^*, s_2^*) \leq \min_{s_2 \in S_{II}} u(s_1^*, s_2) \leq \max_{s_1 \in S_I} \min_{s_2 \in S_{II}} u(s_1, s_2) = \underline{v} .$$

לפי משפט משפט המקסמין 5.5: $\underline{v} \leq \bar{v}$. לכן

$$u(s_1^*, s_2^*) \leq \underline{v} \leq \bar{v} = u(s_1^*, s_2^*) \Rightarrow \underline{v} = \bar{v} = v.$$

