

חדו"א 2 להנדסת תוכנה

מועד א'

מרצים: ד"ר אלכס קגנוביץ, ד"ר שי סרוסי.

תשפ"ב סמסטר ב'

השאלון מכיל 12 עמודים (כולל עמוד זה).

בהצלחה!**הנחיות למדור בחינות שאלוני בחינה**

- לשאלון הבחינה יש לצרף מחברת.
- ניתן להשתמש במחשבון מדעי לא גרפי עם צג קטן.

חומר עזר

- דפי נוסחאות של הקורס (7 עמודים בפורמט A4) מצורפים לשאלון.

אחר / הערות יש לענות על השאלות באופן הבא:

- יש לנמק היטב כל שלב של פתרון. תשובה ללא הסבר וללא נימוק, אפילו נכונה, לא תתקבל.
- שאלות 1,2 - יש לענות על כל השאלות!
- שאלות 3,4,5,6 - יש לענות **שלוש** שאלות בלבד מתוך **ארבע**.
- שאלות 7,8 - יש לענות על שאלה **אחת** בלבד מתוך **שתיים**.

שאלות 2 – 1 חובה

שאלה 1 (24 נק')

נתונה הפונקציה $f(x, y) = 2x^3 + y^2 - 2xy - 4x + 3$

א. (10 נק') מצאו נקודות קיצון מקומיות של הפונקציה.

ב. (14 נק') בתחום הסגור המוגבל ע"י המשולש שקודקדיו $A(0, 0), B(2, 0), C(0, 3)$ מצאו את הערך הגדול ביותר והערך הקטן ביותר של הפונקציה.

שאלה 2 (18 נק')

א. (9 נק') שרטטו את תחום האינטגרציה, שנו את סדר האינטגרציה וחשבו (בכל דרך אפשרית):

$$\int_{-1}^0 dy \int_{\frac{1}{e}}^{e^y} dx + \int_0^{1-\frac{1}{e}} dy \int_{y+\frac{1}{e}}^1 dx$$

ב. (9 נק') פתרו 3 מתוך 4 הסעיפים הבאים.

תהינה $(a_n)_{n=1}^{\infty}$ סדרה מתבדרת ו- $(b_n)_{n=1}^{\infty}$ סדרה מתבדרת. הוכיחו או הפריכו:

א. הסדרה $(a_n + b_n)_{n=1}^{\infty}$ מתבדרת (תמיד).

ב. הסדרה $(a_n \cdot b_n)_{n=1}^{\infty}$ מתבדרת (תמיד).

ג. הסדרה $(a_n + b_n)_{n=1}^{\infty}$ מתכנסת (תמיד).

ד. הסדרה $(a_n \cdot b_n)_{n=1}^{\infty}$ מתכנסת (תמיד).

פתרו 3 מבין השאלות 3-6

שאלה 3 (16 נק')

(א) (8 נק') מצאו את נקודת החיתוך של הישר העובר דרך הנקודות $A(1, 2, 3)$ ו- $B(0, 1, 3)$ עם המישור העובר דרך הנקודות $C(2, 0, 4)$, $D(1, 1, 1)$, $E(3, 4, 5)$.

(ב) (8 נק') נתונה הפונקציה $z = e^{y - \cos x}$.

1. (5 נק') מצאו את משוואת המישור המשיק לגרף הפונקציה בנקודה שבה $(x, y) = (\frac{\pi}{2}, 1)$.

2. (3 נק') אפיינו את קו הגובה למשטח $z = e^{y - \cos x}$ המתאים לקבוע $c = 1$. ציירו את קו הגובה במישור xy .

שאלה 4 (16 נק')

(א) (10 נק') חשבו את נפח הגוף החסום ע"י המשטחים

$$x = 0, \quad x = 2, \quad y = x^2, \quad x + y = 12, \quad z = 0, \quad z = x^2 + 2y$$

ציירו את תחום האינטגרציה במישור xy . ציירו את הגוף במערכת הצירים xyz .

(ב) 1. (3 נק') מצאו לאיזה ערך של הפרמטר a הישר

$$\begin{cases} 2x + 3y - z = -21 \\ x - y + 2z = 12 \end{cases}$$

יהיה מקביל למישור $x + 2y + az = 2022$.

2. (3 נק') עבור הערך של a שמצאתם בסעיף הקודם, חשבו את מרחק הישר מהמישור.

שאלה 5 (16 נק')

(א) (12 נק') מצאו את תחום ההתכנסות של הטור

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{2^n(n^3 + 17)}{5^n n^4} (2x + 5)^n$$

ב) (4 נק') חשבו את האינטגרל הכפול

$$\iint_D 10 \, dx \, dy$$

כאשר $D = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 \mid (x - 3)^2 + (y - 6)^2 \leq 9\}$
רמז: חישבו על המשמעות הגאומטרית.

שאלה 6 (16 נק')

נתונה הפונקציה $z(x, y) = \ln(x^2 - y) + 3e^{xy}$:

(א) (3 נק') מצאו את תחום ההגדרה של הפונקציה וציירו תחום זה במישור.

(ב) (5 נק') מצאו את הנגזרת הכיוונית $\frac{\partial z}{\partial MO}$ בנקודה $M(1, 0)$ כאשר $O(0, 0)$.

(ג) (4 נק') מצאו את הכיוון בו הנגזרת הכיוונית בנקודה $M(1, 0)$ מקבלת את ערכה המינימלי וחשבו את הנגזרת המינימלית. האם קיים כיוון בו הנגזרת המכוונת בנקודה $M(1, 0)$ שווה ל-7?

(ד) (4 נק') מצאו את משוואת הישר הנורמל למשטח $z(x, y) = \ln(x^2 - y) + 3e^{xy}$ בנקודה עליו שבה $x = 1, y = 0$.

פתרו 2 מבין השאלות 7-8

שאלה 7 (10 נק')

על העקומה $(y - \cos x)^2 + |z + 1| = 0$ מצאו את הנקודות הקרובות ביותר לעקומה $|y - 2x - 5| + \sqrt{z - 3} = 0$.

שאלה 8 (10 נק')

מצאו את הנקודה הנמוכה ביותר והנקודה הגבוהה ביותר על העקומה המוגדרת של שני המשטחים:

$$\begin{cases} z = 2x^2 + y^2 - 4y, \\ (x - 1)^2 + (y - 2)^2 = 3^2. \end{cases}$$

מבחן דלמבר: נתון הטור $\sum_{k=0}^{\infty} a_k$. וקיים הגבול $q = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{a_{n+1}}{a_n}$.
אם $q < 1$ הטור מתכנס. אם $q > 1$ הטור מתבדר. אם $q = 1$ המבחן לא נותן תשובה.

מבחן קושי: נתון הטור $\sum_{k=0}^{\infty} a_k$. וקיים הגבול $q = \lim_{n \rightarrow \infty} (a_n)^{1/n}$.
אם $q < 1$ הטור מתכנס. אם $q > 1$ הטור מתבדר. אם $q = 1$ המבחן לא נותן תשובה.

רדיוס התכנסות: לכל טור חזקות $\sum_{n=1}^{\infty} a_n x^n$ קיים $R \geq 0$ עבורו הטור מתכנס לכל $-R < x < R$ ומתבדר לכל $x > R$ ו- $x < -R$.

נוסחת דלמבר לרדיוס התכנסות:

$$R = \lim_{n \rightarrow \infty} \left| \frac{a_n}{a_{n+1}} \right|.$$

נוסחת קושי לרדיוס התכנסות:

$$R = \lim_{n \rightarrow \infty} \left(\frac{1}{a_n} \right)^{1/n}.$$

טור טיילור עבור הפונקציה $f(x)$:

$$\sum_{n=0}^{\infty} \frac{f^{(n)}(a)}{n!} (x-a)^n.$$

טורי מקלורן לפונקציות בסיסיות:

$\frac{1}{1-x} = 1 + x + x^2 + \dots + x^n + \dots$	$(-1 < x < 1)$
$e^x = 1 + x + \frac{x^2}{2!} + \dots + \frac{x^n}{n!} + \dots$	$(-\infty < x < \infty)$
$\sin x = x - \frac{x^3}{3!} + \dots + \frac{(-1)^n x^{2n+1}}{(2n+1)!} + \dots$	$(-\infty < x < \infty)$
$\cos x = 1 - \frac{x^2}{2!} + \dots + \frac{(-1)^n x^{2n}}{(2n)!} + \dots$	$(-\infty < x < \infty)$

הנדסה אנליטית:

$$V = \frac{1}{6} (\overline{DA} \times \overline{DB}) \cdot \overline{DC}$$

נפח של פירמידה משולשת $ABCD$:

$$\frac{|Ax_0 + By_0 + Cz_0 + D|}{\sqrt{A^2 + B^2 + C^2}}$$

מרחק מהנקודה (x_0, y_0, z_0) למישור $Ax + By + Cz + D = 0$:

$$d = \frac{|\overline{MN} \times a|}{|a|}$$

מרחק מהנקודה M לישר העובר דרך הנקודה N במקביל לווקטור a :

$$d = \frac{|\overline{MN} \cdot (a \times b)|}{|a \times b|}$$

מרחק בין שני ישרים מצטלבים שעוברים דרך נקודות M ו- N במקביל לווקטורים a ו- b :

משוואת המישור העובר דרך הנקודה $M(x_0, y_0, z_0)$ במאונך ל ווקטור נורמל $n(A, B, C)$:
 $A(x - x_0) + B(y - y_0) + C(z - z_0) = 0$.

הצגה פרמטרית של הישר העובר דרך הנקודה (x_0, y_0, z_0) : במקביל לווקטור $a(l, m, n)$
 $x = x_0 + lt$, $y = y_0 + mt$, $z = z_0 + nt$, $-\infty < t < \infty$.

משוואת מישור המשיק למשטח $f(x, y, z) = 0$ בנקודה $M(x_0, y_0, z_0)$:
 $f'_x(M_0)(x - x_0) + f'_y(M_0)(y - y_0) + f'_z(M_0)(z - z_0)$

נגזרת מכוונת של $z(x, y)$ בנקודה M_0 ובכיוון של וקטור a :
 $\frac{dz(M_0)}{da} = \frac{\nabla z(M_0) \cdot a}{|a|}$

קריטריון לבדיקת קיום אקסטרמום לוקלי של $f(x)$:
 $\Delta(M) = f''_{xx}(M) \cdot f''_{yy}(M) - (f''_{xy}(M))^2$

פונקצית לגרנז' למציאת אקסטרמום של $f(x, y)$ בתנאי $\phi(x, y)$:
 $L(x, y) = f(x, y) + \lambda \phi(x, y)$

אינטגרלים כפולים:

מעבר לקואורדינטות קוטביות:
 $\iint_D f(x, y) dx dy = \iint_D f(r \cos \theta, r \sin \theta) r dr d\theta$

חישוב המסה m ומרכז המסה (x_c, y_c) של "גוף מישורי" D בעל צפיפות $\rho(x, y)$:
 $m = \iint_D \rho(x, y) dx dy$, $x_c = \frac{1}{m} \iint_D x \rho(x, y) dx dy$, $y_c = \frac{1}{m} \iint_D y \rho(x, y) dx dy$

חישוב של אינטגרל קווי מסוג ראשון:

אם המסלול L מוגדר באופן $y = y(x)$:
 $\int_L f(x, y) dl = \int_a^b f(x, y) \sqrt{1 + y'(x)^2} dx$

אם המסלול L מוגדר באופן פרמטרי:
 $\int_L f(x, y) dl = \int_{t_1}^{t_2} f(x(t), y(t)) \sqrt{x'(t)^2 + y'(t)^2} dt$

נוסחת גרין:
 $\oint_L P(x, y) dx + Q(x, y) dy = \iint_D (Q'_x - P'_y)$

נגזרות:

1. $(c)' = 0$
2. $(x^n)' = nx^{n-1}$
3. $(a^x)' = a^x \cdot \ln a$
4. $(\log_a x)' = \frac{1}{x \ln a}$
5. $(\sin x)' = \cos x$
6. $(\cos x)' = -\sin x$
7. $(\tan x)' = \frac{1}{\cos^2 x}$
8. $(\cot x)' = \frac{-1}{\sin^2 x}$
9. $(\arctan x)' = \frac{1}{1 + x^2}$
10. $(\arcsin x)' = \frac{1}{\sqrt{1 - x^2}}$
11. $(\arccos x)' = \frac{-1}{\sqrt{1 - x^2}}$
12. $(\operatorname{arccot} x)' = \frac{-1}{a + x^2}$

$$(uv)' = u'v + uv' , \quad \left(\frac{u}{v}\right)' = \frac{u'v - uv'}{v^2} , \quad (f(g(x)))' = f'(g(x)) \cdot g'(x) .$$

אינטגרלים:

$$\begin{array}{lll} \int dx = x & \int (ax+b)^n dx = \frac{(ax+b)^{n+1}}{a(n+1)} \quad (n \neq -1) & \int \frac{1}{ax+b} dx = \frac{1}{a} \cdot \ln |ax+b| \\ \int \cos(ax) dx = \frac{1}{a} \cdot \sin(ax) & \int \sin(ax) dx = \frac{-1}{a} \cdot \cos(ax) & \int a^x dx = \frac{a^x}{\ln a} \\ \int \frac{dx}{x^2+a^2} = \frac{1}{a} \cdot \arctan\left(\frac{x}{a}\right) & \int \frac{dx}{\sin^2 x} = -\cot x & \int \frac{dx}{\cos^2 x} = \tan x \\ \int \frac{dx}{a^2-x^2} = \frac{1}{2a} \ln \left| \frac{x+a}{x-a} \right| & \int \frac{dx}{\sqrt{x^2+p}} = \ln \left| x + \sqrt{x^2+p} \right| & \int \frac{dx}{\sqrt{a^2-x^2}} = \arcsin\left(\frac{x}{a}\right) \\ \int \frac{f'(x)dx}{\sqrt{f(x)}} = 2\sqrt{f(x)} & \int \frac{x dx}{x^2+a} = \frac{\ln|x^2+a|}{2} & \int \frac{f'(x)dx}{f(x)} = \ln|f(x)| \\ \int \cot x dx = \ln|\sin x| & \int \tan x dx = -\ln|\cos x| & \int e^{ax} dx = \frac{e^{ax}}{a} \end{array}$$

$$\int u \cdot v' dx = u \cdot v - \int u'v dx \quad \text{אינטגרציה בחלקים:}$$

הצבה אוניברסלית

$$\int f(\sqrt{a^2-x^2}) dx \Rightarrow x = a \sin t, \quad \int f(\sqrt{a^2+x^2}) dx \Rightarrow x = a \tan t, \quad \int f(\sqrt{x^2-a^2}) dx \Rightarrow x = \frac{a}{\sin t},$$

$$\tan\left(\frac{x}{2}\right) = t, \quad x = 2 \arctan(t), \quad dx = \frac{2 dt}{1+t^2}, \quad \sin x = \frac{2t}{1+t^2}, \quad \cos x = \frac{1-t^2}{1+t^2}.$$

נוסחאות טריגונומטריות

$$\begin{array}{lll} \sin^2 x + \cos^2 x = 1 & \sin^2 x = 1 - \cos^2 x & \cos^2 x = 1 - \sin^2 x \\ \tan x = \frac{\sin x}{\cos x} & \cot x = \frac{1}{\tan x} & 1 + \tan^2 x = \frac{1}{\cos^2 x} \\ 1 + \cot^2 x = \frac{1}{\sin^2 x} & \cos\left(\frac{\pi}{2} - x\right) = \sin x & \sin\left(\frac{\pi}{2} - x\right) = \cos x \end{array}$$

$$\tan\left(\frac{\pi}{2} - x\right) = \cot x$$

$$\sin(x+y) = \sin x \cos y + \cos x \sin y$$

$$\cos(x+y) = \cos x \cos y - \sin x \sin y$$

$$\sin(2x) = 2 \sin x \cos x$$

$$\cos(2x) = \cos^2 x - \sin^2 x$$

$$\sin^2 x = \frac{1 - \cos(2x)}{2}$$

$$\cos^2 x = \frac{1 + \cos(2x)}{2}$$

$$\sin x + \sin y = 2 \sin\left(\frac{x+y}{2}\right) \cos\left(\frac{x-y}{2}\right)$$

$$\sin x - \sin y = 2 \sin\left(\frac{x-y}{2}\right) \cos\left(\frac{x+y}{2}\right)$$

$$\cos x + \cos y = 2 \cos\left(\frac{x+y}{2}\right) \cos\left(\frac{x-y}{2}\right)$$

$$\cos x - \cos y = -2 \sin\left(\frac{x+y}{2}\right) \sin\left(\frac{x-y}{2}\right)$$

$$\sin x \cdot \sin y = \frac{\cos(x-y) - \cos(x+y)}{2}$$

$$\cos x \cdot \cos y = \frac{\cos(x+y) + \cos(x-y)}{2}$$

$$\sin x \cdot \cos y = \frac{\sin(x+y) + \sin(x-y)}{2}$$

סדרה חשבונית:

$$\{a_1, a_1 + d, a_1 + 2d, a_1 + 3d, \dots\}$$

איבר ה- n של סדרה חשבונית:

$$a_n = a_1 + (n - 1)d$$

כאשר a_1 איבר הראשון ו- d הפרש הסדרה.

סכום של סדרה חשבונית:

$$\sum_{n=1}^N a_n = \frac{1}{2} (a_1 + a_N) = \frac{1}{2} (2a_1 + (N - 1)d).$$

סדרה הנדסית:

$$\{a_1, a \cdot a_1, q^2 \cdot a_1, q^3 \cdot a_1, \dots\}.$$

אביר ה- n של סדרה הנדסית:

$$a_n = a_1 q^{n-1}$$

כאשר a_1 איבר הראשון ו- q מנת הסדרה.

סכום של סדרה הנדסית:

$$\sum_{n=1}^N a_n = \frac{a_1 (1 - q^N)}{1 - q}.$$

הסכום אינסופי של סדרה הנדסית:

$$\sum_{n=1}^{\infty} a_1 q^{n-1} = \lim_{N \rightarrow \infty} \frac{a_1 (1 - q^N)}{1 - q} = \begin{cases} \text{מתבדר} & |q| > 1 \\ \frac{a_1}{1 - q} & |q| < 1 \end{cases}.$$

מבחן האינטגרל להתכנסות של טורים חיוביים:

אם $f(x)$ חיובית ומונוטונית יורדת לכל $x \geq 1$.

$$\int_1^{\infty} dx f(x) \leq S \leq \int_1^{\infty} dx f(x) + f(1) \quad \text{אם } S = \sum_{k=1}^{\infty} f(k) \text{ מתכנס ומתקיים}$$

$$\int_1^{\infty} dx f(x) \text{ מתבדר אז } \sum_{k=1}^{\infty} f(k) \text{ מתבדר.}$$

התכנסות של טור ההרמוניה הכללי:

$$\sum_{n=0}^{\infty} \frac{1}{n^k} \begin{cases} k > 1 & \text{מתכנס} \\ k \leq 1 & \text{מתבדר} \end{cases}$$

מבחן השוואה:

יהיו a_n, b_n סדרות חיוביות כך ש- $a_n \leq b_n$ לכל $n \geq k$.

$$\sum_{n=1}^{\infty} a_n \text{ מתכנס אז } \sum_{n=1}^{\infty} b_n \text{ מתכנס.}$$

$$\sum_{n=1}^{\infty} b_n \text{ מתבדר אז } \sum_{n=1}^{\infty} a_n \text{ מתבדר.}$$

מבחן השוואה הגבולי:

יהיו a_n, b_n סדרות חיוביות כך ש- $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{a_n}{b_n} = L \neq 0$ עבור L סופי.

$$\sum_{n=1}^{\infty} a_n \text{ מתכנס אם ורק אם } \sum_{n=1}^{\infty} b_n \text{ מתכנס.}$$

$$\sum_{n=1}^{\infty} a_n \text{ מתבדר אם ורק אם } \sum_{n=1}^{\infty} b_n \text{ מתבדר.}$$

התכנסות של טורים כלליים:

$$\sum_{k=1}^{\infty} |a_k| \text{ מתכנס אז } \sum_{k=1}^{\infty} a_k \text{ מתכנס, ואומרים שהטור } \sum_{k=1}^{\infty} a_k \text{ מתכנס בהחלט (absolutely convergent).}$$

$$\sum_{k=1}^{\infty} |a_k| \text{ מתבדר אבל } \lim_{n \rightarrow \infty} |a_n| = 0 \text{ יש להמשיך לחקור את הטור } \sum_{k=1}^{\infty} a_k \text{ ע"י מבחן לייבניץ (Leibniz).}$$

$$\sum_{k=1}^{\infty} |a_k| \text{ מתבדר אבל הטור } \sum_{n=1}^{\infty} a_n \text{ מתכנס, אומרים שהטור } \sum_{n=1}^{\infty} a_n \text{ מתכנס בתנאי (conditionally convergent).}$$

מבחן לייבניץ (Leibniz): נתון טור מחליף סימן $\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^{n+1} a_n$. אם הסדרה מקיימת את התנאים הבאים:

$$(1) a_n > 0, (2) \{a_n\} \text{ מונוטונית יורדת, } (3) \lim_{n \rightarrow \infty} a_n = 0, \text{ אז הטור מתכנס.}$$

הנדסה אנליטית:

$$\overline{M_1 M_2} = (x_2 - x_1, y_2 - y_1, z_2 - z_1) \quad \text{קואורדינטות של וקטור } \overline{M_1 M_2}:$$

$$|a| = \sqrt{a_1^2 + a_2^2 + a_3^2} \quad \text{גודל (אורך, מודול) של וקטור } a = (a_1, a_2, a_3):$$

$$a = a_1 i + a_2 j + a_3 k \quad \text{הצגה של וקטור } a = (a_1, a_2, a_3) \text{ על-ידי הבסיס } i, j, k:$$

$$e_a = \frac{a}{|a|} = (\cos \alpha, \cos \beta, \cos \gamma) \quad \text{וקטור יחידה של וקטור } a \text{ וקוסינוסי הכיוון:}$$

$$b \parallel a \Leftrightarrow \exists t \in \mathbb{R} | b = ta \quad \text{תנאי קולינאריות של שני וקטורים } a, b:$$

$$(a_1, a_2, a_3) \cdot (b_1, b_2, b_3) = a_1 b_1 + a_2 b_2 + a_3 b_3 \quad \text{מכפלה סקלרית:}$$

$$\cos \theta = \frac{a \cdot b}{|a||b|} = \frac{a_1 b_1 + a_2 b_2 + a_3 b_3}{\sqrt{a_1^2 + a_2^2 + a_3^2} \sqrt{b_1^2 + b_2^2 + b_3^2}} \quad \text{זווית בין שני וקטורים:}$$

$$a \perp b \Leftrightarrow a \cdot b = 0 \quad \text{תנאי מאונכות של שני וקטורים:}$$

$$(a_1, a_2, a_3) \times (b_1, b_2, b_3) = \begin{vmatrix} i & j & k \\ a_1 & a_2 & a_3 \\ b_1 & b_2 & b_3 \end{vmatrix} \quad \text{מכפלה וקטורית:}$$

$$S_{ABC} = \frac{1}{2} |\overline{AB} \times \overline{AC}| \quad \text{שטח של משולש } ABC:$$

$$(a \times b) \cdot c = a \cdot (b \times c) = \begin{vmatrix} a_1 & a_2 & a_3 \\ b_1 & b_2 & b_3 \\ c_1 & c_2 & c_3 \end{vmatrix} \quad \text{מכפלה מעורבת:}$$

$$(a \times b) \cdot c = 0 \quad \text{תנאי קופלנריות של 3 וקטורים } a, b, c:$$

גרדיאנט של הפונקציה $z = f(x, y)$ בנקודה $M_0(x_0, y_0)$: $\nabla z(M_0) = (f'_x(x_0, y_0), f'_y(x_0, y_0))$

קריטריון לבדיקת קיום אקסטרמום לוקלי של $f(x)$:
 בנקודה קריטית שבה $f'_x = 0, f'_y = 0$:
 אם $\Delta(M) > 0$ אזי יש אקסטרמום לוקלי בנקודה M .

• אם $\Delta(M) > 0$ ו- $f''_{xx}(M) > 0$ יש מינימום בנקודה M

• אם $\Delta(M) > 0$ ו- $f''_{xx}(M) < 0$ יש מקסימום בנקודה M .

• אם $\Delta(M) < 0$ אז אין אקסטרמום בנקודה M .

• אם $\Delta(M) = 0$ הקריטריון לא נותן תשובה ויש לחקור את המצב בדרכים נוספות.

נפח V של גוף החסום מלמטה על ידי משטח $z = f_1(x, y)$ מלמעלה ידי משטח $z = f_2(x, y)$ ומצדדים על ידי המשטח הגלילי שמדריכו הוא שפת התחום D וקו יוצר מקביל לציר ה- z :

$$V = \iint_D (f_2(x, y) - f_1(x, y)) dx dy .$$

טור טיילור של $f(x)$ סביב הנקודה $x = a$:

$$f(a) + f'(a)(x - a) + \frac{f''(a)}{2!}(x - a)^2 + \dots + \frac{f^{(n)}(a)}{n!}(x - a)^n + \dots$$

נוסחאות אלגבריות

$$\begin{aligned} (a \pm b)^2 &= a^2 \pm 2ab + b^2, & a^2 - b^2 &= (a - b)(a + b), \\ (a + b)^3 &= a^3 + 3a^2b + 3ab^2 + b^3, & (a - b)^3 &= a^3 - 3a^2b + 3ab^2 - b^3, \\ a^3 \pm b^3 &= (a \pm b)(a^2 \mp ab + b^2) \end{aligned}$$

תכונות בסיסיות של חזקות בהנחה ש $a > 0, b > 0$:

$$\begin{aligned} a^n \cdot a^m &= a^{m+n}, & \frac{a^n}{a^m} &= a^{n-m}, & (a^n)^m &= a^{n \cdot m} = (a^m)^n, & a^n \cdot b^n &= (a \cdot b)^n, & \frac{a^n}{b^n} &= \left(\frac{a}{b}\right)^n, \\ \sqrt[n]{a \cdot b} &= \sqrt[n]{a} \cdot \sqrt[n]{b}, & \sqrt[n]{\frac{a}{b}} &= \frac{\sqrt[n]{a}}{\sqrt[n]{b}}, & a \cdot \sqrt[n]{b} &= \sqrt[n]{a^n b}, & \sqrt[n]{\sqrt[m]{a}} &= \sqrt[n \cdot m]{a}, & \sqrt[n]{a^m} &= \sqrt[n \cdot k]{a^{m \cdot k}}, \\ a^1 &= a, & a^0 &= 1. \end{aligned}$$

תכונות בסיסיות של לוגריתמים $(x > 0, y > 0)$:

$$\begin{aligned} \log_a(xy) &= \log_a x + \log_a y, & \log_a\left(\frac{x}{y}\right) &= \log_a x - \log_a y, & \log_a(x^n) &= n \cdot \log_a x, \\ \log_a(a^n) &= n, & \log_{a^m} x &= \frac{1}{m} \log_a x, & \log_a x &= \log_{a^m} x^m, & \log_a x &= \frac{\log_c x}{\log_c a}. \end{aligned}$$

מקובל להשתמש בסימון $\log$ עבור לוגריתמים עשרוניים:
 מקובל להשתמש בסימון $\ln$ עבור לוגריתמים טבעיים:

$$\begin{aligned} \log(x) &= \log_{10}(x) \\ \ln(x) &= \log_e(x) \end{aligned}$$

כאשר את המספר e מגדירים כגבול

$$e = \lim_{n \rightarrow \infty} \left(1 + \frac{1}{n}\right)^n \quad e \approx 2.718$$

משוואת המעגל במישור xy עם מרכזו בנקודה (a, b) ורדיוס R :

$$(x - a)^2 + (y - b)^2 = R^2$$

משוואת הספירה במערכת מרחבית xyz :

$$(x - a)^2 + (y - b)^2 + (z - c)^2 = R^2$$

משוואת האליפסה שצירי סימטריה: הם צירי המערכת xy :

$$\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1$$

משוואתה היפרבולה שצירי סימטריה הם צירי המערכת xy :

$$\frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2} = 1$$

תהי $z = f(x, y)$ פונקציה בעלת נגזרות חלקיות f'_x, f'_y רציפות ויהיו $x(t), y(t)$ פונקציות גזירות של משתנה x . אזי קיימת הנגזרת z'_t ומתקיים:

$$z'_t = f'_x x'_t + f'_y y'_t .$$

במקרה $x = x(u, v), y = y(u, v)$ הפונקציה $z = f(x, y)$ הופכת לפונקציה של המשתנים u ו- v ומתקיים:

$$z'_u = f'_x x'_u + f'_y y'_u , \quad z'_v = f'_x x'_v + f'_y y'_v .$$

גזירה של פונקציה $y(x)$ הנתונה בצורה סתומה $f(x, y) = 0$:

$$y'_x = \frac{-f'_x(x, y)}{f'_y(x, y)}$$

פונקציה רציפה $f(M)$ מעל תחום סגור D מקבלת את הערך המקסימלי והערך המינימלי שלה בתחום זה ואת הערכים היא עשויה להשיג בנקודות הקריטיות הנמצאות בתוך התחום D או בשפת התחום.

לכן כדי לחשב את הערכים $\max_{M \in D} f(M)$ ואת $\min_{M \in D} f(M)$ יש:

(א) למצוא את כל הנקודות הקריטיות של $f(M)$ הנמצאות בתוך התחום D

(ב) לחקור יחסית הערכים הקיצוניים את הפונקציה $f(M)$ בשפת התחום.

(ג) להשוות את הערכי הפונקציה בנקודות שהתקבלו בסעיפים א' ו- ב'.

פתרונות

שאלה 1

שאלה 2

שאלה 3

שאלה 4

שאלה 5

שאלה 6

שאלה 7

שאלה 8