חישוביות וסיבוכיות

מועד ג'

ד"ר ירמיהו מילר, .

סמסטר ב, תשפ"ו'

מספר העמוד הנוכחי ומספר העמודים הכולל בשאלון מופיעים בתחתית כל עמוד. בהצלחה!

הנחיות למדור בחינות

שאלוני בחינה

- ☑ לשאלון הבחינה יש לצרף מחברת.
- ☐ לשאלון הבחינה יש לצרף כריכה בלבד.
- ☐ יש להחזיר את השאלון ביחד עם המחברת/כריכה.

שימוש במחשבונים

- ☐ ניתן להשתמש במחשבון.
- ☑ לא ניתן להשתמש במחשבון.

חומר עזר

- ☑ לא ניתן להשתמש בחומר עזר כלל.
- ☐ ניתן להשתמש בחומר עזר/דף נוסחאות, כמפורט:

- ☐ הבחינה עם חומר פתוח – מותר להשתמש בכל חומר עזר מודפס או כתוב.

הנחיות רגילות

נא קראו בעיון את ההנחיות הבאות בטרם תתחילו לפתור את הבחינה. מומלץ לקרוא בקצרה את כלל השאלות לפני שמתחילים לפתור את הבחינה. ניתן לענות על השאלות בכל סדר שתרצו.

1. המבחן כולל 5 שאלות. יש לענות על כולן.
2. שאלות הבחינה שוות משקל - כל שאלה 20 נקודות.
3. כתבו הוכחות מלאות ומפורטות. אל תדלגו על שלבים.
4. המבחן כולל נספחים, לשימושכם. הסתייעו בהם במידת הצורך.
5. הקפידו על כתב יד ברור וקריא.
6. הקפידו לרשום בגדול ובבירור את מספר השאלה / סעיף בראש העמוד.
7. כתבו את פתרונותיכם במחברות שקיבלתם. רק הן נבדקות !
8. ניתן לקחת את השאלון כאשר הבחינה מסתיימת.

בהצלחה!

הנחיות פרטניות למילואימניקים

נא קראו בעיון את ההנחיות הבאות בטרם תתחילו לפתור את הבחינה. מומלץ לקרוא בקצרה את כלל השאלות לפני שמתחילים לפתור את הבחינה. ניתן לענות על השאלות בכל סדר שתרצו.

1. המבחן כולל 5 שאלות. יש לענות על 4 מתוך ה-5 שאלות.
2. שאלות הבחינה שוות משקל - כל שאלה 25 נקודות.
3. מילואימניק יכתוב בדפים שנסרקים - "משויך למתווה המילואים".
4. כתבו הוכחות מלאות ומפורטות. אל תדלגו על שלבים.
5. המבחן כולל נספחים, לשימושכם. הסתייעו בהם במידת הצורך.
6. הקפידו על כתב יד ברור וקריא.
7. הקפידו לרשום בגדול ובבירור את מספר השאלה / סעיף בראש העמוד.
8. כתבו את פתרונותיכם במחברות שקיבלתם. רק הן נבדקות !
9. ניתן לקחת את השאלון כאשר הבחינה מסתיימת.

בהצלחה!

הבחינה

שאלה 1: מכונות טיורינג (20 נקודות)

סעיף א' (10 נקודות)

נתונה השפה הבאה:

$$L = \left\{ w \in \{a,b\}^* \;\middle|\; \#a_w \geqslant \#b_w + 1 \right\}$$

תארו מכונת טיורינג עם סרט יחיד שמכריעה את השפה בעזרת תרשים מצבים בלבד ולא בדרכים אחרות.

סעיף ב' (10 נקודות)

ציירו את התרשים מצבים של מכונת טיורינג דטרמיניסטית עם סרט יחיד, שעבור הקלט x בייצוג אונרי, מחשבת את הפונקציה: $f(x) = (2x) \bmod 3$.

שאלה 2: סגירות של שפות כריעות (20 נקודות)

תהי L שפה. הוכיחו או הפריכו את ע"י דוגמה נגדית את הטענות הבאות:

סעיף א' (10 נקודות)

אם L^R שפה שמוגדרת: $L^R = \left\{ w \in \Sigma^* \;\middle|\; w^R \in L \right\}$ וגם $L \in RE$ אז $L^R \in RE$.

סעיף ב' (10 נקודות)

אם $L \in RE$ וגם $\bar{L} \notin RE$ אזי $L \in RE \backslash R$.

שאלה 3: אי כריעות (20 נקודות)

סעיף א' (8 נקודות)

נתונה השפה הבאה: $L = \left\{ \langle M_1, M_2, w \rangle \;\middle|\; w \in (\ L(M_1) \cup L(M_2)\ ) \right\}$. הוכיחו כי: $L \in RE$.

סעיף ב' (12 נקודות)

הוכיחו כי $L \notin R$ ע"י רדוקציה מ- L_{acc}.

שאלה 4: NP - שלמות (20 נקודות)

לכל אחת מהטענות הבאות, הוכיחו או הפריכו ע"י דוגמה נגדית:

סעיף א' (5 נקודות)
לכל שתי שפות NP- קשות A ו- B, מתקיים $A \leqslant B$.

סעיף ב' (5 נקודות)
לכל מכונת טיורינג M, אם $L(M) \in Co\,RE$ אזי $L(M) \in R$.

סעיף ג' (5 נקודות)
תהי A בעיה NP- קשה ותהי B בעיה NP שלמה. אזי מתקיים $A \leqslant_P B$.

סעיף ד' (5 נקודות)
אם $P = Co\,NP$ אז $\overline{SAT}$ היא NP- שלמה.

שאלה 5: סיבוכיות זמן (20 נקודות)

בעיית סכום התת קבוצה $SUBSETSUM$: בהינתן קבוצת מספרים שלמים $S = \{x_1, x_2, \ldots, x_n\}$ ומספר שלם t, האם קיימת תת קבוצה $Y \subseteq S$ שסכום איבריה הוא בדיוק t.
בעיית סכום התת קבוצה כשפה פורמלית:

$$SUBSETSUM = \left\{ \langle S, t \rangle \;\middle|\; \begin{array}{l} S \text{ קבוצת שלמים, } t \text{ שלם וקיימת תת-קבוצה } Y \subseteq S \text{ כך ש-} \\ t = \sum_{y \in Y} Y \end{array} \right\}$$

בעיית החלוקה ($PARTITION$) מוגדרת באופן הבא:

בהינתן קבוצת מספרים שלמים $A = \{a_1, a_2, \ldots, a_n\}$ האם קיימת חלוקה לשתי קבוצות A_1 ו- A_2 כך ש:

- $A_1 \cap A_2 = \varnothing$
- $A_1 \cup A_2 = A$
- $\sum_{a_i \in A_1} a_i = \sum_{a_i \in A_2} a_i = \frac{1}{2} \sum_{a_i \in A} a_i$

בעיית החלוקה כשפה פורמלית:

$$PARTITION = \left\{ A \subseteq \mathbb{Z} \middle| \exists A_1, A_2 \subseteq A : \left(\left(\sum_{a \in A_1} a = \sum_{a \in A_2} a = \frac{1}{2} \sum_{a \in A} a \right) \wedge (A_1 \cap A_2 = \varnothing) \wedge (A_1 \cup A_2 = A) \right) \right\}$$

הוכיחו כי קיימת רדוקציית התאמה פולינומיאלית מהשפה $SUBSETSUM$ לשפה $PARTITION$. כלומר:

$$SUBSETSUM \leqslant_P PARTITION\ .$$

בשאלה זו עליכם:

סעיף א' (8 נקודות)

להגדיר במפורש את הרדוקציה.

סעיף ב' (6 נקודות)

להראות שהרדוקציה היא רדוקציית התאמה.

סעיף ג' (6 נקודות)

להראות שהרדוקציה פולינומיאלית.

תוכן העניינים

1 מכונות טיורינג 7

2 וריאציות של מכונות טיורינג 8

3 התזה של צ'רץ'-טיורינג 12

4 אי-כריעות 16

5 המחלקות החישוביות R, RE ו- $CoRE$ ותכונותן 17

6 רדוקציות 18

7 סיבוכיות 19

8 רדוקציה פולינומיאלית 20

9 NP שלמות 21

10 בעיית הספיקות (SAT) 21

11 סיווג שפות ידיועות - סיבוכיות 22

12 רדוקציות זמן פולינומיאליות 27

1 מכונות טיורינג

הגדרה 1: מכונת טיורינג

מכונת טיורינג (מ"ט) היא שביעיה $M = (Q, \Sigma, \Gamma, \delta, q_0, q_{\text{acc}}, q_{\text{rej}})$ כאשר:

Q	קבוצת מצבים סופית ולא ריקה	
Σ	א"ב הקלט סופי	$\sqcup \notin \Sigma$
Γ	א"ב הסרט סופי	$\Sigma \cup \{\sqcup\} \subseteq \Gamma$
δ	פונקציית המעברים	$\delta : (Q \backslash \{q_{\text{rej}}, q_{\text{acc}}\}) \times \Gamma \to Q \times \Gamma \times \{L, R\}$
q_0	מצב התחלתי.	
q_{acc}	מצב מקבל יחיד.	
q_{rej}	מצב דוחה יחיד.	

הגדרה 2: קונפיגורציה

בהינתן מכונת טיורינג M ומילה $w \in \Sigma^*$. **קונפיגורציה** בריצה של M על w היא שלושה $(u, q, \sigma, \mathsf{v})$ (או $uq\sigma\mathsf{v}$ לשם קיצור) כאשר:

- $u \in \Gamma^*$: תוכן הסרט לפני הראש (מצד שמאל של הראש).
- $q \in Q$: המצב הנוכחי של המכונת טיורינג.
- $\sigma \in \Gamma$: תוכן הסרט במיקום של הראש, כלומר התו הנקרא במיקום הנוכחי של הראש.
- $\mathsf{v} \in \Gamma^*$: תוכן הסרט אחרי הראש (מצד ימין של הראש).

הגדרה 3: גרירה בצעד אחד

תהי $M = (Q, \Sigma, \Gamma, \delta, q_0, q_{\text{acc}}, q_{\text{rej}})$ מכונת טיורינג, ותהיינה c_1 ו- c_2 קונפיגורציות של M. נסמן

$$c_1 \vdash_M c_2$$

(במילים, c_1 גורר את c_2) אם כשנמצאים ב- c_1 עוברים ל- c_2 בצעד בודד.

הגדרה 4: גרירה בכללי

תהי $M = (Q, \Sigma, \Gamma, \delta, q_0, q_{\text{acc}}, q_{\text{rej}})$ מכונת טיורינג, ותהיינה c_1 ו- c_2 קונפיגורציות של M. נסמן

$$c_1 \vdash_M^* c_2$$

(במילים, c_1 גורר את c_2) אם ניתן לעבור מ- c_1 ל- c_2 ב- 0 או יותר צעדים.

הגדרה 5: קבלה ודחייה של מילה

תהי $M = (Q, \Sigma, \Gamma, \delta, q_0, q_{\text{acc}}, q_{\text{rej}})$ מכונת טיורינג, ו- $w \in \Sigma^*$ מחרוזת. אומרים כי

- M **מקבלת** את w אם $q_0 w \vdash_M^* u\ q_{\text{acc}}\ \sigma\ \mathsf{v}$
- M **דוחה** את w אם $q_0 w \vdash_M^* u\ q_{\text{rej}}\ \sigma\ \mathsf{v}$

עבור $\sigma \in \Gamma$ ו- $u, \mathsf{v} \in \Gamma^*$ כלשהם.

הגדרה 6: הכרעה של שפה

תהי $M = (Q, \Sigma, \Gamma, \delta, q_0, \text{acc}, q_{\text{rej}})$ מכונת טיורינג, ו- $L \subseteq \Sigma^*$ שפה. אומרים כי M **מכריעה** את L אם לכל $w \in \Sigma^*$ מתקיים

- $w \in L \Leftarrow M$ מקבלת את w.
- $w \notin L \Leftarrow M$ דוחה את w.

הגדרה 7: קבלה של שפה

תהי $M = (Q, \Sigma, \Gamma, \delta, q_0, q_{\text{acc}}, q_{\text{rej}})$ מכונת טיורינג, ו- $L \subseteq \Sigma^*$ שפה. אומרים כי M **מקבלת** את L אם לכל $w \in \Sigma^*$ מתקיים

- אם $w \in L$ אז M מקבלת את w.
- אם $w \notin L$ אז M לא מקבלת את w.

במקרה כזה נכתוב ש- $L(M) = L$.

הגדרה 8: מכונת טיורינג שמחשבת פונקציה f

תהי $f : \Sigma_1^* \to \Sigma_2^*$ ותהי $M = (Q, \Sigma, \Gamma, \delta, q_0, q_{\text{acc}}, q_{\text{rej}})$ מכונת טיורינג. אומרים כי M מחשבת את f אם:

- $\Sigma = \Sigma_1$ ו- $\Sigma_2 \subset \Gamma$.
- לכל $w \in \Sigma_1^*$ מתקיים $q_0 w \vdash q_{\text{acc}} f(w)$.

2 וריאציות של מכונות טיורינג

הגדרה 9: מודל חישוב

מודל חישובי = אוסף של מכונות שעבורן מוגדרים המושגים של הכרעה וקבלה של שפות.

הגדרה 10: מודלים שקולים חישובית

יהיו A, B מודלים חישוביים. נאמר כי A ו- B שקולים אם לכל שפה L:

- קיימת מכונה במודל A שמכריעה את L אם"ם קיימת מכונה כזו במודל B.
- קיימת מכונה במודל A שמקבלת את L אם"ם קיימת מכונה כזו במודל B.

הגדרה 11: מכונות שקולות חישובית

שתי מכונות הן שקולות חישובית אם הן מקבלות ודוחות בדיוק את אותן המילים.

משפט 1: מכונת טיורינג עם סרט ימינה בלבד

מודל מכונת טיורינג עם סרט אינסופי לכיוון אחד בלבד (מודל O) שקול למודל אינסופי בשני הכיוונים (מודל T).
כלומר, לכל שפה L:

- יש מכונת טיורינג ממודל O שמקבלת את L אם"ם יש מכונת טיורינג במודל T שמקבלת את L.
- יש מכונת טיורינג ממודל O שמכריעה את L אם"ם יש מכונת טיורינג במודל T שמכריעה את L.

הגדרה 12: מכונת טיורינג מרובת סרטים

מכונת טיורינג מרובת סרטים היא שביעייה:

$$M = (Q, \Sigma, \Gamma, \delta_k, q_0, q_{\text{acc}}, q_{\text{rej}})$$

כאשר Q, Σ, Γ, q_0, q_{acc},q_{rej} מוגדרים כמו מכונת טיורינג עם סרט יחיד (ראו הגדרה 1).
ההבדל היחיד בין מכונת טיורינג עם סרט יחיד לבין מכונת טיורינג מרובת סרטים הוא הפונקצית המעברים.
עבור מטמ"ס הפונקצית המעברים היא מצורה הבאה:

$$\delta_k : (Q \backslash \{q_{\text{acc}}, q_{\text{rej}}\}) \times \Gamma^k \to Q \times \Gamma^k \times \{L, R, S\}^k$$

כאשר k הוא מספר טבעי השווה למספר הסרטים של המכונה.

משפט 2: תכונות של מכונת טיורינג מרובת סרטים

במכונת טיורינג מרובת סרטים:

- יתכנו מספר סרטים.
- מספר הסרטים סופי וקבוע מראש בזמן בניית המ"ט, ואינו תלוי בקלט או במהלך החישוב.
- לכל סרט יש ראש נפרד.
- הפעילות (תנועה וכתיבה) בכל סרט נעשית בנפרד.
  בפרט, הראשים יכולים לזוז בכיוונים שונים בסרטים שונים.
- ישנו בקר מרכזי יחיד, שקובע את הפעילות בכל אחד מהסרטים, על סמך המידע שמתקבל מכל הסרטים.
  לכן, תוכן סרט אחד יכול להשפיע על הפעילות בשאר הסרטים.
- בתחילת החישוב, הקלט נמצא בסרט הראשון ושאר הסרטים ריקים.

משפט 3: מ"ט מרובת סרטים שקולה למ"ט עם סרט יחיד

לכל k, המודל של מ"ט עם k סרטים שקול חישובי למודל של מ"ט עם סרט אחד.

הגדרה 13: מכונת טיורינג אי-דטרמיניסטית

מכונת טיורינג אי-דטרמיניסטית (מ"ט א"ד) היא שביעייה

$$M = (Q, \Sigma, \Gamma, \Delta, q_0, q_{\text{acc}}, q_{\text{rej}})$$

כאשר $Q, \Sigma, \Gamma, q_0, q_{\text{acc}}, q_{\text{rej}}$ מוגדרים כמו במכונת טיורינג דטרמיניסטית (ראו הגדרה 1).
Δ היא פונקצית המעברים

$$\Delta : (Q \backslash \{q_{\text{acc}}, q_{\text{rej}}\}) \times \Gamma \to P\left(Q \times \Gamma \times \{L, R, S\}\right) \ .$$

$$\Delta(q, \alpha) = \{(q_1, a, S) \ , \ (q_2, b, L) \ , \ \ldots\} \ .$$

כלומר, לכל זוג $q \in Q, \alpha \in \Gamma$ ייתכן מספר מעברים אפשריים, 0, 1 או יותר.

- קונפיגורציה של מ"ט א"ד זהה לקונפיגורציה של מ"ט דטרמיניסטית.
- לכל קונפיגורציה ייתכן מספר קונפיגורציות עוקבות.
- לכל מילה $w \in \Sigma^*$ ייתכנו מספר ריצות שונות:
  - ריצות שמגיעות ל- q_{acc}.
  - ריצות שמגיעות ל- q_{rej}.
  - ריצות שלא עוצרות.

הגדרה 14: קבלה ודחייה של מילה ע"י מ"ט אי-דטרמיניסטית

עבור מ"ט לא דטרמיניסטית N ומילה w:

- N **מקבלת** את w אם קיים חישוב של N על w שמגיע למצב מקבל.
- N **דוחה** את w אם כל החישובים של N על w עוצרים במצב דוחה.

הגדרה 15: קבלה ודחייה של שפה ע"י מ"ט אי-דטרמיניסטית

נתונה מ"ט לא דטרמיניסטית N ושפה L:

- N **מכריעה** את L אם N מקבלת את כל המילים ב- L ודוחה את כל המילים שאינן ב- L.
- N **מקבלת** את L אם N מקבלת את כל המילים ב- L ולא מקבלת את כל המילים שאינן ב- L.

משפט 4: מ"ט אי-דטרמיניסטית שקולה למ"ט דטרמיניסטית

לכל מ"ט לא דטרמיניסטית קיימת מ"ט אי-דטרמיניסטית שקולה.

הגדרה 16: שפה של מכונת טיורינג אי דטרמיניסטית

השפה של מ"ט א"ד N היא

$$L(N) = \left\{ w \in \Sigma^* \;\middle|\; \exists u, \mathsf{v} \in \Gamma^* \,, \exists \sigma \in \Gamma \;:\; q_0\ w \vdash_*\ u\ q_{\text{acc}}\ \sigma\ \mathsf{v} \right\}$$

כלומר:

- $w \in L(N)$ אם קיימת ריצה אחת שבה N מקבלת את w.
- $w \notin L(N)$ אם בכל ריצה של N על w, N דוחה או לא עוצרת.

הגדרה 17: מ"ט אי דטרמיניסטית המכריעה שפה L

אומרים כי מ"ט אי דטרמיניסטית N מכריעה שפה L אם לכל $w \in \Sigma^*$:

- אם $w \in L \Leftarrow N$ מקבלת את w.
- אם $w \notin L \Leftarrow N$ דוחה את w.

הגדרה 18: מ"ט א"ד המקבלת שפה L

אומרים כי מ"ט אי דטרמיניסטית N מקבלת שפה L אם לכל $w \in \Sigma^*$:

- אם $w \in L \Leftarrow N$ מקבלת את w.
- אם $w \notin L \Leftarrow N$ דוחה את w או N לא עוצרת על w.

משפט 5: שקילות בין מ"ט א"ד למ"ט דטרמיניסטית ב- RE

לכל מ"ט א"ד N קיימת מ"ט דטרמיניסטית D כך ש-
$L(N) = L(D)$.

כלומר לכל $w \in \Sigma^*$:

- אם N מקבלת את w $\Leftarrow$ D תקבל את w.
- אם N לא מקבלת את w $\Leftarrow$ D לא תקבל את w.

3 התזה של צ'רץ'-טיורינג

שמות נרדפים לשפות כריעות ושפות קבילות

שפות כריעות	Decideable languages	שפות קבילות	Acceptable languages
שפות רקורסיביות	Recursive languages	שפות ניתנות לזיהוי	recognizable languages
		שפות כריעות למחצה	Semi-decidable languages
			Partially-decidable languages
		שפות הניתנות למנייה רקורסיביות	Recursively enumerable languages.

משפט 6: סגירות שפות כריעות

השפות הכריעות סגורות תחת:
- איחוד
- חיתוך
- משלים
- שרשור
- סגור קלין

משפט 7: סגירות שפות קבילות

- איחוד
- חיתוך
- שרשור
- סגור קלין

משפט 8: היחס בין הכרעה לקבלה

עבור כל שפה L התנאים הבאים מתקיימים.
- אם L הינה כריעה אז היא קבילה. כלומר:
$$L \in R \quad \Rightarrow \quad L \in RE \ .$$
- אם השפה L קבילה וגם והמשלים שלה $\bar{L}$ קבילה אז L כריעה. כלומר:
$$L \in RE \wedge \bar{L} \in RE \quad \Rightarrow \quad L \in R \ .$$

הגדרה 19: שפת סימפל

<u>משתנים</u>
- טבעיים: `i,j,k,...`
  מקבלים כערך מספר טבעי.
- מערכים: `A[],B[],C[],...` בכל תא ערך מתוך א"ב Γ אין סופיים.
- אתחול: הקלט נמצא בתאים הראשונים של `A[]`.
  כל שאר המשתנים מאותחלים ל- 0.

פעולות

- השמה בקבוע:
  `i=3, B[i]="#"`
- השמה בין משתנים:
  `i=k, A[k]=B[i]`
- פעולות חשבון:
  `x = y + z , x = y - z , x = y.z`

תנאים

- `B[i]==A[j]`
  (מערכים).
- `x >= y`
  (משתנים טבעיים).

כל משתנה מופיע רק פעם אחת בכל פעולה או תנאי.

זרימה

- סדרה פקודות ממוספרות.
- `goto`: מותנה ולא מותנה.
- `stop` עצירה עם ערך חזרה.

```
1  one = 1
2  zero = 0
3  B[zero] = "0"
4  i=0
5  j=i
6  if A[i] == B[zero] goto 9
7  i=j + one
8  goto 3
9  C[one] = A[j]
10 if C[one] ==  A[zero] goto 12
11 stop(0)
12 stop(1)
```

הגדרה 20: קבלה ודחייה של מחרוזת בשפה SIMPLE

עבור קלט `w` ותוכנית `P` בשפת SIMPLE. נאמר כי

- `P` **מקבלת** את `w` אם הריצה של `P` על `w` עוצרת עם ערך חזרה `1`.
- `P` **דוחה** את `w` אם הריצה של `P` על `w` עוצרת עם ערך חזרה `0`.

הגדרה 21: הכרעה וקבלה של שפות

עבור שפה `L` ותוכנית `P` בשפת SIMPLE. נאמר כי

- `P` **מכריעה** את `L` אם היא מקבלת את המילים שב- `L` ודוחה את אלה שלא ב- `L`.
- `P` **מקבלת** את `L` אם היא מקבלת את כל ורק המילים ב- `L`.

משפט 9: שפת SIMPLE שקולה למכונת טיורינג

המודלים של מכונת טיורינג ותוכניות SIMPLE שקולים.

משפט 10: מ"ט ותוכניות מחשב

מ"ט חזקה לפחות כמו תוכנית משחב.
כל תוכנית מחשב ניתנת למימוש במ"ט.
לכן, כל שפה שהינה כריעה ע"י מחשב היא כם כריעה ע"י מ"ט.
וכמו כן, שפה שהינה קבילה ע"י מחשב היא גם קבילה ע"י מ"ט.

הגדרה 22: דקדוקים כלליים

בדקדוק כללי, בצד שמאל של כלל יצירה יכולה להופיעה מחרוזת (לא ריקה) כלשהי.
פורמלית, כלל יצירה בדקדוק כללי הוא מהצורה

$$\gamma \to u$$

כאשר $\gamma \in (V \cup \Sigma)^+$, $u \in (V \cup \Sigma)^*$.

משפט 11:

תהי L שפה. L קבילה אם"ם קיים דקדוק כללי G כך ש- $L(G) = L$.

משפחת שפות	דקדוק	מודל חישובי
קבילות	כללי	מכונת טיורינג
חסרות הקשר	חסר הקשר	אוטומט מחסנית
רגולריות	רגולרי	אוטומט סופי

משפט 12:

כל שפה חסרת הקשר הינה כריעה.

משפט 13: התזה של צ'רץ' טיורינג

התזה של צ'רץ' טיורינג מודל מ"ט מגלם את המושג האבסטרקרטי של "אלגוריתם".
כלומר, כל אלגוריתם שניתן לתיאור כתהליך מכניסטי שבו:

- התהליך מתבצע כסדרה של צעדים.
- כל צעד מצריך כמות סופית של "עבודה".

ניתן גם לתיאור כמ"ט.

בפרט, אין מודל מכניסטי / אוטומטי יותר ממ"ט.

הגדרה 23: מודלים שקולים חישובית

יהיו A ו- B מודלים חישוביים. אומרים כי A ו- B שקולים אם לכל שפה L מתקיימים:

1) קיימת מ"ט במודל A **שמכריעה** את L אם"ם קיימת מ"ט במודל B **שמכריעה** את L.

2) קיימת מ"ט במודל A **שמקבלת** את L אם"ם קיימת מ"ט במודל B **שמקבלת** את L.

הגדרה 24: מכונת טיורינג מרובת סרטים

מכונת טיורינג מרובת סרטים היא שביעייה:

$$M = (Q, \Sigma, \Gamma, \delta_k, q_0, q_{\text{acc}}, q_{\text{rej}})$$

כאשר Q, Σ, Γ, q_0, q_{rej},q_{acc} מוגדרים כמו מ"ט עם סרט יחיד (ראו הגדרה 1).
ההבדל היחיד בין מ"ט עם סרט יחיד לבין מטב"ס הוא הפונקצית המעברים. עבור מטמ"ס הפונקצית המעברים היא מצורה הבאה:

$$\delta_k : (Q \backslash \{q_{\text{acc}}, q_{\text{rej}}\}) \times \Gamma^k \to Q \times \Gamma^k \times \{L, R, S\}^k$$

הקונפיגורציה של מכונת טיורנג מרובת סרטים מסומנת $(u_1 q \; \mathsf{v}_1 \; , \; u_2 q \; \mathsf{v}_2 \; , \; \ldots \; , \; u_k q \; \mathsf{v}_k \; .)$

משפט 14: שקילות בין מ"ט מרובת סרטים למ"ט עם סרט יחיד

לכל מטמ"ס M קיימת מ"ט עם סרט יחיד M' השקולה ל- M.
כלומר, לכל קלט $w \in \Sigma^*$:

- אם M מקבלת את w $\Leftarrow$ M' מקבלת את w.
- אם M דוחה את w $\Leftarrow$ M' דוחה את w.
- אם M לא עוצרת על w $\Leftarrow$ M' לא עוצרת על w.

4 אי-כריעות


משפט 15: סיווג שפות ידועות - חישוביות

$L_{\text{acc}} = \{\langle M,w\rangle \mid w \in L(M)\}$	$\in RE\backslash R$	
$L_{\text{halt}} = \{\langle M,w\rangle \mid w$ עוצרת על $M\}$	$\in RE\backslash R$	
$L_M = \{\langle M\rangle \mid \langle M\rangle$ מקבלת את $M\}$	$\in RE\backslash R$	
$L_{\text{d}} = \{\langle M\rangle \mid \langle M\rangle \notin L(M)\}$	$\in Co\,RE\backslash R$	
$L_E = \{\langle M\rangle \mid L(M) = \varnothing\}$	$\in Co\,RE\backslash R$	
$L_{EQ} = \{\langle M_1,M_2\rangle \mid L(M_1) = L(M_2)\}$	$\notin RE\backslash R, \notin Co\,RE\backslash R$	
$L_{REG} = \{\langle M\rangle \mid$ רגולרית $L(M)\}$	$\notin RE\backslash R, \notin Co\,RE\backslash R$	
$L_{NOTREG} = \{\langle M\rangle \mid$ לא רגולרית $L(M)\}$	$\notin RE\backslash R, \notin Co\,RE\backslash R$	

	כריעה	קבילה
L_{acc}	×	✓
$\overline{L_{\text{acc}}}$	×	×
L_{d}	×	×
L_{Halt}	×	✓
$\overline{L_{\text{Halt}}}$	×	×
L_{E}	×	×
$\overline{L_{\text{E}}}$	×	✓
L_{EQ}	×	×
$\overline{L_{\text{EQ}}}$	×	×
L_{REG}	×	×
L_{NOTREG}	×	×

משפט 16:

$$L_{\text{acc}} \in RE\backslash R \Rightarrow \bar{L}_{\text{acc}} \notin RE\ ,$$
$$L_{\text{halt}} \in RE\backslash R \Rightarrow \bar{L}_{\text{halt}} \notin RE\ ,$$
$$L_{\text{d}} \notin RE\backslash R\ .$$



5 המחלקות החישוביות R, RE ו- $Co\,RE$ ותכונותן

הגדרה 25: כוכב קליני

בהינתן השפה L. השפה L^* מוגדרת:

$$L^* = \{\varepsilon\} \cup \left\{ w = w_1 w_2 \cdots w_k \;\middle|\; \forall\ 1 \leqslant i \leqslant k\ ,\ w_i \in L \right\}$$

הגדרה 26:


- אוסף השפות הכריעות מסומן R ומוגדר $\left\{\text{קיימת מ"ט המכריעה את } L \;\middle|\; L \subseteq \Sigma^*\right\}$. $R = \left\{L \subseteq \Sigma^* \;\middle|\; \text{קיימת מ"ט המכריעה את } L\right\}$.
- אוסף השפות הקבילות מסומן R ומוגדר $\left\{\text{קיימת מ"ט המקבלת את } L \;\middle|\; L \subseteq \Sigma^*\right\}$. $RE = \left\{L \subseteq \Sigma^* \;\middle|\; \text{קיימת מ"ט המקבלת את } L\right\}$.
- אוסף השפות שהמשלימה שלהן קבילה מסומן R ומוגדר $Co\,RE = \left\{L \subseteq \Sigma^* \;\middle|\; \bar{L} \in RE\right\}$.

משפט 17: סגירות של השפות הכריעות והשפות הקבילות

- R סגורה תחת: **1)** איחוד **2)** חיתוך **3)** שרשור **4)** סגור קלין **5)** משלים.
- RE סגורה תחת: **1)** איחוד **2)** חיתוך **3)** שרשור **4)** סגור קלין.

משפט 18: תכונות של השפות החישוביות

1. אם $L \in RE$ וגם $\bar{L} \in RE$ אזי $L \in R$.
2. אם $L \in RE \backslash R$ אזי $\bar{L} \notin RE$ (כי $\bar{L} \in Co\,RE \backslash R$).
3. $RE \cap Co\,RE = R$.



הגדרה 27: מכונת טיורינג אוניברסלית

מ"ט אוניברסלית U מקבלת כקלט זוג, קידוד של מ"ט $\langle M \rangle$ וקידוד של מילה $\langle w \rangle$, ומבצעת סימולציה של ריצה של M על w ועונה בהתאם.

$$L(U) = \left\{ \langle M, w \rangle \;\middle|\; w \in L(M) \right\}\ .$$

6 רדוקציות

הגדרה 28: מ"ט המחשבת פונקציה

בהינתן פונקציה $f : \Sigma^* \to \Sigma^*$ אומרים כי מ"ט M מחשבת את f אם לכל $x \in \Sigma^*$:

- M מגיעה ל- q_{acc} בסוף החישוב של $f(x)$ וגם
- על סרט הפלט של M רשום $f(x)$.

הגדרה 29: מ"ט המחשבת פונקציה

בהינתן פונקציה $f : \Sigma^* \to \Sigma^*$ אומרים כי f חשיבה אם קיימת מ"ט המחשבת את f.

הגדרה 30: רדוקציה

בהינתן שתי שפות $L_1, L_2 \subseteq \Sigma^*$ אומרים כי L_1 ניתנת לרדוקציה ל- L_2, ומסמנים


$$L_1 \leqslant L_2 \ ,$$

אם קיימת פונקציה $f : \Sigma^* \to \Sigma^*$ המקיימת:

1) f חשיבה

2) לכל $x \in \Sigma^*$:

$$x \in L_1 \quad \Leftrightarrow \quad f(x) \in L_2 \ .$$



משפט 19: משפט הרדוקציה

לכל שתי שפות $L_1, L_2 \subseteq \Sigma^*$, אם קיימת רדוקציה $L_1 \leqslant L_2$ אזי

$$\begin{aligned} L_1 \in R \quad &\Leftarrow \quad L_2 \in R \\ L_1 \in RE \quad &\Leftarrow \quad L_2 \in RE \\ L_1 \notin R \quad &\Rightarrow \quad L_2 \notin R \\ L_1 \notin RE \quad &\Rightarrow \quad L_2 \notin RE \end{aligned}$$

משפט 20: תכונות של רדוקציה

- לכל שפה L מתקיים: $L \leqslant L$.
- אם $L_1 \leqslant L_2$ אזי $\bar{L}_1 \leqslant \bar{L}_2$.
- אם $L_1 \leqslant L_2$ וגם $L_2 \leqslant L_3$ אזי $L_1 \leqslant L_3$.
- לכל $L \in R$ ולכל L' שאינה $\varnothing, \Sigma^*$ מתקיים $L \leqslant L'$.

משפט 21: משפט רייס

עבור כל תכונה S של שפות שאינה טריואלית מתקיים: $L_S \notin R$

- תכונה S לא טריואלית היא קבוצה של שפות ב RE כך ש $S \neq RE$ וגם $S \neq \varnothing$.
- $L_S = \{\langle M \rangle \mid L(M) = S\}$.

7 סיבוכיות

הגדרה 31: סיבוכיות זמן של מ"ט

סיבוכיות זמן של מכונת טיורינג (או אלגוריתם) M היא פונקציה $f(|w|)$ שווה למספר צעדים לכל היותר ש- M מבצעת בחישוב של M על הקלט w.

משפט 22: קשר בין סיבוכיות של מ"ט מרובת סרטים ומ"ט סרט יחיד

לכל מ"ט מרובת סרטים M הרצה בזמן $f(n)$, קיימת מ"ט סרט יחיד M' השקולה ל- M ורצה בזמן $O\left(f^2(n)\right)$.

משפט 23: קשר בין סיבוכיות של מ"ט אי-דטרמיניסטית ומ"ט דטרמיניסטית

לכל מ"ט א"ד N הרצה בזמן $f(n)$, קיימת מ"ט דטרמיניסטית D השקולה ל- N ורצה בזמן $2^{(f(n))}$.

הגדרה 32: אלגוריתם אימות

אלגוריתם אימות עבור בעייה A הוא אלגוריתם V כך שלכל קלט $w \in \Sigma^*$ מתקיים:
$w \in A$ אם ורק אם קיימת מילה y באורך פולינומיאלי ב- $|w|$ כך ש- V מקבל את הזוג (w, y). כלומר:

- אם $w \in A \quad \Leftarrow$ קיים $y \in \Sigma^*$ כך ש- $V(w, y) = T$.
- אם $w \notin A \quad \Leftarrow$ לכל $y \in \Sigma^*$ מתקיים $V(w, y) = F$.

הגדרה 33: המחלקות P ו- NP

- $P =$ קבוצת כל השפות שיש להן מ"ט דטרמיניסטית המכריעה אותן בזמן פולינומי.
- $NP =$ קבוצת כל השפות שיש להן אלגוריתם אימות המאמת אותן בזמן פולינומי.


הגדרה שקולה:

- $NP =$ קבוצת כל השפות שיש להן מ"ט אי-דטרמיניסטית המכריעה אותן בזמן פולינומי.

- $Co\,NP =$ קבוצת כל השפות שהמשלימה שלהן שייכת ל- NP $\quad Co\,NP = \{A \mid \bar{A} \in NP\ .\}$.

משפט 24: תכונות של P ו- NP

- $P \subseteq NP$.
- P סגורה תחת משלים: אם $A \in P$ אזי גם $\bar{A} \in P$.
- $P \subseteq NP \cap Co\,NP$.



8 רדוקציה פולינומיאלית

הגדרה 34: פונקציה פולינומיאלית

בהינתן פונקציה $f : \Sigma^* \to \Sigma^*$. אומרים כי f חשיבה בזמן פולינומיאלי אם קיים אלגוריתם (מ"ט דטרמיניסטית) המחשב את f בזמן פולינומיאלי.

הגדרה 35: רדוקציה פולינומיאלית

בהינתן שתי הבעיות A ו- B. אומרים כי A ניתנת לרדוקציה פולינומיאלית ל- B, ומסמנים $A \leqslant_P B$, אם קיימת פונקציה $f : \Sigma^* \to \Sigma^*$ המקיימת:

1) f חשיבה בזמן פולינומיאלי

2) לכל $w \in \Sigma^*$:

$$w \in A \quad \Leftrightarrow \quad f(w) \in B\ .$$

משפט 25: משפט הרדוקציה

לכל שתי בעיות A ו- B, אם $A \leqslant_P B$ אזי

$$A \in P \quad \Leftarrow \quad B \in P$$
$$A \in NP \quad \Leftarrow \quad B \in NP$$
$$A \notin P \quad \Rightarrow \quad B \notin P$$
$$A \notin NP \quad \Rightarrow \quad B \notin NP$$


9 NP שלמות

הגדרה 36: NP - קשה (NP-hard)

בעייה B נקראת NP קשה אם לכל בעייה $A \in NP$ קיימת רדוקציה $A \leqslant_P B$.

הגדרה 37: NP- שלמה (NP-complete)

בעייה B נקראת NP שלמה אם
1) $B \in NP$
2) לכל בעייה $A \in NP$ קיימת רדוקציה $A \leqslant_p B$.



משפט 26: תכונות של רדוקציה פולינומיאלית

- אם $A \leqslant_P B$ אזי $\bar{A} \leqslant_P \bar{B}$.
- אם $A \leqslant_p B$ וגם $B \leqslant_p C$ אזי $A \leqslant_p C$.

משפט 27: טרנזיטיביות של NP- שלמות

תהי B בעייה NP- שלמה. אזי לכל בעייה $C \in NP$, אם $B \leqslant_p C$ אזי גם C היא NP שלמה.

10 בעיית הספיקות (SAT)

הגדרה 38: נוסחת CNF

נוסחת CNF, ϕ היא נוסחה בוליאנית מעל n משתנים $x_1, x_2, \ldots, x_n$ המכילה m פסוקיות $C_1, C_2, \ldots, C_m$, כאשר כל פסוקית מכילה אוסף של ליטרלים ($x_i \backslash \bar{x}_i$) המחוברים ע"י OR ($\vee$) בוליאני והפסוקיות מחוברות ע"י AND ($\wedge$) בוליאני. לדוגמה:

$$\phi = \underset{x_1 \vee \bar{x}_2 \vee x_4 \vee \bar{x}_7}{\overset{C_1}{\left(\quad\right)}} \wedge \underset{x_3 \vee x_5 \vee \bar{x}_8}{\overset{C_2}{\left(\quad\right)}} \wedge \quad \cdots$$

הגדרה 39: נוסחת $3CNF$

נוסחת $3CNF$, ϕ היא נוסחה CNF שבה בכל פסקוית יש בדיוק שלוש ליטרלים. לדוגמה:

$$\phi = \left(\begin{matrix} C_1 \\ x_1 \vee \bar{x}_2 \vee x_4 \end{matrix}\right) \wedge \left(\begin{matrix} C_2 \\ x_3 \vee x_5 \vee \bar{x}_8 \end{matrix}\right) \wedge \quad \cdots$$

הגדרה 40: נוסחת CNF ספיקה

נוסחת CNF, ϕ היא ספיקה אם קיימת השמה של המשתנים $x_1, x_2, \ldots, x_n$ כך ש- ϕ מקבלת ערך אמת 1. ז"א בכל פסוקית יש לפחות ליטרל אחד שמקבל את הערך אמת 1.

הגדרה 41: בעיית SAT

קלט: נוסחת CNF, ϕ.
פלט: האם ϕ ספיקה?

$$SAT = \{\langle\phi\rangle \mid \text{נוסחת } CNF \text{ ספיקה } \phi\}$$

הגדרה 42: בעיית $3SAT$

קלט: נוסחת $3CNF$ ϕ.
פלט: האם ϕ ספיקה?

$$3SAT = \{\langle\phi\rangle \mid \text{נוסחת } 3CNF \text{ ספיקה } \phi\}$$

משפט 28:


- $SAT \in NP$.
- **משפט קוק לוין:** $SAT \in NPC$.
- $3SAT \in NPC$.
- $SAT \in P \Leftrightarrow P = NP$.

11 סיווג שפות ידיועות - סיבוכיות

הגדרה 43: בעיית מסלול $PATH$

קלט: גרף מכוון G ושני קודקודים s ו- t.
פלט: האם G מכיל מסלול מקודקוד s לקודדוק t.

$$PATH = \{\langle G, s, t\rangle \mid G \text{ גרף מכוון המכיל מסלול מ- } s \text{ ל- } t\}$$




הגדרה 44: בעיית $RELPRIME$

קלט: שני מספרים x ו- y.
פלט: האם x ו- y זרים?

$$RELPRIME = \{\langle x, y\rangle \mid \gcd(x, y) = 1\} \ .$$

הגדרה 45: מסלול המילטוני

בהינתן גרף מכוון $G = (V, E)$ ושני קודקודים $s, t \in V$. מסלול המילטוני מ- s ל- t הוא מסלול מ- s ל- t שעובר דרך כל קודקוד ב-G בדיוק פעם אחת.



הגדרה 46: בעיית מסלול המילטוני - $HAMPATH$

קלט: גרף מכוון $G = (V, E)$ ושני קודקודים $s, t \in V$.
פלט: האם G מכיל מסלול המילטוני מ- s ל- t?

$$HAMPATH = \{\langle G, s, t\rangle \mid \text{ גרף מכוון } G \text{ המכיל מסלול המילטוני מ- } s \text{ ל- } t\text{?} \}$$

הגדרה 47: מעגל המילטוני

בהינתן גרף מכוון $G = (V, E)$.
מעגל המילטוני הוא מסלול מעגלי שעובר כל קודקוד ב- G בדיוק פעם אחת.

הגדרה 48: בעיית מעגל המילטוני - $HAMCYCLE$


קלט: גרף מכוון $G = (V, E)$.
פלט: האם G מכיל מעגל המילטוני?

$$HAMCYCLE = \{\langle G \rangle \mid G \text{ גרף מכוון המכיל מעגל המילטוני.}\}$$


הגדרה 49: קליקה

בהינתן גרף לא מכוון $G = (V, E)$.
קליקה ב- G היא תת-קבוצה של קודקודים $C \subseteq V$ כך שלכל שני קודקודים $u, \mathsf{v} \in C$ מתקיים $(u, \mathsf{v}) \in E$.

קליקה בגודל $k = 3$:



קליקה בגודל $k = 5$:



הגדרה 50: בעיית הקליקה - $CLIQUE$


קלט: גרף לא מכוון $G = (V, E)$ ומספר k.
פלט: האם G קליקה בגודל k לכל היותר?

$$CLIQUE = \{\langle G, k \rangle \mid G \text{ גרף לא מכוון המכיל קליקה בגודל } k \text{ לכל היותר}\}$$


הגדרה 51: כיסוי בקודקודים

בהינתן גרף לא מכוון $G = (V, E)$, כיסוי בקודקודים ב- G הוא תת-קבוצה של קודקודים $C \subseteq V$ כך שלכל צלע $u, \mathsf{v} \in S$ מתקיים $u \in C$ או $\mathsf{v} \in C$.


כיסוי בקדקודים בגודל $k = 2$:



כיסוי בקדקודים בגודל $k = 5$:



כיסוי בקדקודים בגודל $k = 5$:



הגדרה 52: בעיית VC


קלט: גרף לא מכוון $G = (V, E)$ ומספר k.
פלט: האם קיים כיסוי בקודקודים ב- G בגודל k לכל היותר ?

$$VC = \{\langle G, k\rangle \mid G \text{ גרף לא מכוון המכיל כיסוי בקודקודים בגודל } k \text{ לכל היותר}\}$$


הגדרה 53: קבוצה בלתי תלויה

בהינתן גרף לא מכוון $G = (V, E)$, קבוצה בלתי תלויה ב- G היא תת-קבוצה של קודקודים $S \subseteq V$ כך שלכל שני קודקודים $u, \mathsf{v} \in S$ מתקיים $(u, \mathsf{v}) \notin E$.

קבוצה בלתי תלוייה בגודל $k = 3$:



קבוצה בלתי תלוייה בגודל $k = 3$:



הגדרה 54: בעיית IS

קלט: גרף לא מכוון $G = (V, E)$ ומספר k.
פלט: האם קיימת קבוצה בלתי תלויה ב- G בגודל k לפחות?

$$IS = \{\langle G, k\rangle \mid G \text{ גרף לא מכוון המכיל קבוצה בלתי תלויה בגודל } k \text{ לפחות}\}$$

הגדרה 55: בעיית $PARTITION$

קלט: קבוצת מספרים שלמים $S = \{x_1, x_2, \ldots, x_n\}$.
פלט: האם קיימת תת-קבוצה $Y \subseteq S$ כך ש- $\sum_{y \in Y} y = \sum_{y \in S \setminus Y} y$?

$$PARTITION = \left\{ S \;\middle|\; S \text{ קבוצת שלמים, וקיימת תת-קבוצה } Y \subseteq S \text{ כך ש- } \sum_{y \in Y} y = \sum_{y \in S \setminus Y} y \right\}$$

הגדרה 56: בעיית $SUBSETSUM$

קלט: קבוצת מספרים $S = \{x_1, x_2, \quad \ldots \quad x_n\}$ ומספר t.
פלט: האם קיימת תת-קבוצה של S שסכום איבריה שווה t?

$$SUBSETSUM = \left\{ \langle S, t \rangle \;\middle|\; \text{קיימת } Y \subseteq S \text{ כך ש- } \sum_{x \in Y} x = t \right\}$$

משפט 29:

$PATH = \{\langle G, s, t \rangle \mid G$ גרף מכוון המכיל מסלול מ- s ל- $t\}$	$\in P$
$RELPRIME = \{\langle x, y \rangle \mid \gcd(x, y) = 1\}$	$\in P$
$SAT = \{\langle \phi \rangle \mid \phi$ היא נוסחת CNF ספיקה$\}$	$\in NP, \in NPC$
$3SAT = \{\langle \phi \rangle \mid \phi$ היא נוסחת $3CNF$ ספיקה$\}$	$\in NP, \in NPC$
$IS = \{\langle G, k \rangle \mid G$ גרף לא מכוון המכיל קליקה בגודל k לפחות$\}$	$\in NP, \in NPC$
$CLIQUE = \{\langle G, k \rangle \mid G$ גרף לא מכוון המכיל קליקה בגודל k לכל היותר$\}$	$\in NP, \in NPC$
$VC = \{\langle G, k \rangle \mid G$ גרף לא מכוון המכיל כיסוי בקודקודים בגודל k לכל היותר$\}$	$\in NP, \in NPC$
$HAMPATH = \{\langle G, s, t \rangle \mid G$ גרף מכוון המכיל מסלול המילטוני מ- s ל- $t\}$	$\in NP, \in NPC$
$HAMCYCLE = \{\langle G \rangle \mid G$ גרף מכוון המכיל מעגל המילטוני$\}$	$\in NP$
$SUBSETSUM = \left\{ \langle S, t \rangle \mid \text{קיימת } Y \subseteq S \text{ כך ש- } \sum_{x \in Y} x = t \right\}$	$\in NP$
$\overline{HAMPATH}$	$\in CoNP$
$\overline{CLIQUE}$	$\in CoNP$

משפט 30: בעיות פתוחות בתורת הסיבוכיות

- האם $P = NP$?
- האם $Co\,NP = NP$?
- האם $Co\,NP \cap NP = P$?

12 רדוקציות זמן פולינומיאליות

משפט 31: רדוקציות פולינומיאליות

$$\begin{aligned} SAT &\leqslant_P 3SAT \\ 3SAT &\leqslant_P CLIQUE \\ CLIQUE &\leqslant_P IS \\ IS &\leqslant_P VC \\ SUBSETSUM &\leqslant_P PARTITION \\ HAMPATH &\leqslant_P HAMCYCLE \end{aligned}$$

חישוביות וסיבוכיות

מועד ג'

פתרון לדוגמא

ד"ר ירמיהו מילר , .

סמסטר ב, תשפ"ו'


מסמך זה כולל פתרון לדוגמא של המבחן. הפתרונות לשאלות הינן פתרונות לדוגמא. ניתן לפתור חלק בדרכים נוספות/אחרות, מלבד הדרך המוצעת בפתרון לדוגמא.

פתרונות


שאלה 1: מכונות טיורינג (20 נקודות)

סעיף א' (10 נקודות)

הרעיון: המכונה סורקת ימינה ומחפשת זוגות של a ו- b כדי לסמן אותם ב- ✓. כל פעם שמסומן a, היא מחפשת b כדי לקזז אותו (ולהיפך). אם המכונה מגיעה לקצה המחרוזת (רווח ␣) וחסר לה b כדי לאזן a שנמצא קודם לכן, זה אומר שיש לפחות a אחד יותר מאשר b, ולכן היא מקבלת. אם היא מגיעה לקצה במצב מאוזן או כשחסר לה a, היא דוחה. כל המעברים שאינם מופיעים בתרשים עוברים ל- q_{rej}.



סעיף ב' (10 נקודות)



שאלה 2: סגירות של שפות כריעות (20 נקודות)

סעיף א'

הטענה נכונה.
ניתן תמיד לעשות רדוקציה $L^R \leqslant L$ ולהפך.
ולפי משפט הרדוקציה, אם $L \in RE$ אזי $L^R \in RE$.
הפונקציה הרדוקציה היא:

$$\forall\, x \in \Sigma^* : \qquad f(x) = x^R \,.$$

ברור שמתקיים:

$$x^R \in L \quad \iff \quad x \in L^R \,.$$

סעיף ב' (10 נקודות)

הטענה נכונה.
נניח כי $L \in RE$ וגם $\bar{L} \notin RE$ ונניח בשלילה כי $L \in R$.
אזי מכיוון ש- R סגורה תחת משלים, מתקיים: $\bar{L} \in R$.
מכיוון ש- $R \subseteq RE$ אז בהכרח $\bar{L} \in RE$. וזאת בסתירה לכך ש- $\bar{L} \notin RE$.

שאלה 3: אי כריעות (20 נקודות)

פתרונות

סעיף א'

נבנה מ"ט M המקבלת את L.
על קלט x, M מבצעת:

1) בודקת האם $x = \langle M_1, M_2, w \rangle$.

- אם לא $\Leftarrow$ דוחה.

2) אחרת מריצה במקביל את M_1 ו- M_2 על w.

- אם לפחות אחת מהן מקבלת $\Leftarrow$ מקבלת.
- אחרת $\Leftarrow$ דוחה.

<u>נכונות</u>

- אם $x \in L$
- $\Leftarrow x = \langle M_1, M_2, w \rangle$ וגם $w \in L(M_1) \cup L(M_2)$.
- $\Leftarrow w \in L(M_1)$ או $w \in L(M_2)$.
- $\Leftarrow M_1$ מקבלת את w או M_2 מקבלת את w.
- $\Leftarrow M$ מקבלת את x.

אם $x \notin L$ אז שני מקרים:

מקרה 1: $x \neq \langle M_1, M_2, w \rangle$

- $\Leftarrow M$ דוחה את x.

מקרה 2: $\Leftarrow x = \langle M_1, M_2, w \rangle$ וגם $w \notin L(M_1) \cup L(M_2)$.

- $\Leftarrow w \notin L(M_1)$ וגם $w \notin L(M_2)$.
- $\Leftarrow M_1$ לא מקבלת את w וגם M_2 לא מקבלת את w.
- $\Leftarrow M$ לא מקבלת את x.

סעיף ב'

$$f(x) = \begin{cases} \langle M, M, w \rangle & : \quad x = \langle M, w \rangle \\ \langle M_\varnothing, M_\varnothing, \varepsilon \rangle & : \quad x \neq \langle M, w \rangle \end{cases}$$

כאשר $M_\varnothing$ מ"ט שדוחה כל קלט.

<u>נכונות הרדוקציה</u>

(1) f חשיבה מכיוון שניתן לבנות מ"ט שתבדוק האם $x = \langle M, w \rangle$. אם לא, תחזיר קידוד קבוע $\langle M_\varnothing, M_\varnothing, \varepsilon \rangle$, אחרת תחזיר קידוד $\langle M, M, w \rangle$.

(2) נראה כי

$$f(x) \in L \quad \iff \quad x \in L_{\text{acc}} \, .$$

(א) אם $x \in L_{\text{acc}}$
$\Leftarrow x = \langle M, w \rangle$ וגם $w \in L(M)$
$\Leftarrow f(x) = \langle M, M, w \rangle$ וגם $w \in L(M)$.
$\Leftarrow f(x) \in L$.

(ב) אם $x \notin L_{\text{acc}}$ אז שני מקרים:

מקרה 1: $x \neq \langle M, w \rangle \Leftarrow f(x) = \langle M_\varnothing, M_\varnothing, \varepsilon \rangle$ וגם $\varepsilon \notin L(M_\varnothing) \Leftarrow f(x) \notin L$.

מקרה 2: $x = \langle M, w \rangle \Leftarrow w \notin L(M)$ וגם $f(x) = \langle M, M, w \rangle \Leftarrow f(x) \notin L$.

לסיכום הראנו רדוקציה $L_{\text{acc}} \leqslant L$ ומכיוון ש- $L_{\text{acc}} \notin R$, ממשט הרדוקציה מתקיים ש- $L \notin R$.

שאלה 4: NP - שלמות (20 נקודות)

סעיף א' (5 נקודות)

לא נכון. דוגמה נגדית:
עבור בעייה NP- קשה $B \in NP$ (לדוגמא SAT), ועבור בעייה NP- קשה $A \notin R$ (לדוגמא L_{Halt}), לא קיימת $A \leqslant_P B$, כי לפי משפט הרדוקציה, אם $A \notin R$ אזי $B \notin R$, בסתירה לכך ש- $SAT \in R$.

סעיף ב' (5 נקודות)

הטענה נכונה.
לכל מ"ט M מתקיים, לפי ההגדרה: $L(M) \in RE$, ולכן אם $L(M) \in Co\,RE$ אזי

$$L(M) \in RE \cap Co\,RE = R\ .$$

סעיף ג' (5 נקודות)

לא נכון:
הטענה לא נכונה לכל בעייה NP- קשה $A \notin NP$ (ויש בעיות כאלה). כי אם נניח בשלילה שקיימת רדוקציה $A \leqslant_P B$, אזי לפי משפט הרדוקציה, מכיוון ש- $B \in NP$ (כי B היא NP- שלמה), מתקיים ש- $A \in NP$ וזו סתירה לבחירה של A.

סעיף ד' (5 נקודות)

הטענה נכונה.
אם $P = Co\,NP$, מכיוון ש- P סגורה תחת משלים, מתקיים ש- $P = NP = Co\,NP$.
מכיוון ש- $\overline{SAT} \in Co\,NP$, מתקיים

$$\overline{SAT} \in NP\ . \tag{1}$$

מכיוון ש- $SAT \in NP = P$, ניתן להכריע את SAT בזמן פולינומיאלי ולכן ניתן לבצע רדוקציה $SAT \leqslant_P \overline{SAT}$, ולכן $\overline{SAT}$ היא NP קשה. כלומר

$$\overline{SAT} \in NPH\ . \tag{2}$$

מ- (1) ו- (2) מתקיים ש- $\overline{SAT}$ היא NP- שלמה.

שאלה 5: סיבוכיות זמן (20 נקודות)

סעיף א' (8 נקודות)

נבנה פונקצית הרדוקציה $f : \Sigma^* \to \Sigma^*$ שמוגדרת

$$f\left(\langle S,t\rangle\right) = \langle A\rangle$$

כאשר $\langle S,t\rangle$ קלט של $SUBSETSUM$ ו- $\langle A\rangle$ קלט של $PARTITION$.

1) יהי $\sigma = \sum_{x\in S} x$.

2) נגדיר את הקבוצה החדשה A על ידי הוספת האיבר $\sigma - 2t$ לקבוצה S:

$$A = S \cup \{\sigma - 2t\} \ .$$

סעיף ב' (6 נקודות)

$\Leftarrow$ <u>כיוון</u>

נניח ש- $\langle S,t\rangle \in SUBSETSUM$.

$\Leftarrow$ קיימת תת-קבוצה $Y \subseteq S$ כך ש- $t = \sum_{y\in Y} y$.

$$\Leftarrow \sum_{x\in A} x = \sum_{x\in S} x + \sigma - 2t = 2\sigma - 2t$$

$\Leftarrow$ אם נגדיר $A_1 = Y \cup \{\sigma - 2t\}$ ו- $A_2 = A\backslash A$ אז

$$\sum_{x\in A_1} x = \sum_{x\in Y} x + \sigma - 2t = t + \sigma - 2t = \sigma - t$$

וכן

$$\sum_{x\in A_2} x = \sum_{x\in A\backslash A_1} x = \sum_{x\in A} x - \sum_{x\in A_1} x = 2\sigma - 2t - (\sigma - t) = \sigma - t \ .$$

$$\Leftarrow \sum_{x\in A_1} x = \sum_{x\in A_2} x = \frac{1}{2}\sum_{x\in A} x$$

וגם $A_1 \cap A_2 = A_1 \cap (A\backslash A_1) = \varnothing$

וגם $A_1 \cup A_2 = A_1 \cup (A\backslash A_1) = A$.

$\Leftarrow$ קיימת חלוקה $A_1, A_2 \subset A$ של A

$\Leftarrow f(x) = \langle A\rangle \in PARTITION$.

<u>$\Rightarrow$ כיוון</u>

נניח ש- $\langle A\rangle \in PARTITION$.

$\Leftarrow$ **קיימות תת-קבוצות** $A_1, A_2 \subseteq S'$ **כך ש:**

$$\sum_{x\in A_1} x = \sum_{x\in A_2} x = \frac{1}{2}\sum_{x\in A} x$$

וגם $A_1 \cap A_2 = A_1 \cap (A\backslash A_1) = \varnothing$

וגם $A_1 \cup A_2 = A_1 \cup (A\backslash A_1) = A$.

$\Leftarrow$ **לפי הבניית הרדוקציה:** $A = \{\sigma - 2t\} \cup S$ **כאשר** $t \leqslant \sigma$ **שלם ו-** S **קבוצת שלמים ו-** $\sigma = \sum_{x\in S} x$.

$\Leftarrow$ **קיימת הקבוצה** $S = A\backslash\{\sigma - 2t\}$.

$\Leftarrow$ **מכיוון ש:** $A = \{\sigma - 2t\} \cup S$ **ו-** A_1, A_2 **מהוות חלוקה של** A **אז** $\{\sigma - 2t\}$ **שייך ל-** A_1 **או** A_2.

ללא הגבחת כלליות נניח ש: $\{\sigma - 2t\} \in A_1$

$\Leftarrow$ **קיימת הקבוצה** $A_1\backslash\{\sigma - 2t\}$.

$\Leftarrow$ **נגדיר הקבוצה:**

$$Y = A_1\backslash\{\sigma - 2t\} \quad \subseteq \quad A\backslash\{\sigma - 2t\} = S\ .$$

$\Leftarrow$

$$\sum_{y\in Y} y = \sum_{y\in A_1} y - (\sigma - 2t) = \frac{1}{2}\sum_{y\in A} y - (\sigma - 2t) = \frac{1}{2}(2\sigma - 2t) - (\sigma - 2t) = t\ .$$

$\Leftarrow$ **קיימת תת- קבוצה** $Y \subseteq S$ **כך ש:** $\sum_{y\in Y} y = t$

$\Leftarrow \langle S, t\rangle \in SUBSETSUM$.

סעיף ג' (6 נקודות)

הפונקצית הרדוקציה f**, על קלט** $\langle S, t\rangle$ **מחזירה את הפלט** $\langle A\rangle$ **כאשר** $A = S \cup \{\sigma - 2t\}$.

לכן, על קלט $\langle S, t\rangle$ **הפונקציה** f **תבצע לכך:**

שלב 1) מחשבת את הסכום σ של כל האיברים שבקבוצה S

שלב 2) מחשבת את החיסור $\sigma - 2t$.

שלב 3) בונה את הקבוצה $S \cup \{\sigma - 2t\}$.

נסמן ב- $n = |\langle S, t\rangle|$ **אורך הקלט.**

- **שלב (1) עולה** $O(|S|)$ **צעדים.**

- שלב (2) עולה $O(|S|)$ צעדים.
- שלב (3) עולה n צעדים לכל היותר.

לכן בסה"כ הסיבוכיות זמן של f היא:

$$O(|S|) + O(|S|) + O(n) = O(n) \ .$$