

פרק 6: אסטרטגיות מעורבות

6.1 הגדרה של אסטרטגיות מעורבות

הגדרה 6.1 אסטרטגיות מעורבות

- יהי $G = (N, (S_i)_{i \in N}, (u_i)_{i \in N})$ משחק בצורה אסטרטגית.
- **אסטרטגיה מעורבת** של שחקן i היא פונקציה הסתברות $\sigma_i : S_i \rightarrow [0, 1]$ של קבוצת האסטרטגיות S_i שלו.
- **קבוצת אסטרטגיות מעורבות** של שחקן i תסומן Σ_i ותוגדר:

$$\Sigma_i \triangleq \left\{ \sigma_i : S_i \rightarrow [0, 1] : \sum_{s_i \in S_i} \sigma_i(s_i) = 1 \right\}.$$

דוגמה 6.1 (אסטרטגיה מעורבת)

יהי $G = (N, (S_i)_{i \in N}, (u_i)_{i \in N})$ משחק n שחקנים. נניח שקבוצת האסטרטגיות הטהורות של שחקן $1 \in N$ היא:

$$S_1 = \{A, B, C\}.$$

תהי $\sigma_1 \in \Sigma_1$ אסטרטגיה מעורבת עבורה לכל אסטרטגיה יש הסתברות שווה:

$$\sigma_1(A) = \frac{1}{3}, \quad \sigma_1(B) = \frac{1}{3}, \quad \sigma_1(C) = \frac{1}{3}.$$

בשפה של תורת המשחקים **האסטרטגיה המעורבת** σ_1 מסומנת:

$$\sigma_1 = \left\{ \frac{1}{3}(A), \frac{1}{3}(B), \frac{1}{3}(C) \right\}.$$

ניתן לרשום את **הוקטור הסתברות** של σ_1 בצורה:

$$x_1 = \left(\frac{1}{3}, \frac{1}{3}, \frac{1}{3} \right).$$

דוגמה 6.2 (אסטרטגיה מעורבת)

- יהי $G = (N = \{I, II\}, \{S_I, S_{II}\}, \{u_I, u_{II}\})$ משחק 2 שחקנים.
- אם קבוצת האסטרטגיות של שחקן $I \in N$ היא $S_I = \{H, T\}$, אז האוסף של כל האסטרטגיות המעורבות של I הוא:

$$\Sigma_I = \{ \{p_1(H), p_2(T)\} : (0 \leq p_1, p_2 \leq 1) \wedge (p_1 + p_2 = 1) \}.$$

- במקרה זה הקבוצה Σ_I שקולה לקטע ב- $\mathbb{R}^2$ המחבר את הנקודות $(1, 0)$ עם $(0, 1)$.
- אם קבוצת האסטרטגיות של שחקן $II \in N$ היא $S_{II} = \{L, M, R\}$, אז האוסף של כל האסטרטגיות

המעורבות של II הוא:

$$\Sigma_{II} = \{ \{p_1(L), p_2(M), p_3(R)\} : (p_1, p_2, p_3 \geq 0) \wedge (p_1 + p_2 + p_3 = 1) \} .$$

- במקרה זה הקבוצה Σ_{II} שקולה לקטע ב- $\mathbb{R}^3$ המחבר את הנקודות $(0, 1, 0), (1, 0, 0)$ ו- $(0, 0, 1)$.

דוגמה 6.3 (אסטרטגיה מעורבת)

אם $S_2 = \{L, M, R\}$, אוסף של כל האסטרטגיות המעורבות Y של שחקן 2 מסומן

$$\Sigma_2 = \{ \{ \sigma_2(L), \sigma_2(M), \sigma_2(R) \} = (y_1 \ y_2 \ y_3) \mid 0 \leq y_1, y_2, y_3 \leq 1, y_1 + y_2 + y_3 = 1 \} .$$

במקרה זה Σ_2 שקולה למשולש ב- $\mathbb{R}^3$ שקדקודיו הם הנקודות $(0, 1, 0), (1, 0, 0)$ ו- $(0, 0, 1)$.

הגדרה 6.2 סימפלקס

- לכל קבוצה סופית A , סימפלקס על הקבוצה A יסומן $\Delta(A)$ ויוגדר כל וקטורי ההסתברות על A באופן הבא:

$$\Delta(A) \triangleq \left\{ p : A \rightarrow [0, 1] : \sum_{a \in A} p(a) = 1 \right\} .$$

- הקבוצה $\Delta(A)$ נמצאת במרחב $\mathbb{R}^{|A|}$.

- הממד שך הסימפלקס $\Delta(A)$ הוא

$$\dim \Delta(A) = |A| - 1$$

$$\sum_{a \in A} p(a) = 1$$

משפט 6.1

יהי $G = (N, (S_i)_{i \in N}, (u_i)_{i \in N})$ משחק n שחקנים. אם הקבוצת אסטרטגיות טהורות של שחקן i היא

$$S_i = \{s_i^1, s_i^2, \dots, s_i^{m_i}\} ,$$

כאשר המספר האסטרטגיות הטהורות של שחקן i הוא

$$m_i = |S_i|$$

אז הקבוצת האסטרטגיות המעורבות של שחקן i היא:

$$\Sigma_i = \Delta(S_i)$$

כאשר $\Delta(S_i)$ היא הסימפלקס של S_i , וגם $\Sigma_i \subseteq \mathbb{R}^{m_i}$ היא תת-קבוצה של $\mathbb{R}^{m_i}$ וגם

$$\dim(\Sigma_i) = |\Sigma_i| - 1 = m_i - 1 .$$

דוגמה 6.4 (וקטור אסטרטגיות מעורב)

נתון המשחק שני שחקנים G באסטרטגיות טהורות הבא:

$I \backslash II$	A	B
α	1, 1	2, -7
β	3, -2	5, 6

באסטרטגיות מעורבות:

- שחקן 1 משחק לפי אסטרטגיה A בהסתברות $\frac{1}{3}$ ולפי אסטרטגיה B בהסתברות $\frac{2}{3}$.
- ושחקן 2 משחק לפי אסטרטגיה α בהסתברות $\frac{2}{5}$ ולפי אסטרטגיה β בהסתברות $\frac{3}{5}$.
- האסטרטגיה המעורבת של שחקן 1 הוא

$$\sigma_1 = \left\{ \frac{1}{3}(\alpha), \frac{2}{3}(\beta) \right\}.$$

הוקטור הסתברויות הוא:

$$x = (x_1, x_2) = \left(\frac{1}{3}, \frac{2}{3} \right).$$

- האסטרטגיה המעורבת של שחקן 2 הוא

$$\sigma_2 = \left\{ \frac{2}{5}(A), \frac{3}{5}(B) \right\}.$$

הוקטור הסתברויות הוא:

$$y = (y_1, y_2) = \left(\frac{2}{5}, \frac{3}{5} \right).$$

- המשחק בצורה אסטרטגית מעורבת הינה

$I \backslash II$	$\frac{1}{3}(A)$	$\frac{2}{3}(B)$
$\frac{2}{5}(\alpha)$	1, 1	2, -7
$\frac{3}{5}(\beta)$	3, -2	5, 6

דוגמה 6.5 (וקטור אסטרטגיות מעורב)

נתון המשחק שני שחקנים G באסטרטגיות טהורות הבא::

$I \backslash II$	L	C	R
t	0, 2	2, -7	3, 2
m	3, -2	5, 4	2, 9
b	3, -2	5, 6	7, -8

באסטרטגיות מעורבות:

- שחקן 1 משחק לפי אסטרטגיה L בהסתברות $\frac{1}{7}$, לפי אסטרטגיה C בהסתברות $\frac{2}{7}$, ולפי אסטרטגיה R בהסתברות $\frac{4}{7}$.
- שחקן 2 משחק לפי אסטרטגיה t בהסתברות $\frac{1}{9}$, לפי אסטרטגיה m בהסתברות $\frac{4}{9}$, ולפי אסטרטגיה b בהסתברות $\frac{5}{9}$.
- האסטרטגיה המעורבת של שחקן 1 הוא

$$\sigma_1 = \left(\frac{1}{7}(t), \frac{2}{7}(m), \frac{4}{7}(b) \right).$$

- הוקטור הסתברויות הוא:

$$x = (x_1, x_2, x_3) = \left(\frac{1}{7}, \frac{2}{7}, \frac{4}{7} \right)$$

- האסטרטגיה המעורבת של שחקן 2 הוא

$$\sigma_2 = \left(\frac{1}{9}(L), \frac{4}{9}(C), \frac{5}{9}(R) \right).$$

- הוקטור הסתברויות הוא:

$$y = (y_1, y_2, y_3) = \left(\frac{1}{9}, \frac{4}{9}, \frac{5}{9} \right).$$

- המשחק בצורה אסטרטגית מעורבת הינה

$I \backslash II$	$\frac{1}{7}(L)$	$\frac{2}{7}(C)$	$\frac{4}{7}(R)$
$\frac{1}{9}(t)$	0, 2	2, -7	3, 2
$\frac{4}{9}(m)$	3, -2	5, 4	2, 9
$\frac{5}{9}(b)$	3, -2	5, 6	7, -8

הגדרה 6.3 ההרחבה של משחק לאסטרטגיות מעורבות

- יהי $G = (N, (S_i)_{i \in N}, (u_i)_{i \in N})$ משחק בצורה אסטרטגית.
- נסמן ב- $S \triangleq S_1 \times S_2 \times \dots \times S_n$ את קבוצת וקטורי האסטרטגיות הטהורות.
- ההרחבה של G לאסטרטגיות מעורבות הוא המשחק

$$\Gamma = (N, (\Sigma_i)_{i \in N}, (U_i)_{i \in N}) \quad (6.1)$$

שבו לכל $i \in N$ קבוצת האסטרטגיות של שחקן i היא $\Sigma_i = \Delta(S_i)$.

- במשחק Γ הפונקציית התשלומים לשחקן i היא הפונקציה $U_i : \Sigma \rightarrow \mathbb{R}$, המתאימה לכל וקטור

אסטרטגיות $\sigma = (\sigma_1, \dots, \sigma_n) \in \Sigma = \Sigma_1 \times \dots \times \Sigma_n$ את התשלום

$$U_i(\sigma) = E_\sigma[u_i(\sigma)] = \sum_{(s_1, \dots, s_n) \in S} u_i(s_1, \dots, s_n) \sigma_1(s_1) \sigma_2(s_2) \dots \sigma_n(s_n) \quad (6.2)$$

דוגמה 6.6 (פונקצית התשלום של משחק באסטרטגיות מעורבות)

נתון המשחק G באסטרטגיות טהורות:

$I \backslash II$	a	b
α	1, 1	2, -7
β	3, -2	5, 6

ונתון הוקטור האסטרטגיות המעורבות של שחקן 1:

$$x = (x_1, x_2) = \left(\frac{1}{3}, \frac{2}{3}\right)$$

והוקטור אסטרטגיות מעורבות של שחקן 2:

$$y = (y_1, y_2) = \left(\frac{2}{5}, \frac{3}{5}\right).$$

ההרחבה של המשחק לאסטרטגיות מעורבות הינה

$I \backslash II$	$x_1(a)$	$x_2(b)$
$y_1(\alpha)$	1, 1	2, -7
$y_2(\beta)$	3, -2	5, 6

 $=$

$I \backslash II$	$\frac{1}{3}(a)$	$\frac{2}{3}(b)$
$\frac{2}{5}(\alpha)$	1, 1	2, -7
$\frac{3}{5}(\beta)$	3, -2	5, 6

פונקצית התשלום של שחקן i היא התוחלת התשלום של שחקן i :

$$U_1(x, y) = 1x_1x_2 + 2x_2y_1 + 3x_1y_2 + 5x_2y_2 = \frac{59}{15}.$$

$$U_2(x, y) = 1x_1x_2 - 7x_2y_1 - 2x_1y_2 + 6x_2y_2 = \frac{4}{15}.$$

ניתן לרשום את פונקצית התשלום במונחי המטריצות התשלומים של שחקן 1 ו- שחקן 2 בנפרד. המטריצות התשלומים של המשחק הינה

$$U = \begin{pmatrix} (1, 1) & (2, -7) \\ (3, -2) & (5, 6) \end{pmatrix}$$

והמטריצות התשלומים של השחקנים הנפרדים הינן

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 5 \end{pmatrix}, \quad B = \begin{pmatrix} 1 & -7 \\ -2 & 6 \end{pmatrix}.$$

A המטריצת התשלומים של שחקן 1 ו- B המטריצת התשלומים של שחקן 2. במונחי A ו- B הפונקציות התשלומים שלהם באסטרטגיות מעורבות הן

$$U_1(x, y) = x^t A y = (x_1 \ x_2) \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 5 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} y_1 \\ y_2 \end{pmatrix}$$

$$U_2(x, y) = x^t B y = (x_1 \ x_2) \begin{pmatrix} 1 & -7 \\ -2 & 6 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} y_1 \\ y_2 \end{pmatrix}$$

דוגמה 6.7 (וקטור אסטרטגיות מעורב)

נתון המשחק G באסטרטגיות טהורות:

$I \backslash II$	L	C	R
t	0, 2	2, -7	3, 2
m	3, -2	5, 4	2, 9
b	3, -2	5, 6	7, -8

ונתון וקטור האסטרטגיות המעורבות של שחקן 1:

$$x = (x_1, x_2, x_3) = \left(\frac{1}{7}, \frac{2}{7}, \frac{4}{7}\right)$$

ווקטור האסטרטגיות המעורבות של שחקן 2:

$$y = (y_1, y_2, y_3) = \left(\frac{1}{9}, \frac{4}{9}, \frac{5}{9}\right).$$

המשחק בצורה אסטרטגית מעורבת הינה

$I \backslash II$	$x_1 (L)$	$x_2 (C)$	$x_3 (R)$		$I \backslash II$	$\frac{1}{7} (L)$	$\frac{2}{7} (C)$	$\frac{4}{7} (R)$
$y_1 (t)$	0, 2	2, -7	3, 2	=	$\frac{1}{9} (t)$	0, 2	2, -7	3, 2
$y_2 (m)$	3, -2	5, 4	2, 9		$\frac{4}{9} (m)$	3, -2	5, 4	2, 9
$y_3 (b)$	3, -2	5, 6	7, -8		$\frac{5}{9} (b)$	3, -2	5, 6	7, -8

פונקצית התשלום של שחקן i היא התוחלת התשלום של שחקן i :

$$U_1(x, y) = 0 \cdot x_1 x_2 + 2x_2 y_1 + 3x_1 y_2 + 3x_3 y_1 + 3x_1 y_2 + 5x_2 y_2 + 2x_3 y_2 + 3x_1 y_3 + 5x_2 y_3 + 7x_3 y_3 = \frac{107}{21}.$$

$$U_2(x, y) = 2x_1 y_1 - 7x_1 y_2 + 2x_1 y_3 - 2x_2 y_1 + 4x_2 y_2 + 9x_2 y_3 - 2x_3 y_1 + 6x_3 y_2 - 8x_3 y_3 = \frac{10}{21}.$$

ניתן לרשום את פונקצית התשלום במונחי המטריצות התשלומים של שחקן 1 ו- שחקן 2 בנפרד. המטריצות התשלומים של המשחק הינה

$$U = \begin{pmatrix} (0, 2) & (2, -7) & (3, 2) \\ (3, -2) & (5, 4) & (2, 9) \\ (3, -2) & (5, 6) & (7, -8) \end{pmatrix}$$

והמטריצות התשלומים של השחקנים הנפרדים הינן

$$A = \begin{pmatrix} 0 & 2 & 3 \\ 3 & 5 & 2 \\ 3 & 5 & 7 \end{pmatrix}, \quad B = \begin{pmatrix} 2 & -7 & 2 \\ -2 & 4 & 9 \\ -2 & 6 & -8 \end{pmatrix}.$$

 A המטריצת התשלומים של שחקן 1 ו- B המטריצת התשלומים של שחקן 2. במונחי A ו- B הפונקציות התשלומים שלהם באסטרטגיות מעורבות הן

$$U_1(x, y) = x^t A y = (x_1 \ x_2 \ x_3) \begin{pmatrix} 0 & 2 & 3 \\ 3 & 5 & 2 \\ 3 & 5 & 7 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} y_1 \\ y_2 \\ y_3 \end{pmatrix}$$

$$U_2(x, y) = x^t B y = (x_1 \ x_2 \ x_3) \begin{pmatrix} 2 & -7 & 2 \\ -2 & 4 & 9 \\ -2 & 6 & -8 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} y_1 \\ y_2 \\ y_3 \end{pmatrix}$$

6.2 שיווי משקל נאש ועקרון האדישות

הגדרה 6.4 שיווי משקל נאש באסטרטגיות מעורבות

יהי $G = (N, (S_i)_{i \in N}, (u_i)_{i \in N})$ משחק N שחקנים באסטרטגיות טהורות ויהי $\Gamma = (N, (\Sigma_i)_{i \in N}, (U_i)_{i \in N})$ ההחרבה שלו לאסטרטגיות מעורבות. $\sigma^* = (\sigma_1^*, \dots, \sigma_N^*)$ הוא שיווי משקל באסטרטגיות מעורבות אם התנאי הבא מתקיים

$$U_i(\sigma^*) \geq U_i(\sigma_i, \sigma_{-i}^*) \quad (6.3)$$

משפט 6.2 עקרון האדישות

יהי σ^* שיווי משקל במשחק בצורה אסטרטגית, ותהינה s_i ו- $\hat{s}_i$ שתי אסטרטגיות טהורות של שחקן i . אם $\sigma_i^*(s_i) > 0$ וכן $\sigma_i^*(\hat{s}_i) > 0$ אזי

$$U_i(s_i, \sigma_{-i}^*) = U_i(\hat{s}_i, \sigma_{-i}^*) \quad (6.4)$$

הוכחה: נניח בשלילה כי משוואה (6.4) אינה מתקיימת ובלי הגבלת הכלליות נניח כי

$$U_i(s_i, \sigma_{-i}^*) > U_i(\hat{s}_i, \sigma_{-i}^*) \quad (6.5)$$

תהי σ_i האסטרטגיה של שחקן i המוגדרת באופן הבא:

$$\sigma_i(t_i) \triangleq \begin{cases} \sigma_i^*(t_i) & t_i \notin \{s_i, \hat{s}_i\} \\ 0 & t_i = \hat{s}_i \\ \sigma_i^*(s_i) + \sigma_i^*(\hat{s}_i) & t_i = s_i \end{cases}$$

$$U_i(\sigma_i, \sigma_{-i}^*) = \sum_{t_i \in S_i} \sigma_i(t_i) U_i(t_i, \sigma_{-i}^*) \quad (6.6)$$

$$= \sum_{t_i \notin \{s_i, \hat{s}_i\}} \sigma_i^*(t_i) U_i(t_i, \sigma_{-i}^*) + (\sigma_i^*(s_i) + \sigma_i^*(\hat{s}_i)) U_i(s_i, \sigma_{-i}^*) \quad (6.7)$$

$$> \sum_{t_i \notin \{s_i, \hat{s}_i\}} \sigma_i^*(t_i) U_i(t_i, \sigma_{-i}^*) + \sigma_i^*(s_i) U_i(s_i, \sigma_{-i}^*) + \sigma_i^*(\hat{s}_i) U_i(\hat{s}_i, \sigma_{-i}^*) \quad (6.8)$$

$$= \sum_{t_i \in S_i} \sigma_i^*(t_i) U_i(t_i, \sigma_{-i}^*) \quad (6.9)$$

$$= U_i(\sigma^*) \quad (6.10)$$

קיבלנו כי $U_i(\sigma_i, \sigma_{-i}^*) > U_i(\sigma^*)$ בסתירה לכך ש- X^* שיווי משקל.

דוגמה 6.8 ()

נתון משחק שני שחקנים (שאינו סכום אפס) בצורה אסטרטגית על ידי המטריצה הבאה.

$I \backslash II$	L	R
T	1, 8	9, 2
B	7, 1	2, 5

מצאו את השיווי משקל באסטרטגיות מעורבות.

פתרון:

$I \backslash II$	$y(L)$	$(1-y)(R)$
$x(T)$	1, 8	9, 2
$(1-x)(B)$	7, 1	2, 5

$$U_1(x, y) = (2(1-x) + 9x)(1-y) + (7(1-x) + x)y = -13xy + 7x + 5y + 2.$$

$$U_2(x, y) = (5(1-x) + 2x)(1-y) + (7x + 1)y = 10xy - 3x - 4y + 5.$$

לפי עקרון האדישות:

$$\begin{aligned} U_1(T, y^*) &= U_1(B, y^*) \\ \Rightarrow U_1(1, y^*) &= U_1(0, y^*) \\ \Rightarrow 9 - 8y^* &= 2 + 5y^* \\ \Rightarrow y^* &= \frac{7}{13}. \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} U_2(x^*, L) &= U_2(x^*, R) \\ \Rightarrow U_2(x^*, 1) &= U_2(x^*, 0) \\ \Rightarrow 1 + 7x^* &= 5 - 3x^* \\ \Rightarrow x^* &= \frac{2}{5}. \end{aligned}$$

לכן השיווי משקל הוא

$$x^* = \left(\frac{2}{5}, \frac{3}{5}\right), \quad y^* = \left(\frac{7}{13}, \frac{6}{13}\right).$$

דוגמה 6.9 ()

נתון משחק שני שחקנים (שאינו סכום אפס) בצורה אסטרטגית על ידי המטריצה הבאה.

$I \backslash II$	L	R
T	5, 5	-2, -2
B	4, 4	3, 3

מצאו את השיווי משקל באסטרטגיות מעורבות.

פתרון:

$I \backslash II$	$y(L)$	$(1-y)(R)$
	$x(T)$	$-2, -2$
B	$4, 4$	$3, 3$

$$U_1(x, y) = (3(1-x) - 2x)(1-y) + (4(1-x) + 5x)y = 6xy - 5x + y + 3.$$

$$U_2(x, y) = (3(1-x) - 2x)(1-y) + (4(1-x) + 5x)y = 6xy - 5x + y + 3.$$

לפי עקרון האדישות:

$$U_1(T, y^*) = U_1(B, y^*)$$

$$\Rightarrow U_1(1, y^*) = U_1(0, y^*)$$

$$\Rightarrow -2 + 7y^* = 3 + y^*$$

$$\Rightarrow y^* = \frac{5}{6}.$$

$$U_2(x^*, L) = U_2(x^*, R)$$

$$\Rightarrow U_2(x^*, 1) = U_2(x^*, 0)$$

$$\Rightarrow 4 + x^* = 3 - 5x^*$$

$$\Rightarrow x^* = -\frac{1}{6} \notin [0, 1].$$

אין השיווי משקל באסטרטגיות מעורבות.

משפט 6.3 נוסחאות שיווי משקל למשחק שני-שחקנים ריבועי

יהי $G = (\{1, 2\}, \{S_1, S_2\}, \{u_1, u_2\})$ משחק שני שחקנים ריבועי שבו לכל שחקן יש n אסטרטגיות טהורות.

יהי $x^* = \begin{pmatrix} x_1^* \\ \vdots \\ x_n^* \end{pmatrix} \in \mathbb{R}^n$ וקטור אסטרטגיות שיווי משקל של שחקן 1,

יהי $y^* = \begin{pmatrix} y_1^* \\ \vdots \\ y_n^* \end{pmatrix} \in \mathbb{R}^n$ וקטור אסטרטגיות שיווי משקל של שחקן 2

תהי $A \in \mathbb{R}^{n \times n}$ מטריצת התשלומים של שחקן 1, תהי $B \in \mathbb{R}^{n \times n}$ מטריצת התשלומים של שחקן 2,

ויהו U_1^* ו- U_2^* התשלומי שיווי משקל של שחקן 1 ושחקן 2 בהתאמה.

אזי

$$x^{*t} = \frac{e^t B^{-1}}{\langle e, B^{-1}e \rangle}, \quad U_1^* = \langle x^*, Ay^* \rangle = \frac{1}{\langle e, A^{-1}e \rangle}$$

$$y^* = \frac{A^{-1}e}{\langle e, A^{-1}e \rangle}, \quad U_2^* = \langle x^*, By^* \rangle = \frac{1}{\langle e, B^{-1}e \rangle}.$$

$$e = \begin{pmatrix} 1 \\ \vdots \\ 1 \end{pmatrix} \in \mathbb{R}^n \text{ וקטור של } \mathbb{R}^n \text{ שבו כל איבר שווה ל-1.}$$

הוכחה:

- לפי עקרון האדישות, אם שחקן 1 משחק לפי האסורוגיה המעורבת x^* של שיווי המשקל אזי שחקן 2 יהיה אדיש בין האסטרטגיות הטהורות שלו. ז"א

$$x^{*t} B = U_2 e^t.$$

לכן

$$x^{*t} = U_2 e^t B^{-1}.$$

מכיוון שהסכום של ההסתברויות שווה ל-1 אז

$$1 = x^{*t} e = U_2 e^t B^{-1} e \Rightarrow U_2 = \frac{1}{e^t B^{-1} e} = \frac{1}{\langle e, B^{-1} e \rangle}.$$

על ידי הצבה בביטוי הקודם נקבל

$$x^{*t} = \frac{e^t B^{-1}}{\langle e, B^{-1} e \rangle}.$$

- באותה מידה לפי עקרון האדישות, אם שחקן 2 משחק לפי האסורוגיה המעורבת y^* של שיווי המשקל אזי שחקן 1 יהיה אדיש בין האסטרטגיות הטהורות שלו. ז"א

$$A y^* = U_1 e.$$

לכן

$$y^* = U_1 A^{-1} e.$$

מכיוון שהסכום של ההסתברויות שווה ל-1 אז

$$1 = e^t y^* = U_1 e^t A^{-1} e \Rightarrow U_1 = \frac{1}{e^t A^{-1} e} = \frac{1}{\langle e, A^{-1} e \rangle}.$$

על ידי הצבה בביטוי הקודם נקבל

$$y^* = \frac{A^{-1} e}{\langle e, A^{-1} e \rangle}.$$

•

$$\begin{aligned} U_1^* &= \langle x^*, A y^* \rangle = x^{*t} A y^* \\ &= \frac{e^t B^{-1} A A^{-1} e}{\langle e, A^{-1} e \rangle \langle e, B^{-1} e \rangle} \\ &= \frac{e^t B^{-1} e}{\langle e, A^{-1} e \rangle \langle e, B^{-1} e \rangle} \\ &= \frac{\langle e, B^{-1} e \rangle}{\langle e, A^{-1} e \rangle \langle e, B^{-1} e \rangle} \\ &= \frac{1}{\langle e, A^{-1} e \rangle}. \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} U_2^* &= \langle x^*, By^* \rangle = x^{*t} B y^* \\ &= \frac{e^t B^{-1} B A^{-1} e}{\langle e, A^{-1} e \rangle \langle e, B^{-1} e \rangle} \\ &= \frac{e^t A^{-1} e}{\langle e, A^{-1} e \rangle \langle e, B^{-1} e \rangle} \\ &= \frac{\langle e, A^{-1} e \rangle}{\langle e, A^{-1} e \rangle \langle e, B^{-1} e \rangle} \\ &= \frac{1}{\langle e, B^{-1} e \rangle} . \end{aligned}$$

דוגמה 6.10 ()

$I \backslash II$	a	b	c
α	1, 1	1, 2	2, 1
β	1, 2	3, 1	0, 1
γ	2, -1	1, 1	1, 2

פתרון:

$$\begin{aligned} A &= \begin{pmatrix} 1 & 1 & 2 \\ 1 & 3 & 0 \\ 2 & 1 & 1 \end{pmatrix} , \quad B = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 1 \\ 2 & 1 & 1 \\ -1 & 1 & 2 \end{pmatrix} . \\ A^{-1} &= \frac{1}{8} \begin{pmatrix} -3 & -1 & 6 \\ 1 & 3 & -2 \\ 5 & -1 & -2 \end{pmatrix} , \quad B^{-1} = \frac{1}{6} \begin{pmatrix} -1 & 3 & -1 \\ 5 & -3 & -1 \\ -3 & 3 & 3 \end{pmatrix} . \end{aligned}$$

לכן

$$\begin{aligned} U_1^* &= \frac{1}{\langle e, A^{-1} e \rangle} = \frac{4}{3} . \\ U_2^* &= \frac{1}{\langle e, B^{-1} e \rangle} = \frac{6}{5} . \\ x^* &= U_2^* B^{-1} e = \left(\frac{1}{5} \quad \frac{1}{5} \quad \frac{3}{5} \right) . \\ y^* &= U_1^* e^t A^{-1} = \left(\frac{1}{2} \quad \frac{1}{6} \quad \frac{1}{3} \right) , \end{aligned}$$

מסקנה 6.1 נוסחאות שיווי משקל למשחק שני-שחקנים סכום-אפס ריבועי

במשחק סכום אפס ריבועי שבו לכל שחקן יש n אסטרטגיות טהורות. אם A המטריצת המשחק אז הווקטורי אסטרטגיות שיווי משקל x^* ו- y^* של שחקן 1 (שחקן השורות) ושחקן 2 (שחקן העמודות), והתשלום שיווי

משקל נתונים על ידי

$$x^{*t} = \frac{e^t A^{-1}}{\langle e, A^{-1}e \rangle}, \quad y^* = \frac{A^{-1}e}{\langle e, B^{-1}e \rangle}, \quad U = \langle x^*, Ay^* \rangle = \frac{1}{\langle e, A^{-1}e \rangle}.$$

משפט 6.4

יהי $G = (N, (S_i)_{i \in N}, (u_i)_{i \in N})$ משחק בצורה אסטרטגית ו- Γ ההרחבה שלו לאסטרטגיות מעורבות. וקטור אסטרטגיות מעורבות σ^* הוא שיווי משקל באסטרטגיות מעורבות במשחק Γ אם ורק אם לכל שחקן $i \in N$ ולכל אסטרטגיה טהורה $s_i \in S_i$ מתקיים

$$U_i(\sigma^*) \geq U_i(s_i, \sigma_{-i}^*). \quad (6.11)$$

הוכחה: σ^* שיווי משקל באסטרטגיות מעורבות במשחק Γ אז

$$U_i(\sigma^*) \geq U_i(s_i, \sigma_{-i}^*)$$

לכל שחקן i ולכל אסטרטגיה מעורבת $\sigma_i \in \Sigma_i$.

כל אסטרטגיה טהורה היא אסטרטגיה מעורבת, אז

$$U_i(\sigma^*) \geq U_i(s_i, \sigma_{-i}^*)$$

לכל שחקן i ולכל אסטרטגיה טהורה $s_i \in S_i$.

להוכחת הכיוון ההפוך, נניח כי וקטור האסטרטגיות המעורבות σ^* מקיים את המשוואה (6.11) לכל שחקן $i \in N$ ולכל אסטרטגיה טהורה $s_i \in S_i$. אזי לכל אסטרטגיה מעורבת σ_i של שחקן i :

$$U_i(\sigma_i, \sigma_{-i}^*) = \sum_{s_i \in S_i} \sigma_i(s_i) U_i(s_i, \sigma_{-i}^*) \quad (6.12)$$

$$\leq \sum_{s_i \in S_i} \sigma_i(s_i) U_i(\sigma^*) \quad (6.13)$$

$$= U_i(\sigma^*) \sum_{s_i \in S_i} \sigma_i(s_i) = U_i(\sigma^*), \quad (6.14)$$

כאשר השוויון (6.12) נובע מכך ש- U_i היא פונקציה מולטי-לינארית והאי-שוויון (6.13) נובע מהאי-שוויון (6.11).
בפרט, σ^* הוא שיווי משקל באסטרטגיות מעורבות ב- Γ . ■

מסקנה 6.2

יהי σ^* שיווי משקל במשחק בצורה אסטרטגית, ותהיינה s_i ו- $\hat{s}_i$ שתי אסטרטגיות טהורות של שחקן i .

(1) אם $U_i(s_i, \sigma_{-i}^*) < U_i(\sigma^*)$ אז $\sigma_i^*(s_i) = 0$.

(2) אם $U_i(s_i, \sigma_{-i}^*) < U_i(\hat{s}_i, \sigma_{-i}^*)$ אז $\sigma_i^*(s_i) = 0$.

(3) אם $\sigma_i^*(s_i) > 0$ ו- $\sigma_i^*(\hat{s}_i) > 0$ אז $U_i(s_i, \sigma_{-i}^*) = U_i(\hat{s}_i, \sigma_{-i}^*)$.

(4) אם s_i נשלטת חזק על ידי $\hat{s}_i$ אז $\sigma_i^*(s_i) = 0$.

הוכחה:

$$(1) \quad U_i(s_i, \sigma_{-i}^*) < U_i(\sigma^*)$$

נניח בשלילה כי $\sigma_i^*(s_i) > 0$. לפי עקרטו האדישות לכל אסטרטגיה טהורה $\hat{s}_i$ עבורה $\sigma_i^*(\hat{s}_i) > 0$ מתקיים

$$U_i(\hat{s}_i, \sigma_{-i}^*) = U_i(s_i, \sigma_{-i}^*) \quad \text{לכן}$$

$$\begin{aligned} U_i(\sigma^*) &= \sum_{\hat{s}_i \in S_i} \sigma_i^*(\hat{s}_i) U_i(\hat{s}_i, \sigma_{-i}^*) \\ &= \sum_{\substack{\hat{s}_i \in S_i \\ \sigma_i^*(\hat{s}_i) > 0}} \sigma_i^*(\hat{s}_i) U_i(\hat{s}_i, \sigma_{-i}^*) \\ &= \sum_{\substack{\hat{s}_i \in S_i \\ \sigma_i^*(\hat{s}_i) > 0}} \sigma_i^*(\hat{s}_i) U_i(s_i, \sigma_{-i}^*) \\ &= U_i(s_i, \sigma_{-i}^*) \end{aligned}$$

בסתירה לכך ש- $U_i(s_i, \sigma_{-i}^*) < U_i(\sigma^*)$.

(2)

$$U_i(s_i, \sigma_{-i}^*) < U_i(\hat{s}_i, \sigma_{-i}^*) \stackrel{\text{אדישות}}{=} U_i(\sigma^*)$$

ז"א $U_i(s_i, \sigma_{-i}^*) < U_i(\sigma^*)$ ולכן לפי סעיף א' $\sigma_i^*(s_i) = 0$.

(3) עקרון האדישות (משפט 6.2).

(4) נניח כי s_i נשלטת חזק על ידי $\hat{s}_i$. אזי

$$u_i(s_i, s_{-i}) < u_i(\hat{s}_i, s_{-i}) \quad \forall s_{-i} \in S_{-i}.$$

מכאן

$$\begin{aligned} U_i(s_i, \sigma_{-i}^*) &= \sum_{s_{-i} \in S_{-i}} \sigma_{-i}^*(s_{-i}) u_i(s_i, s_{-i}) \\ &< \sum_{s_{-i} \in S_{-i}} \sigma_{-i}^*(s_{-i}) u_i(\hat{s}_i, s_{-i}) \\ &= U_i(\hat{s}_i, \sigma_{-i}^*) \end{aligned}$$

ז"א

$$U_i(s_i, \sigma_{-i}^*) < U_i(\hat{s}_i, \sigma_{-i}^*)$$

ולכן לפי סעיף ב' $\sigma_i^*(s_i) = 0$.

6.3 דוגמאות

דוגמה 6.11 (מלחמת המינים)

המשחק הבא נקרא "מלחמת המינים". זוג מתכונן בילוי לערב שבת. האפשרויות העומדות לרשותם הן קונצרט (C) או צפייה שמשחק כדורגל (F). הגבר מעדיף צפייה במשחק הכדורגל, בעוד האישה מעדיפה את הוקנצרט, אך שניהם מעדיפים להיות יחד גם אם הבילוי המשותף הוא הפחות עדיף בעיניהם. מצאו את

כל שיווי המשקל של המשחק.

$I \backslash II$	F	C
F	2, 1	0, 0
C	0, 0	1, 2

מצאו כל שיווי משקל של המשחק.

פתרון:

קודם כל נשים לב שיש למשחק שיווי משקל באסטרטגיות טהורות:

$I \backslash II$	F	C
F	<u>2</u> , <u>1</u>	0, 0
C	0, 0	<u>1</u> , <u>2</u>

כעת נבדוק אם יש שיווי משקל באסטרטגיות מעורבות.

$I \backslash II$	$y(F)$	$(1 - y)C$
$x(F)$	<u>2</u> , <u>1</u>	0, 0
$(1 - x)(C)$	0, 0	<u>1</u> , <u>2</u>

לפי עקרון האדישות:

$$U_1(F, y^*) = U_1(C, y^*) \Rightarrow 2y^* = (1 - y^*) \Rightarrow y^* = \frac{1}{3}.$$

$$U_2(x^*, F) = U_2(x^*, C) \Rightarrow x^* = 2(1 - x^*) \Rightarrow x^* = \frac{2}{3}.$$

לכן הווקטור אסטרטגיות $\sigma^* = (X^*, Y^*)$ כאשר

$$\sigma_1^* = \left(\frac{2}{3}(F), \frac{1}{3}(C) \right), \quad \sigma_2^* = \left(\frac{1}{3}(F), \frac{2}{3}(C) \right)$$

הוא שיווי משקל באסטרטגיות מעורבות.

דוגמה 6.12 ()

במשחק הבא מצאו את כל שיווי המשקל של המשחק.

$I \backslash II$	L	R
T	4, -4	-4, 4
M	-4, 4	4, 3
B	-4, 2	3, 1

פתרון:

נבדוק אם קיים שיווי משקל באסטרטגיות טהורות לפי שיטת תשובות הטובות ביותר:

$I \backslash II$	L	R
T	$\underline{4}, -4$	$-4, \underline{4}$
M	$-4, \underline{4}$	$\underline{4}, 3$
B	$-4, \underline{2}$	$3, 1$

לפיכך לא קיים שיווי משקל באסטרטגיות טהורות.

לפי משפט נאש בהכרח קיים שיווי משקל באסטרטגיות מעורבות. אסטרטגיה B נשלטת על ידי M לכן שחקן 1 ישחק לפי אסטרטגיה B בהסתברות 0. לכן המשחק באסטרטגיות מעורבות הינו

$I \backslash II$	$y(L)$	$(1-y)(R)$
$x(T)$	$4, -4$	$-4, 4$
$(1-x)(M)$	$-4, 4$	$4, 3$
$0(B)$	$-4, 2$	$3, 1$

לפי עקרון האדישות אם x^* שיווי משקל אז שחקן 2 אדיש בין האסטרטגיה L לבין האסטרטגיה R :

$$U_2(x^*, L) = U_2(x^*, R) \Rightarrow -4x^* + 4(1-x^*) = 4x^* + 3(1-x^*) \Rightarrow -7x^* = -1 \Rightarrow x^* = \frac{1}{7}.$$

לפי עקרון האדישות אם y^* שיווי משקל אז 1 אדיש בין האסטרטגיה T לבין האסטרטגיה M :

$$U_1(T, y^*) = U_1(M, y^*) \Rightarrow 4y^* - 4(1-y^*) = -4y^* + 4(1-y^*) \Rightarrow 16y^* = 8 \Rightarrow y^* = \frac{1}{2}.$$

לכן $\sigma^* = (\sigma_1^*, \sigma_2^*)$ שיווי משקל של המשחק באסטרטגיות מעורבות כאשר

$$\sigma_1^* = \left(\frac{1}{7}, \frac{6}{7}\right), \quad \sigma_2^* = \left(\frac{1}{2}, \frac{1}{2}\right).$$

■

דוגמה 6.13 ()

נתון המשחק הבא.

$I \backslash II$	L	C	R
T	$0, 0$	$7, 6$	$6, 7$
M	$6, 7$	$0, 0$	$7, 6$
B	$7, 6$	$6, 7$	$0, 0$

מצאו את כל שיווי המשקל של המשחק.

פתרון:

המטריצת התשלומים של שחקן I היא

$$A = \begin{pmatrix} 0 & 7 & 6 \\ 6 & 0 & 7 \\ 7 & 6 & 0 \end{pmatrix}$$

$$|A| = 559 \text{ לכן}$$

$$A^{-1} = \frac{1}{559} \begin{pmatrix} -42 & 49 & 36 \\ 36 & -42 & 49 \\ 49 & 36 & -42 \end{pmatrix}^t = \frac{1}{559} \begin{pmatrix} -42 & 36 & 49 \\ 49 & -42 & 36 \\ 36 & 49 & -42 \end{pmatrix}.$$

המטריצת התשלומים של שחקן II היא

$$B = \begin{pmatrix} 0 & 6 & 7 \\ 7 & 0 & 6 \\ 6 & 7 & 0 \end{pmatrix}$$

$$|B| = 559 \text{ לכן}$$

$$B^{-1} = \frac{1}{559} \begin{pmatrix} -42 & 36 & 49 \\ 49 & -42 & 36 \\ 36 & 49 & -42 \end{pmatrix}^t = \frac{1}{559} \begin{pmatrix} -42 & 49 & 36 \\ 36 & -42 & 49 \\ 49 & 36 & -42 \end{pmatrix}.$$

מכאן

$$\langle e, A^{-1}e \rangle = \frac{1}{559} \left\langle \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 43 \\ 43 \\ 43 \end{pmatrix} \right\rangle = \frac{129}{559}.$$

לכן התשלום בשיווי משקל לשחקן 1 הוא:

$$U_1^* = \frac{1}{\langle e, A^{-1}e \rangle} = \frac{559}{129}$$

$$\langle e, B^{-1}e \rangle = \frac{1}{559} \left\langle \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 43 \\ 43 \\ 43 \end{pmatrix} \right\rangle = \frac{129}{559}.$$

לכן התשלום בשיווי משקל לשחקן 2 הוא:

$$U_2^* = \frac{1}{\langle e, B^{-1}e \rangle} = \frac{559}{129}$$

$$y^* = \frac{e^t A^{-1}}{\langle e, A^{-1}e \rangle} = \frac{559}{129} \cdot \frac{1}{559} (43 \ 43 \ 43) = \left(\frac{1}{3} \ \frac{1}{3} \ \frac{1}{3} \right)$$

$$x^* = \frac{B^{-1}e}{\langle e, B^{-1}e \rangle} = \frac{559}{129} \cdot \frac{1}{559} \begin{pmatrix} 43 \\ 43 \\ 43 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \frac{1}{3} \\ \frac{1}{3} \\ \frac{1}{3} \end{pmatrix}$$

■

דוגמה 6.14 (ערך המקסמין של משחק סכום אפס באסטרטגיות מעורבות)

נתון משחק שני שחקנים סכום אפס.

$I \backslash II$	L	R
T	4	1
B	2	3

(א) מצאו את הערך של המשחק באסטרטגיות טהורות.

(ב) מצאו את הערך של המשחק באסטרטגיות מעורבות.

פתרון:

(א)

$I \backslash II$	L	R	$\min_{s_2 \in S_2}$
T	4	1	1
B	2	3	2
$\max_{s_1 \in S_1}$	4	3	2, 3

ערך המקסמין של שחקן 1:

$$\underline{v} = \max_{s_1 \in \{T, B\}} \min_{s_2 \in \{L, R\}} = 2.$$

ז"א שחקן 1 יכול להבטיח שיקבל לפחות 2 אם הוא ישחק B .

ערך המינימקס של שחקן 2:

$$\bar{v} = \min_{s_2 \in \{L, R\}} \max_{s_1 \in \{T, B\}} = 3.$$

ז"א שחקן 2 יכול להבטיח שישלם לכל היותר 3 אם הוא ישחק R .

$$\bar{v} = 3 > 2 = \underline{v}.$$

למשחק אין ערך.

(ב) כאשר לשחקן 1 יש שתי אסטרטגיות טהורות T ו- B , נזהה את האסטרטגיה המעורבת

$$[x(T), (1-x)(B)]$$

עם ההסתברות x שבה נבחרת האסטרטגיה הטהורה T .

באופן דומה, כאשר יש לשחקן 2 שתי אסטרטגיות טהורות L ו- R , נזהה את האסטרטגיה המעורבת

$$[y(L), (1-y)(R)]$$

עם ההסתברות y שבה נבחרת האסטרטגיה הטהורה L .

לכל זוג אסטרטגיות מעורבות התשלום ניתן על ידי פונקציה התועלת

$$U(x, y) = 4xy + 1x(1-y) + 2(1-x)y + 3(1-x)(1-y) = 4xy - 2x - y + 3.$$

ראשית נחשב לכל $x \in [0, 1]$ את


$$\min_{y \in [0, 1]} U(x, y) = \min_{y \in [0, 1]} (4xy - 2x - y + 3) = \min_{y \in [0, 1]} (y(4x - 1) - 2x + 3)$$

עבור x קבוע זוהי פונקציה לינארית ב- y , ולכן הנקודה שבה המינימום מתקבל נקבעת לפי השיפוע $4x - 1$.

אם השיפוע חיובי הפונקציה עולה והמינימום מתקבל ב- $y = 0$.

אם השיפוע שלילי הפונקציה יורדת והמינימום מתקבל ב- $y = 1$.
אם השיפוע 0 הפונקציה קבועה וכל הנקודות הן נקודות מינימום. לכן

$$\min_{y \in [0,1]} u(x, y) = \begin{cases} 2x + 2 & x \leq \frac{1}{4} , \\ -2x + 3 & x \geq \frac{1}{4} , \end{cases}$$




לפונקציה זו של x יש מקסימום יחיד ב- $x = \frac{1}{4}$ וערכו $\frac{5}{2}$. לכן

$$\underline{v} = \max_{x \in [0,1]} \min_{y \in [0,1]} U(x, y) = \frac{5}{2} .$$

באופן דומה נחשב:

$$\begin{aligned} \max_{x \in [0,1]} U(x, y) &= \max_{x \in [0,1]} [4xy - 2x - y + 3] \\ &= \max_{x \in [0,1]} [x(4y - 2) - y + 3] \\ &= \begin{cases} -y + 3 & y \leq \frac{1}{2} , \\ 3y + 1 & y \geq \frac{1}{2} , \end{cases} \end{aligned}$$



לפונקציה זו של y יש מינימום יחיד ב- $y = \frac{1}{2}$ וערכו $\frac{5}{2}$. לכן

$$\bar{v} = \min_{y \in [0,1]} \max_{x \in [0,1]} U(x, y) = \frac{5}{2}.$$

כלומר, למשחק יש ערך $v = \underline{v} = \bar{v} = \frac{5}{2}$, והאסטרטגיות האופטימליות הן $x^* = \frac{1}{4}$, $y^* = \frac{1}{2}$.

מכיוון ש- x^* ו- y^* הן אסטרטגיות האופטימליות היחידות של השחקנים, אז (x^*, y^*) הוא שיווי המשקל נאש היחיד במשחק.



דוגמה 6.15 (מקסמין של משחק שני שחקנים באסטרטגיות מעורבות)

נתון משחק שני שחקנים (שאינו סכום אפס) בצורה אסטרטגית על ידי המטריצה הבאה.

		II	
		L	R
I	T	1, -1	0, 2
	B	0, 1	2, 0

מצאו התשלום מקסמין והתשלום מינמקס באסטרטגיות מעורבות.

פתרון:

ראשית נחשב את התשלום מקסמין של השחקנים.

קבוצות האסטרטגיות של שחקן 1:

$$\Sigma_1 = \{[x(T), (1-x)(B)] \mid x \in [0, 1]\}.$$

המזוהה עם הקטע $[0, 1]$.

קבוצות האסטרטגיות של שחקן 2:

$$\Sigma_2 = \{[y(L), (1-y)(R)] \mid y \in [0, 1]\}.$$

פונקצית התועלת של שחקן 1:

$$U_1(x, y) = xy + 2(1-x)(1-y) = 3xy - 2x - 2y + 2.$$

פונקצית התועלת של שחקן 2:

$$U_2(x, y) = -xy + 2x(1-y) + y(1-x) = -4xy + 2x + y.$$


התשלום מקסמין של שחקן 1 הינו:

$$\underline{v}_1 = \max_{x \in [0,1]} \min_{y \in [0,1]} U_1(x, y).$$

התשלום מקסמין של שחקן 2 הינו:

$$\underline{v}_2 = \max_{y \in [0,1]} \min_{x \in [0,1]} U_2(x, y).$$

$$\begin{aligned} \min_{y \in [0,1]} U_1(x, y) &= \min_{y \in [0,1]} 3xy - 2x - 2y + 2 \\ &= \min_{y \in [0,1]} y(3x - 2) - 2x + 2 \\ &= \begin{cases} x & x \leq \frac{2}{3} \\ -2x + 2 & x \geq \frac{2}{3} \end{cases} \end{aligned}$$




לפונקציה זו יש מקסימום ב- $x = \frac{2}{3}$. לפיכך

$$\underline{v}_1 = \max_{x \in [0,1]} \min_{y \in [0,1]} U_1(x, y) = \frac{2}{3}.$$

התשלום מקסמין של שחקן 2 הינו:

$$\underline{v}_2 = \max_{y \in [0,1]} \min_{x \in [0,1]} U_2(x, y).$$

$$\begin{aligned} \min_{x \in [0,1]} U_2(x, y) &= \min_{x \in [0,1]} 3xy - 2x - 2y + 2 \\ &= \min_{x \in [0,1]} x(2 - 4y) + y \\ &= \begin{cases} y & y \leq \frac{1}{2} \\ 2 - 3y & y \geq \frac{1}{2} \end{cases} \end{aligned}$$



לפונקציה זו יש מקסימום ב- $y = \frac{1}{2}$. לפיכך

$$v_2 = \max_{x \in [0,1]} \min_{y \in [0,1]} U_2(x, y) = \frac{1}{2} .$$

■

דוגמה 6.16 (ערך ואסטרטגיה אופטימלית של משחק סכום אפס באסטרטגיות מעורבות)

נתון משחק שני שחקנים סכום אפס בצורה אסטרטגית על ידי המטריצה הבאה.

$I \backslash II$	L	R
	5	0
T	5	0
B	3	4


מצאו את הערך של המשחק באסטרטגיות מעורבות.

פתרון:

תחילה נחשב את המקסמין של שחקן 1. אם שחקן 1 משחק את האסטרטגיה המעורבת $[x(T), (1 - x)(B)]$ התשלום שלו כפונקציה של x תלוי על האסטרטגיה של שחקן 2:

- $U(x, L) = 5x + 3(1 - x) = 2x + 3.$
- אם שחקן 2 משחק L אז
- $U(x, R) = 4(1 - x) = -4x + 4.$
- אם שחקן 2 משחק R אז

הגרף למטה מראה את הגרפים של הפונקציות האלו. הקו של $\min_{s_2 \in \{L, R\}} U(x, s_2)$ מראה את התשלום המינימלי ששחקן 1 יקבל אם הוא משחק x . הקו הזה נקרא **מעטפת תחתונה** של התשלומים.



הערך של המשחק באסטרטגיות מעורבות שווה ל- $\max_{x \in [0,1]} \min_{s_2 \in \{L,R\}} U(x, s_2)$, אשר מתקבל בנקודת מקסימום של המעטפת התחתונה. המקסימום מתקבל בנקודת חיתוך של הקווים של שתי הפונקציות, כלומר בנקודה

$$2x + 3 = -4x + 4 \quad \Rightarrow \quad x = \frac{1}{6}.$$


מכאן האסטרטגיה האופטימלית של שחקן 1 היא $x^* = \left(\frac{1}{6}(T), \frac{5}{6}(B)\right)$. הערך של המשחק שווה לגובה של הנקודת חיתוך: $v = \frac{10}{3}$.

כעת נחשב את המינמקס של שחקן 2. אם שחקן 2 משחק את האסטרטגיה המעורבת $[y(L), (1-y)(R)]$ התשלום שלו כפונקציה של y תלוי על האסטרטגיה של שחקן 1:

• אם שחקן 1 משחק T אז $U(T, y) = 5y$.

• אם שחקן 1 משחק B אז $U(B, y) = 4 - y$.

הגרף למטה מראה את הגרפים של הפונקציות האלו. הקו של $\max_{s_1 \in \{B,T\}} U(s_1, y)$ מראה את התשלום המקסימלי ששחקן 2 יקבל אם הוא משחק y . הקו הזה נקרא **מעטפת עליונה** של התשלומים.



הערך של המשחק באסטרטגיות מעורבות שווה ל- $\min_{y \in [0,1]} \max_{s_1 \in \{B,T\}} U(s_1, y)$, אשר מתקבל בנקודת מינימום של המעטפת העליונה. המינימום מתקבל בנקודת חיתוך של הקווים של שתי הפונקציות, כלומר בנקודה

$$5y = 4 - y \quad \Rightarrow \quad y = \frac{2}{3}.$$

מכאן האסטרטגיה האופטימלית של שחקן 2 היא $y^* = \left(\frac{2}{3}(L), \frac{1}{3}(R)\right)$. הערך של המשחק שווה לגובה של הנקודת

חיתוך: $v = \frac{10}{3}$. ■

דוגמה 6.17 ()

נתון משחק שני שחקנים סכום אפס בצורה אסטרטגית על ידי המטריצה הבאה.

$I \backslash II$	L	M	R
T	2	5	-1
B	1	-2	5

מצאו את הערך של המשחק באסטרטגיות מעורבות.

פתרון:

נחשב את המקסמין של שחקן 1. אם שחקן 1 משחק את האסטרטגיה המעורבת $[x(T), (1-x)(B)]$ התשלום שלו כפונקציה של x תלוי על האסטרטגיה של שחקן 2:

• אם שחקן 2 משחק L אז $U(x, L) = 2x + (1-x) = 1 + x$.


• אם שחקן 2 משחק M אז

$$U(x, M) = 5x - 2(1 - x) = 7x - 2.$$

• אם שחקן 2 משחק R אז

$$U(x, R) = -x + 5(1 - x) = -6x + 5.$$

התרשים למטה מתאר את הגרפים של שלוש פונקציות אלו.



המקסימום של המעטפת התחתונה מתקבל בנקודת חיתוך של הקווים של $U(x, L)$ ו- $U(x, R)$:

$$1 + x \stackrel{!}{=} -6x + 5 \quad \Rightarrow \quad x = \frac{4}{7}$$

■