

LYON 60 ME

Herbicida de uso agrícola
Titular: QUÍMICOS OMA S.A.

Tipo de formulación:	Microemulsión (ME)
Ingrediente activo:	Oxadiazón
Concentración:	60 g/L
Ingredientes aditivos:	c.s.p. 1 litro
Grupo químico:	N-Phenyl-oxadiazolones

MODO DE ACCIÓN: Herbicida selectivo que actúa por contacto y sistémico.

MECANISMO DE ACCIÓN: Inhibe la protoporfirinogeno-9-oxidasa promoviendo daños en las membranas celulares, afectando su organización, permeabilidad, el transporte de iones y la activación de luz en las sustancias reactivas de oxígeno-ROS. La selectividad se basa en factores anatómicos y morfológicos, especialmente cuando se da una baja penetración en el interior de la planta.

RECOMENDACIONES DE USO

“Consulte con un Ingeniero Agrónomo”

CULTIVO	MALEZAS	DOSIS	P.C	P.R.
Arroz	MALEZAS DE HOJA ANCHA: Pega-pegá (<i>Desmodium tortuosum</i>), Dormidera (<i>Mimosa pudica</i>), Verdolaga (<i>Portulaca oleracea</i>), GRAMÍNEAS: Falsa caminadora (<i>Ischaemum rugosum</i>), Caminadora (<i>Rottboellia exaltata</i>), Paja mona (<i>Leptochloa filiformis</i>), Liendrepuerco (<i>Echinochloa colonum</i>), Guardarroció (<i>Digitaria sanguinalis</i>), Paja peluda (<i>Paspalum pilosum</i>), Pata de gallina (<i>Eleusine indica</i>)	1 – 1,5 L /ha Pre y Pos emergencia. PREEMERGENCIA Aplíquese 3 días antes de la siembra. POSTEMERGENCIA Aplíquese entre los 4 y 8 días después de la germinación.	N.A.	0 horas

P.R.: Periodo de Reentrada (Reingreso): Tiempo que debe transcurrir entre la aplicación del plaguicida y el ingreso de personas y animales al área o cultivo tratado sin elementos de protección personal. Las personas no podrán ingresar al área de cultivo dentro del tiempo establecido. El valor PR contenido en la presente etiqueta fue calculado por evaluación del riesgo (método 2. Res. ICA 00011768)

P.C.: Periodo de Carencia: Días que deben transcurrir entre la última aplicación y la cosecha.

Advertencia: “Para aplicaciones aéreas y terrestres, se debe respetar las franjas de seguridad de 100 y 10 metros respectivamente, con relación a cuerpos de agua”
No contamine las aguas.

FITOTOXICIDAD: No se ha presentado fitotoxicidad en los cultivos de la recomendación de uso. Sin embargo, se recomienda hacer pruebas previas a su uso comercial.

COMPATIBILIDAD: Se recomienda hacer pruebas de compatibilidad de mezcla antes de hacer las aplicaciones comerciales. El producto es selectivo y presenta control solo sobre las especies de las recomendaciones de uso.

Lea la etiqueta antes de usar el producto

Presentaciones: 4 y 20 Litros

**EMERGENCIAS TOXICOLÓGICAS 24 HORAS CISPQUIM 018000916012 FUERA DE BOGOTÁ.
EN BOGOTÁ COMUNICARSE AL TELÉFONO 2886012**



Registro Nacional ICA No. PL00018502023
Formulado, Distribuido y Comercializado por:
QUIMICOS OMA S.A.
Autopista Medellín Km 2.5 Vía Parcelas (Cota) Km 1.3
Parque Empresarial AEPI, Bodega 16
PBX: 8985179 – E. Mail: servicioalcliente@quimicosoma.com
Cota (Cundinamarca), Colombia
www.quimicosoma.com