FICHA TÉCNICA ZOOM 650 SC



Actualización: 08/02/2023



Fungicida de uso agrícola

Titular: QUÍMICOS OMA S.A.

Tipo de formulación: Suspensión Concentrada (SC) **Ingrediente activo:** Dimetomorph + Propamocarb HCl

Concentración: 300 g/L + 350 g/L

Ingredientes aditivos: c.s.p. 1 litro.

Grupo químico: Morfolinas + Carbamatos

MODO DE ACCIÓN: Preventivo-protectante, curativo y erradicante; sistemicidad ascendente y movimiento translaminar. Proporciona protección total y prolongada a la planta.

MECANISMO DE ACCIÓN: Inhibe la formación o biosíntesis de la pared celular y afecta la permeabilidad de la membrana. Como consecuencia afecta la germinación del patógeno, su crecimiento micelial y su esporulación.

COMPATIBILIDAD: Se recomienda hacer pruebas de fitocompatibilidad y compatibilidad de mezcla antes de su aplicación comercial. No ha causado fitotoxicidad en las dosis y cultivos de las recomendaciones de uso.

RECOMENDACIONES DE USO

| CULTIVOS | ENFERMEDADES | DOSIS | P.C. | P.R. |
|--------------------|---|----------------|---------|-----------|
| Cebolla (bulbo) | Mildeo Velloso Peronospora destructor | 400 cc / 200 L | 7 días | 4 horas |
| Papa | Gota o tizón tardío Phytophthora infestans | 400 cc / 200 L | 7 días | 4 horas |
| Piña | Podredumbre del corazón Phytophthora parasitica | 3 cc / L | 90 días | 24 horas* |
| Rosa | Mildeo velloso Peronospora sparsa | 1.25 cc /L | N.A. | 4 horas |
| Tomate | Gota o tizón tardío Phytophthora infestans | 400 cc / 200 L | 7 días | 4 horas |
| Uva | Mildeo Velloso Plasmophara viticola | 1.5 cc/L | 7 días | 4 horas |

P.R.: Periodo de Reentrada (Reingreso): Tiempo que debe transcurrir entre la aplicación del plaguicida y el ingreso de personas y animales al área o cultivo tratado sin elementos de protección personal. Las personas no podrán ingresar al área de cultivo dentro del tiempo establecido. El valor PR contenido en la presente etiqueta fue calculado por evaluación del riesgo (método 2. Res. ICA 00011768). El valor PR para Piña fue calculado por evaluación de peligrosidad (método 1. Res. ICA 00011768)

P.C.: Periodo de Carencia: Días que deben transcurrir entre la última aplicación y la cosecha

N.A.: No Aplica

FICHA TÉCNICA ZOOM 650 SC



Advertencias:

"Para aplicaciones aéreas y terrestres, se debe respetar las franjas de seguridad de 100 y 10 metros respectivamente, con relación a cuerpos de agua"

- No contamine las aguas.
- Lea la etiqueta antes de usar el producto

OBSERVACIONES

Fitotoxicidad: No presenta fitotoxicidad en los cultivos recomendados. Dada la existencia de materiales genéticos (variedades) diferentes a los probados con el producto, es necesario hacer pruebas propias de fitotoxicidad.

PRESENTACIONES: 200 cc, 1, 4, 20 Litros

EMERGENCIAS TOXICOLÓGICAS 24 HORAS CISPROQUIM 018000916012 FUERA DE BOGOTÁ.
EN BOGOTÁ COMUNICARSE AL TELÉFONO 2886012



Registro Nacional ICA No. PL0003072022 Formulado, Distribuido y Comercializado por: QUIMICOS OMA S.A.

Autopista Medellín Km 2.5 Vía Parcelas (Cota) Km 1.3
Parque Empresarial AEPI, Bodega 16
PBX: 8985179 – E. Mail: servicioalcliente@quimicosoma.com
Cota (Cundinamarca), Colombia
www.quimicosoma.com