PRÁCTICA 4: Funciones Recursivas

Dante Zanarini Alejandro Hernández Denise Marzorati Guido De Luca Santiago Coronel

- 1. Demuestre que las funciones recursivas primitivas son totales.
- 2. Sea $\{f_k \mid k \in \mathbb{N}_0\}$ el conjunto de funciones de Ackermann visto en teoría. Demuestre las siguientes propiedades:
 - (a) $\forall k \in \mathbb{N} \quad f_k(x) \in FRP$
 - (b) $\forall x, k \in \mathbb{N} \quad f_k(x) > x$
 - (c) $\forall x_1, x_2, k \in \mathbb{N}$ $x_1 < x_2 \Rightarrow f_k(x_1) < f_k(x_2)$
 - (d) $\forall x, k \in \mathbb{N}$ $f_k(x) < f_{k+1}(x)$
- 3. Defina las siguientes funciones como FR:
 - (a) f(x,y) = x y
 - (b) $h(x) = \sqrt{x}$
 - (c) $g(x) = |\sqrt{x}|$
- 4. Sea la función div(x,y) = |x/y|. Se pide:
 - (a) Exprese la función div(x,y) como FR suponiendo que 0/0 no está definido.
 - (b) Exprese la función div(x, y) como FR suponiendo que 0/0 = 0.
 - (c) Defina la función mod(x, y) (que da el resto de la división entera entre $x \in y$) como FR utilizando la definición de div(x, y).
- 5. Considere la función:

$$menos\left(x,y\right) = \begin{cases} x & \text{si } y = 0\\ pd(menos(x,pd\left(y\right))) & \text{si } y \ge 1 \end{cases}$$

- (a) Calcule f(4), donde f se define como $f(x) = \mu_y(menos(x, pd(y)))$.
- (b) ¿Es parcial o total la función definida en el ítem anterior?

- 6. Escriba la siguiente función como FR: $g(y,x) = \sqrt[y]{x^2 + x + 6}$. ¿Podríamos definir esta función como FRP? Justifique.
- 7. Muestre que la siguiente función es FR:

$$r: \mathbb{N} \to \mathbb{N}$$

 $n \to r(n) = \lfloor log_2((n+3)^3) \rfloor$

- 8. Sea $f(n) = \begin{cases} n/2 & \text{si } n \text{ es par} \\ 3n+1 & \text{si } n \text{ es impar} \end{cases}$. Defina una función recursiva F(x) que devuelva la mínima cantidad de aplicaciones sucesivas de f que son necesarias para llegar a 1. Por ejemplo:
 - f(f(f(8))) = 1, por lo que F(8) = 3
 - f(f(f(f(f(f(f(f(f(13))))))))) = 1, por lo que F(13) = 9

Ayuda: no intente resolver analíticamente cuál es el mínimo número de veces que se necesita aplicar f para un argumento n cualquiera con la intención de luego implementar dicha solución analítica. En cambio, proponga directamente una función que haga el trabajo de encontrar dicho número por usted.