

دليل شامل لصحة الرجل
الباقة الشاملة
٥ أدلة عربية فاخرة

- ١ دليل حصوات الكلى الشامل
- ٢ المثانة المفرطة النشاط — دليل المريض
- ٣ صحة البروستاتا — دليل الرجل العربي
- ٤ الوقاية من التهابات المسالك البولية
- ٥ الضعف الجنسي — دليل الرجل الشامل

د. جورج شاكر

أخصائي المسالك البولية — الخدمة الصحية الوطنية البريطانية
NHS Urology Specialist — United Kingdom

مرحباً بك

أهلاً بك في الباقية الشاملة لصحة المسالك البولية. هذه الباقية تضم خمسة أدلة طبية متكاملة كتبها خبيراً للقارئ العربي، مبنية على خبرة سنوات في طب المسالك البولية وأحدث الأبحاث والإرشادات الطبية العالمية.

هذه الأدلة هي تمكينك من فهم جسمك وصحتك بشكل أعمق، ومساعدتك على اتخاذ قرارات صحية مدروسة، وتشجيعك على طلب المساعدة الطبية عند الحاجة دون تردد أو إحراج.

• ما تحتويه الباقية

١ دليل حصوات الكلى الشامل

كل ما تحتاج معرفته عن أسباب الحصوات وأعراضها والتغذية الوقائية وخيارات العلاج من التفتيت بالليزر إلى المنظار — مع خطة وقائية لمدة ٣٠ يوماً.

٢ المثانة المفرطة النشاط

تمارين كيجل المتقدمة وبرنامج تدريب المثانة خطوة بخطوة والأطعمة الصديقة للمثانة وجميع خيارات العلاج من الأدوية إلى حقن البوتوكس والتحفيز العصبي.

٣ صحة البروستاتا

دليل شامل للرجل فوق ٤٠ عن تضخم البروستاتا وسرطان البروستاتا وفحص PSA وعلامات التحذير ومتى يجب مراجعة الطبيب — مع رسالة خاصة لعائلة الرجل.

٤ الوقاية من التهابات المسالك

دليل عملي بالعادات اليومية والنظافة الصحيحة والتغذية الوقائية — مع حلول طبية حقيقية للالتهابات المتكررة ونصائح خاصة للحوامل والنساء بعد انقطاع الطمث.

٥ الضعف الجنسي

العلاقة بين صحة القلب والانتصاب والأسباب الحقيقية وراء المشكلة وجميع خيارات العلاج من تغيير نمط الحياة إلى الأدوية والعلاجات المتقدمة — بكل صراحة واحترام.

ملاحظة مهمة

هذه الأدلة مرجع للتثقيف الصحي ولا تغني عن استشارة الطبيب المختص إذا كنت تعاني من أي أعراض — لا تتردد في مراجعة طبيبك صحتك أهم استثمار — والمعرفة هي الخطوة الأولى للوقاية

كيف تستفيد من هذه الباقية

- اقرأ الدليل الذي يخص مشكلتك أولاً — ثم اطلع على الأدلة الأخرى للمعرفة العامة
- شارك الأدلة مع عائلتك وأصدقائك — المعرفة الصحية حق للجميع
- احتفظ بهذه الأدلة كمرجع — يمكنك العودة إليها في أي وقت
- إذا وجدت معلومة تنطبق عليك — ناقشها مع طبيبك في الزيارة القادمة
- الوقاية دائماً أفضل من العلاج — ابدأ بتطبيق النصائح البسيطة اليوم

عن الكاتب

د. جورج شاكر — أخصائي المسالك البولية في الخدمة الصحية الوطنية البريطانية، يحمل الزمالة المصرية في جراحة المسالك البولية وعضوية الكلية الملكية للجراحين في بريطانيا والزمالة الأوروبية في المسالك البولية.

يمتلك ٨ سنوات من الخبرة السريرية منها ٥ سنوات في بريطانيا مع سجل أكاديمي قوي يشمل منشورات بحثية دولية ومحاضرات في مؤتمرات عالمية. شغفه هو تبسيط المعلومات الطبية المعقدة وإيصالها للقارئ العربي بأسلوب واضح وعلمي.

● تابعني للمزيد من المحتوى الطبي

[@dr.george.shaker](https://www.instagram.com/dr.george.shaker)

إنستغرام — تيك توك — لينكد إن

جميع الحقوق محفوظة ٢٠٢٦ — د. جورج شاكر
لا يسمح بنسخ أو توزيع هذا المحتوى بدون إذن كتابي مسبق

دليل حصوات الكلى الشامل

الأسباب العميقة والأعراض الحقيقية
التغذية الوقائية المتقدمة
والعلاج الشامل

د. جورج شاكر

أخصائي المسالك البولية

كل ما تحتاج معرفته في دليل واحد فاحر

NHS Urology Specialist

فهرس المحتويات



ما هي حصوات الكلى؟

تعريف شامل وأنواع الحصوات

الأسباب العميقة لتكون الحصوات

العوامل الطبية والوراثية والبيئية

الأعراض الحقيقية والتشخيص

العلامات المبكرة والمتقدمة

التغذية الوقائية المتقدمة

نظام غذائي متكامل للوقاية

الأطعمة الممنوعة والمسموحة

دليل تفصيلي للتغذية اليومية

العلاج الطبي والجراحي

الخيارات العلاجية الحديثة

نصائح ذهبية للوقاية

عادات يومية تحميكم مدى الحياة

خطة عملية لمدة ٣٠ يوم

برنامج وقائي متكامل

١

٢

٣

٤

٥

٦

٧

٨

ما هي حصوات الكلى؟

حصوات الكلى هي كتل صلبة تتكون من المعادن والأملاح داخل الكلى. تتشكل عندما يصبح البول مركزا بشكل كبير مما يسمح للمعادن بالتبلور والالتصاق ببعضها البعض. يمكن أن تتراوح في الحجم من حبة رمل صغيرة إلى حجم كرة الغولف.

تعتبر حصوات الكلى من أكثر الحالات شيوعا في طب المسالك البولية، حيث يصاب بها شخص من كل عشرة أشخاص خلال حياتهم. وتزداد نسبة الإصابة في منطقة الشرق الأوسط بسبب المناخ الحار وأنماط التغذية.

• أنواع حصوات الكلى

١ حصوات الكالسيوم أوكسالات

الأكثر شيوعا — تشكل حوالي ٧٥٪ من جميع الحصوات. تتكون عندما يرتبط الكالسيوم بالأوكسالات في البول. تتأثر بالنظام الغذائي بشكل كبير.

٢ حصوات حمض اليوريك

تمثل حوالي ١٠٪ من الحصوات. ترتبط بتناول كميات كبيرة من البروتين الحيواني واللحوم الحمراء. أكثر شيوعا عند مرضى النقرس.

٣ حصوات الستروفايت

تتكون نتيجة التهابات المسالك البولية المتكررة. يمكن أن تنمو بسرعة وتصبح كبيرة جدا. أكثر شيوعا عند النساء.

٤ حصوات السيستين

نادرة وراثية. تتكون بسبب خلل جيني يسبب تسرب حمض السيستين إلى البول. تتطلب متابعة طبية متخصصة مدى الحياة.

تنبيه مهم

إذا شعرت بألم شديد مفاجئ في الخصرة مع غثيان أو دم في البول توجه فورا إلى أقرب طوارئ — قد تكون حالة طبية طارئة

الأسباب العميقة لتكون الحصوات

تتكون حصوات الكلى نتيجة تفاعل عدة عوامل معا. فهم هذه الأسباب هو الخطوة الأولى نحو الوقاية الفعالة. هناك أسباب لا يمكن التحكم بها مثل الوراثة، وأخرى يمكن تعديلها مثل النظام الغذائي ونمط الحياة.

● العوامل الرئيسية

- قلة شرب الماء — السبب الأول والأهم. عندما يقل حجم البول يزداد تركيز المعادن ويسهل تكون البلورات
- النظام الغذائي الغني بالصوديوم — الملح الزائد يزيد من إفراز الكالسيوم في البول بشكل كبير
- الإفراط في البروتين الحيواني — اللحوم الحمراء والدواجن تزيد حمض اليوريك وتقلل السيترات الواقية
- السمنة وزيادة الوزن — ترتبط بتغيرات في كيمياء البول تزيد خطر تكون الحصوات
- العوامل الوراثية — إذا أصيب أحد والديك بالحصوات تزداد احتمالية إصابتك بنسبة 50٪
- بعض الأدوية — مدرات البول ومضادات الحموضة وبعض المكملات الغذائية
- أمراض الأمعاء — مرض كرون وعمليات تحويل مسار المعدة تؤثر على امتصاص الكالسيوم
- المناخ الحار — يسبب التعرق الزائد وتركيز البول، وهذا يفسر شيوع الحصوات في الشرق الأوسط

● عوامل الخطر الخفية

- نقص فيتامين د أو الإفراط فيه — كلاهما يؤثر على استقلاب الكالسيوم
- مقاومة الأنسولين — ترتبط بحموضة البول وتكون حصوات حمض اليوريك
- فرط نشاط الغدة جار الدرقية — يسبب ارتفاع مستوى الكالسيوم في الدم والبول
- التهابات المسالك البولية المزمنة — تهيئ بيئة مناسبة لتكون حصوات الستروفايت

الأعراض الحقيقية والتشخيص

قد تبقى حصوات الكلى صامتة بدون أعراض لسنوات. تظهر الأعراض عادة عندما تتحرك الحصوة من الكلية إلى الحالب، مسببة انسدادا وألما شديدا يعرف بالمغص الكلوي.

• الأعراض الشائعة

- ألم حاد ومفاجئ في الخصرة أو أسفل الظهر — يوصف بأنه من أشد أنواع الألم
- ألم ينتقل إلى أسفل البطن والمنطقة الأربية — يتبع مسار الحالب
- ألم متموج يأتي ويذهب — بسبب تقلصات الحالب حول الحصوة
- دم في البول — قد يكون مرئيا أو مجهريا فقط
- حرقة أو ألم عند التبول — خاصة عندما تقترب الحصوة من المثانة
- تكرار الحاجة للتبول مع كميات قليلة — بسبب تهيج المثانة
- غثيان وقيء — استجابة الجسم للألم الشديد
- حمى وقشعريرة — علامة تحذيرية تشير لوجود التهاب ويجب مراجعة الطوارئ فوراً

• طرق التشخيص

١ الأشعة المقطعية

الفحص الأدق والأسرع — يكشف حجم وموقع الحصوة بدقة عالية ولا يحتاج صبغة

٢ تحليل البول

يكشف وجود الدم والبلورات والالتهاب ويساعد في تحديد نوع الحصوة

٣ تحاليل الدم

قياس وظائف الكلى والكالسيوم وحمض اليوريك والغدة جار الدرقية

٤ الموجات فوق الصوتية

آمنة ومفيدة للحوامل والأطفال — تكشف التوسع في الكلية

التغذية الوقائية المتقدمة

التغذية السليمة هي أقوى سلاح في الوقاية من حصوات الكلى. يمكن تقليل خطر الإصابة بنسبة تصل إلى ٥٠٪ من خلال تعديلات غذائية بسيطة. هذه الإرشادات مبنية على أحدث الأبحاث الطبية.

● القاعدة الذهبية: الماء

اشرب ما لا يقل عن ٢.٥ إلى ٣ لترات من الماء يوميا. الهدف أن يكون لون البول أصفر فاتحا جدا أو شفافا تقريبا. زد الكمية في الأجواء الحارة وبعد التمارين الرياضية. وزع الشرب على مدار اليوم ولا تنس شرب كوب قبل النوم.

● الأطعمة الوقائية

- الليمون والحمضيات — تحتوي على السيترات التي تمنع تبلور الكالسيوم وتحمي من تكون الحصوات
- الخضروات الورقية الخضراء — غنية بالمغنيسيوم الذي يقلل امتصاص الأوكسالات في الأمعاء
- منتجات الألبان باعتدال — الكالسيوم الغذائي يرتبط بالأوكسالات في الأمعاء ويمنع امتصاصها
- الفواكه والخضروات الغنية بالبوتاسيوم — مثل الموز والبطاطا الحلوة والأفوكادو
- الأسماك الدهنية — مصدر ممتاز لفيتامين د وأحماض أوميغا ٣ المضادة للالتهاب
- زيت الزيتون — مضاد للأكسدة ويساعد في صحة الكلى العامة

● الأطعمة التي يجب تقليلها

- الأطعمة الغنية بالأوكسالات — السبانخ، البنجر، الشوكولاتة، المكسرات، الشاي الأسود المركز
- الملح والأطعمة المالحة — المخللات، الأطعمة المعلبة، الوجبات السريعة، رقائق البطاطس
- اللحوم الحمراء بكميات كبيرة — تزيد حمض اليوريك وتقلل السيترات في البول
- المشروبات الغازية والسكرية — خاصة المحتوية على الفركتوز وحمض الفوسفوريك
- مكملات فيتامين سي بجرعات عالية — تتحول إلى أوكسالات في الجسم

العلاج الطبي والجراحي

يعتمد علاج حصوات الكلى على حجمها وموقعها ونوعها وشدة الأعراض. معظم الحصوات الصغيرة تخرج تلقائياً، بينما تحتاج الحصوات الكبيرة إلى تدخل طبي متخصص.

• العلاج التحفظي (للحصوات الصغيرة)

- الإكثار من شرب السوائل — ٢ إلى ٣ لترات يومياً لتسهيل مرور الحصوة عبر الحالب
- مسكنات الألم — مضادات الالتهاب غير الستيرويدية مثل الديكلوفيناك أو الإيبوبروفين
- أدوية توسيع الحالب — مثل التامسولوسين لتسهيل نزول الحصوات في الحالب السفلي
- المتابعة الدورية — بالأشعة المقطعية أو الموجات فوق الصوتية للتأكد من تقدم الحصوة

• التدخلات الطبية المتقدمة

١ تفتيت الحصوات بالموجات التصادمية

تستخدم للحصوات في الكلية بحجم أقل من ٢ سم. موجات صدمية من خارج الجسم تفتت الحصوة إلى قطع صغيرة تخرج مع البول. لا تحتاج جراحة.

٢ منظار الحالب بالليزر

أنبوب رفيع يدخل عبر مجرى البول والمثانة والحالب. يصل إلى الحصوة ويفتتها بالليزر. الأكثر استخداماً للحصوات في الحالب والكلية.

٣ منظار الكلية عبر الجلد

للحصوات الكبيرة جداً أو المرجانية. يتم عمل فتحة صغيرة في الظهر والوصول مباشرة للكلية لنفتيت وإزالة الحصوة.

٤ الجراحة الروبوتية

في حالات نادرة ومعقدة. تتيح دقة عالية في إزالة الحصوات الكبيرة مع الحفاظ على نسيج الكلية.

ملاحظة مهمة

٩٠٪ من الحصوات أقل من ٥ ملم تخرج تلقائياً خلال ٤ إلى ٦ أسابيع
الحصوات أكبر من ٧ ملم غالباً تحتاج تدخلاً طبياً

نصائح ذهبية للوقاية مدى الحياة

- ١ **اشرب الماء أول شيء عند الاستيقاظ**
ابدأ يومك بكوبين كبيرين من الماء — الكلى تكون أكثر تركيزاً بعد النوم
- ٢ **أضف الليمون لمائك يوميا**
عصير ليمونة واحدة يوميا يرفع السيترات الواقية بشكل ملحوظ
- ٣ **قلل الملح تدريجيا**
استبدل الملح بالتوابل والأعشاب — الهدف أقل من ٥ غرام يوميا
- ٤ **تناول الكالسيوم مع الوجبات**
الكالسيوم الغذائي مع الطعام يقلل امتصاص الأوكسالات — لا تتجنب منتجات الألبان
- ٥ **مارس الرياضة بانتظام**
النشاط البدني يقلل خطر الحصوات ويساعد في الحفاظ على وزن صحي
- ٦ **راقب لون بولك**
إذا كان غامقا فأنت لا تشرب كفاية — الهدف لون أصفر فاتح جدا
- ٧ **تابع مع طبيبك سنويا**
تحليل بول وتحاليل دم دورية يمكن أن تكشف المشاكل مبكرا

خطة عملية لمدة ٣٠ يوم

ابدأ تدريجيا ولا تحاول تغيير كل شيء دفعة واحدة. كل أسبوع أضف عادة جديدة:

الأسبوع ١

ركز فقط على شرب ٣ لترات ماء يوميا — ضع منبهات على هاتفك كل ساعتين

الأسبوع ٢

أضف عصير الليمون اليومي وابدأ بتقليل الملح في طعامك تدريجيا

الأسبوع ٣

قلل اللحوم الحمراء إلى مرتين أسبوعيا واستبدلها بالسمك والدجاج والبقوليات

الأسبوع ٤

ابدأ ببرنامج رياضي خفيف — ٣٠ دقيقة مشي يوميا وقم بإجراء تحاليلك الدورية

عن الكاتب

د. جورج شاكر

أخصائي المسالك البولية

NHS Urology Specialist — United Kingdom

الزمالة المصرية في جراحة المسالك البولية
عضو الكلية الملكية للجراحين — بريطانيا
• الزمالة الأوروبية في المسالك البولية
٨ سنوات خبرة في طب المسالك البولية
٥ سنوات خبرة في الخدمة الصحية الوطنية البريطانية
باحث ومحاضر في جراحة المسالك البولية

تابعني على إنستغرام وتيك توك
@dr.george.shaker

هذا الدليل للتقيف الصحي فقط ولا يعني عن استشارة الطبيب المختص
جميع الحقوق محفوظة ٢٠٢٦

المثانة المفرطة النشاط

دليل المريض الشامل

تمارين المثانة المتقدمة
تعديلات نمط الحياة العلمية
خيارات العلاج الشاملة
لاسترجاع السيطرة الكاملة

د. جورج شاكر

أخصائي المسالك البولية

NHS Urology Specialist

ما هي المثانة المفرطة النشاط؟

المثانة المفرطة النشاط هي حالة شائعة تصيب ملايين الأشخاص حول العالم. تتميز بالشعور المفاجئ والملح بالحاجة للتبول يصعب تأجيله، وقد يصاحبه تسرب لا إرادي للبول. هذه الحالة ليست جزءاً طبيعياً من التقدم في العمر ويمكن علاجها بفعالية.

تصيب هذه الحالة حوالي ١٥٪ من البالغين، وتزداد شيوعاً مع التقدم في السن. تؤثر بشكل كبير على جودة الحياة والنشاط الاجتماعي والنفسي، لكن كثير من المرضى لا يطلبون المساعدة الطبية بسبب الإحراج.

• الأعراض الرئيسية

- الإلحاح البولي — شعور مفاجئ وقوي بالحاجة للتبول يصعب تأجيله وقد يسبب قلقاً شديداً
- تكرار التبول — أكثر من ٨ مرات في النهار وهو أكثر من المعدل الطبيعي
- التبول الليلي — الاستيقاظ مرتين أو أكثر ليلاً للتبول مما يؤثر على جودة النوم
- سلس الإلحاح — تسرب البول قبل الوصول للحمام بسبب شدة الإلحاح المفاجئ

• الأسباب والعوامل المساهمة

١ ضعف عضلات قاع الحوض

بسبب الحمل والولادة أو التقدم في العمر أو السمنة مما يقلل دعم المثانة

٢ فرط نشاط العضلة الدافعة

تقلصات لا إرادية في عضلة المثانة حتى عندما لا تكون ممتلئة

٣ مشاكل عصبية

مثل السكتة الدماغية أو التصلب المتعدد أو مرض باركنسون أو إصابات الحبل الشوكي

٤ عوامل نمط الحياة

الكافيين والكحول والتدخين والسمنة وقلة النشاط البدني

تمارين المثانة المتقدمة

تدريب المثانة هو الخط الأول والأهم في العلاج. الهدف هو إعادة تعليم المثانة تخزين كميات أكبر من البول وتقليل الإلحاح. يحتاج البرنامج ٦ إلى ١٢ أسبوعاً لتحقيق نتائج ملموسة.

• تمارين كيجل لتقوية قاع الحوض

- حدد العضلات الصحيحة — تخيل أنك تحاول إيقاف تدفق البول أو منع خروج الغازات
- اقبض هذه العضلات لمدة ٥ ثوان ثم ارخها لمدة ٥ ثوان — كرر ١٠ مرات
- تدرج تدريجياً لتصل إلى ١٠ ثوان قبض و ١٠ ثوان إرخاء
- كرر التمارين ٣ مرات يومياً — صباحاً وظهراً ومساءً
- لا تقبض عضلات البطن أو الفخذين — ركز فقط على عضلات قاع الحوض
- يمكن أداء هذه التمارين في أي مكان — أثناء الجلوس أو القيادة أو العمل

• برنامج تدريب المثانة

الأسبوع ١-٢

ابدأ بالذهاب للحمام كل ساعة حتى لو لم تشعر بالحاجة — سجل أوقات التبول في دفتر يومي

الأسبوع ٣-٤

زد الفترة بين كل زيارة بمقدار ١٥ دقيقة — عند الشعور بالإلحاح توقف وخذ نفساً عميقاً وابقبض عضلات كيجل

الأسبوع ٥-٨

استمر في زيادة الفترة تدريجياً حتى تصل إلى ٣ إلى ٤ ساعات بين كل تبول

الأسبوع ٩-١٢

حافظ على الجدول وراقب التحسن — معظم المرضى يلاحظون تحسناً بنسبة ٥٠٪ أو أكثر

نصيحة مهمة

عند الشعور بالإلحاح مفاجئ: توقف — خذ ٣ أنفاس عميقة — اقبض عضلات كيجل ٥ مرات سريعة عادة يزول الإلحاح خلال ٣٠ إلى ٦٠ ثانية ويمكنك بعدها المشي بهدوء للحمام

تعديلات نمط الحياة العلمية

تغيير بعض العادات اليومية يمكن أن يحدث فرقاً كبيراً في السيطرة على أعراض المثانة المفرطة النشاط. هذه التعديلات مبنية على أبحاث علمية موثقة.

● إدارة السوائل

- اشرب ١.٥ إلى ٢ لتر يومياً — تقليل السوائل بشكل مبالغ فيه يزيد تركيز البول ويهيج المثانة
- وزع الشرب على مدار اليوم — لا تشرب كميات كبيرة دفعة واحدة
- قلل السوائل مساءً — أوقف الشرب قبل النوم بساعتين لتقليل التبول الليلي
- تجنب الكافيين — القهوة والشاي والمشروبات الغازية تهيج المثانة بشكل مباشر

● أطعمة صديقة للمثانة

- الماء العادي والأعشاب الخالية من الكافيين مثل البابونج والنعناع
- الكمثرى والموز والتفاح — فواكه غير حمضية ولطيفة على المثانة
- الخبز الكامل والأرز البني والشوفان — ألياف تمنع الإمساك الذي يضغط على المثانة
- البروتينات الخفيفة مثل الدجاج والسّمك والبيض
- الخضروات غير الحمضية مثل الجزر والبروكلي والفاصوليا الخضراء

● أطعمة ومشروبات يجب تجنبها

- القهوة والشاي الأسود والمشروبات الغازية — مدرات للبول وتهيج المثانة
- الحمضيات والطماطم — البرتقال والليمون والجريب فروت تزيد حموضة البول
- الأطعمة الحارة والتوابل القوية — تهيج بطانة المثانة
- الشوكولاتة — تحتوي على الكافيين والثيوبورومين المهيجين للمثانة
- المحليات الصناعية — أظهرت الأبحاث أنها تهيج المثانة عند بعض المرضى

● عادات يومية مهمة

- حافظ على وزن صحي — كل ٥ كغ زيادة في الوزن تزيد الضغط على المثانة بنسبة ملحوظة
- عالج الإمساك — الإمساك المزمن يضغط على المثانة ويزيد الأعراض
- ألق عن التدخين — السعال المزمن يضعف عضلات قاع الحوض
- مارس الرياضة بانتظام — المشي واليوغا والسباحة ممتازة لصحة الحوض

خيارات العلاج الشاملة

إذا لم تكف تعديلات نمط الحياة وتمارين المثانة، هناك خيارات علاجية متعددة فعالة. العلاج يبدأ بالأبسط ويتدرج حسب استجابة المريض.

• العلاج الدوائي

١ مضادات الكولين

مثل الأوكسيبوتينين والسوليفيناسين والتولثيرودين. تعمل على إرخاء عضلة المثانة وتقليل التقلصات اللاإرادية. قد تسبب جفاف الفم والإمساك.

٢ ميرابيجرون

دواء حديث يعمل بآلية مختلفة. يرخي عضلة المثانة ويزيد سعتها. آثاره الجانبية أقل من مضادات الكولين. مناسب لكبار السن.

٣ كريمات الإستروجين الموضعية

للنساء بعد انقطاع الطمث. تحسن صحة أنسجة المهبل والإحليل وتقلل أعراض المثانة.

• العلاجات المتقدمة

٤ حقن البوتوكس في المثانة

يحقن في عضلة المثانة عبر المنظار. يرخي العضلة لمدة ٦ إلى ٩ أشهر. فعال جدا للحالات التي لم تستجب للأدوية. يمكن تكراره.

٥ تحفيز العصب العجزي

جهاز صغير يزرع تحت الجلد يرسل نبضات كهربائية خفيفة للأعصاب المتحكمة في المثانة. نتائج ممتازة طويلة المدى.

٦ تحفيز العصب الطنبوبي

علاج غير جراحي — إبرة رفيعة بالقرب من الكاقل ترسل نبضات للأعصاب. جلسة أسبوعية لمدة ١٢ أسبوعاً.

متى تراجع الطبيب فوراً؟

دم في البول — ألم شديد عند التبول — حمى مع أعراض بولية
تغير مفاجئ في عادات التبول — عدم القدرة على التبول نهائياً

عن الكاتب

د. جورج شاكر

أخصائي المسالك البولية

NHS Urology Specialist — United Kingdom

الزمالة المصرية في جراحة المسالك البولية
عضو الكلية الملكية للجراحين — بريطانيا
• الزمالة الأوروبية في المسالك البولية
٨ سنوات خبرة في طب المسالك البولية
٥ سنوات خبرة في الخدمة الصحية الوطنية البريطانية

تابعني على إنستغرام وتيك توك
@dr.george.shaker

هذا الدليل للتقيف الصحي فقط ولا يغني عن استشارة الطبيب المختص
جميع الحقوق محفوظة ٢٠٢٦

صحة البروستاتا دليل الرجل العربي

تضخم البروستاتا الحميد والسرطان
فحص PSA — ما يجب أن تعرفه
للرجل فوق ٤٠ ولعائلته المحيطة
معرفة عميقة وشاملة

د. جورج شاكر

أخصائي المسالك البولية

NHS Urology Specialist

ما هي البروستاتا؟

البروستاتا غدة صغيرة بحجم حبة الجوز تقع أسفل المثانة مباشرة وتحيط بالإحليل. وظيفتها الأساسية إنتاج جزء من السائل المنوي الذي يغذي وينقل الحيوانات المنوية. تبدأ بالنمو التدريجي بعد سن الأربعين عند معظم الرجال.

مشاكل البروستاتا شائعة جدا — أكثر من نصف الرجال فوق الخمسين يعانون من أعراض تضخم البروستاتا. الخبر الجيد أن معظم مشاكل البروستاتا حميدة وقابلة للعلاج، لكن الفحص المبكر والمنتظم ضروري.

• أهم مشاكل البروستاتا

١ تضخم البروستاتا الحميد

الأكثر شيوعا. نمو تدريجي غير سرطاني يضغط على الإحليل ويسبب صعوبة في التبول. يصيب ٥٠٪ من الرجال فوق ٥٠ و ٨٠٪ فوق ٧٠.

٢ التهاب البروستاتا

عدوى بكتيرية أو التهاب غير بكتيري. يسبب ألما في الحوض وحرقة في التبول وأحيانا حمى. يصيب الرجال في أي عمر.

٣ سرطان البروستاتا

أكثر السرطانات شيوعا عند الرجال. غالبا بطيء النمو ويمكن علاجه إذا اكتشف مبكرا. الفحص الدوري ينقذ الأرواح.

• أعراض تضخم البروستاتا

- ضعف تدفق البول أو تقطعه — الشعور بأن المثانة لم تفرغ تماما
- التبول المتكرر خاصة في الليل — الاستيقاظ مرتين أو أكثر
- صعوبة في بدء التبول — الحاجة للانتظار أو الدفع
- التقطير بعد الانتهاء من التبول — نزول قطرات بعد إغلاق الصنبور
- الشعور بالإلحاح المفاجئ — صعوبة تأجيل التبول

فحص PSA – ما يجب أن تعرفه

هو بروتين تنتجه البروستاتا بشكل طبيعي. يمكن قياسه بتحليل دم بسيط. ارتفاعه قد يشير PSA لمشكلة في البروستاتا لكنه ليس دائما علامة على السرطان. فهم هذا الفحص يساعدك على اتخاذ قرارات مدروسة.

• متى يجب إجراء الفحص؟

- الرجال فوق ٥٠ سنة — ينصح بمناقشة فحص PSA مع طبيبك سنويا
- الرجال فوق ٤٥ إذا كان هناك تاريخ عائلي — أب أو أخ أصيب بسرطان البروستاتا
- الرجال من أصول أفريقية فوق ٤٥ — لديهم خطر أعلى للإصابة
- إذا ظهرت أعراض بولية جديدة — بغض النظر عن العمر يجب مراجعة الطبيب

• ماذا تعني نتائج PSA؟

أقل من ٤

طبيعي في معظم الحالات — لكن ١٥٪ من الحالات بسرطان يكون PSA طبيعيا

بين ٤ و ١٠

المنطقة الرمادية — يحتاج فحوصات إضافية لتحديد السبب

أكثر من ١٠

يزداد احتمال وجود سرطان — يحتاج تحويل عاجل لأخصائي المسالك

أسباب أخرى لارتفاع PSA غير السرطان

تضخم البروستاتا الحميد — التهاب البروستاتا — ممارسة الرياضة الشاقة
القذف خلال ٤٨ ساعة قبل الفحص — ركوب الدراجات لفترات طويلة
فحص المستقيم الرقمي قبل سحب الدم مباشرة

• سرطان البروستاتا — الحقائق المهمة

- سرطان البروستاتا غالبا بطيء النمو — كثير من الرجال يعيشون حياة كاملة دون أن يسبب مشاكل
- الاكتشاف المبكر يعني خيارات علاج أكثر وأفضل ونسب شفاء عالية جدا
- ليس كل سرطان بروتستاتا يحتاج علاجاً فورياً — المراقبة النشطة خيار معتمد للأورام البطيئة
- العلاج يشمل الجراحة والعلاج الإشعاعي والعلاج الهرموني حسب مرحلة الورم
- التاريخ العائلي مهم جدا — أخبر أبنائك إذا أصبت حتى يبدأوا الفحص مبكرا

خيارات علاج تضخم البروستاتا

يعتمد العلاج على شدة الأعراض ومدى تأثيرها على حياتك اليومية. ليس كل تضخم يحتاج علاجاً — الأعراض الخفيفة قد تحتاج فقط مراقبة وتعديلات في نمط الحياة.

• تعديلات نمط الحياة

- قلل السوائل مساءً — توقف عن الشرب قبل النوم بساعتين
- قلل الكافيين والكحول — يزيدان تكرار التبول ويهيجان المثانة
- أفرغ المثانة مرتين — بعد الانتهاء انتظر ٣٠ ثانية وحاول مرة أخرى
- تجنب أدوية البرد التي تحتوي مضادات الاحتقان — تسبب احتباس البول
- مارس النشاط البدني — الجلوس الطويل يزيد احتقان البروستاتا

• العلاج الدوائي

١ حاصرات ألفا

مثل التامسولوسين والألفوزوسين. ترخي عضلات عنق المثانة والبروستاتا لتحسين تدفق البول. تعمل خلال أيام.

٢ مثبطات ٥-ألفا ريداكترز

مثل الفيناسترايد والدوتاستيرايد. تقلص حجم البروستاتا تدريجياً. تحتاج ٣ إلى ٦ أشهر لتظهر النتائج.

٣ العلاج المركب

الجمع بين الدوائين يعطي نتائج أفضل في الحالات المتوسطة والشديدة.

• التدخلات الجراحية

٤ استئصال البروستاتا بالمنظار

العملية الأكثر شيوعاً. يتم استئصال النسيج المتضخم من الداخل عبر الإحليل بدون جرح خارجي.

٥ تبخير البروستاتا بالليزر

تقنية حديثة باستخدام ليزر الجرين لايت. نزيف أقل ومناسبة للمرضى على أدوية سيولة الدم.

٦ رفع الإحليل البروستاتي

إجراء بسيط يرفع فصوص البروستاتا بعيداً عن الإحليل. يحافظ على الوظيفة الجنسية.

نصائح ذهبية لصحة البروستاتا

- ١ تناول الطماطم المطبوخة
غنية بالليكوبين الذي أظهرت الدراسات أنه يقلل خطر سرطان البروستاتا
- ٢ أكثر من الخضروات الصليبية
البروكلي والقرنبيط والملفوف تحتوي مركبات واقية من السرطان
- ٣ قلل اللحوم الحمراء والدهون المشبعة
ارتبطت بزيادة خطر سرطان البروستاتا في عدة دراسات
- ٤ مارس الرياضة ٣٠ دقيقة يوميا
تقلل خطر تضخم البروستاتا وتحسن الأعراض البولية
- ٥ حافظ على وزن صحي
السمنة مرتبطة بزيادة خطر سرطان البروستاتا العدوانية
- ٦ لا تتجاهل الأعراض
أي تغير في عادات التبول بعد الأربعين يستحق استشارة طبية
- ٧ ناقش فحص PSA مع طبيبك
الفحص الدوري ينفذ الأرواح — اسأل طبيبك عن الموعد المناسب لك

أعراض تستدعي مراجعة الطبيب فوراً

عدم القدرة على التبول نهائياً — دم في البول — ألم شديد في أسفل البطن
فقدان وزن غير مبرر — ألم في العظام خاصة أسفل الظهر والحوض

رسالة لعائلة الرجل

شجع زوجك أو أباك أو أخاك على الفحص الدوري بعد سن ٥٠
كثير من الرجال يتجاهلون الأعراض بسبب الإحراج — دعمك مهم جداً
سرطان البروستاتا قابل للشفاء إذا اكتشف مبكراً — الفحص بسيط وسريع

عن الكاتب

د. جورج شاكر

أخصائي المسالك البولية

NHS Urology Specialist — United Kingdom

الزمالة المصرية في جراحة المسالك البولية
عضو الكلية الملكية للجراحين — بريطانيا
• الزمالة الأوروبية في المسالك البولية
٨ سنوات خبرة في طب المسالك البولية
٥ سنوات خبرة في الخدمة الصحية الوطنية البريطانية

تابعني على إنستغرام وتيك توك

@dr.george.shaker

هذا الدليل للتقيف الصحي فقط ولا يغني عن استشارة الطبيب المختص
جميع الحقوق محفوظة ٢٠٢٦

الوقاية من التهابات المسالك البولية

عادات يومية ونظافة صحيحة
متى تحتاجين طبيباً
لأن الالتهابات المتكررة لها حل حقيقي
دليل شامل للمرأة والرجل

د. جورج شاكر

أخصائي المسالك البولية

NHS Urology Specialist

ما هي التهابات المسالك البولية؟

التهابات المسالك البولية هي عدوى بكتيرية تصيب أي جزء من الجهاز البولي — الكلى أو الحالب أو المثانة أو الإحليل. تعتبر من أكثر أنواع العدوى شيوعا خاصة عند النساء، حيث تصاب واحدة من كل ثلاث نساء بالتهاب مسالك مرة واحدة على الأقل قبل سن الأربعين.

بكتيريا الإشريشيا كولاي هي المسبب الرئيسي في ٨٠٪ من الحالات. تدخل عبر الإحليل وتصل إلى المثانة. النساء أكثر عرضة لأن الإحليل الأنثوي أقصر وأقرب لمنطقة الشرج.

• أنواع التهابات المسالك

١ التهاب المثانة

الأكثر شيوعا — يسبب حرقا عند التبول وتكرار التبول وألم أسفل البطن. عادة غير خطير ويستجيب للمضادات الحيوية.

٢ التهاب الإحليل

التهاب في مجرى البول — يسبب حرقا وإفرازات. قد يرتبط بالعدوى المنقولة جنسيا عند الشباب.

٣ التهاب الكلى الحاد

عدوى خطيرة تصل الكلية — تسبب حمى عالية وألم الخصرة وغثيان. تحتاج علاجاً عاجلاً لمنع المضاعفات.

• الأعراض التحذيرية

- حرقا أو ألم عند التبول — العرض الأكثر شيوعا
- الحاجة المتكررة للتبول مع كميات قليلة كل مرة
- بول غائم أو برائحة قوية غير معتادة
- دم في البول — قد يظهر بلون وردي أو أحمر
- ألم أو ضغط في أسفل البطن أو منطقة الحوض
- حمى وقشعريرة — علامة على وصول الالتهاب للكلى وتحتاج مراجعة فورية

عادات يومية تحميك من الالتهابات

الوقاية أسهل وأفضل من العلاج. معظم التهابات المسالك يمكن تجنبها بعادات بسيطة يومية. هذه النصائح مبنية على إرشادات الجمعية الأوروبية والأمريكية لطب المسالك البولية.

● النظافة الشخصية الصحيحة

- امسحي دائما من الأمام إلى الخلف بعد استخدام الحمام — هذه القاعدة الذهبية لمنع انتقال البكتيريا
- اغسلي المنطقة الحساسة بالماء فقط أو بغسول خفيف غير معطر — تجنب الصابون القوي والدوش المهبلي
- ارتدي ملابس داخلية قطنية فضفاضة — تسمح بالتهوية وتمنع الرطوبة
- غيري الملابس الداخلية يوميا وبعد التعرق الشديد
- تجنبني البانتي لاينر المعطر والفوط اليومية المعطرة — المواد الكيميائية تهيج المنطقة

● عادات التبول

- لا تؤخري التبول — احتباس البول لفترات طويلة يسمح للبكتيريا بالتكاثر في المثانة
- أفرغي المثانة تماما — لا تستعجلي واجلسي بوضعية مريحة
- تبولي بعد العلاقة الزوجية مباشرة — تطرد البكتيريا التي قد تدخل الإحليل
- اشربي ٢ إلى ٣ لترات من الماء يوميا — البول المخفف يمنع تكاثر البكتيريا

● التغذية الوقائية

- الماء هو أفضل مشروب وقائي — اجعليه رفيقك الدائم
- عصير التوت البري — أظهرت الدراسات أنه يمنع التصاق البكتيريا بجدار المثانة
- البروبيوتيك — مثل الزبادي واللبن — يعزز البكتيريا النافعة ويحمي من العدوى
- فيتامين سي — يزيد حموضة البول ويخلق بيئة غير مناسبة لنمو البكتيريا
- تقليل السكريات المكررة — السكر يغذي البكتيريا ويضعف المناعة

الالتهابات المتكررة – لها حل حقيقي

إذا كنت تعاني من التهابات متكررة – ثلاث مرات أو أكثر في السنة – فأنت لست وحدك. حوالي ٢٥٪ من النساء اللواتي يصبن بالتهاب مسالك يتكرر عندهن. هناك حلول طبية فعالة يجب أن تعرفها.

• أسباب التكرار

- عوامل تشريحية – قرب الإحليل من المهبل والشرج يسهل دخول البكتيريا
- التغيرات الهرمونية – انخفاض الإستروجين بعد انقطاع الطمث يضعف الحماية الطبيعية
- استخدام بعض وسائل منع الحمل – الحاجر المهلي ومبيدات النطاف تزيد الخطر
- مقاومة المضادات الحيوية – الاستخدام المتكرر للمضادات يضعف فعاليتها
- وجود مشاكل تشريحية في الجهاز البولي تحتاج تقييما متخصصا

• خيارات الوقاية الطبية

١ المضادات الحيوية الوقائية

جرعة منخفضة يومية أو بعد العلاقة الزوجية لمدة ٦ إلى ١٢ شهرا. فعالة جدا لكن تحتاج إشراف طبي.

٢ كريمات الإستروجين الموضعية

للنساء بعد انقطاع الطمث. تعيد الحماية الطبيعية للمهبل والإحليل وتقلل الالتهابات بنسبة ٥٠٪.

٣ لقاحات ومنشطات مناعية

مثل أوم-٨٩ – تحفز جهاز المناعة للتعرف على البكتيريا ومحاربتها. خيار واعد ومتاح.

٤ D-Mannose

سكر طبيعي يمنع التصاق البكتيريا بجدار المثانة. متوفر كمكمل غذائي ومدعوم بأبحاث أولية جيدة.

متى يجب مراجعة الطبيب فورا؟

حمى عالية مع ألم في الخصرة أو الظهر – قد يكون التهاب كلى
دم في البول – غثيان وقيء مع أعراض بولية
الأعراض لا تتحسن بعد ٣ أيام من المضادات الحيوية
التهابات متكررة عند الأطفال أو الرجال – تحتاج تقييم متخصص

نصائح لفئات خاصة

• للحوامل

- التهابات المسالك أثناء الحمل شائعة وتحتاج علاجاً فوراً لمنع المضاعفات
- التهاب المسالك غير المعالج قد يسبب ولادة مبكرة أو نقص وزن المولود
- فحص البول الروتيني في كل زيارة للطبيب ضروري لاكتشاف العدوى الصامتة

• للنساء بعد انقطاع الطمث

- انخفاض الإستروجين يغير بيئة المهبل ويقلل الحماية الطبيعية ضد البكتيريا
- كريمات الإستروجين الموضعية هي الحل الأفضل والأكثر فعالية — ناقشها مع طبيبك
- البروبيوتيك المهبل يسهل في استعادة التوازن البكتيري الصحي

• للرجال

- التهابات المسالك أقل شيوعاً عند الرجال لكن عند حدوثها تحتاج تقييم متخصص
- غالباً ترتبط بتضخم البروستاتا أو حصوات أو مشاكل تشريحية
- أي التهاب مسالك عند رجل تحت ٥٠ يحتاج تحويل لأخصائي مسالك بولية

خطة وقائية يومية بسيطة

الصباح

اشربي كوبين ماء عند الاستيقاظ — تبولي فوراً ولا تؤخري

خلال النهار

اشربي كوب ماء كل ساعتين — لا تحبسي البول — استخدم الحمام كل ٣ ساعات

بعد الحمام

امسحي من الأمام للخلف دائماً — اغسلي بالماء فقط

المساء

تبولي قبل النوم — قللي السوائل بعد العشاء

بعد العلاقة

تبولي خلال ١٥ دقيقة — اشربي كوب ماء

عن الكاتب

د. جورج شاكر

أخصائي المسالك البولية

NHS Urology Specialist — United Kingdom

الزمالة المصرية في جراحة المسالك البولية
عضو الكلية الملكية للجراحين — بريطانيا
• الزمالة الأوروبية في المسالك البولية
٨ سنوات خبرة في طب المسالك البولية
٥ سنوات خبرة في الخدمة الصحية الوطنية البريطانية

تابعني على إنستغرام وتيك توك

@dr.george.shaker

هذا الدليل للتقيف الصحي فقط ولا يغني عن استشارة الطبيب المختص
جميع الحقوق محفوظة ٢٠٢٦

الضعف الجنسي دليل الرجل الشامل

الأسباب الحقيقية وراء المشكلة
العلاقة بين صحة القلب والانتصاب
خيارات العلاج الحديثة والفعالة
لاستعادة الثقة وجودة الحياة

د. جورج شاكر

أخصائي المسالك البولية

NHS Urology Specialist

ما هو ضعف الانتصاب؟

ضعف الانتصاب هو عدم القدرة على تحقيق أو الحفاظ على انتصاب كاف لعلاقة جنسية مرضية. إنه مشكلة طبية شائعة جدا تصيب أكثر من ١٥٠ مليون رجل حول العالم، وليست علامة ضعف أو فشل شخصي.

يصيب ضعف الانتصاب حوالي ٤٠٪ من الرجال فوق الأربعين بدرجات متفاوتة، وتزداد النسبة مع التقدم في العمر. الخبر المطمئن أن معظم الحالات قابلة للعلاج بنجاح عند تحديد السبب الصحيح.

• كيف يحدث الانتصاب الطبيعي؟

الانتصاب عملية معقدة تحتاج تناسقا بين الجهاز العصبي والأوعية الدموية والهرمونات والحالة النفسية. يبدأ بإشارة من الدماغ تسبب ارتخاء العضلات الملساء في الجسم الكهفي مما يسمح بتدفق الدم وانتصاب القضيب. أي خلل في هذه السلسلة يمكن أن يسبب ضعف الانتصاب.

• الأسباب الرئيسية

١ أمراض الأوعية الدموية

السبب الأول — تصلب الشرايين وارتفاع ضغط الدم والسكري تضيق الشرايين المغذية للقضيب. ضعف الانتصاب قد يكون أول علامة على مشاكل القلب.

٢ مرض السكري

يصيب كلا من الأعصاب والأوعية الدموية. ٥٠٪ من مرضى السكري يعانون من ضعف الانتصاب.

٣ العوامل النفسية

القلق والاكتئاب وضغوط العمل ومشاكل العلاقة. أكثر شيوعا عند الشباب وعادة الانتصاب الصباحي يكون موجودا.

٤ نقص هرمون التستوستيرون

يقل تدريجيا بعد سن ٣٠. يسبب ضعف الرغبة والانتصاب مع تعب وتغيرات مزاجية.

٥ الأدوية

بعض أدوية الضغط ومضادات الاكتئاب ومضادات الهيستامين تسبب ضعف الانتصاب كأثر جانبي.

ضعف الانتصاب وصحة القلب

هناك رابط مهم جدا بين ضعف الانتصاب وأمراض القلب. شرايين القضيب أصغر من شرايين القلب بكثير، لذلك تتأثر بتصلب الشرايين أولا. ضعف الانتصاب قد يسبق النوبة القلبية بـ ٣ إلى ٥ سنوات. لهذا يعتبر الأطباء ضعف الانتصاب نافذة على صحة القلب.

تحذير مهم

إذا كنت تعاني من ضعف الانتصاب وعمرك فوق ٤٠
اطلب من طبيبك فحص عوامل خطر أمراض القلب:
ضغط الدم — الكوليسترول — السكر — التدخين — الوزن

● الفحوصات المطلوبة

- تحليل السكر التراكمي — لاكتشاف السكري أو ما قبل السكري
- صورة دهون الدم — الكوليسترول والدهون الثلاثية
- هرمون التستوستيرون — يفحص صباحا حيث يكون في أعلى مستوياته
- وظائف الغدة الدرقية — اضطراباتها تؤثر على الرغبة والانتصاب
- وظائف الكلى والكبد — مشاكلها تسبب ضعف الانتصاب
- هرمون البرولاكتين — ارتفاعه يقلل الرغبة الجنسية

● عوامل نمط الحياة المؤثرة

- التدخين — يدمر بطانة الأوعية الدموية ويقلل تدفق الدم بنسبة تصل إلى ٣٠٪
- السمنة — الدهون الزائدة تحول التستوستيرون إلى إستروجين وتزيد الالتهابات
- الخمول البدني — الرياضة المنتظمة تحسن الانتصاب بنسبة مماثلة للأدوية
- النوم السيء — قلة النوم تخفض التستوستيرون وتزيد التوتر
- الإفراط في مشاهدة المواد الإباحية — يسبب صعوبة في الإثارة مع الشريك الحقيقي

خيارات العلاج الفعالة

العلاج يعتمد على السبب وتفضيلات المريض. الأهم أن تطلب المساعدة — لا يوجد ما يستدعي الإحراج. طبيب المسالك البولية متخصص في هذا المجال وسيساعدك بسرية تامة.

• الخط الأول: تغيير نمط الحياة

- أوقف التدخين — التحسن يبدأ خلال أسابيع وتحسن الأوعية تدريجياً
- مارس الرياضة ١٥٠ دقيقة أسبوعياً — خاصة تمارين القلب والأوعية مثل المشي السريع والسباحة
- انقص وزنك — فقدان ١٠٪ من الوزن يحسن الانتصاب بشكل ملحوظ
- حسن نومك — ٧ إلى ٨ ساعات نوم جيد ترفع التستوستيرون
- عالج التوتر — التأمل والاسترخاء والتحدث مع شريكك يساعد كثيراً

• العلاج الدوائي

١ مثبطات PDE5

السيلدينافيل والتادالافيل والفاردينافيل. الخط الأول الدوائي. فعالة في ٧٠٪ من الحالات. تعمل بتحسين تدفق الدم عند الإثارة الجنسية. لا تؤخذ مع النيترات.

٢ العلاج الهرموني

إذا كان التستوستيرون منخفضاً — حقن أو جل أو لصقات. يحسن الرغبة والانتصاب. يحتاج متابعة دورية.

٣ حقن داخل القضيب

ألبروستاديل يحقن مباشرة في الجسم الكهفي. فعال في ٨٥٪ من الحالات حتى الحالات الشديدة.

• العلاجات المتقدمة

٤ موجات الصدمة منخفضة الطاقة

علاج حديث يحفز نمو أوعية دموية جديدة. جلسات أسبوعية بدون ألم. نتائج واعدة لاستعادة الانتصاب الطبيعي.

٥ زراعة دعامة القضيب

الحل الجراحي النهائي للحالات التي لا تستجيب للعلاجات الأخرى. نسبة رضا عالية جداً تتجاوز ٩٠٪. أنواعها قابلة للنفخ أو مرنة.

رسالة مهمة

ضعف الانتصاب مشكلة طبية وليست عيباً — لا تلجأ لمنتجات مجهولة المصدر
استشر طبيب مسالك بولية متخصصاً — العلاج الصحيح يبدأ بالتشخيص الصحيح
شريك حياتك جزء من الحل — التواصل المفتوح يساعد كثيراً في العلاج

عن الكاتب

د. جورج شاكر

أخصائي المسالك البولية

NHS Urology Specialist — United Kingdom

الزمالة المصرية في جراحة المسالك البولية
عضو الكلية الملكية للجراحين — بريطانيا
• الزمالة الأوروبية في المسالك البولية
٨ سنوات خبرة في طب المسالك البولية
٥ سنوات خبرة في الخدمة الصحية الوطنية البريطانية

تابعني على إنستغرام وتيك توك

@dr.george.shaker

هذا الدليل للتقيف الصحي فقط ولا يغني عن استشارة الطبيب المختص
جميع الحقوق محفوظة ٢٠٢٦