

صحة البروستاتا دليل الرجل العربي

تضخم البروستاتا الحميد والسرطان
فحص PSA — ما يجب أن تعرفه
للرجل فوق ٤٠ ولعائلته المحيطة
معرفة عميقة وشاملة

د. جورج شاكر

أخصائي المسالك البولية

NHS Urology Specialist

ما هي البروستاتا؟

البروستاتا غدة صغيرة بحجم حبة الجوز تقع أسفل المثانة مباشرة وتحيط بالإحليل. وظيفتها الأساسية إنتاج جزء من السائل المنوي الذي يغذي وينقل الحيوانات المنوية. تبدأ بالنمو التدريجي بعد سن الأربعين عند معظم الرجال.

مشاكل البروستاتا شائعة جدا — أكثر من نصف الرجال فوق الخمسين يعانون من أعراض تضخم البروستاتا. الخبر الجيد أن معظم مشاكل البروستاتا حميدة وقابلة للعلاج، لكن الفحص المبكر والمنتظم ضروري.

• أهم مشاكل البروستاتا

١ تضخم البروستاتا الحميد

الأكثر شيوعا. نمو تدريجي غير سرطاني يضغط على الإحليل ويسبب صعوبة في التبول. يصيب ٥٠٪ من الرجال فوق ٥٠ و ٨٠٪ فوق ٧٠.

٢ التهاب البروستاتا

عدوى بكتيرية أو التهاب غير بكتيري. يسبب ألما في الحوض وحرقة في التبول وأحيانا حمى. يصيب الرجال في أي عمر.

٣ سرطان البروستاتا

أكثر السرطانات شيوعا عند الرجال. غالبا بطيء النمو ويمكن علاجه إذا اكتشف مبكرا. الفحص الدوري ينقذ الأرواح.

• أعراض تضخم البروستاتا

- ضعف تدفق البول أو تقطعه — الشعور بأن المثانة لم تفرغ تماما
- التبول المتكرر خاصة في الليل — الاستيقاظ مرتين أو أكثر
- صعوبة في بدء التبول — الحاجة للانتظار أو الدفع
- التقطير بعد الانتهاء من التبول — نزول قطرات بعد إغلاق الصنبور
- الشعور بالإلحاح المفاجئ — صعوبة تأجيل التبول

فحص PSA – ما يجب أن تعرفه

هو بروتين تنتجه البروستاتا بشكل طبيعي. يمكن قياسه بتحليل دم بسيط. ارتفاعه قد يشير PSA لمشكلة في البروستاتا لكنه ليس دائما علامة على السرطان. فهم هذا الفحص يساعدك على اتخاذ قرارات مدروسة.

• متى يجب إجراء الفحص؟

- الرجال فوق ٥٠ سنة — ينصح بمناقشة فحص PSA مع طبيبك سنويا
- الرجال فوق ٤٥ إذا كان هناك تاريخ عائلي — أب أو أخ أصيب بسرطان البروستاتا
- الرجال من أصول أفريقية فوق ٤٥ — لديهم خطر أعلى للإصابة
- إذا ظهرت أعراض بولية جديدة — بغض النظر عن العمر يجب مراجعة الطبيب

• ماذا تعني نتائج PSA؟

أقل من ٤

طبيعي في معظم الحالات — لكن ١٥٪ من الحالات بسرطان يكون PSA طبيعيا

بين ٤ و ١٠

المنطقة الرمادية — يحتاج فحوصات إضافية لتحديد السبب

أكثر من ١٠

يزداد احتمال وجود سرطان — يحتاج تحويل عاجل لأخصائي المسالك

أسباب أخرى لارتفاع PSA غير السرطان

تضخم البروستاتا الحميد — التهاب البروستاتا — ممارسة الرياضة الشاقة
القذف خلال ٤٨ ساعة قبل الفحص — ركوب الدراجات لفترات طويلة
فحص المستقيم الرقمي قبل سحب الدم مباشرة

• سرطان البروستاتا — الحقائق المهمة

- سرطان البروستاتا غالبا بطيء النمو — كثير من الرجال يعيشون حياة كاملة دون أن يسبب مشاكل
- الاكتشاف المبكر يعني خيارات علاج أكثر وأفضل ونسب شفاء عالية جدا
- ليس كل سرطان بروتستاتا يحتاج علاجاً فورياً — المراقبة النشطة خيار معتمد للأورام البطيئة
- العلاج يشمل الجراحة والعلاج الإشعاعي والعلاج الهرموني حسب مرحلة الورم
- التاريخ العائلي مهم جدا — أخبر أبنائك إذا أصبت حتى يبدأوا الفحص مبكرا

خيارات علاج تضخم البروستاتا

يعتمد العلاج على شدة الأعراض ومدى تأثيرها على حياتك اليومية. ليس كل تضخم يحتاج علاجاً — الأعراض الخفيفة قد تحتاج فقط مراقبة وتعديلات في نمط الحياة.

• تعديلات نمط الحياة

- قلل السوائل مساءً — توقف عن الشرب قبل النوم بساعتين
- قلل الكافيين والكحول — يزيدان تكرار التبول ويهيجان المثانة
- أفرغ المثانة مرتين — بعد الانتهاء انتظر ٣٠ ثانية وحاول مرة أخرى
- تجنب أدوية البرد التي تحتوي مضادات الاحتقان — تسبب احتباس البول
- مارس النشاط البدني — الجلوس الطويل يزيد احتقان البروستاتا

• العلاج الدوائي

١ حاصرات ألفا

مثل التامسولوسين والألفوزوسين. ترخي عضلات عنق المثانة والبروستاتا لتحسين تدفق البول. تعمل خلال أيام.

٢ مثبطات ٥-ألفا ريداكترز

مثل الفيناسترايد والدوتاستيرايد. تقلص حجم البروستاتا تدريجياً. تحتاج ٣ إلى ٦ أشهر لتظهر النتائج.

٣ العلاج المركب

الجمع بين الدوائين يعطي نتائج أفضل في الحالات المتوسطة والشديدة.

• التدخلات الجراحية

٤ استئصال البروستاتا بالمنظار

العملية الأكثر شيوعاً. يتم استئصال النسيج المتضخم من الداخل عبر الإحليل بدون جرح خارجي.

٥ تبخير البروستاتا بالليزر

تقنية حديثة باستخدام ليزر الجرين لايت. نزيف أقل ومناسبة للمرضى على أدوية سيولة الدم.

٦ رفع الإحليل البروستاتي

إجراء بسيط يرفع فصوص البروستاتا بعيداً عن الإحليل. يحافظ على الوظيفة الجنسية.

نصائح ذهبية لصحة البروستاتا

- ١ تناول الطماطم المطبوخة
غنية بالليكوبين الذي أظهرت الدراسات أنه يقلل خطر سرطان البروستاتا
- ٢ أكثر من الخضروات الصليبية
البروكلي والقرنبيط والملفوف تحتوي مركبات واقية من السرطان
- ٣ قلل اللحوم الحمراء والدهون المشبعة
ارتبطت بزيادة خطر سرطان البروستاتا في عدة دراسات
- ٤ مارس الرياضة ٣٠ دقيقة يوميا
تقلل خطر تضخم البروستاتا وتحسن الأعراض البولية
- ٥ حافظ على وزن صحي
السمنة مرتبطة بزيادة خطر سرطان البروستاتا العدوانية
- ٦ لا تتجاهل الأعراض
أي تغير في عادات التبول بعد الأربعين يستحق استشارة طبية
- ٧ ناقش فحص PSA مع طبيبك
الفحص الدوري ينفذ الأرواح — اسأل طبيبك عن الموعد المناسب لك

أعراض تستدعي مراجعة الطبيب فوراً

عدم القدرة على التبول نهائياً — دم في البول — ألم شديد في أسفل البطن
فقدان وزن غير مبرر — ألم في العظام خاصة أسفل الظهر والحوض

رسالة لعائلة الرجل

شجع زوجك أو أباك أو أخاك على الفحص الدوري بعد سن ٥٠
كثير من الرجال يتجاهلون الأعراض بسبب الإحراج — دعمك مهم جداً
سرطان البروستاتا قابل للشفاء إذا اكتشف مبكراً — الفحص بسيط وسريع

عن الكاتب

د. جورج شاكر

أخصائي المسالك البولية

NHS Urology Specialist — United Kingdom

الزمالة المصرية في جراحة المسالك البولية
عضو الكلية الملكية للجراحين — بريطانيا
• الزمالة الأوروبية في المسالك البولية
٨ سنوات خبرة في طب المسالك البولية
٥ سنوات خبرة في الخدمة الصحية الوطنية البريطانية

تابعني على إنستغرام وتيك توك

@dr.george.shaker

هذا الدليل للتقيف الصحي فقط ولا يغني عن استشارة الطبيب المختص
جميع الحقوق محفوظة ٢٠٢٦