

BIOESTATÍSTICA

M.I. Eng. Biomédica

2015-2016

Aula Teórica 4



Probabilidade

- Experiência aleatória
 - O conjunto de resultados é fixado antecipadamente;
 - O resultado da experiência nunca pode ser previsto de forma exacta, mesmo que se façam todos os esforços para controlar as circunstâncias relevantes;



Probabilidade

- Exemplos de experiências aleatórias
 - Lançamento de uma moeda ao ar;
 - Lançamento de um dado;
 - Tiragem de uma carta de um baralho;
 - Registo do número de sinistros viários durante um ano;
 - Taxa de inflação nos próximos anos;
 - Equipas vencedoras em casa na próxima jornada;
 - SMS... quem, quando, quanto,...

Probabilidade

- Espaço de resultados
 - Denomina-se espaço de resultados ou espaço-amostra, e representa-se por Ω , o conjunto fundamental (não vazio) formado por todos os resultados que hipoteticamente é possível obter quando se efectua determinada experiência aleatória.

Probabilidade

- Lançamento de 2 moedas ao ar
 - O espaço-amostra, Ω , é

$$\Omega = \{FF, FC, CF, CC\}$$

Probabilidade

- N° de telefonemas recebidos por hora no INEM
 - O espaço-amostra, Ω , é o conjunto de todos os números inteiros não negativos;
 - Na prática considera-se um limite superior

$$\Omega = \{1, 2, 3, \dots, H\}$$

Probabilidade

- Observação da duração da vida humana, medida em anos
 - O espaço-amostra, Ω , é contínuo

$$\Omega = \{x: x > 0\}$$

Probabilidade

- Acontecimento
 - Designa-se por acontecimento um subconjunto do espaço-amostra, Ω .
 - Os subconjuntos $\{\omega\} \subset \Omega$ formados por um só elemento ou ponto dizem-se acontecimentos elementares;




Probabilidade

- Álgebra de acontecimentos
 - Implicação de acontecimentos
 - Identidade de acontecimentos
 - União de acontecimentos
 - Intersecção de acontecimentos
 - Acontecimentos incompatíveis

Probabilidade

População de mulheres que constitui o espaço amostral Ω , com conjuntos definidos pelos eventos $J, \overline{J}, C, \overline{C}$.




- até 19 anos
- até 29 anos
- 30 anos ou mais

- sem câncer de mama
- com câncer de mama


Probabilidade

População de mulheres, mostrando o subconjunto J_0 e J .




Probabilidade

População de mulheres, ilustrando a união dos conjuntos C e \overline{J} ,
que corresponde ao evento [ter câncer de mama ou ter 30 anos ou mais].



Probabilidade

População de mulheres, ilustrando a intersecção dos conjuntos C e \overline{J} , que corresponde ao evento [ter câncer de mama e ter 30 anos ou mais].



Probabilidade

- Propriedades

- Associatividade

- $A \cup (B \cap C) = (A \cup B) \cap C; A \cap (B \cup C) = (A \cap B) \cup C$

- Comutatividade

- $A \cup B = B \cup A; A \cap B = B \cap A$

- Distributividade

- $A \cap (B \cup C) = (A \cap B) \cup (A \cap C)$

- $A \cup (B \cap C) = (A \cup B) \cap (A \cup C)$

- Leis de De Morgan

- $\overline{A \cup B} = \bar{A} \cap \bar{B}; \overline{A \cap B} = \bar{A} \cup \bar{B}$

Probabilidade

- Medida
 - A medida de probabilidade é uma função P que a cada acontecimento A , $A \subset \Omega$, faz corresponder um número real, $P(A)$, probabilidade do acontecimento A , que verifica os três axiomas seguintes:
 - P1) $P(A) \geq 0$
 - P2) $P(\Omega) = 1$
 - P3) Se A e B forem acontecimentos incompatíveis, $A \cap B = \emptyset$, então $P(A \cup B) = P(A) + P(B)$

Probabilidade

- Propriedades da medida
 - $P(A) = 1 - P(\bar{A})$;
 - $P(\emptyset) = 0$;
 - $P(B - A) = P(B) - P(A \cap B)$
 - $P(A \cup B) = P(A) + P(B) - P(A \cap B)$
 - $A \subset B \Rightarrow P(A) \leq P(B)$
 - $P(A) \leq 1$

Probabilidade

- Probabilidade à priori:
 - quociente entre o número de ocorrências favoráveis à realização do acontecimento e o número de ocorrências possíveis da experiência – pressupondo um espaço amostral conhecido

Probabilidade

- Probabilidade à priori:
 - A probabilidade sair face par de um dado é de $1/2$:
 - espaço amostral = 6 faces; número de faces par = 3 faces;
 - logo a probabilidade de sair face par = $3/6 = 1/2$.
 - A probabilidade de se extrair um rei num baralho é de $1/13$:
 - espaço amostral = 52 cartas; número de reis = 4;
 - logo a probabilidade de sair um rei = $4/52 = 1/13$

Probabilidade

- Probabilidade à priori:
 - A probabilidade do evento A no espaço amostral Ω é:

$$P(A) = \frac{n(A)}{N(\Omega)} \quad \text{com } n(A) = \#\{A\} \quad N(\Omega) = \#\{\Omega\}$$

Probabilidade

- Probabilidade à posteriori:
 - quociente entre o número de vezes que A ocorre (k) e o número de experiências ou tentativas realizadas (n):

$$p = P(A) = \frac{k}{n}$$

Probabilidade

- Probabilidade à posteriori:
 - a probabilidade do acontecimento contrário, ou seja, a probabilidade de A não acontecer será:

$$q = P(\bar{A}) = \frac{n - k}{n} = 1 - \frac{k}{n} = 1 - P(A)$$

Probabilidade

- Probabilidade à posteriori:
 - a probabilidade do acontecimento A se verificar ou não se verificar:

$$p + q = 1$$

Probabilidade

- Lei dos grandes números:
 - Quando n se torna muito grande a frequência relativa é igual à probabilidade

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} P(f_n(A) - P(A)) = 1$$

Probabilidade

- Probabilidade condicionada
 - Sejam dois acontecimentos, A e B , subconjuntos do mesmo espaço de resultados Ω . A probabilidade de A se realizar sabendo-se que B se realizou – ou a probabilidade de A condicionada por B , designada por $P(A|B)$ – é definida por

$$P(A|B) = \frac{P(A \cap B)}{P(B)}$$

Probabilidade

Classificação de peças de vulcanite quanto à porosidade e ao dimensionamento

Dimensionamento	Porosas	Não porosas	Totais
Defeituoso	2,1%	4,9%	7%
Não defeituoso	18,1%	74,9%	93%
Totais	20,2%	79,8%	100%

Probabilidade

- Probabilidade de obter uma peça porosa $P(A) = 0,202$;
- Probabilidade de obter uma peça não porosa $P(\bar{A}) = 0,798$;
- Probabilidade de obter uma peça 'defeituosa' $P(B) = 0,070$
- Probabilidade de obter uma peça 'não defeituosa' $P(\bar{B}) = 0,930$
- Probabilidade de obter uma peça porosa e 'não defeituosa' ...

Probabilidade

- Acontecimentos independentes
 - Dois acontecimentos, A e B , do mesmo espaço de resultados, dizem-se independentes sse

$$P(A \cap B) = P(A) P(B)$$

Probabilidade

- Acontecimentos independentes
 - Se A e B forem acontecimentos independentes, então

$$P(A|B) = P(A), \quad P(B) > 0$$

$$P(B|A) = P(B), \quad P(A) > 0$$



Distribuições

- Distribuições discretas
 - Uniforme
 - Bernoulli
 - Binomial
 - Poisson
- Distribuições contínuas
 - Normal
 - Exponencial
 - Qui-quadrado

Uniforme

- Definição
 - Seja X uma variável aleatória com $D = \{x_1, x_2, \dots, x_n\}$. Diz-se que X segue uma distribuição uniforme nos pontos x_k sse

$$f_X(x) = \begin{cases} \frac{1}{n} & x \in D \\ 0 & x \notin D \end{cases}$$

Uniforme

- Propriedades

- $E(X) = \mu = \frac{1}{n} \sum_{j=1}^n x_j;$

- $Var(X) = \frac{1}{n} \sum_{j=1}^n (x_j - \mu)^2 = \frac{1}{n} \sum_{j=1}^n x_j^2 - \mu$

Uniforme

- Exemplo
 - Lançamento de um dado ‘perfeito’.
 - $n = 6$
 - $P(X = x) = \frac{1}{6}, \quad x = 1, 2, \dots, 6$