

Relación 2

Derivación e integración numérica

1.
 - a) Use el método interpolatorio para obtener la fórmula de diferencia progresiva en dos nodos para aproximar $f'(a)$. ¿Cuál es el grado de exactitud de dicha fórmula? Justifique la respuesta.
 - b) Utilice la fórmula de Taylor para hallar la fórmula mencionada en el apartado anterior y la expresión de su error cuando $f_2 \in \mathcal{C}^2[a, a + h]$.
 - c) Use el método interpolatorio para obtener la fórmula de diferencia centrada en dos nodos para aproximar $f'(a)$. ¿Cuál es el grado de exactitud de dicha fórmula? Justifique la respuesta.
 - d) Utilice la fórmula de Taylor para hallar la fórmula mencionada en el apartado anterior y la expresión de su error cuando $f_2 \in \mathcal{C}^3[a - h, a + h]$.
2. Usando el método de los coeficientes indeterminados deduzca la fórmula de diferencia centrada en tres nodos para aproximar $f'(a)$ y compruebe que coincide con la fórmula de diferencia centrada en dos nodos.
3. Obtenga la fórmula de diferencia progresiva en tres nodos para aproximar $f'(a)$ calculando directamente sus coeficientes mediante la base de Lagrange del problema de interpolación unisolvente asociado a dicha fórmula. Halle la expresión del error para esta fórmula cuando $f \in \mathcal{C}^4[a, a + 2h]$.
4. Se considera la fórmula de tipo interpolatorio en \mathbb{P}_n siguiente:

$$f''(c) \approx \alpha_0 f(x_0) + \alpha_1 f(x_1) + \cdots + \alpha_n f(x_n)$$

con $x_0 < x_1 < \cdots < x_n$. Demuestre que si $f \in \mathcal{C}^{n+3}[a, b]$ con $[a, b]$ tal que $x_0, x_1, \dots, x_n, c \in [a, b]$, entonces

$$R(f) = 2 \frac{f^{(n+3)}(\xi_2)}{(n+3)!} \Pi(c) + 2 \frac{f^{(n+2)}(\xi_1)}{(n+2)!} \Pi'(c) + \frac{f^{(n+1)}(\xi_0)}{(n+1)!} \Pi''(c)$$

siendo $\xi_0, \xi_1, \xi_2 \in]\min\{x_0, c\}, \max\{x_n, c\}[$ y $\Pi(x) = \prod_{i=0}^n (x - x_i)$.

5. Use el método de los coeficientes indeterminados para obtener la fórmula de diferencia regresiva en tres nodos para aproximar $f''(a)$. Halle la expresión del error de truncamiento para esta fórmula cuando $f \in \mathcal{C}^5[a - 2h, a]$.

6. Use la fórmula de Taylor para obtener, cuando $f \in \mathcal{C}^4[a-h, a+h]$, la fórmula de diferencia centrada en tres nodos para aproximar $f''(a)$ y la expresión de su error. ¿Cuál es el orden de precisión de esta fórmula? ¿Por qué?

7. a) Halle la fórmula de tipo interpolatorio en \mathbb{P}_2 de la forma

$$f'(a) \approx \alpha_0 f(a-h_1) + \alpha_1 f(a) + \alpha_2 f(a+h_2)$$

con $h_1, h_2 > 0$, así como la expresión de su error de truncamiento cuando $f \in \mathcal{C}^4[a-h_1, a+h_2]$. ¿Cuál es el grado de exactitud de esta fórmula? Justifique la respuesta.

- b) Use la tabla de valores $\frac{x}{f(x)} \left| \begin{array}{cccc} 0.7 & 1.25 & 1.50 & 1.75 \\ -0.1 & 0.2 & 0.3 & 0.25 \end{array} \right.$ para dar valores aproximados de $f'(0.7)$, $f'(1.25)$, $f'(1.5)$ y $f'(1.75)$ utilizando para cada uno de ellos la fórmula de derivación numérica más adecuada. Indique la fórmula usada en cada caso y justifique su uso.

8. Halle una cota del valor absoluto del error que se comete al aproximar la derivada de la función $f(x) = \cos^2 x$ en $x = 0.8$ mediante la correspondiente fórmula de derivación numérica de tipo interpolatorio que usa los valores de f en los puntos 0.6, 0.8 y 1.

9. Se considera la siguiente fórmula de integración numérica:

$$\int_{-1}^1 f(x) dx \approx \alpha_0 f(-1) + \alpha_1 f(0) + \alpha_2 f(1).$$

- a) Halle de tres formas distintas los valores $\alpha_i \in \mathbb{R}$, $i = 0, 1, 2$ para que dicha fórmula sea de tipo interpolatorio en \mathbb{P}_2 .
- b) Halle el grado de exactitud de la fórmula obtenida en el apartado anterior.
- c) Proporcione una fórmula de la forma propuesta que no sea de tipo interpolatorio en \mathbb{P}_2 . Justifique la respuesta.

10. Para evaluar el funcional lineal $L(f) = f(\frac{1}{2}) + \int_0^1 f(x) dx$ con $f \in \mathcal{C}^1[0, 1]$ se propone la siguiente fórmula de aproximación lineal:

$$L(f) \approx \frac{1}{8}(13f(0) + 5f'(0) + 3f(1)).$$

- a) ¿La fórmula es exacta para $f(x) = x^3$? ¿Por qué? ¿Cuál es el grado de exactitud de la fórmula? ¿Por qué?
 - b) ¿La fórmula es de tipo interpolatorio en \mathbb{P}_2 ? ¿Por qué? Si no lo es, deduzca los coeficientes de la fórmula para que sí lo sea.
 - c) Deduzca el error de la fórmula obtenida en el apartado b) cuando $f \in \mathcal{C}^3[0, 1]$. (Nota: el error de interpolación puede escribirse como $E(f) = f(x) - p(x) = f[0, 0, 1, x]x^2(x - 1)$).
 - d) ¿Qué fórmula se obtiene si deseamos que sea de tipo interpolatorio en el espacio $V = \langle 1, \sin(\pi x), \cos(\pi x) \rangle$?
11. a) Use el método interpolatorio para obtener la fórmula del rectángulo izquierda y deducir la expresión del error de esta fórmula cuando $f \in \mathcal{C}^1[a, b]$. ¿Cuál es el grado de exactitud de dicha fórmula? Justifique la respuesta.
- b) Utilice el método interpolatorio para obtener la fórmula del punto medio y deduzca la expresión del error de esta fórmula cuando $f \in \mathcal{C}^2[a, b]$.
12. Obtenga la fórmula del trapecio calculando directamente sus coeficientes mediante la base de Lagrange del problema de interpolación unisolvente asociado a dicha fórmula. Halle la expresión del error de cuadratura de esta fórmula cuando $f \in \mathcal{C}^2[a, b]$ y deduzca cuál es su grado de exactitud.
13. Halle la fórmula de Newton-Cotes abierta con dos nodos.
14. Aproxime el valor de $\ln 2 = \int_1^2 \frac{1}{x} dx$ usando la fórmula del punto medio, la fórmula del trapecio y la fórmula de Simpson. Calcule una cota del valor absoluto del error que se comete en cada una de las aproximaciones obtenidas.
15. Halle la expresión del error de la fórmula del trapecio compuesta cuando $f \in \mathcal{C}^2[a, b]$.
16. La fórmula de integración numérica de tipo interpolatorio en \mathbb{P}_3 de la forma

$$\int_a^b f(x) dx \approx \alpha_0 f(a) + \alpha_1 f(b) + \alpha_2 f'(a) + \alpha_3 f'(b)$$

es conocida como *fórmula del trapecio corregida*.

- a) Halle dicha fórmula, así como la expresión de su error si $f \in \mathcal{C}^4[a, b]$. ¿Cuál es su grado de exactitud? Razone la respuesta.
- b) Escriba la fórmula de cuadratura compuesta que se obtiene a partir de ella para una partición uniforme del intervalo de integración y halle la expresión de su error cuando $f \in \mathcal{C}^4[a, b]$.

17. De una función $f(x)$ se conocen los valores $\frac{x}{f(x)} \left| \begin{array}{ccccc} -2 & -1 & 0 & 1 & 2 \\ 2 & 1 & 0.5 & 0.75 & 1.5 \end{array} \right.$. Se pide:

- a) Calcule un valor aproximado de $\int_{-2}^2 f(x) dx$ usando la fórmula
 - 1) del punto medio compuesta,
 - 2) del trapecio compuesta,
 - 3) de Simpson compuesta.
- b) Interprete geoméricamente cada una de las fórmulas anteriores para aproximar $\int_{-2}^2 f(x) dx$ y haga un dibujo que ilustre la respuesta.

18. Calcule valores aproximados para $\ln 2 = \int_1^2 \frac{1}{x} dx$ usando

- a) La fórmula del punto medio compuesta con 4 subintervalos.
- b) La fórmula del trapecio compuesta con 4 subintervalos.
- c) La fórmula de Simpson compuesta con 2 subintervalos.

Halle una cota del valor absoluto del error cometido en cada uno de los valores aproximados calculados. Compare los resultados obtenidos con los del problema ??.

19. Se quiere calcular $\int_0^1 e^{-x^2} dx$ usando la fórmula del punto medio compuesta. ¿Cuántos subintervalos deberá tener la partición uniforme a considerar para que el valor absoluto del error que se cometa al aproximar dicha integral sea menor que 5×10^{-7} ?

20. Se quiere hallar un valor aproximado de $\int_1^2 \ln^2(x) dx$.

- a) ¿Cuántos subintervalos deberá tener la partición uniforme para que el valor absoluto del error que se cometa al aproximar dicha integral usando la fórmula del trapecio compuesta sea menor que 10^{-3} ?
- b) ¿Cuántos subintervalos deberá tener la partición uniforme para que el valor absoluto del error que se cometa al aproximar dicha integral utilizando la fórmula de Simpson compuesta sea menor que 10^{-3} ?
- c) ¿Cuál de las fórmulas compuestas de los apartados anteriores será preferible utilizar para aproximar la integral dada? Justifique la respuesta.

21. Se consideran las fórmulas simples del rectángulo, del punto medio, del trapecio y de Simpson. ¿Alguna de ellas es una fórmula de cuadratura gaussiana? Justifique la respuesta.

22. a) La fórmula numérica $f''(a) \approx \frac{3f(-2h)-5f(0)+2f(3h)}{15h^2}$
- 1) ¿es de tipo interpolatorio clásico?
 - 2) ¿cuál su grado de exactitud?
- b) ¿Existe alguna fórmula de derivación numérica, basada en $n + 1$ nodos distintos, de la forma: $f''(a) \approx \alpha_0 f(x_0) + \alpha_1 f(x_1) + \dots + \alpha_n f(x_n)$ que sea de tipo interpolatorio en \mathbb{P}_n y tenga grado de exactitud $n + 3$? Justifique la respuesta.
- c) Justifique que la fórmula de integración numérica $\int_0^2 f(x) dx = \frac{2}{3}(3f(0) + 3f'(0) + 2f''(0)) + R(f)$ es de tipo interpolatorio en \mathbb{P}_2 y para $f \in \mathcal{C}^3[0, 2]$ su error se puede escribir como $R(f) = \frac{2}{3}f'''(\xi)$ con $\xi \in]0, 2[$.
23. a) Calcule la fórmula de Gauss-Legendre con 2 nodos y halle la expresión de su error cuando $f \in \mathcal{C}^4[-1, 1]$.
- b) Usando la fórmula del apartado anterior, obtenga una fórmula para aproximar $\int_a^b f(x) dx$ con $[a, b]$ un intervalo cualquiera. ¿Cuál es la expresión del error de dicha fórmula cuando f es suficientemente regular?
24. Calcule la fórmula de Gauss-Legendre con 3 nodos y halle la expresión de su error cuando $f \in \mathcal{C}^6[1, 1]$.
25. Calcule la fórmula gaussiana con dos nodos de la forma $\int_{-1}^1 |x| f(x) dx \approx \alpha_0 f(x_0) + \alpha_1 f(x_1)$ y halle la expresión de su error cuando $f \in \mathcal{C}^4[-1, 1]$.
26. a) Determine los valores de A, B, C de forma que la fórmula de cuadratura $\int_0^3 f(x) dx \approx Af(0) + Bf(C)$ tenga el máximo grado de exactitud posible.
- b) Utilizando la fórmula obtenida en a), obtenga una fórmula para aproximar $\int_a^b f(x) dx$ con $[a, b]$ un intervalo cualquiera.
- c) Deduzca la fórmula de cuadratura compuesta asociada a la fórmula obtenida en b) para una partición uniforme del intervalo de integración $[a, b]$ en N subintervalos.
27. Halle la fórmula de cuadratura de la forma $\int_{-1}^1 f(x) dx \approx \alpha_0 f(-1) + \alpha_1 f(x_1) + \alpha_2 f(1)$ que tiene el máximo grado de exactitud posible. ¿Cuál es ese grado de exactitud máximo? ¿Se trata de una fórmula de cuadratura gaussiana? ¿Por qué?
28. Las fórmulas gaussianas de Laguerre corresponden a una integral del tipo

$$\int_0^\infty e^{-x} f(x) dx$$

- a) Obtenga la fórmula de Laguerre con dos nodos.
- b) Aplique la fórmula obtenida para aproximar $\int_0^\infty e^{-x} x^4 dx$.

29. Se denominan fórmulas de integración de Lobatto a aquellas que usan como nodos los dos extremos del intervalo de integración, y eligen los restantes para alcanzar la máxima exactitud posible. Trapecio y Simpson son ejemplos de fórmulas de Lobatto, siendo la del trapecio la más sencilla.

a) Obtenga la fórmula de Lobatto del tipo

$$\int_{-1}^1 f(x) dx \approx \alpha_0 f(-1) + \alpha_1 f(x_1) + \alpha_2 f(x_2) + \alpha_3 f(1).$$

b) Obtenga la expresión del error de dicha fórmula.

30. Se necesita calcular $\int_0^1 x f(x) dx \approx \alpha_0 f(x_0) + \alpha_1 f(x_1)$. Obtenga $x_0, x_1, \alpha_0, \alpha_1$ para que la fórmula anterior tenga exactitud máxima.