



Universidad de Granada

DOBLE GRADO EN INGENIERÍA INFORMÁTICA Y  
MATEMÁTICAS

# GEOMETRÍA GLOBAL DE CURVAS Y SUPERFICIES

Autor:  
Jesús Muñoz Velasco

Curso 2026-2027



# Índice general

1. Curvas Simples. Clasificación. Teorema de la Curva de Jordan. Teorema de la Divergencia 5



# 1. Curvas Simples. Clasificación.

## Teorema de la Curva de Jordan.

## Teorema de la Divergencia

**Definición 1.1.** Una **curva simple** es un subconjunto  $C \subset \mathbb{R}^2$  no vacío tal que  $\forall p \in C$  se tiene que

- )  $\exists V$  entorno abierto de  $p$  en  $C$ .
- )  $\exists I \subset \mathbb{R}$  intervalo abierto.
- )  $\exists \alpha : I \rightarrow \mathbb{R}^2$  curva parametrizada regular

de forma que  $\alpha(I) = V$ , y la aplicación  $\alpha : I \rightarrow V$  es un homeomorfismo.

*Observación.*

1. La aplicación  $\alpha$  la llamaremos **parametrización local** de  $C$ .
2.  $C$  no puede tener “esquinas” (o “picos”) ya que  $\alpha$  es regular.
3.  $C$  no puede tener autointersecciones. Ni siquiera el Folium de Descartes puede ser una curva simple, a pesar de que en este caso  $\alpha$  es inyectiva.
4. Los entornos  $V$  son todos de la forma

$$V = U \cap C$$

donde  $U$  es un entorno abierto de  $p$  en  $\mathbb{R}^2$ .

5. Los entornos  $V$  son todos conexos.

**Ejemplo.** Supongamos que tenemos una curva simple  $C \subset \mathbb{R}^2$  y consideramos las parametrizaciones  $\alpha : I \rightarrow C$  y  $\beta : J \rightarrow C$  de forma que  $W = \alpha(I) \cap \beta(J) \neq \emptyset$ .

Tenemos que  $\alpha^{-1}(W) \subset I$  y que  $\beta^{-1}(W) \subset J$ . Además, como  $W$  es abiertos, tendremos que  $\alpha^{-1}(W)$  es abierto en  $I$  y  $\beta^{-1}(W)$  es abierto en  $J$  y por ser abiertos de un abierto, ambos serán abiertos en  $\mathbb{R}$ .

Además, podemos considerar los **cambios de parametrización**

$$\begin{aligned}\phi &= \beta^{-1} \circ \alpha : \alpha^{-1}(W) \rightarrow \beta^{-1}(W) \\ \phi^{-1} &= \psi = \alpha^{-1} \circ \beta : \beta^{-1}(W) \rightarrow \alpha^{-1}(W)\end{aligned}$$

Veamos que  $\phi$  y  $\psi$  son **difeomorfismos**. Para ello, tan solo tendremos que verlo para  $\phi$ . Además, bastará con ver que  $\phi$  es derivable (diferenciable), ya que tenemos que es una biyección y su inversa será  $\psi$ , donde  $\alpha$  y  $\beta$  juegan papeles inversos por lo que será equivalente a ver que  $\phi$  lo sea.

Recordamos la situación en la que estamos

$$\begin{array}{ccccc} \alpha^{-1}(W) & \xrightarrow{\phi} & \beta^{-1}(W) & \xrightarrow{\beta_1} & \mathbb{R} \\ t_0 & \longmapsto & \phi(t_0) & \longmapsto & \beta(\phi(t_0)) \end{array}$$

Además, como  $\beta$  es regular tenemos que  $\beta'(\phi(t_0)) \neq (0, 0)$ . Supongamos sin pérdida de generalidad que  $\beta_1(\phi(t_0)) \neq 0$  y estamos en condiciones de aplicarle el Teorema de la Función Inversa. Este nos dice que existe un  $W_2$  entorno abierto de  $\phi(t_0)$  en  $\beta^{-1}(W)$  (que también será abierto en  $\mathbb{R}$  por ser abierto de abierto) y existe también un  $W_1$  entorno abierto de  $\beta_1(\phi(t_0))$  en  $\mathbb{R}$  de forma que  $\beta_1(W_2) = W_1$  y tal que  $\beta_{1|W_2} : W_2 \rightarrow W_1$  es un difeomorfismo. Además,

$$\phi = \beta^{-1} \circ \alpha \quad \Rightarrow \quad \alpha = \beta \circ \phi \quad \Rightarrow \quad \alpha_1 = \beta_1 \circ \phi$$

Como  $\phi$  es continua, en particular será continua en  $t_0$  por lo que tenemos un entorno abierto de  $\phi(t_0)$  que es  $W_2$ . Por la definición topológica de continuidad tendremos que existe un  $W_3$  entorno abierto de  $t_0$  en  $\alpha^{-1}(W)$  y por tanto en  $\mathbb{R}$  de forma que  $\phi(W_3) \subset W_2$ .

Vamos ahora a considerar la restricción

$$\alpha_{1|W_3} = (\beta_1 \circ \phi)_{|W_3} = \beta_{1|W_2} \circ \phi_{|W_3}$$

Además, por ser una parametrización,  $\alpha$  es derivable y por tanto su primera componente  $\alpha_1$  también lo será (y en particular su restricción también). Del Teorema de la función inversa anterior sabemos que  $\beta_{1|W_2}$  es un difeomorfismo. Por tanto podemos pasar

$$\phi_{|W_3} = \beta_{1|W_2}^{-1} \circ \alpha_{1|W_3}$$

y llegamos a la conclusión de que  $\phi_{|W_3}$  es derivable, pero  $W_3$  es un entorno abierto de  $t_0$ . Hemos llegado a que para un  $t_0$  cualquiera del dominio del cambio de parámetros existe un entorno suyo en el que  $\phi$  es derivable. En particular lo será en  $t_0$ .

Del ejemplo anterior podemos concluir la siguiente proposición:

**Proposición 1.1.** Sean  $C \subset \mathbb{R}^2$  una curva simple y  $\alpha : I \rightarrow C$ ,  $\beta : J \rightarrow C$  dos parametrizaciones cuyas imágenes se solapan, es decir, tal que

$$W = \alpha(I) \cap \beta(J) \neq \emptyset$$

Entonces las aplicaciones **cambio de parámetros** siguientes

$$\begin{array}{l} \phi = \beta^{-1} \circ \alpha : \alpha^{-1}(W) \rightarrow \beta^{-1}(W) \\ \psi = \alpha^{-1} \circ \beta : \beta^{-1}(W) \rightarrow \alpha^{-1}(W) \end{array}$$

son difeomorfismos entre abiertos de  $\mathbb{R}$  (de  $I$  y  $J$  respectivamente).

**Definición 1.2.** Sea  $C \subset \mathbb{R}^2$  una curva simple y un punto  $p \in C$ . Definimos la **recta tangente** a la curva  $C$  en el punto  $p$  como la recta afín  $T_p C$  que pasa por  $p$  y tiene dirección  $\alpha'(t_0)$ , es decir,

$$T_p C = p + \langle \alpha'(t_0) \rangle$$

donde  $\alpha : I \rightarrow C$  es una parametrización con  $\alpha(t_0) = p$ .

*Observación.* En primer lugar es fácil ver que  $T_p C$  es una recta, ya que  $\alpha'(t_0) \neq 0$  por ser una curva regular.

Nos planteamos además, qué ocurre si tomamos una parametrización distinta. Para ello consideramos  $\beta : J \rightarrow C$  otra parametrización con  $\beta(u_0) = p$ , donde  $u_0 \in J$  y queremos ver la relación entre  $\alpha'(t_0)$  y  $\beta'(u_0)$ .

Sabemos que  $\phi = \beta^{-1} \circ \alpha$  es un difeomorfismo. Además, esto podemos aplicarlo porque sabemos que se solapan, ya que

$$\left. \begin{array}{l} p = \alpha(t_0) \in \alpha(I) \\ p = \beta(u_0) \in \beta(J) \end{array} \right\} \Rightarrow \alpha(I) \cap \beta(J) \neq \emptyset, \quad \phi(t_0) = u_0$$

Además  $\alpha = \beta \circ \phi$  y estamos en condiciones de derivar en  $t_0$  aplicando la regla de la cadena.

$$\alpha'(t_0) = (\beta \circ \phi)'(t_0) = \phi'(t_0)\beta'(\phi(t_0)) = \phi'(t_0)\beta'(u_0) \neq 0$$

Por colinealidad tenemos que

$$\langle \alpha'(t_0) \rangle = \langle \beta'(u_0) \rangle$$

lo que nos confirma que la definición anterior está bien hecha y no depende de la parametrización escogida.

### Ejemplo.

1. Sea  $C \subset \mathbb{R}^2$  una curva simple y consideramos  $C' \subset C$  n abierto suyo. Entonces  $C'$  es también una curva simple.

*Demostración.* Para probarlo tenemos que ver que para todo punto existe una parametrización regular. Así consideramos un  $p' \in C'$  y en particular  $p' \in C$  por lo que existirá un  $V \subset C$  entorno de  $p'$ , un intervalo abierto  $I \subset \mathbb{R}$  y una curva regular  $\alpha : I \rightarrow \mathbb{R}^2$  tal que  $\alpha(I) = V$  y tal que  $\alpha : I \rightarrow V$  es un homeomorfismo.

Podríamos ahora pensar en elegir un  $V' = V \cap C'$  pero a poco que lo pensemos no vale porque  $V'$  puede ser no conexo. Por ello consideramos  $V'$  como la componente conexa de  $V \cap C'$  que contiene a  $p'$ , que será un entorno abierto y conexo de  $p'$  en  $C'$ .

Con esta elección es natural considerar  $I' = \alpha^{-1}(V') \subset \alpha^{-1}(V) \subset I \subset \mathbb{R}$ . Por ser  $\alpha$  continua tendremos que  $I'$  es un abierto de  $\mathbb{R}$  y por ser homeomorfismo  $\alpha^{-1}$  será también continua lo que nos garantiza que  $I'$  es conexo. Concluimos que  $I'$  es un intervalo abierto de  $\mathbb{R}$ .

Finalmente consideramos  $\alpha' = \alpha|_{I'}$  que será una curva regular de  $I'$  en  $\mathbb{R}^2$  (por ser restricción en el dominio de una curva regular).

Queremos ver ahora que se verifican las condiciones para que  $C'$  sea una curva simple. Tenemos que

$$\alpha'(I') = \alpha'(\alpha^{-1}(V')) = V'$$

y además  $\alpha' : I' \rightarrow V'$  es un homeomorfismo por ser restricción de  $\alpha$  que ya lo era. □

2. Consideramos  $C \subset \mathbb{R}^2$  un subconjunto y  $\{C_i\}_{i \in I}$  una familia de subconjuntos de  $C$ , es decir,  $C_i \subset C$  para todo  $i \in I$  tal que cada  $C_i$  es una curva simple abierta en  $C$  y tal que

$$C = \bigcup_{i \in I} C_i$$

Entonces  $C$  es una curva simple.

*Demostración.* La demostración se deja como ejercicio □

3. Grafos de funciones derivables. Consideramos un intervalo abierto  $I \subset \mathbb{R}$  y una función  $f : I \rightarrow \mathbb{R}$  es derivable. De esta forma podemos tomar

$$\text{Grafo}(f) = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 : x \in I, y = f(x)\} \subset \mathbb{R}^2$$

y dicho grafo será una curva simple.

*Demostración.* Comencemos nombrando  $C = \text{Grafo}(f) \neq \emptyset$  y podemos reescribir

$$C = \{(x, f(x)) : x \in I\}$$

Tomamos un  $p = (x, f(x)) \in C$  donde  $x \in I$ . Elegimos  $V = C$  por lo que trivialmente  $V$  será un entorno abierto de  $p$  en  $C$ . También tomamos el  $I$  dominio de la función que ya es un intervalo abierto de  $\mathbb{R}$ . Nos queda por escoger un  $\alpha : I \rightarrow \mathbb{R}^2$  que a poco que pensemos es claro que nos vale

$$\alpha(t) = (t, f(t))$$

que es derivable por serlo la identidad y  $f$ . Además, tenemos que  $\alpha'(t) = (1, f'(t)) \neq (0, 0)$  por lo que claramente  $\alpha$  es una curva regular. Tenemos que

$$\alpha(I) = \{(t, f(t)) : t \in I\} = \text{Grafo}(f) = C = V$$

Veamos que  $\alpha : I \rightarrow V$  es un homeomorfismo. Para ello consideramos  $\pi : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$  la primera proyección, es decir, tal que

$$\pi(x, y) = x$$


y se verificará que

$$\begin{aligned} (\pi \circ \alpha)(t) &= \pi(\alpha(t)) = \pi(t, f(t)) = t \\ (\alpha \circ \pi)(x, f(x)) &= \alpha(\pi(x, f(x))) = \alpha(x) = (x, f(x)) \end{aligned}$$

Concluimos que  $\pi$  es la inversa de  $\alpha$  y además es continua (ya que la proyección siempre lo es<sup>1</sup>) por lo que  $\alpha : I \rightarrow V$  es un homeomorfismo.  $\square$

Una consecuencia clara es que todas las rectas de  $\mathbb{R}^2$  son curvas simples. Por la primera observación tendremos también que todos los segmentos abiertos de  $\mathbb{R}^2$  (o la unión de ellos) son curvas simples.

4. Consideramos  $O \subset \mathbb{R}^2$  y la función  $F : O \rightarrow \mathbb{R}$  diferenciable. Vamos a suponer que  $a \in \mathbb{R}$  es un valor regular<sup>2</sup> no trivial<sup>3</sup> de  $F$ . Tomamos  $C = F^{-1}(\{a\}) \subset O \subset \mathbb{R}^2$  y queremos ver que es una curva simple. Ya sabemos que es no vacío (ya que hemos tomado  $a$  un valor regular no trivial).



Tomamos un punto  $p \in C = F^{-1}(\{a\})$  y por ser  $a$  regular tenemos que

$$\nabla f_p = \left( \frac{\partial F}{\partial x}(p), \frac{\partial F}{\partial y}(p) \right) \neq (0, 0)$$

Vamos a suponer sin pérdida de generalidad que  $\frac{\partial F}{\partial y}(p) \neq 0$ . Estamos en la situación en la que  $p = (x, y)$  y tenemos que  $F(x, y) = a$  que es una ecuación y esto nos debería recordar al Teorema de la Función Implícita que nos permite despejar una variable en función de la otra de forma local, ya que tenemos todas las hipótesis necesarias. De esta forma sabemos que  $\exists U_p$  entorno abierto de  $p$  en  $O$  (y por tanto en  $\mathbb{R}^2$ ),  $\exists I_p \subset \mathbb{R}$  un intervalo abierto y  $\exists f_p : I_p \rightarrow \mathbb{R}$  tales que

$$C \cap U_p = F^{-1}(\{a\}) \cap U_p = \text{Grafo}(f_p) = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 : x \in I_p, y = f(x)\}$$

<sup>1</sup>Contenido estudiado en Topología I

<sup>2</sup>Un valor regular es aquel que verifica que  $\forall p \in F^{-1}(\{a\})$  se tiene que  $\nabla f_p = \left( \frac{\partial F}{\partial x}(p), \frac{\partial F}{\partial y}(p) \right) \neq (0, 0)$ .

<sup>3</sup>Un valor regular no trivial es aquel  $a \in \mathbb{R}$  que además verifica  $F^{-1}(\{a\}) \neq \emptyset$ .

y por ser grafo de una función diferenciable tenemos que  $C \cap U_p$  es una curva simple. Además, podemos escribir

$$C = \bigcup_{p \in C} (C \cap U_p)$$

y además  $(C \cap U_p)$  es abierto en  $C$  porque  $U_p$  es abierto en  $\mathbb{R}^2$  por lo que su intersección con  $C$  será un abierto en la topología inducida. De esta forma tenemos que  $C$  es una curva simple.

Hemos demostrado que las imágenes inversas de un valor regular no trivial de una función de dos variables son curvas simples (no necesariamente conexas). Además a estas curvas las llamaremos **curvas de nivel** de la función.

Todos los grafos en particular son de este tipo, ya que tenemos  $F(x, y) = a$  y tomando  $F(x, y) = y - f(x)$  y  $a = 0$  tenemos  $y = f(x)$  que era el caso que estudiábamos en el punto anterior. En este caso sí serán siempre conexos.

5. Consideramos  $\alpha : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}^2$  curva regular  $L$ -periódica (con  $L > 0$ ) tal que  $\alpha|_{[0, L)}$  es inyectiva. Veamos que el siguiente conjunto

$$C = \text{traza}(\alpha) = \alpha(\mathbb{R}) = \alpha([0, L]) = \alpha([0, L))$$

es una curva simple homeomorfa a  $S^1$ .

Lo primero que observamos es que  $C$  es la imagen por  $\alpha$ , que es una función continua, de un compacto por lo que  $C$  es un compacto. Además es no trivial, ya que  $C$  es también  $\alpha(\mathbb{R})$  y  $\mathbb{R}$  no es vacío teniendo necesariamente alguna imagen. Tenemos

$$\mathbb{R} \xrightarrow{\alpha} C \quad \text{continua y sobreyectiva}$$

y así habrá una relación de equivalencia  $R_\alpha$  inducida por  $\alpha$  en  $\mathbb{R}$  donde si  $t, t' \in \mathbb{R}$  se tiene que

$$t R_\alpha t' \iff \alpha(t) = \alpha(t')$$

Podemos ver esta relación como

$$\left. \begin{array}{l} t = kL + m, \quad k \in \mathbb{Z}, \quad m \in [0, L) \\ t' = k'L + m', \quad k' \in \mathbb{Z}, \quad m' \in [0, L) \end{array} \right\} \Rightarrow \begin{array}{l} t R_\alpha t' \iff \alpha(kL + m) = \alpha(k'L + m') \\ \iff \alpha(m) = \alpha(m') \iff \\ t - t' = (k - k')L \in L\mathbb{Z} \end{array}$$

de esta forma podemos considerar el conjunto cociente

$$\begin{array}{ccc} \mathbb{R} & \xrightarrow{\alpha} & C \\ \pi \downarrow & \nearrow \tilde{\alpha} & \\ S^1 \cong \mathbb{R}/R_\alpha & & \end{array}$$

y tenemos que existe  $\tilde{\alpha} : \mathbb{R}/R_\alpha \rightarrow C$  continua y biyectiva. Para ver que es un homeomorfismo basta con ver que  $\tilde{\alpha}$  es cerrada, y lo es porque sale de un compacto ( $S^1$ ) y llega a un espacio T2 ( $C$  es T2 porque lo hereda de  $\mathbb{R}$ ). Por tanto

$$C \cong \mathbb{R}/R_\alpha \cong S^1$$