## Trabajo Práctico N° 3 Análisis de Lenguajes de Programación

Mellino, Natalia

Farizano, Juan Ignacio

#### Ejercicio 1

$$\frac{x:E \to E \to E \to E \in \Gamma'}{\Gamma' \vdash x:E \to E \to E} \text{ T-Var} \qquad \frac{z:E \in \Gamma'}{\Gamma' \vdash z:E} \text{ T-App} \qquad \frac{y:E \to E \in \Gamma'}{\Gamma' \vdash y:E \to E} \text{ T-Var} \qquad \frac{z:E \in \Gamma'}{\Gamma' \vdash z:E} \text{ T-App}$$

$$\frac{\Gamma' \vdash (xz):E \to E}{\Gamma'} \qquad \frac{\Gamma' \vdash (yz):E}{\Gamma' \vdash (yz):E} \qquad \frac{\Gamma' \vdash (yz):E}{\Gamma' \vdash (yz):E} \qquad \Gamma$$

$$\frac{T \vdash (yz):E \to E}{T \vdash (xz) (yz):E} \qquad \Gamma$$

$$\frac{x:E \to E \to E \to E, \ y:E \to E \vdash \lambda z:E. \ (xz) \ (yz):E \to E}{T \vdash \lambda z:E. \ (xz) \ (yz):E \to E} \qquad \Gamma$$

$$\frac{T \vdash \Lambda BS}{T \vdash \Lambda BS} \qquad \Gamma$$

$$\frac{T \vdash \Lambda BS}{T \vdash \Lambda BS} \qquad \Gamma$$

### Ejercicio 2

La función infer retorna un valor del tipo Either String Type porque en caso de que haya un error de tipo, se devuelve un String indicando cuál fue el error.

Funcionamiento de >>=: Este operador recibe un valor del tipo Either String Type y una función con el tipo Type  $\rightarrow$  Either String Type.

Se utiliza cuando realizamos una llamada recursiva en infer y devuelve un valor del tipo Either String Type, en el caso de recibir un error el operador nos permite propagarlo y en el caso de recibir un tipo le aplicamos la función dada como argumento.

#### Ejercicio 5

$$\frac{\frac{x:E \in x:E}{x:E \vdash x:E} \text{ T-Var}}{\frac{Ax:E \vdash x:E}{\vdash \lambda x:E \cdot x:E} \text{ T-Abs}} \frac{z:E \to E \in z:E \to E}{z:E \to E} \text{ T-Var}}{\frac{(\lambda x:E.x) \ as \ E \to E:E \to E}{\vdash (let \ z = ((\lambda x:E.x) \ as \ E \to E) \ in \ z):E \to E}}{\vdash (let \ z = ((\lambda x:E.x) \ as \ E \to E) \ in \ z) \ as \ E \to E:E \to E}} \text{ T-Ascribe}}$$

## Ejercicio 7

$$\frac{t_1 \to t_1'}{(t_1, t_2) \to (t_1', t_2)} \text{ E-PAIR}_1$$

$$\frac{t_2 \to t_2'}{(v, t_2) \to (v, t_2')} \text{ E-PAIR}_2$$

$$fst (v_1, v_2) \to v_1 \quad \text{E-FST'}$$

$$snd (v_1, v_2) \to v_2 \quad \text{E-SND'}$$

$$\frac{t \to t'}{fst \ t \to fst \ t'} \text{ E-FST}$$

$$\frac{t \to t'}{snd \ t \to snd \ t'} \text{ E-SND}$$

# Ejercicio 9

$$\frac{x:(E,E) \in x:(E,E)}{x:(E,E) \vdash x:(E,E)} \frac{\text{T-Var}}{\text{T-Snd}} \\ \frac{\frac{x:(E,E) \vdash x:(E,E)}{x:(E,E) \vdash x:(E,E)} \frac{\text{T-Var}}{\text{T-Snd}} \\ \frac{\vdash unit \ as \ Unit: Unit}{\vdash unit \ as \ Unit, \lambda x:(E,E).snd \ x:(E,E) \rightarrow E} \\ \frac{\vdash (unit \ as \ Unit, \lambda x:(E,E).snd \ x):(Unit,(E,E) \rightarrow E)}{\vdash fst \ (unit \ as \ Unit, \lambda x:(E,E).snd \ x):Unit} \frac{\text{T-Pair}}{\vdash fst \ (unit \ as \ Unit, \lambda x:(E,E).snd \ x):Unit}$$