

TRABAJO PRÁCTICO FINAL

Probabilidad y Estadística

Farizano, Juan Ignacio

Mellino, Natalia

Índice

1. Ejercicio 1	3
2. Ejercicio 2	5
3. Ejercicio 3	6
4. Ejercicio 4	9
5. Ejercicio 5	10
6. Ejercicio 6	13
7. Ejercicio 7	14
8. Ejercicio 8	14

1. Ejercicio 1

Apartado a)

Para realizar la simulación utilizamos la siguiente función en R, donde recibe como parámetro la probabilidad p de que salga cara al tirar la moneda. Como la moneda está equilibrada, en este caso la función tomará $p = 0.5$.

```
simularCienTiradas <- function(P) {  
  Sim <- sample(c("Cara", "Cruz"), 100, T, c(P, 1 - P))  
  length(which(Sim == "Cara"))  
}
```

Evaluando una vez esta función con parámetro $p = 0.5$ obtenemos:

```
> simularCienTiradas(0.5)  
[1] 54
```

En esta simulación el número de caras resultó ser 54.

Apartado b)

Este apartado se puede resolver de dos formas distintas: una utilizando la simulación y otra usando la teoría vista en clase. Para este apartado interpretamos a X como X_{100} .

Utilizando la simulación:

Para hallar la $P(X = 1)$ y la $E(X)$ utilizamos el siguiente código, donde los argumentos recibidos N y P representan la cantidad de veces que se simularán las cien tiradas (siendo N arbitrariamente grande) y P es análoga al apartado a). En la función la variable **Acumulador** es la suma de la cantidad de veces que salió cara en todas las simulaciones y la variable **Uno** representa la cantidad de veces que una simulación dió un numero de caras igual a uno.

```
simularCienPorN <- function(N, P) {  
  Acumulador <- 0  
  Uno <- 0  
  for (i in 1:N) {  
    Sim <- simularCienTiradas(P)  
    Acumulador <- Acumulador + Sim  
    if (Sim == 1) {  
      Uno <- Uno + 1  
    }  
  }  
  c(Uno / N, Acumulador / N)  
}
```

Cuando ejecutamos esta función, obtenemos los siguientes resultados:

```
> simularCienPorN(1000000, 0.5)  
[1] 0.00000 49.98931
```

Al intentar estimar los valores pedidos con la simulación, se obtuvo que la $P(X) = 1$ es aproximadamente 0 (esto lo veremos al calcular el valor de forma teórica, lo que sucede es que la probabilidad es tan chica que en ninguna simulación sucede). Por otro lado, estimamos el valor de la esperanza que se acerca a 50, que como veremos luego, éste es el valor exacto.

Utilizando la teoría:

Para calcular $P(X = 1)$ definimos una nueva variable aleatoria Y : número de caras obtenidas de un total de 100. Entonces, hallar $P(X = 1)$ es igual a hallar $P(Y = 1)$, donde Y tiene una **Distribución Binomial** de parámetros $n = 100$, $p = 0.5$, es decir, $Y \sim B(100, 0.5)$.

$$\begin{aligned} P(Y = 1) &= \binom{100}{1} \cdot 0.5^1 \cdot (1 - 0.5)^{100-1} \\ &= 100 \cdot 0.5 \cdot 0.5^{99} \\ &= 7.888609052 \cdot 10^{-29} \end{aligned}$$

Por lo tanto, $P(X = 1) = 7.888609052 \cdot 10^{-29}$, que como podemos ver es muy pequeña, y eso explica que no hayamos obtenido una buena estimación con nuestra simulación.

Para hallar la esperanza de X , hacemos:

$$E(X) = E(Y) = n \cdot p = 100 \cdot 0.5 = 50$$

Y así podemos afirmar que nuestra simulación pudo obtener una buena estimación para $E(X)$.

Apartado c)

En este apartado, también se realizó de forma teórica y utilizando la simulación.

Utilizando la simulación

Utilizamos el siguiente código:

```
tresCaras <- function(N, P) {  
  Acumulador <- 0  
  for (i in 1:N) {  
    Veces <- 0  
    Tiradas <- 0  
    while(Veces < 3) {  
      Sim <- sample(c("Cara", "Cruz"), 1, T, c(P, 1 - P))  
      if (Sim[1] == "Cara") {  
        Veces <- Veces + 1  
      }  
      Tiradas <- Tiradas + 1  
    }  
    Acumulador <- Acumulador + Tiradas  
  }  
  Acumulador / N  
}
```

y obtenemos el siguiente resultado:

```
> buscarTres(1000000, 0.5)  
[1] 6.004526
```

Entonces, se obtuvo que el número de veces a realizar el experimento hasta obtener 3 caras es aproximadamente 6.

Utilizando la teoría

Definimos una nueva variable aleatoria, Z : número de veces que se realizó el experimento hasta que salió cara por tercera vez. Esta variable aleatoria posee una **distribución de Pascal** de parámetros $r = 3$ y $p = 0.5$. Lo que queremos hallar nosotros entonces, es el número promedio de veces que se realizó el experimento hasta que salió cara por tercera vez, es decir, queremos hallar $E(Z)$, que viene dado por:

$$E(Z) = \frac{r}{p} = \frac{3}{0.5} = 6$$

Por lo tanto, el número promedio de veces que se deberá realizar el experimento hasta que salga cara por tercera vez es 6.

Apartado d):

El código dado en los apartados a) y b) ya permite que la moneda sea sesgada, a continuación, realizamos la simulación parados valores diferentes de p : $p = 0.01$, $p = 0.3$ y $p = 0.85$

```
simularCienPorN(1000000, 0.01)
[1] 0.369727 1.000360

> simularCienPorN(1000000, 0.3)
[1] 0.000000 29.99997

> simularCienPorN(1000000, 0.85)
[1] 0.0000 84.9958
```

De estas simulaciones, obtuvimos los siguientes resultados:

p	$P(X = 1)$	$E(X)$
0.01	0.3697	1.0003
0.03	0.0000	29.9999
0.85	0.0000	84.9958

2. Ejercicio 2

Apartado a)

Para simular el proceso D_n utilizamos la siguiente función escrita en R

```
trayectoriaD <- function(N, P) {
  Sim <- sample(c(1, 0), N, T, c(P, 1 - P))
  D <- vector()
  for (i in 1:N) {
    D[i] <- 2 * Sim[i] - 1
  }
  D
}
```

Para simular 10 pasos de una trayectoria de D_n (suponiendo que la moneda está equilibrada) realizamos lo siguiente


```
> trayectoriaD(10, 0.5)
[1] 1 1 -1 -1 1 1 1 1 -1 -1
```

Apartado b)

Para simular el proceso S_n utilizamos la siguiente función escrita en R

```
trayectoriaS <- function(N, P) {  
  D <- trayectoriaD(N, P)  
  S <- c(0)  
  S[1] = 2 * D[1] - 1  
  for (i in 2:N) {  
    S[i] <- S[i - 1] + D[i]  
  }  
  S  
}
```

Y simulamos una trayectoria que graficamos



3. Ejercicio 3

Apartado a)

Para simular la trayectoria del jugador utilizamos el siguiente código en R:

```
gamblersRuinTrayectoria <- function(P, K, S) {  
  Pasos = 0  
  Resultado = K  
  Trayectoria = c(K)  
  
  while (Resultado != 0 & Resultado != S) {  
    Resultado = Resultado + sample(c(1, -1), 1, T, c(P, 1 - P))[1]  
  }  
}
```

```


    Trayectoria = c(Trayectoria, Resultado)
    Pasos = Pasos + 1
  }

  plot(0:Pasos, Trayectoria, type = "p", xlab = "Instante", ylab = "Cantidad de dinero",
       main = "Trayectoria del jugador", ylim = c(0, S))
}

```

Apartado b)

Utilizando el código escrito en a) con los valores $P = 0.6$, $K = 35$, $S = 100$ obtuvimos el siguiente gráfico



Apartado c):

Resolvemos este apartado por simulación y luego comprobamos los resultados teóricamente. Tomamos los valores: $k = 3$, $S = 5$, $p = 0.65$.

Simulación

```

calcularProbRuinaIter <- function(P, K, S, Simulaciones) {
  Arruinado <- 0
  Millonario <- 0
  for (i in 1:Simulaciones) {
    Resultado <- K
    Pasos <- 0

    while (Resultado != 0 & Resultado != S) {
      Resultado <- Resultado + sample(c(1, -1), 1, T, c(P, 1 - P))[1]
    }
  }
}

```

```

    Pasos <- Pasos + 1
  }
  if (Resultado == 0) {
    Arruinado <- Arruinado + 1
  }
}
Arruinado / Simulaciones
}

```

Y obtenemos como resultado:

```

> calcularProbRuinaIter(0.65, 3, 5, 100000)
[1] 0.11564

```

Teórico

Podemos modelar el problema como una Cadena de Markov estados: $E = 0, 1, 2, 3, 4, 5$, donde la matriz de transición es:

$$P = \begin{matrix} & \begin{matrix} 0 & 1 & 2 & 3 & 4 & 5 \end{matrix} \\ \begin{matrix} 0 \\ 1 \\ 2 \\ 3 \\ 4 \\ 5 \end{matrix} & \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0.35 & 0 & 0.65 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0.35 & 0 & 0.65 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0.35 & 0 & 0.65 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0.35 & 0 & 0.65 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \end{matrix}$$

Queremos estimar la probabilidad de ruinar del jugador, esto es hallar la $F(k=3, 0)$. Vimos en teoría que:

$$G(i, j) = F(i, j, k) \forall k \in C_j$$

Sabemos que $G = SB$, donde $S = (I - Q)^{-1}$. Entonces procedemos a calcular las matrices correspondientes:

$$Q = \begin{matrix} & \begin{matrix} 1 & 2 & 3 & 4 \end{matrix} \\ \begin{matrix} 1 \\ 2 \\ 3 \\ 4 \end{matrix} & \begin{pmatrix} 0 & 0.65 & 0 & 0 \\ 0.35 & 0 & 0.65 & 0 \\ 0 & 0.35 & 0 & 0.65 \\ 0 & 0 & 0.35 & 0 \end{pmatrix} \end{matrix}$$

$$B = \begin{matrix} & \begin{matrix} 0 & 5 \end{matrix} \\ \begin{matrix} 1 \\ 2 \\ 3 \\ 4 \end{matrix} & \begin{pmatrix} 0.35 & 0 \\ 0 & 0 \\ 0 & 0 \\ 0 & 0.65 \end{pmatrix} \end{matrix}$$

$$S = \begin{matrix} & \begin{matrix} 1 & 2 & 3 & 4 \end{matrix} \\ \begin{matrix} 1 \\ 2 \\ 3 \\ 4 \end{matrix} & \begin{pmatrix} 1.4759 & 1.3598 & 1.1441 & 0.7437 \\ 0.7322 & 2.0920 & 1.7602 & 1.1441 \\ 0.3317 & 0.9478 & 2.0920 & 1.3598 \\ 0.1161 & 0.3317 & 0.7322 & 1.4759 \end{pmatrix} \end{matrix}$$

$$G = \begin{matrix} & \begin{matrix} 0 & 5 \end{matrix} \\ \begin{matrix} 1 \\ 2 \\ 3 \\ 4 \end{matrix} & \begin{pmatrix} 0.5165 & 0.4834 \\ 0.2562 & 0.7437 \\ 0.1161 & 0.8838 \\ 0.0406 & 0.9593 \end{pmatrix} \end{matrix}$$

Entonces, la probabilidad de ruina del jugador arracando con $k = 3$ es $G(3, 0) \simeq 0.1161$ (los resultados de la matriz S y G están redondeados a 4 cifras decimales). Observemos además que con la simulación se obtuvo una buena aproximación a la probabilidad deseada.

4. Ejercicio 4

Apartado a)

Realizamos la simulación utilizando el siguiente código en R, siendo el argumento N la cantidad de veces que se realizará la simulación:

```
ratonLaboratorio <- function(N) {
  Total = 0

  for (i in 1:N) {
    Tiempo = 0
    Resultado = "Seguir"

    while (Resultado == "Seguir") {
      Direccion = sample(c("Izquierda", "Derecha"), 1, T, c(0.5, 0.5))[1]
      if (Direccion == "Izquierda") {
        Resultado = sample(c("Seguir", "Salir"), 1, T, c(2/3, 1/3))[1]
        if (Resultado == "Seguir") {
          Tiempo = Tiempo + 5
        } else {
          Tiempo = Tiempo + 2
          Resultado = "Salir"
        }
      } else {
        Tiempo = Tiempo + 3
      }
    }

    Total = Total + Tiempo
  }

  Total / N
}
```

Al realizar la simulación una vez, obtenemos el siguiente resultado:

```
> ratonLaboratorio(1000000)
[1] 20.98719
```

Apartado b)

Definimos las variable aleatorias:

X: tiempo (en minutos) que tarda el ratón en salir del laberinto.

$$Y = \begin{cases} 1 & \text{si el ratón elige la puerta izquierda y va a la salida} \\ 2 & \text{si el ratón elige la puerta izquierda y vuelve al inicio} \\ 3 & \text{si el ratón elige la puerta derecha} \end{cases}$$

Entonces, si queremos obtener el resultado del apartado a) en forma analítica simplemente recurrimos a la fórmula de esperanza condicional:

$$\begin{aligned} E(X) &= E(X|Y=1)P(Y=1) + E(X|Y=2)P(Y=2) + E(X|Y=3)P(Y=3) \\ &= 2 \cdot \frac{1}{2} \cdot \frac{1}{3} + (5 + E(X)) \cdot \frac{1}{2} \cdot \frac{2}{3} + (3 + E(X)) \cdot \frac{1}{2} \\ &= \frac{1}{3} + \frac{5}{3} + \frac{E(X)}{3} + \frac{3}{2} + \frac{E(X)}{2} \\ &= \frac{7}{2} + \frac{5}{6} \cdot E(X) \Rightarrow \frac{E(X)}{6} = \frac{7}{2} \Rightarrow E(X) = 21 \end{aligned}$$

5. Ejercicio 5

Apartado a)

Sea P la matriz de transición de la cadena

$$P = \begin{matrix} & \begin{matrix} S & VIH & SIDA & M \end{matrix} \\ \begin{matrix} S \\ VIH \\ SIDA \\ M \end{matrix} & \begin{pmatrix} 0.999 & 0.001 & 0 & 0 \\ 0 & 0.994 & 0.006 & 0 \\ 0 & 0 & 0.918 & 0.082 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \end{matrix}$$

Llamamos E al conjunto de estados, luego $E = \{S, VIH, SIDA, M\}$

A partir del grafo hallamos el conjunto cerrado al cual pertenece cada uno de los estados.

- $C_S = \{S, VIH, SIDA, M\} = E$
- $C_{VIH} = \{VIH, SIDA, M\}$
- $C_{SIDA} = \{SIDA, M\}$
- $C_M = \{M\}$

C_S , C_{VIH} y C_{SIDA} son conjuntos cerrados no irreducibles finitos, C_M es irreducible finito. La CM no es irreducible y por lo tanto no es periódica, aperiódica, recurrente, transitoria ni ergódica. Ningún estado es periódico. S, VIH y SIDA son estados transitorios, M es un estado absorbente.

Apartado b)

Viendo la matriz de transición podemos deducir lo siguiente:

$$F(\text{VIH}, S) = F(\text{SIDA}, S) = F(\text{SIDA}, \text{VIH}) = F(M, S) = F(M, \text{VIH}) = F(M, \text{SIDA}) = 0$$

$$F(M, M) = 1$$

entonces la matriz F nos queda completada parcialmente de la siguiente manera:

$$F = \begin{array}{c} \begin{array}{c} S \\ \text{VIH} \\ \text{SIDA} \\ M \end{array} \end{array} \begin{array}{c} S \quad \text{VIH} \quad \text{SIDA} \quad M \\ \left(\begin{array}{cccc} - & - & - & - \\ 0 & - & - & - \\ 0 & 0 & - & - \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{array} \right) \end{array}$$

Ahora, procedemos a hallar la matriz $G = SB$:

$$Q = \begin{array}{c} \begin{array}{c} S \\ \text{VIH} \\ \text{SIDA} \end{array} \end{array} \begin{array}{c} S \quad \text{VIH} \quad \text{SIDA} \\ \left(\begin{array}{ccc} 0.999 & 0.01 & 0 \\ 0 & 0.994 & 0.06 \\ 0 & 0 & 0.918 \end{array} \right) \end{array}$$

$$B = \begin{array}{c} \begin{array}{c} S \\ \text{VIH} \\ \text{SIDA} \end{array} \end{array} \begin{array}{c} C_M \\ \left(\begin{array}{c} 0 \\ 0 \\ 0.082 \end{array} \right) \end{array}$$

$$S = (I - Q)^{-1}$$

$$S = \begin{array}{c} \begin{array}{c} S \\ \text{VIH} \\ \text{SIDA} \end{array} \end{array} \begin{array}{c} S \quad \text{VIH} \quad \text{SIDA} \\ \left(\begin{array}{ccc} 1000 & 166.\bar{6} & 12.1951 \\ 0 & 166.\bar{6} & 12.1951 \\ 0 & 0 & 12.1951 \end{array} \right) \end{array}$$

Luego la matriz $G = SB$ viene dada por:

$$G = \begin{array}{c} \begin{array}{c} S \\ \text{VIH} \\ \text{SIDA} \end{array} \end{array} \begin{array}{c} C_M \\ \left(\begin{array}{c} 1 \\ 1 \\ 1 \end{array} \right) \end{array}$$

Luego, a partir de la matriz G podemos deducir que:

$$F(S, M) = F(S, \text{VIH}) = F(S, \text{SIDA}) = 1$$

y podemos seguir completando la matriz F .

$$F = \begin{array}{c} \begin{array}{c} S \\ \text{VIH} \\ \text{SIDA} \\ M \end{array} \end{array} \begin{array}{c} S \quad \text{VIH} \quad \text{SIDA} \quad M \\ \left(\begin{array}{cccc} - & - & - & 1 \\ 0 & - & - & 1 \\ 0 & 0 & - & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{array} \right) \end{array}$$

Ahora, recordemos que la matriz S es igual a la matriz R suprimiendo las filas y columnas de estados recurrentes.

$$R = \begin{array}{c} \begin{array}{c} S \\ S \\ VIH \\ SIDA \\ M \end{array} \begin{pmatrix} S & VIH & SIDA & M \\ 1000 & 166.\bar{6} & 12.1951 & - \\ 0 & 166.\bar{6} & 12.1951 & - \\ 0 & 0 & 12.1951 & - \\ - & - & - & - \end{pmatrix} \end{array}$$

Entonces como sabemos que $F(j, j) = 1 - \frac{1}{R(j, j)}$ y $F(i, j) = \frac{R(i, j)}{R(j, j)}$. Ahora podemos completar lo que resta de la matriz:

- $F(S, S) = 0.999$
- $F(S, VIH) = F(S, SIDA) = F(VIH, SIDA) = 1$
- $F(SIDA, SIDA) = 0.9179$

Y la matriz F nos queda:

$$F = \begin{array}{c} \begin{array}{c} S \\ S \\ VIH \\ SIDA \\ M \end{array} \begin{pmatrix} S & VIH & SIDA & M \\ 0.999 & 1 & 1 & 1 \\ 0 & 0.9939 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 0.9179 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \end{array}$$

Los datos que nos provee la matriz F se pueden interpretar como la probabilidad de pasar de un estado e a un estado e' en un tiempo en años finito.

Apartado c)

Basta hacer el siguiente calculo:

$A = S1$ donde 1 es el vector columna cuyas entradas son el número 1

$$A = \begin{array}{c} \begin{array}{c} S \\ VIH \\ SIDA \end{array} \begin{pmatrix} M \\ 1178.8617 \\ 178.8617 \\ 12.1951 \end{pmatrix} \end{array}$$

Esto lo podemos interpretar de la siguiente manera:

La entrada $A(e, 1)$ con $e \in \{S, VIH, SIDA\}$ representa el tiempo promedio en años que le tomará pasar de el estado e a estar muerto (pasar al estado M).

Apartado d)

- $\pi P = \pi$
- $\sum_{i \in E} \pi(i) = 1$

$$\begin{cases} 0.999a = a \\ 0.001a + 0.994b = b \\ 0.006b + 0.918c = c \\ 0.082c + d = d \\ a + b + c + d = 1 \end{cases}$$

Utilizano un solucionador de ecuaciones online, obtenemos el vector π

$$\pi = \begin{pmatrix} \text{S} & \text{VIH} & \text{SIDA} & \text{M} \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

Por lo tanto, para esta cadena sí existe una distribución invariante.

Apartado e)

que lo haga deos

6. Ejercicio 6

Apartado a)

Podemos transformar el grafo dado en el enunciado en una Cadena de Markov, si asumimos que cualquier página A que no tiene hipervínculos tiene igual probabilidad de ir a todas las páginas (A incluida). Entonces, en el grafo de la figura, basta con agregar aristas desde g a todas las páginas distribuyendo uniformemente la probabilidad. La matriz de transición P de la cadena nos queda de la siguiente forma:

$$P = \begin{matrix} & \begin{matrix} a & b & c & d & e & f & g \end{matrix} \\ \begin{matrix} a \\ b \\ c \\ d \\ e \\ f \\ g \end{matrix} & \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{1}{2} & \frac{1}{2} & 0 \\ \frac{1}{3} & 0 & \frac{1}{3} & 0 & 0 & \frac{1}{3} & 0 \\ 0 & 0 & 0 & \frac{1}{2} & 0 & \frac{1}{2} & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 \\ \frac{1}{4} & 0 & 0 & \frac{1}{4} & 0 & \frac{1}{4} & \frac{1}{4} \\ \frac{1}{2} & \frac{1}{2} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ \frac{1}{7} & \frac{1}{7} & \frac{1}{7} & \frac{1}{7} & \frac{1}{7} & \frac{1}{7} & \frac{1}{7} \end{pmatrix} \end{pmatrix}$$

Apartado b)

Apartado c)

El rango de cada página es la probabilidad a largo plazo de permanecer en ella, entonces, para encontrarlo necesitamos hallar su distribución límite. Como la matriz es irreducible y aperiódica podemos hallar la distribución encontrando π tal que cumpla con el siguiente sistema de ecuaciones:

- $\pi P = \pi$
- $\sum_{i \in E} \pi(i) = 1$

Usando la función steadyStates de la librería de cadenas de markov obtenemos:

$$\pi = \begin{matrix} & \text{a} & \text{b} & \text{c} & \text{d} & \text{e} & \text{f} & \text{g} \\ \pi = & (0.2440318 & 0.1591512 & 0.05835544 & 0.066313 & 0.127321 & 0.3076923 & 0.03713528) \end{matrix}$$

7. Ejercicio 7

Apartado a)

Podemos definir N_t como un proceso de Poisson de parámetro $\lambda = 10$ que cuenta la cantidad de mensajes que llegaron en el intervalo $[0, t]$, con $t_0 = 10 : 00hs$, $t_1 = 11 : 00hs$, etc.

(enunciar las 5 hipótesis)

Queremos hallar $P(N_2 = 18, N_7 = 70)$, observemos que si entran 18 mensajes en el intervalo $[0, 2]$ y 70 en el $[0, 7]$, entonces entran $70 - 18 = 52$ mensajes en el intervalo $(2, 7]$, entonces tenemos ahora que los intervalos $[0, 2]$ y $(2, 7]$ son disjuntos y entonces se tiene que:

$$\begin{aligned} P(N_2 = 18, N_7 = 70) &= P(N_2 = 18, N_7 - N_2 = 52) \\ &= P(N_2 = 18) \cdot P(N_7 - N_2 = 52) \\ &= P(N_2 = 18) \cdot P(N_5 = 52) \\ &= \frac{e^{-2(10)} \cdot (2 \cdot 10)^{18}}{18!} \cdot \frac{e^{-5(10)} \cdot (5 \cdot 10)^{52}}{52!} \\ &= 0.0045 \end{aligned}$$

Por lo tanto la probabilidad de que reciba 18 mensajes el mediodía y 70 a la tarde es de 0.0045.

Apartado b)

8. Ejercicio 8

Apartado a)

Sea P la matriz de transición.

$$P = \begin{matrix} & \begin{matrix} 80 & 135 & 139 & 445 & \text{No attack} \end{matrix} \\ \begin{matrix} 80 \\ 135 \\ 139 \\ 445 \\ \text{No} \end{matrix} & \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & \frac{8}{13} & \frac{3}{13} & \frac{1}{13} & \frac{1}{13} \\ \frac{1}{16} & \frac{3}{16} & \frac{3}{8} & \frac{1}{4} & \frac{1}{8} \\ 0 & \frac{1}{11} & \frac{4}{11} & \frac{5}{11} & \frac{1}{11} \\ 0 & \frac{1}{8} & \frac{1}{2} & \frac{1}{8} & \frac{1}{4} \end{pmatrix} \end{matrix}$$

y sea el vector de distribución inicial $\pi_0 = (0, 0, 0, 0, 1)$

Para obtener la probabilidad de cada estado después de dos semanas debemos calcular la matriz de transición en 2 pasos $\pi_0 \cdot P^2$ y obtenemos:

$$\begin{matrix} & \begin{matrix} 80 & 135 & 139 & 445 & \text{No attack} \end{matrix} \\ \begin{matrix} 80 & 135 & 139 & 445 & \text{No attack} \end{matrix} & \begin{pmatrix} 0.03125 & 0.2132867 & 0.3868007 & 0.2226836 & 0.145979 \end{pmatrix} \end{matrix}$$

Por lo tanto, el puerto con más probabilidad de ser atacado después de dos semanas es el puerto 139, y el menos probable es el puerto 90.

Apartado b)

Podemos verificar en R que la matriz es aperiódica, irreducible y finita, resultando ser ergódica:

```
> period(MC)
[1] 1

> is.irreducible(MC)
[1] TRUE
```

Por lo tanto, la distribución invariante es única, resulta ser la distribución límite y viene dada por la solución al sistema de ecuaciones:

- $\pi P = \pi$
- $\sum_{i \in E} \pi(i) = 1$

Sea $\pi = (a, b, c, d, e)$, planteamos el sistema de ecuaciones

$$\begin{cases} \frac{1}{16}c = a \\ \frac{8}{13}b + \frac{3}{16}c + \frac{1}{11}d + \frac{1}{8}e = b \\ \frac{3}{13}b + \frac{3}{8}c + \frac{4}{11}d + \frac{1}{2}e = c \\ \frac{1}{13}b + \frac{1}{4}c + \frac{5}{11}d + \frac{1}{8}e = d \\ a + \frac{1}{13}b + \frac{1}{8}c + \frac{1}{11}d + \frac{1}{4}e = e \\ a + b + c + d + e = 1 \end{cases}$$

Resolviendo el sistema obtenemos que

$$\pi = \begin{pmatrix} 80 & 135 & 139 & 445 & \text{No attack} \\ 0.02146667 & 0.2669333 & 0.3434667 & 0.2273333 & 0.1408 \end{pmatrix}$$