Université Lille 1 - WAR de Mathématiques Licence de Mathématiques (L3, 55, année 2006-2007)

M305 (Variables Complexes) Examen du 7 mars 2007 durée: 3 heures; ni documents ni calculatrices

Toute question demande en réponse non seulement un résultat mais surtout une démonstration. Le barême n'est donné qu'à titre indicatif.

(3 pts) 1. Déterminer les rayons de convergence

(a) de
$$\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^n \frac{1}{4^n + 9^n} y^{2n}$$
,

(b) et de
$$\sum_{n=1}^{\infty} 10^{n^3} g^{n^2}$$
.

(4 pts) 2 Soit $f(g) = \frac{3g^2 - 1}{g(g^2 - 1)}$

- (a) Décomposer la fraction rationnelle f en éléments simples,
- (b) pris déterminer ses séries de Lourent :

(a) Enfin, determiner
$$\int_{\text{Byb}=2} \text{Kg} dg$$
.

(4 pts) 3. Soit ((g) = 1 (g2+4g+5)(g-i)

- (a) Péterminer les singularités et les résidus dans C de $\mathfrak{f},$
- (b) puis trouver en la justifiant la valeur de $\int_{-\infty}^{\infty} f(x) dx$,
- (c) enfin, en déduire les valeurs de

$$\int_{-\infty}^{\infty} \frac{x}{(x^2 + 4x + 5)(x^2 + 1)} dx \quad \text{et de} \quad \int_{-\infty}^{\infty} \frac{1}{(x^2 + 4x + 5)(x^2 + 1)} dx$$

Ces valeurs doinent être déduites du résultat donné à la question précédente.

(2 pts) 4. Jeterminer
$$a = \int_{-\infty}^{\infty} \frac{e^{-ix}}{x^2 + 6ix - 9} dx$$
.

(2 pts) 5. Jéterminer
$$B = \int_{-\infty}^{\infty} \frac{dx}{(x^{2} + 2x^{2} + 1)^{2}}$$

(2 pts) 6. Soit
$$f(g) = \frac{1}{5}g^{50} + g^{30} + \frac{1}{5}$$
.

- 1. Quel est l'énoncé du théorème de Rouché?
- 2 Combien la fonction f a-t-elle de géres dans le disque unité? Montrer qu'ils sont tous simples.
- (3 pts) 7. Quel est l'énoncé du principe du maximum? Soit $Q = \{g = x + iy \ \& x > 0, y > 0\}$. Soit f une fonction holomorphe sur \overline{Q} . Est-il exact que si $\mathbb{R}(x) \mathbb{R} \le 1$ pour tout $x \ge 0$ et si $\mathbb{R}(y) \mathbb{R} \le 1$ pour tout $y \ge 0$ alors $\mathbb{R}(q) \mathbb{R} \le 1$ pour $g \in Q$? Si oui, le prouver; si non, le prouver.

%% Font Skeetch from the emerald package.
\DeclareFontFamily{T1}{fsk}{}
\DeclareFontShape{T1}{fsk}{m}{n}{<->s*[1.315] fskmw8t}{}
\usepackage[T1]{fontenc}
\renewcommand\rmdefault{fsk}
\usepackage[alldelims]{mathastext}