

# Álgebra 1

## Notas de Aula 1/2016<sup>1</sup>

**José Antônio O. Freitas**  
Departamento de Matemática  
Universidade de Brasília - UnB

---

<sup>1</sup>  Este texto está licenciado sob uma **Licença Creative Commons Atribuição-NãoComercial-CompartilhaIgual 3.0 Brasil** [http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/br/deed.pt\\_BR](http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/br/deed.pt_BR).



---

# SUMÁRIO

<b>1</b>	<b>Conceitos Básicos</b>	<b>11</b>
1.1	Princípio da não contradição e do 3º excluído . . . . .	11
<b>2</b>	<b>Noções de Teoria de Conjuntos</b>	<b>13</b>
2.1	Conceitos básicos . . . . .	13
2.2	Descrição de um conjunto . . . . .	14
2.3	Alguns conjuntos importantes . . . . .	14
2.4	Propriedades dos conjuntos . . . . .	15
2.4.1	Propriedades da continência . . . . .	15
2.5	Relações entre conjuntos . . . . .	16
<b>3</b>	<b>Números Inteiros</b>	<b>23</b>
3.1	Conceitos básicos . . . . .	23
3.1.0.1	Propriedades básicas da adição e da multiplicação . . . . .	23
3.1.0.2	Propriedades básicas das desigualdades . . . . .	24
3.2	Princípio da boa ordenação . . . . .	25
3.3	Princípio da Indução Finita . . . . .	25
3.4	Divisibilidade . . . . .	27
3.5	Algoritmo de divisão de Euclides . . . . .	28

3.6	Máximo Divisor Comum . . . . .	29
3.7	Ideais . . . . .	31
3.7.0.1	Definição . . . . .	31
3.7.0.2	Propriedades . . . . .	32
3.7.0.3	Conjunto dos múltiplos de $g$ . . . . .	33
<b>4</b>	<b>Relações e Funções</b>	<b>35</b>
4.1	Relações . . . . .	35
4.1.0.1	Definição . . . . .	35
4.2	Relações de equivalência . . . . .	36
4.2.0.1	Definição . . . . .	36
4.2.1	Equivalência módulo $R$ . . . . .	36
4.2.2	Classe de equivalência e conjunto quociente . . . . .	37
4.3	Funções . . . . .	39
4.3.0.1	Definição . . . . .	39
4.3.0.2	Domínio e contra-domínio . . . . .	40
4.3.1	Tipos de funções . . . . .	40
4.3.2	Composição de funções . . . . .	42
4.3.2.1	Definição . . . . .	42
4.3.2.2	Propriedades . . . . .	42
4.3.3	Função Identidade . . . . .	43
4.3.3.1	Definição . . . . .	43
4.3.3.2	Propriedades . . . . .	43
<b>5</b>	<b>Operações em <math>\frac{\mathbb{Z}}{m\mathbb{Z}}</math></b>	<b>47</b>
5.1	Relações de congruência . . . . .	47
5.1.1	Definição . . . . .	47
5.1.2	Propriedades . . . . .	47
5.1.3	Classes de equivalência módulo $m$ . . . . .	49
5.2	Conjunto quociente $\left(\frac{\mathbb{Z}}{m\mathbb{Z}}\right)$ . . . . .	50

5.2.1	Elementos Inversíveis de $\frac{\mathbb{Z}}{m\mathbb{Z}}$	52
5.2.1.1	Inversibilidade	52
<b>6</b>	<b>Anéis</b>	<b>55</b>
6.1	Definições	55
6.2	Propriedades de um Anel	58
6.3	Anel de Integridade	59
6.3.0.1	Definição	59
6.4	Homomorfismo	61
6.4.0.1	Definição	61
6.4.0.2	Propriedades	61
6.4.1	Epimorfismo, monomorfismo e isomorfismo	62
6.5	Ideal de um anel	62
6.5.0.1	Definição	62
6.5.0.2	Propriedades	63
6.5.1	Congruência módulo I	64
6.5.1.1	Definição	64
6.5.1.2	Propriedades	64
<b>7</b>	<b>Grupos</b>	<b>67</b>
7.1	Definição	67
7.2	Grupo comutativo ou abeliano	68
7.3	Propriedades Imediatas de um grupo	70
7.4	Ordem de um Grupo	70
7.5	Subgrupo	70
7.5.0.1	Definição	70
7.5.0.2	Propriedades	71
7.6	Ordem de um subgrupo	71
7.7	Homomorfismos de Grupos	72
7.8	Grupos de Permutação	75
7.9	Grupos Cíclicos	75

**Bibliografia****77****Índice Remissivo****79**

---

## LISTA DE FIGURAS

# Prefácio

Essas notas de Aula são referentes à matéria Álgebra 1, ministrada na UnB - Universidade de Brasília - durante o 2 Semestre de 2010 pelo professor José Antônio de O. Freitas, Departamento de Matemática. Tais notas foram transcritas e editadas pelo graduando em Ciências Econômicas Luiz Eduardo Sol R. da Silva<sup>2</sup>.

É livre a reprodução, distribuição e edição deste material, desde que citadas as suas fontes e autores. Críticas e sugestões são bem vindas.

---

<sup>2</sup>luizeduardosol@hotmail.com



## Notações e expressões

- $\neg$  Não
- $\forall$  Para todo
- $/$  Tal que
- $|$  Divide
- $\Rightarrow$  Implica
- $\in$  Pertence
- $\emptyset$  Vazio
- $\subseteq$  Contido ou igual a
- $\supseteq$  Contém ou igual a
- $\wedge$  E
- $\vee$  Ou
- $=$  Igual
- $\neq$  Diferente
- $\mathbb{Z}$  Números Inteiros
- $\mathbb{R}$  Números Reais
- $\cap$  Intersecção
- $>$  Maior que
- $\geq$  Maior ou igual a
- $\bigcup_{i=1}^n$  União de  $n$  conjuntos
- $\bigsqcup_{i=1}^n$  União disjunta de  $n$  conjuntos
- $\leftrightarrow$  Se, e somente se
- $\nmid$  Ou...,ou..., mas nunca ambos
- $\rightarrow$  Se,... então...
- $\exists$  Existe
- $\Leftrightarrow$  Equivalente a
- $\notin$  Não pertence
- $\#$  Fim da demonstração
- $\mathbb{N}$  Números Naturais
- $\mathbb{Q}$  Números Racionais
- $\not\subseteq$  Não contém ou é igual a
- $\cup$  União
- $\sqcup$  União Disjunta
- $<$  Menor que
- $\leq$  Menor ou igual a
- $\bigcap_{i=1}^n$  Intersecção de  $n$  conjuntos
- Q.E.D. (*Quod Erat Demonstrandum*): Como se queria demonstrar
- P.B.O.: Princípio da boa ordenação
- H.I.: Hipótese de Indução
- *Mutatis Mutandis*: Mudando o que tem que ser mudado

---

# CAPÍTULO 1

---

## CONCEITOS BÁSICOS

**Definição 1.1.** Uma *proposição* é todo conjunto de palavras ou símbolos ao qual podemos atribuir um *valor lógico*.

**Definição 1.2.** Diz-se que o *valor lógico* de uma proposição “*verdade*” (V) se a proposição *verdadeira* e ou “*falsidade*” (F) se a proposição *falsa*.

---

### 1.1 Princípio da não contradição e do 3º excluído

---

1. Uma proposição não pode ser verdadeira e falsa ao mesmo tempo.
2. Toda proposição ou verdadeira ou falsa, isto é, verifica-se sempre um destes casos e nunca um terceiro.

Assim esses princípios afirmam que:

“Toda proposição tem um, e um só, dos valores lógicos **verdade** ou **falsidade**.”

De modo geral vamos trabalhar com proposições da forma:

1. Se  $\mathcal{H}$ , então  $\mathcal{T}$ .

Aqui  $\mathcal{H}$  chamado de hipótese e  $\mathcal{T}$  de tese. Neste tipo de proposição iremos admitir que  $\mathcal{H}$  uma verdade e precisaremos provar que  $\mathcal{T}$  verdade. Ou seja precisamos construir um argumento que justifique  $\mathcal{T}$  ser verdadeira partir do fato de  $\mathcal{H}$  ser verdadeira.

2.  $\mathcal{H}$  se, e somente se,  $\mathcal{T}$  ou  $\mathcal{H}$  se, e s se,  $\mathcal{T}$ .

Esse tipo de proposição ser decomposta em duas proposições no formato anterior. Isto :

(a) Se  $\mathcal{H}$ , então  $\mathcal{T}$ .

(b) Se  $\mathcal{T}$ , então  $\mathcal{H}$ .

No primeiro caso admitimos  $\mathcal{H}$  verdadeira e provamos que  $\mathcal{T}$  também verdadeira e no segundo caso admitimos que  $\mathcal{T}$  verdadeira e provamos que  $\mathcal{H}$  verdadeira.

---

---

## CAPÍTULO 2

---

# NOÇÕES DE TEORIA DE CONJUNTOS

---

### 2.1 Conceitos básicos

---

Um conjunto é uma “coleção” ou “família” de elementos.

Usaremos letras maiúsculas do alfabeto para denotar os conjuntos e denotaremos elementos por letras minúsculas do alfabeto.

Dado um conjunto  $A$ , para indicar o fato de que  $x$  é um elemento de  $A$ , escrevemos:

$$x \in A.$$

Para dizer que um elemento  $x$  não pertence ao conjunto  $A$ , escrevemos:

$$x \notin A.$$

Um conjunto sem elementos é chamado de **vazio** ou **conjunto vazio**. Tal conjunto é denotado por  $\emptyset$ .

Dado um conjunto  $A$  e  $x$  um elemento, ocorre sempre o uma das seguintes situações:

$$x \in A \text{ ou } x \notin A.$$

Além disso, para dois elementos  $x, y \in A$ , ocorre exatamente uma das seguintes situações:

$$x = y \text{ ou } x \neq y.$$

---

## 2.2 Descrição de um conjunto

---

Um conjunto  $A$  pode ser dado pela simples listagem dos seus elementos, como por exemplo:

$$A = \{1, 2, 3, 4, 5\}$$

$$B = \{\textit{verdade}, \textit{falso}\}.$$

Um conjunto também pode ser dado pela descrição das propriedades dos seus elementos, como por exemplo:

$$A = \{n \mid n \text{ é múltiplo de } 2\} = \{2, 4, 6, \dots\}.$$

---

## 2.3 Alguns conjuntos importantes

---

1.  $\mathbb{N} = \{0, 1, 2, 3, \dots\}$  o conjunto dos números naturais.
2.  $\mathbb{Z} = \{\dots, -2, -1, 0, 1, 2, \dots\}$  o conjunto dos números inteiros.
3.  $\mathbb{N}_0 = \{0, 1, 2, 3, \dots\}$  o conjunto dos números inteiros não negativos.
4.  $\mathbb{R}$  o conjunto dos números reais.
5.  $\mathbb{R}^*$  o conjunto dos números reais não nulos.
6.  $\mathbb{Q} = \left\{ \frac{p}{q} \mid p, q \in \mathbb{Z}, q \neq 0 \right\}$  o conjunto dos números racionais.

---

## 2.4 Propriedades dos conjuntos

---

**Definição 2.1.** Dados dois conjuntos  $A$  e  $B$ , dizemos que  $A$  e  $B$  são iguais se, e somente se, eles têm os mesmos elementos. Ou seja, para todo  $x \in A$  temos que  $x \in B$  e para todo  $y \in B$  temos  $y \in A$ .

Se  $A$  e  $B$  são iguais, escrevemos  $A = B$

$$\{1, 2, 3, 4\} = \{3, 2, 1, 4\}$$

$$\{1, 2, 3\} \neq \{2, 3\}$$

**Definição 2.2.** Se  $A$  e  $B$  são dois conjuntos, dizemos que  $A$  é um **subconjunto** de  $B$  ou que  $A$  **está contido** em  $B$  ou que  $B$  **contém**  $A$  se todo elemento de  $A$  for elemento de  $B$ . Ou seja, se para todo elemento  $x \in A$ , temos  $x \in B$ . Nesse caso, escrevemos  $A \subseteq B$  ou  $B \supseteq A$ .

Caso  $A$  seja um subconjunto de  $B$  mas não é igual a  $B$ , escrevemos:

$$A \subsetneq B.$$

Nesse caso, dizemos que  $A$  é um subconjunto próprio de  $B$ .

Para dizer que  $A$  não está contido em  $B$ , escrevemos  $A \not\subseteq B$

Usando a definição de continência podemos definir igualdade de conjuntos da seguinte forma: dois conjuntos  $A$  e  $B$  são iguais se, e somente se,  $A \subseteq B$  e  $B \subseteq A$ . Ou seja, se  $A = B$  então  $A \subseteq B$  e  $B \subseteq A$ , por outro lado, se  $A \subseteq B$  e  $B \subseteq A$ , então  $A = B$ .

Quando  $A$  e  $B$  não são iguais, escrevemos  $A \neq B$ . Para que  $A \neq B$  devemos ter  $A \not\subseteq B$  ou  $B \not\subseteq A$ .

### 2.4.1 Propriedades da continência

Dados conjuntos  $A$ ,  $B$  e  $C$  temos:

1.  $A \subseteq A$  (Reflexividade)
2. Se  $A \subseteq B$  e  $B \subseteq A$ , então  $A = B$ . (Antissimetria)
3. Se  $A \subseteq B$  e  $B \subseteq C$ , então  $A \subseteq C$ . (Transitividade)

Considere os seguintes conjuntos:

$$A = \{n \in \mathbb{N} \mid n \text{ é múltiplo de } 2\} = \{2, 4, 6, \dots\}$$

$$B = \{n \in \mathbb{N} \mid n \text{ é múltiplo de } 3\} = \{3, 6, 9, \dots\}.$$

Neste caso,  $2 \in A$  e  $2 \notin B$ , logo  $A \not\subseteq B$ . Por outro lado,  $3 \in B$  e  $3 \notin A$  e com isso  $B \not\subseteq A$ . Portanto, dados dois conjuntos  $A$  e  $B$ , nem sempre temos  $A \subseteq B$  ou  $B \subseteq A$ .

**Proposição 2.2.1.** *Seja  $A$  um conjunto. Então  $\emptyset \subseteq A$ .*

**Prova:** Suponha que  $\emptyset \not\subseteq A$ . Logo existe  $x \in \emptyset$  tal que  $x \notin A$ . Mas por definição, o conjunto vazio não contém elementos. Logo a existência de  $x \in \emptyset$  é uma contradição. Tal contradição surgiu por termos suposto que  $\emptyset \not\subseteq A$ . Portanto,  $\emptyset \subseteq A$ , como queríamos demonstrar.  $\diamond$

## 2.5 Relações entre conjuntos

**Definição 2.3** (Intersecção). *Sejam  $A$  e  $B$  dois conjuntos. Definimos a **intersecção** de  $A$  e  $B$  como sendo o conjunto  $A \cap B$  cujos elementos pertencem ao conjunto  $A$  e  $B$  simultaneamente. Assim,*

$$A \cap B = \{x \mid x \in A \text{ e } x \in B\}.$$

Exemplo: Sejam

$$A = \{1, 2, 3\}$$

$$B = \{2, 3, 4\}$$

$$A \cap B = \{2, 3\}.$$

**Proposição 2.3.1.** *Sejam  $A$  e  $B$  dois conjuntos. Então*

1.  $(A \cap B) \subseteq A$ ;
2.  $(A \cap B) \subseteq B$ ;
3.  $A \subseteq A \cup B$ ;



$$4. B \subseteq A \cup B.$$

**Prova:** Seja  $x \in A \cap B$  um elemento qualquer. Da definição de interseção de conjuntos temos  $x \in A$  e  $x \in B$ . De  $x \in A$  segue que  $A \cap B \subseteq A$  e de  $x \in B$  segue que  $A \cap B \subseteq B$ , como queríamos demonstrar.  $\diamond$

**Definição 2.4** (União). *Sejam  $A$  e  $B$  dois conjuntos. Definimos a **união** de  $A$  com  $B$  como sendo o conjunto  $A \cup B$ , cujos elementos pertencem ao conjunto  $A$  ou ao conjunto  $B$ . Assim,*

$$A \cup B = \{x \mid x \in A \text{ ou } x \in B\}.$$

Exemplo: Sejam

$$A = \{1, 2, 3\}$$

$$B = \{2, 3, 4\}$$

$$A \cup B = \{1, 2, 3, 4\}$$

O conceito de união ( $\cup$ ) e intersecção ( $\cap$ ) pode ser estendido para mais de dois conjuntos.

**Definição 2.5** (União e Intersecção finita de conjuntos). *Sejam  $A_1, \dots, A_n$  conjuntos. Então*

$$A_1 \cup A_2 \cup \dots \cup A_n = \bigcup_{k=1}^n A_k$$

*é o conjunto dos elementos  $x$  tais que  $x$  pertence a pelo menos um dos conjuntos  $A_1, \dots, A_n$ . Agora,*

$$A_1 \cap \dots \cap A_n = \bigcap_{k=1}^n A_k$$

*é o conjunto dos elementos  $x$  que pertencem a todos os conjuntos  $A_1, \dots, A_n$  simultaneamente.*

Quando a intersecção de dois ou mais conjuntos é vazia, dizemos que eles são **conjuntos disjuntos**.

Sejam  $A$  e  $B$  conjuntos tais que  $C = A \cup B$  e  $A \cap B = \emptyset$ . Neste caso dizemos que  $C$  é uma **união disjunta** de  $A$  e  $B$ . Denotamos tal fato por

$$C = A \sqcup B.$$

**Proposição 2.5.1.** *Sejam  $A$ ,  $B$  e  $C$  três conjuntos, então:*

$$1. A \cap (B \cup C) = (A \cap B) \cup (A \cap C)$$

$$2. A \cup (B \cap C) = (A \cup B) \cap (A \cup C)$$

**Prova:**

1. Precisamos mostrar que

$$A \cap (B \cup C) \subseteq (A \cap B) \cup (A \cap C)$$

$$(A \cap B) \cup (A \cap C) \subseteq A \cap (B \cup C).$$

Seja  $x \in A \cap (B \cup C)$ . Logo  $x \in A$  e  $x \in B \cup C$ . Agora, de  $x \in B \cup C$ , segue que  $x \in B$  ou  $x \in C$ . Suponha que  $x \in B$ . Como  $x \in A$ , então  $x \in A \cap B$ . Assim,  $x \in (A \cap B) \cup (A \cap C)$ , ou seja,  $A \cap (B \cup C) \subseteq (A \cap B) \cup (A \cap C)$ . Por outro lado, se  $x \in C$ , como  $x \in A$ , então  $x \in A \cap C$  e daí  $x \in (A \cap B) \cup (A \cap C)$ , logo  $A \cap (B \cup C) \subseteq (A \cap B) \cup (A \cap C)$ .

Portanto,

$$A \cap (B \cup C) \subseteq (A \cap B) \cup (A \cap C).$$

Agora, seja  $x \in (A \cap B) \cup (A \cap C)$ . Daí,  $x \in A \cap B$  ou  $x \in A \cap C$ . Suponha que  $x \in A \cap B$ . Assim,  $x \in A$  e  $x \in B$ . Como  $x \in B$ , segue que  $x \in B \cup C$  e então  $x \in A \cap (B \cup C)$ , ou seja,  $(A \cap B) \cup (A \cap C) \subseteq A \cap (B \cup C)$ . Agora, suponha que  $x \in A \cap C$ . Com isso  $x \in A$  e  $x \in C$ . Desse modo,  $x \in B \cup C$  e então  $x \in A \cap (B \cup C)$  e daí

$$(A \cap B) \cup (A \cap C) \subseteq A \cap (B \cup C).$$

Portanto

$$A \cap (B \cup C) = (A \cap B) \cup (A \cap C),$$

como queríamos.

2. Análoga ao caso anterior.

◇

**Definição 2.6** (Diferença de Conjuntos). *Dados dois conjuntos  $A$  e  $B$ , definimos a **diferença** dos conjuntos  $A$  e  $B$ , denotado  $A - B$  (ou  $A \setminus B$ ) como sendo*

$$A - B = \{x \mid x \in A \text{ e } x \notin B\}.$$

Exemplos:

1.  $A = \{1, 2, 3, 5, 4\}$ ,  $B = \{2, 3, 6, 8\}$ ,  $A - B = \{1, 4, 5\}$ ,  $B - A = \{6, 8\}$
2.  $A = \{2, 4, 6, 8, 10, \dots\}$ ,  $B = \{3, 6, 9, 12, 15, \dots\}$ ,  $A - B = \{2, 4, 8, 10, 14, 16, \dots\}$ ,  $B - A = \{3, 9, 15, 21, \dots\}$

**Proposição 2.6.1.** *Sejam  $A$ ,  $B$  e  $C$  conjuntos no vazios. Ento*

$$(A \cup B) - C = (A - C) \cup (B - C).$$

**Prova:** Segue da definio de diferenca de conjuntos. ◇

**Definição 2.7** (Complementar). *Dados dois conjuntos  $A$  e  $E$  tais que  $A \subseteq E$ , definimos o **complementar** de  $A$  em  $E$ , denotado  $A^C$  ou  $C_E(A)$ , como*

$$C_E(A) = \{x \in E \mid x \notin A\}.$$

Observações:

1. Se  $A = E$ , então  $C_A(A) = \{x \in A \mid x \notin A\} = \emptyset$ .
2.  $(A^C)^C = \{x \in E \mid x \notin A^C\} = \{x \in E \mid x \in A\} = A$

Exemplo:

$$A = \{1, 2, 3, 4\}$$

$$E = \{1, 2, 3, 5, 4, 0, 8, 9\}$$

$$A^C = \{0, 5, 8, 9\}$$

**Proposição 2.7.1.** *Sejam  $A$ ,  $B$  e  $E$  conjuntos. Se  $A \subseteq B \subseteq E$ , então  $C_E(B) \subseteq C_E(A)$ .*

**Prova:** Seja  $x \in B^C$ . Assim  $x \notin B$  e como  $A \subseteq B$ , então  $x \notin A$ . Daí por definição  $x \in A^C$ , ou seja,  $B^C \subseteq A^C$ . ◇

**Proposição 2.7.2.** *Sejam  $A$ ,  $B$  e  $E$  três conjuntos tais que  $A \subseteq E$  e  $B \subseteq E$ . Então:*

1.  $(A \cup B)^C = A^C \cap B^C$
2.  $(A \cap B)^C = A^C \cup B^C$

**Prova:**

1. Seja  $x \in (A \cup B)^C$ . Logo  $x \notin A \cup B$ , assim  $x \notin A$  e  $x \notin B$ . Daí,  $x \in A^C$  e  $x \in B^C$ , isto é,  $x \in A^C \cap B^C$ . Desse modo,

$$(A \cup B)^C \subseteq A^C \cap B^C. \quad (2.1)$$

Por outro lado, se  $x \in A^C \cap B^C$ , então  $x \in A^C$  e  $x \in B^C$ . Daí,  $x \notin A$  e  $x \notin B$ , ou seja,  $x \notin A \cup B$ , logo  $x \in (A \cup B)^C$ . Desse modo

$$A^C \cap B^C \subseteq (A \cup B)^C. \quad (2.2)$$

Portanto, de (2.1) e (2.2) temos

$$(A \cup B)^C = A^C \cap B^C.$$

2. Seja  $x \in (A \cap B)^C$ . Logo  $x \notin A \cap B$ , assim  $x \notin A$  ou  $x \notin B$ . Então  $x \in A^C$  ou  $x \in B^C$ , isto é,  $x \in A^C \cup B^C$ . Desse modo,

$$(A \cap B)^C \subseteq A^C \cup B^C. \quad (2.3)$$

Por outro lado, se  $x \in A^C \cup B^C$ , então  $x \in A^C$  ou  $x \in B^C$ . Daí,  $x \notin A$  ou  $x \notin B$ , ou seja,  $x \notin A \cap B$ , logo  $x \in (A \cap B)^C$ . Desse modo

$$A^C \cup B^C \subseteq (A \cap B)^C. \quad (2.4)$$

Portanto, de (2.3) e (2.4) temos

$$(A \cap B)^C = A^C \cup B^C.$$

◇

**Definição 2.8** (Produto Cartesiano). *Dados dois conjuntos  $A$  e  $B$ , definimos o **produto cartesiano** de  $A$  por  $B$  como sendo o conjunto*

$$A \times B = \{(x, y) \mid x \in A, y \in B\}.$$

Dados  $(x, y), (z, t) \in A \times B$ , temos  $(x, y) = (z, t)$  se, e somente se,  $x = z$  e  $y = t$ .

Em geral,  $A \times B \neq B \times A$ .

Exemplo:

$$A = \{1, 2\}$$

$$B = \{3\}$$

$$A \times B = \{(1, 3), (2, 3)\}$$

$$B \times A = \{(3, 1), (3, 2)\}$$

**Definição 2.9** (Conjunto Partes). *Para qualquer conjunto  $A$ , indicamos por  $\mathcal{P}(A)$  o conjunto*

$$\mathcal{P}(A) = \{X \mid X \subseteq A\}$$

*que é chamado de **conjunto das partes** de  $A$ .*

Os elementos desse conjunto são todos os subconjuntos de  $A$ . Dizer que  $Y \in \mathcal{P}(A)$  significa que  $Y \subseteq A$ . Particularmente, temos  $\emptyset \in \mathcal{P}(A)$  e  $A \in \mathcal{P}(A)$ .

Exemplos:

1.  $A = \emptyset, \mathcal{P}(A) = \{\emptyset\};$
2.  $B = \{x\}, \mathcal{P}(B) = \{\emptyset, B\};$
3.  $C = \{a, b, c\}, \mathcal{P}(C) = \{\emptyset, \{a\}, \{b\}, \{c\}, \{a, b\}, \{a, c\}, \{b, c\}, C\};$
4.  $D = \mathbb{R}, \mathcal{P}(D) = \{X \mid X \subseteq \mathbb{R}\},$  por exemplo  $\mathbb{Q} \in \mathcal{P}(D).$



---

## CAPÍTULO 3

---

# NÚMEROS INTEIROS

---

### 3.1 Conceitos básicos

---

Indicaremos por  $\mathbb{Z}$  o conjunto dos números inteiros. Portanto  $\mathbb{Z} = \{0, \pm 1, \pm 2, \pm 3, \pm 4, \dots\}$ .

#### 3.1.0.1 Propriedades básicas da adição e da multiplicação

Admitiremos as propriedades básicas da adição e da multiplicação em  $\mathbb{Z}$ . Assim, dados  $a, b, c \in \mathbb{Z}$ , temos:

Adição	Multiplicação
1. $a + b = b + a$	1. $ab = ba$
2. $a(b + c) = (a + b) + c$	2. $a(bc) = (ab)c$
3. $a + 0 = a$	3. $a1 = a$
4. $a + (-a) = 0$	4. $ab = 0 \rightarrow a = 0 \vee b = 0$
	5. $ab = 1 \rightarrow a = \pm 1 \wedge b = \pm 1$
	6. $a(b + c) = ab + ac$

### 3.1.0.2 Propriedades básicas das desigualdades

Admitiremos também a relação “menor ou igual”, em  $\mathbb{Z}$ , denotada por “ $\leq$ ”. Dados  $a, b, c \in \mathbb{Z}$ , valem as seguintes propriedades:

1.  $a \leq a$
2.  $a \leq b \wedge b \leq a \rightarrow a = b$
3.  $a \leq b \wedge b \leq c \rightarrow a \leq c$
4.  $a \leq b \vee b \leq a$
5.  $a \leq b \rightarrow a + c \leq b + c$
6.  $0 \leq a \wedge 0 \leq b \rightarrow 0 \leq ab$

Para a relação “menor”, cujo símbolo é “ $<$ ”, vale:

1. Se  $a > 0$  e  $b > 0$ , então  $ab > 0$ .
2. Se  $a > 0$  e  $b < 0$ , então  $ab < 0$ .



---

## 3.2 Princípio da boa ordenação

---

**Definição 3.1** (Limite Inferior). *Seja  $A$  um subconjunto não vazio de  $\mathbb{Z}$ . Dizemos que  $A$  é limitado inferiormente se existe  $l \in \mathbb{Z}$  tal que  $l \leq x$ , para todo  $x \in A$ .*

Por exemplo:

$$A = \{-2, 0, 1, 2, 3, \dots\}, B = \{\dots, -6, -4, -2, 0\}, C = \{8, 16, 24, 32\}$$

$A$  e  $C$  são limitados inferiormente pois  $-3 \leq a, 7 \leq c$ , para todo  $a \in A$  e para todo  $c \in C$ .

**Definição 3.2** (Princípio da boa ordenação). *Se  $A$  é um subconjunto não vazio de  $\mathbb{Z}$  e  $A$  é limitado inferiormente, então existe  $a_0 \in A$  tal que  $a_0 \leq x$  para todo  $x \in A$ .*

Seja  $A \neq \emptyset$ ,  $A \subseteq \mathbb{Z}$  e  $A$  limitado inferiormente. Pelo P.B.O., existe  $a_0 \in A$  tal que  $a_0 \leq x$ , para todo  $x \in A$ . Suponha que existe  $a_1 \in A$  tal que  $a_1 \leq x$ ,  $x \in A$ . Logo devemos ter  $a_0 \leq a_1$  e além disso  $a_1 \leq a_0$ , daí  $a_1 = a_0$ . Ou seja, o elemento  $a_0 \in A$  do P.B.O. é único. Chamamos  $a_0$  de elemento **mínimo** ou **elemento minimal**.

---

## 3.3 Princípio da Indução Finita

---

**Teorema 3.1** (Indução finita (1ª versão)). *Dado  $a \in \mathbb{Z}$ , suponhamos que a cada inteiro  $n \geq a$  esteja associada uma proposição  $P(n)$  que depende de  $n$ . Então  $P(n)$  será verdadeira para todo  $n \geq a$  desde que seja possível provar o seguinte:*

1.  $P(a)$  é verdadeira.
2. Dado  $r > a$ , se  $P(k)$  é verdadeira para todo  $k$  tal que  $a \leq k \leq r$ , então  $P(r)$  é verdadeira.

**Teorema 3.2** (Indução finita (2ª versão)). *Dado  $a \in \mathbb{Z}$ , suponhamos que para cada  $n \geq a$  esteja associada uma proposição  $P(n)$ . Então  $P(n)$  é verdadeira para todo  $n \geq a$  desde que seja possível provar o seguinte:*

1.  $P(a)$  é verdadeira.
2. Se  $P(r)$  é verdadeira para  $r \geq a$ , então  $P(r + 1)$  é verdadeira.

**Exemplos 3.2.1.** 1. Mostre que para todo  $n \in \mathbb{N}$  vale

$$1 + 2 + 3 + \dots + n = \frac{n(n+1)}{2}.$$

**Solução:** Para  $n = 1$ , temos

$$1 = \frac{1(1+1)}{2}.$$

Agora, suponha que para  $r \geq 1$ , temos

$$\underbrace{1 + 2 + \dots + r}_{H.I.} = \frac{r(r+1)}{2}.$$

Assim, para  $r + 1$  usando a Hipótese de Indução, obtemos

$$\begin{aligned} 1 + 2 + \dots + r + (r+1) &= \frac{r(r+1)}{2} + (r+1) = \frac{r(r+1) + 2(r+1)}{2} \\ &= \frac{(r+2)(r+1)}{2}. \end{aligned}$$

Portanto, pelo princípio da indução finita a afirmação está provada.

2. Prove que  $(1+p)^n \geq 1+np$  para todo  $n \in \mathbb{N}$  e  $p \geq 0$ .

**Solução:** Para  $n = 1$  temos

$$(1+p)^1 \geq 1+p.$$

Suponha então que para  $n = k$  temos

$$(1+p)^k \geq 1+kp.$$

Para  $n = k + 1$  temos

$$\begin{aligned} (1+p)^{k+1} &= (1+p)^k(1+p) \geq (1+rp)(1+p) \\ &= 1+p+rp+rp^2 \\ &\geq 1+(r+1)p. \end{aligned}$$

Logo pelo Princípio da Indução finita a afirmação é verdadeira.

**Teorema 3.3.** *Dado  $a \in \mathbb{Z}$ , suponhamos que cada inteiro  $n \geq a$  esteja associado uma proposição  $P(n)$ . Então  $P(n)$  será verdadeira  $\forall n \geq a$  desde que seja possível provar que:*

1.  $P(a)$  é verdadeira.
2. Dado que  $r > a$ , se  $P(k)$  é verdadeira para todo  $k$  tal que  $a \leq k \leq r$ , então  $P(r)$  é verdadeira

**Demonstração:** Seja  $F = \{l \in \mathbb{Z} \mid a \leq l \text{ e } P(l) \text{ é falsa}\}$ . Suponha  $F \neq \emptyset$ . Como  $F$  é limitado inferiormente, pelo princípio da boa ordenação, existe  $l_0 \in F$  tal que  $l_0 \leq x$ , para todo  $x \in F$ . Como  $l_0 \in F$ ,  $P(l_0)$  é falsa. Mas  $P(a)$  é verdadeira, assim,  $l_0 > a$ . Agora, como  $l_0$  é o mínimo de  $F$ , então  $P(x)$  é verdadeira para  $a \leq x < l_0$ .

Agora pelo item (2) segue que  $P(l_0)$  é verdadeira, o que é uma contradição, pois verificamos anteriormente que  $P(l_0)$  é falso.

Portanto  $F = \emptyset$  e o teorema está demonstrado. #

## 3.4 Divisibilidade

**Definição 3.3** (Divisão). *Sejam  $a, b$  números inteiros,  $b \neq 0$ . Dizemos que  $b$  divide  $a$  quando existe um inteiro  $c$  tal que  $a = bc$ .*

Exemplos:

1. Os inteiros 1 e  $-1$  dividem todos os números inteiros  $a$ , pois

$$a = 1a, a = (-1)(-a)$$

2. O número 0 não divide nenhum inteiro  $b$ , pois não existe  $a$  tal que  $b = 0a$
3. Para todo  $b \neq 0$ ,  $b$  divide  $\pm b$
4. Para todo inteiro  $b \neq 0$ ,  $b$  divide 0, pois  $0 = b0$
5. 3 não divide 8, mas 17 divide 51

**Notação 3.3.1** (Divisão). *Quando  $b$  divide  $a$ , escrevemos  $b|a$ . Quando  $b$  não divide  $a$ , escrevemos  $b \nmid a$*

**Propriedades**

1.  $a|a, \forall a \in \mathbb{Z}$

2. Se  $a|b$  e  $b|a$ ,  $a, b \geq 0 \rightarrow a = b$

De fato existe  $c, d \in \mathbb{Z}/b = ca \wedge a = bd$ . Se  $a = 0 \vee b = 0$  então  $b = 0 \vee a = 0$ . Podemos supor  $a \neq 0$  e  $b \neq 0$ .

Assim

$$b = c(bd)$$

$$b(1 - cd) = 0. \text{ Daí, } 1 - cd = 0, \text{ isto é, } cd = 1.$$

Assim,  $c = \pm 1 \wedge d = \pm 1$ . Como  $a > 0$  e  $b > 0$ , devemos ter  $c = d = 1$ . Portanto  $a = b$

3. Se  $a|b$  e  $b|c$ , então  $a|c$

De fato,  $b = pa \wedge c = bq \Rightarrow c = (pq)a$ , ou seja,  $a|c$

4. Se  $a|b$  e  $a|c$ , então  $a|(bx + cy)$ , para todos  $x, y \in \mathbb{Z}$

Temos  $b = ap$  e  $c = aq$ ,  $p, q \in \mathbb{Z}$

$$bx + cy = apx + aqy = a \underbrace{(px + qy)}_{\in \mathbb{Z}}$$

Logo  $a|(bx + cy)$

---

## 3.5 Algoritmo de divisão de Euclides

---

**Teorema 3.4** (Algoritmo de divisão de Euclides). *Para quaisquer  $a, b \in \mathbb{Z}$ , com  $b > 0$ , existem únicos  $q$  e  $r$  inteiros tais que  $a = bq + r$ , com  $0 \leq r < b$ .*

**Demonstração:** Vamos mostrar primeiro a existência de  $q$  e  $r$ .

Seja  $M = \{m \in \mathbb{Z} \mid m = a - bt, t \in \mathbb{Z}\}$ . Temos  $M \neq \emptyset$  pois  $a \in M$ . Seja  $M^+ = \{x \in M \mid x \geq 0\}$ . Por definição  $M^+$  é limitado inferiormente. Além disso, como  $t \in \mathbb{Z}$  e  $M^+ \subseteq M$  então  $M^+ \neq \emptyset$ . Logo, pelo princípio da boa ordenação, existe  $r \in M^+$  tal que  $r \leq x$ , para todo

$x \in M^+$ . Como  $r \in M^+ \subseteq M$ , existe  $q \in \mathbb{Z}$  tal que  $r = a + bq$ . Portanto,  $a = bq + r$ ,  $q \in \mathbb{Z}$ , com  $r \geq 0$ .

Precisamos provar que  $r < b$ . Para isso, suponha então que  $r \geq b$ . Logo  $r = a - bq \geq b$ , ou seja,  $a - bq - b \geq 0$ . Isto é,  $a - b(q + 1) \geq 0$  e desse modo,  $a - b(q + 1) \in M^+$ .

Agora, como  $b > 0$  então  $bq + b > bq$ . Daí  $b(q + 1) > bq$ . Logo  $-b(q + 1) < -bq$ . Finalmente,  $a - b(q + 1) < a - bq = r$ , o que é uma contradição, pois  $r$  é o mínimo de  $M^+$ . Logo,  $r < b$ , ou seja,  $a = bq + r$ ,  $q, r \in \mathbb{Z}$  com  $0 \leq r < b$ .

Falta provar a unicidade de  $q$  e  $r$ . Assim, suponha que existam  $q_1, q_2, r_1, r_2 \in \mathbb{Z}$ , com  $0 \leq r_1 < b, 0 \leq r_2 < b$ , tais que:

$$a = bq_1 + r_1 = bq_2 + r_2.$$

Suponha que  $r_1 \neq r_2$ . Suponha também que  $r_1 > r_2$ . Assim,

$$0 \leq r_1 - r_2 = b(q_2 - q_1).$$

E daí,  $q_2 - q_1 \geq 0$ . Desse modo

$$r_1 = b(q_2 - q_1) + r_2.$$

Mas  $r_1 \geq 0, q_2 - q_1 \geq 1$ , daí  $r_1 > b$ , o que é uma contradição. Logo  $r_1 = r_2$  e então  $q_1 = q_2$ , o que prova a unicidade. #

---

## 3.6 Máximo Divisor Comum

---

**Definição 3.4** (Máximo Divisor Comum). Dado  $a, b \in \mathbb{Z}$ , dizemos que  $d \in \mathbb{Z}$  é o máximo divisor comum entre  $a$  e  $b$  se

1.  $d \geq 0$
2.  $d|a$  e  $d|b$
3. Se  $d'$  é um inteiro tal que  $d'|a$  e  $d'|b$ , então  $d'|d$

Observações:

1. Se  $d$  e  $d_1$  são máximos divisores comuns entre  $a$  e  $b$ , então  $d = d_1$ .

De fato, dados  $d$  e  $d_1$  máximos divisores comuns de  $a$  e  $b$ , então temos que  $d|a, d|b, d_1|a, d_1|b$ . Mas pelo item 3 da definição temos  $d|d_1$  e  $d_1|d$ . Agora, como  $d_1 \geq 0$  e  $d \geq 0$ , segue que  $d = d_1$ .

2. Se  $a = b = 0$ , segue que  $d = d_1$
3. Se  $a = 0$  e  $b \neq 0$ , então  $d = |b|$
4. Se  $d$  é o máximo divisor comum entre  $a$  e  $b$ , então  $d$  também é o máximo divisor comum entre  $a$  e  $-b$ ,  $-a$  e  $b$  e entre  $-a$  e  $-b$ .

**Notação 3.4.1** (Máximo Divisor Comum). Indicaremos por  $\text{mdc}(a, b)$  o máximo divisor comum entre  $a$  e  $b$ , que já sabemos que é único quando existe.

**Proposição 3.4.1.** Quaisquer que sejam  $a, b \in \mathbb{Z}$ , existe  $d \in \mathbb{Z}$  que é o máximo divisor comum entre  $a$  e  $b$ .

**Demonstração:** Das observações anteriores podemos considerar somente o caso em que  $a > 0$  e  $b > 0$ .

Seja  $L = \{ax + by/x, y \in \mathbb{Z}\}$ . Temos que  $L \neq \emptyset$  pois tomando  $x = 1$  e  $y = 0$ , temos que  $m = a1 + b0$ , pelo princípio da boa ordenação, existe  $d \in L^+$  tal que  $d \leq x$ , para todo  $x \in L^+$ .

Mostremos que  $d = \text{mdc}(a, b)$

1.  $d \geq 0$  pois  $d \in L^+$
2. Como  $d \in L^+$ , existem  $x_0, y_0 \in \mathbb{Z}$  tais que  $d = ax_0 + by_0$ .

Agora usando o algoritmo da divisão de Euclides para  $a$  e  $d$  temos que existem  $k, r \in \mathbb{Z}, 0 \leq r < d$  tais que  $a = kd + r$ .

Assim:

$$a = k(ax_0 + by_0) + r$$

$$r = a(1 - kx_0) + b(-y_0)k$$

Daí,  $r \in L$ , mas  $r \geq 0$ , então  $r \in L^+$ . Como  $d$  é o mínimo de  $L^+$  devemos ter  $r = 0$  e assim  $a = kd$ , ou seja,  $d|a$ .

Analogamente, *Mutatis Mutandis*, mostra-se que  $d|b$ .

3. Seja  $d \in \mathbb{Z}$  tal que  $d'|a$  e  $d'|b$ . Temos que  $d'|(ax + by)$ , para  $x, y \in \mathbb{Z}$ , em particular,  $d'|(ax_0 + by_0) = d$ , ou seja,  $d'|d$ .

Portanto,  $d = \text{mdc}(a, b)$ .#

Observação:

1. Se  $d = \text{mdc}(a, b)$ , então  $d = ax_0 + by_0$ , onde  $x_0, y_0 \in \mathbb{Z}$ . Os elementos  $x_0$  e  $y_0$  satisfazem que tal igualdade não são únicos.
2. Uma igualdade do tipo  $d = ax_0 + by_0$  é chamada de **Identidade de Bezout**.

Exemplos:

(a)  $\text{mdc}(2, 3) = 1$

$$1 = 2(-1) + 3 \cdot 1 = 2 \cdot 2 + 3(-1)$$

(b)  $\text{mdc}(4, 8) = 4$

Considere os seguintes subconjuntos de  $\mathbb{Z}$ :

$$I = \{2k \mid k \in \mathbb{Z}\} = \{0, \pm 2, \pm 4, \pm 6, \dots\}$$

$$J = \{2r + 1 \mid r \in \mathbb{Z}\} = \{\pm 1, \pm 3, \pm 5, \dots\}.$$

Dados quaisquer  $a, b \in I$ , temos  $a + b \in I$ . Além disso, dado  $n \in \mathbb{Z}$ ,  $na \in I$ . Por outro lado,  $1, 3 \in J$  mas  $1 + 3 = 4 \notin J$ .

## 3.7 Ideais

### 3.7.0.1 Definição

**Definição 3.5.** Um subconjunto não vazio  $S \subseteq \mathbb{Z}$  é chamado de um **ideal** de  $\mathbb{Z}$  se satisfaz as seguintes condições:

1.  $r_1 + r_2 \in S$ , para todos  $r_1, r_2 \in S$ ,
2.  $nr \in S$ , para todo  $n \in \mathbb{Z}$  e para todo  $r \in S$ .

### 3.7.0.2 Propriedades

Seja  $S$  um ideal de  $\mathbb{Z}$ . Então:

1.  $r_1 - r_2 \in S$ , para todos  $r_1, r_2 \in S$ , pois  $r_1 - r_2 = r_1 + (-r_2)$ .
2.  $0 \in S$ , pois  $0 = r - r$ , para qualquer  $r \in S$ .

Exemplos:

1.  $S = \{2k \mid k \in \mathbb{Z}\}$  é um ideal de  $\mathbb{Z}$ .
2.  $S = \{0\}$  e  $S = \mathbb{Z}$  são ideais de  $\mathbb{Z}$ , chamados de **ideais triviais**.
3. Dado  $a, b, c \in \mathbb{Z}$ , o subconjunto  $S = \{ax + by \mid x, y \in \mathbb{Z}\}$  é um ideal de  $\mathbb{Z}$ .

$$S \neq \emptyset \text{ pois } 0 = a0 + b0 \in S$$

$$\text{Sejam } ax_1 + by_1, ax_2 + by_2 \in S. \text{ Temos } (ax_1 + by_1) + (ax_2 + by_2) = a(x_1 + x_2) + b(y_1 + y_2) \in S$$

Agora, sejam  $ax_1 + by_1 \in S$  e  $n \in \mathbb{Z}$  temos

$$n(ax_1 + by_1) = a(nx_1) + b(ny_1) \in S$$

De modo geral, dados  $a_1, a_2, \dots, a_n$  números inteiros, o subconjunto

$$S = \{a_1x_1 + a_2x_2 + \dots + a_nx_n \mid x_1, \dots, x_n \in \mathbb{Z}\}$$

é um ideal de  $\mathbb{Z}$ .

Se  $S$  é ideal de  $\mathbb{Z}$ , então  $S = \{nk \mid n \in \mathbb{Z}\}$ .



### 3.7.0.3 Conjunto dos múltiplos de $g$

**Notação 3.5.1** (Conjunto dos múltiplos de  $g$ ). Se  $g \in \mathbb{Z}$ , denotamos por  $g\mathbb{Z}$ , ou  $\mathbb{Z}g$ , o subconjunto dos inteiros que são múltiplos de  $g$  (os inteiros que são divisíveis por  $g$ ). Em outras palavras

$$g\mathbb{Z} = \{gn/n \in \mathbb{Z}\} = \{0, \pm g, \pm 2g, \pm 3g, \dots\}$$

**Teorema 3.5.** Seja  $S$  um ideal de  $\mathbb{Z}$ . Então, existe um número  $g \in \mathbb{Z}$  tal que  $S = g\mathbb{Z}$ .

**Demonstração:** Se  $S = \{0\}$ , então tomamos  $g = 0$  e daí  $S = 0\mathbb{Z}$ . Se  $S = \mathbb{Z}$ , então  $g = 1$  e  $S = 1\mathbb{Z}$ .

Assim podemos supor  $S \neq \{0\}$  e  $S \neq \mathbb{Z}$ . Seja  $S^+ = \{x \in S/x > 0\}$ . Do item 2 da definição de ideal, segue que  $S^+ \neq \emptyset$ . Assim, pelo princípio da boa ordenação, existe  $g \in S^+$  tal que  $g \leq x, \forall x \in S^+$ .

Como  $g \in S^+ \subseteq S$  e  $S$  é um ideal de  $\mathbb{Z}$ , então  $gn \in S \forall n \in \mathbb{Z}$ , ou seja,  $g\mathbb{Z} \subseteq S$ .

Agora precisamos mostrar que  $a = gq$ , onde  $q \in \mathbb{Z}$ . Assim, dado  $a \in S$ , o algoritmo da divisão de Euclides garante que existem  $q, r \in \mathbb{Z}$  tais que  $a = gq + r$ , onde  $0 \leq r < g$ . Como  $a, q, g \in S$  e  $S$  é um ideal, então  $r = a - gq \in S$ . Se  $r > 0$ , então como  $r < g$  e  $g$  é o mínimo de  $S^+$  obtemos uma contradição. Logo,  $r = 0$  e  $a = gp$ . Daí  $S \subseteq g\mathbb{Z}$ . Portanto  $S = g\mathbb{Z}$ .#

Exemplo: O conjunto  $S = \{2x - 5y/x, y \in \mathbb{Z}\}$  é ideal de  $\mathbb{Z}$ . Neste caso,  $S^+ = \{1, 2, 3, \dots\}$ . Assim,  $g = 1$  e  $S = 1\mathbb{Z} = \mathbb{Z}$ .



---

# CAPÍTULO 4

---

## RELAÇÕES E FUNÇÕES

---

---

### 4.1 Relações

---

#### 4.1.0.1 Definição

Sejam  $A$  e  $B$  dois conjuntos não vazios. Os subconjuntos de  $A \times B$  são chamados relações, ou seja, uma relação em  $A \times B$  é um subconjunto desse produto cartesiano.

Quando  $R$  é uma relação em  $A \times B$ , também dizemos que  $R$  é uma relação de  $A$  em  $B$ .

Exemplos:

1. Se  $A = \{0, 1\}$  e  $B = \{-1, 0, 1\}$ , então  $A \times B = \{(0, -1), (0, 0), (0, 1), (1, -1), (1, 0), (1, 1)\}$

São exemplos de relações:

$$R_1 = \{(0, 1)\}$$

$$R_2 = \emptyset$$

$$R_3 = \{(1, -1), (1, 1)\}$$

$$R_4 = A \times B$$

2. Se  $A = B = \mathbb{R}$ , então  $A \times B$  é o conjunto formado por todos pares ordenados de números reais. Um exemplo de relação em  $\mathbb{R} \times \mathbb{R}$  é o conjunto:

$$R = \{(x, y) \in \mathbb{R} \times \mathbb{R} / y \geq 0\}$$

## 4.2 Relações de equivalência

### 4.2.0.1 Definição

**Definição 4.1** (Relação de equivalência). *Seja  $X$  um conjunto não vazio e  $R \subseteq X \times X$  uma relação. Dizemos que  $R$  é uma relação de equivalência se:*

*Reflexividade Para todo  $a \in X$ ,  $(a, a) \in R$ .*

*Simetria Se  $(a, b) \in R$ , então  $(b, a) \in R$ .*

*Transitividade Se  $(a, b) \in R$  e  $(b, c) \in R$ , então  $(a, c) \in R$ .*

Quando  $R \subseteq X \times X$  é uma relação de equivalência, dizemos que  $R$  é uma relação de equivalência em  $X$ . Quando 2 elementos  $a, b \in X$  são tais que  $(a, b) \in R$ , dizemos que  $a$  e  $b$  são relacionados.

### 4.2.1 Equivalência módulo $R$

**Notação 4.1.1** (Equivalência módulo  $R$ ). *Seja  $R$  uma relação de equivalência em  $X$ . Para dizermos que  $(a, b) \in R$  usaremos a notação  $a \equiv b(R)$ , que se lê “ $a$  equivalente a  $b$  módulo  $R$ ”, ou ainda a notação  $aRb$ , com o mesmo significado anterior.*

Exemplos:

1. Seja  $X = \{1, 2, 3\}$ . Temos  $X \times X = \{(1, 1), (1, 2), (1, 3), (2, 1), (2, 2), (2, 3), (3, 1), (3, 2), (3, 3)\}$ .

São exemplos de relações de equivalência:

$$R_1 = X \times X$$

$$R_2 = \{(1, 1), (2, 2), (3, 3)\}$$

$$R_3 = \{(1, 1), (2, 2), (3, 3), (1, 2), (2, 1)\}$$

2. Seja  $X = \mathbb{Z}$  e  $R \subseteq \mathbb{Z} \times \mathbb{Z}$  definida por  $R = \{(x, y) \in \mathbb{Z} \times \mathbb{Z} \mid x = y\}$   $R$  é uma relação de equivalência pois:

- $\forall a \in \mathbb{Z}, (a, a) \in R$  pois  $a = a$

- $(a, b) \in R \rightarrow a = b \wedge b = a \Leftrightarrow (b, a) \in R$
- $(a, b), (b, c) \in R \rightarrow a = b = c \Rightarrow (a, c) \in R$

3. Tome  $R = \{(x, y) \in \mathbb{Z} \times \mathbb{Z} / 2 \mid (x - y)\} = \{(x, y) \in \mathbb{Z} \times \mathbb{Z} / x - y = 2k, k \in \mathbb{Z}\}$

$R$  é uma relação de equivalência pois:

- $\forall x \in \mathbb{Z}, xRx$  pois  $x - x = 2 \cdot 0$
- $xRy \rightarrow x - y = 2k \Rightarrow y - x = -(x - y) = 2 \cdot (-k) \Rightarrow yRx$
- $xRy \wedge yRz \rightarrow x - y = 2k \wedge y - z = 2q \Rightarrow x + z = x - y + y - z = 2k + 2q = 2(k + q) \rightarrow xRz$

#### 4.2.2 Classe de equivalência e conjunto quociente

**Definição 4.2** (Classe de Equivalência). *Seja  $R$  uma relação de equivalência sobre um conjunto  $X$ . Dado  $a \in X$ , chamamos classe de equivalência determinada por  $a$  módulo  $R$ , denotada por  $\bar{a}$  ou  $C(a)$ , o subconjunto constituído pelos elementos  $b \in X$  tais que  $bRa$ , ou seja,  $\bar{a} = C(a) = \{a \in X / bRa\}$*

**Definição 4.3** (Conjunto quociente). *O conjunto das classes de equivalência módulo  $R$  será denotado por  $X/R$  e é chamado conjunto quociente de  $X$  por  $R$ .*

Observação: Dado um conjunto  $X \neq \emptyset$  e  $R$  uma relação de equivalência em  $X$ , dado  $a \in X$  como  $R$  é uma relação de equivalência,  $aRa$ , daí  $\bar{a} \neq \emptyset$ , pois  $a \in \bar{a}$

Exemplos:

1. Seja  $X = \{a, b, c\}$  e  $R = \{(a, a), (b, b), (c, c), (a, c), (c, a)\}$ . Temos:

$$\bar{a} = \{x \in X / xRa\} = \{a, c\}$$

$$\bar{b} = \{x \in X / xRb\} = \{b\}$$

$$\bar{c} = \{x \in X / xRc\} = \{a, c\}$$

2. Seja  $X = \{1, 2, 3, 4\}$  e a relação de equivalência  $R = \{(1, 1), (2, 2), (3, 3), (4, 4)\}$

$$\bar{1} = \{x \in X / xR1\} = \{1\}$$

$$\bar{2} = \{x \in X / xR2\} = \{2\}$$

$$\bar{3} = \{x \in X/xR3\} = \{3\}$$

$$\bar{4} = \{x \in X/xR4\} = \{4\}$$

**Proposição 4.3.1.** *Seja  $R$  uma relação de equivalência em um conjunto não vazio  $X$ , sejam  $a, b \in X$ . Se  $\bar{a} \cap \bar{b} \neq \emptyset$ , então  $aRb$ .*

**Demonstração:** Como  $\bar{a} \cap \bar{b} \neq \emptyset$ , existe um  $y \in \bar{a} \cap \bar{b}$ , logo  $y \in \bar{a} \wedge y \in \bar{b}$ . Da definição de classe de equivalência temos que  $yRa$  e  $yRb$ . Como  $R$  é relação de equivalência temos que  $aRy$  e  $bRy$ . Por transitividade,  $aRb$ , como queríamos demonstrar. #

**Proposição 4.3.2.** *Se  $\bar{a} \cap \bar{b} \neq \emptyset$ , então  $\bar{a} = \bar{b}$*

**Demonstração:** Seja  $y \in \bar{a}$ . Daí  $yRa$ . Como  $\bar{a} \cap \bar{b} \neq \emptyset$ , pela proposição anterior,  $aRb$ . Logo, como  $yRa$  e  $aRb$ , segue que  $yRb$ , ou seja,  $y \in \bar{b}$ . Daí  $\bar{a} \subseteq \bar{b}$ . Como no caso anterior, mostra-se que  $\bar{b} \subseteq \bar{a}$ . Portanto  $\bar{a} = \bar{b}$ . #

**Corolário 4.0.1.** *As classes de equivalência são conjuntos disjuntos ou iguais.*

Seja  $R$  uma relação de equivalência em  $X \neq \emptyset$ , dado  $a \in R$ . Se  $bRa$ , então  $\bar{b} = \bar{a}$ , mais ainda, se  $dRa$  então  $\bar{d} = \bar{a} = \bar{b}$ . Como por exemplo:

$$X = \{a, b, c, d, e, f, g\}$$

$$\bar{a} = \{a, b, c\}$$

$$\bar{e} = \{e\}$$

$$\bar{f} = \{f, g\}$$

**Definição 4.4** (Representante da Classe de Equivalência). *Seja  $C$  uma classe de equivalência de uma relação de equivalência  $R$ . Qualquer elemento  $y \in C$  é chamado representante de  $C$ .*

**Proposição 4.4.1.** *Seja  $X$  um conjunto não vazio e  $R$  uma relação de equivalência em  $X$ . Então  $X$  é a união disjunta das classes  $\bar{a}, a \in X$ , ou seja,*

$$X = \bigsqcup_{a \in X} \bar{a}$$

**Demonstração:** Para todo  $a \in X$ ,  $\bar{a} \subseteq X$ , logo  $\bigcup_{a \in X} \bar{a} \subseteq X$ . Seja  $b \in X$ . Logo  $b \in \bar{b}$ , daí  $b \in \bigcup_{a \in X} \bar{a}$ , logo  $X \subseteq \bigcup_{a \in X} \bar{a}$ . Portanto,  $X = \bigcup_{a \in X} \bar{a}$ .#

Exemplo:

Em  $\mathbb{Z} \times \mathbb{Z}$  considere a seguinte relação:  $R = \{(a, b) \in \mathbb{Z} \times \mathbb{Z} / 2|(a - b)\}$ . Mostre que é uma relação de equivalência e mostre suas classes de equivalência.

1. Dado  $a \in \mathbb{Z}$ ,  $aRa$  pois  $2|(a - a) = 0$ .
2. Se  $aRb$ , então  $2|(a - b)$ , ou seja,  $a - b = 2k$ ,  $-(a - b) = b - a = 2(-k)$ . Logo  $bRa$ .
3. Se  $aRb$  e  $bRc$ , então  $a - b = 2k$  e  $b - c = 2q$ . Logo  $a - b + b - c = 2k + 2q = 2(k + q)$ . Logo,  $aRc$ .

Portanto  $R$  é uma relação de equivalência.

Dado  $a \in \mathbb{Z}$ , temos:

$\bar{a} = \{b \in \mathbb{Z} / bRa\} = \{b \in \mathbb{Z} / 2|(a - b)\}$  como  $2|(a - b)$ , temos que:

$$a - b = 2k \Leftrightarrow b = a + 2r, r = -k$$

Assim, se  $a$  é ímpar,  $b$  também o é. Logo:

$$\bar{a} = \{\dots, -3, -1, 1, 3, \dots\}$$

Agora, se  $a$  é par,  $b$  também é. Logo:

$$\bar{a} = \{\dots, -2, 0, 2, 4, \dots\}$$

## 4.3 Funções

### 4.3.0.1 Definição

**Definição 4.5** (Função). Uma função  $f$  de um conjunto  $A$  em um conjunto  $B$  é uma relação  $f \subseteq A \times B$  satisfazendo:

1.  $\forall x \in A, \exists y \in B / (x, y) \in f$
2.  $(x_1, y_1), (x_1, y_2) \in f \rightarrow y_1 = y_2$

Geralmente, para dizer que  $f$  é uma função de  $A$  em  $B$  escrevemos  $f : A \rightarrow B$ .

### 4.3.0.2 Domínio e contra-domínio

O conjunto  $A$  é chamado de Domínio de  $f$  e o conjunto  $B$  é chamado de contra-domínio.

Se  $f : A \rightarrow B$  é uma função, escrevemos  $f(a) = b$  para dizer que  $(a, b) \in f$

Exemplos:

1. Sejam  $A = \{0, 1, 2, 3\}$  e  $B = \{4, 5, 6, 7, 8\}$ . Quais das seguintes relações são funções?
  - $R_1 = \{(0, 5), (1, 6), (2, 7)\}$  - Não é função pois o número 3 não tem valor associado à ele.
  - $R_2 = \{(0, 4), (1, 5), (1, 6), (2, 7), (3, 8)\}$  - Não é função pois o valor 1 tem mais de um valor diferente associado à ele.
  - $R_3 = \{(0, 4), (1, 5), (2, 7), (3, 8)\}$  - É função
  - $R_4 = \{(0, 5), (1, 5), (2, 6), (3, 7)\}$  - É função
2.  $R_5 = \{(x, y) \in \mathbb{R} \times \mathbb{R} / y^2 = x^2\}$  - Não é função, pois  $x = \pm \sqrt{y}$
3.  $R_6 = \{(x, y) \in \mathbb{R} \times \mathbb{R} / x^2 + y^2 = 1\}$  - Não é função pois quando  $x = 0, y = 1 \wedge y = -1$
4.  $R_7 = \{(x, y) \in \mathbb{R} \times \mathbb{R} / y = x^2\}$  - É função

### 4.3.1 Tipos de funções

**Definição 4.6** (Função sobrejetora). *Uma função  $f : A \rightarrow B$  é sobrejetora se, e somente se, para todo  $y \in B$  exista um  $x \in A$  tal que  $f(x) = y$*

**Definição 4.7** (Função injetora). *Uma função  $f : A \rightarrow B$  é injetora se, e somente se, para  $a_1 \neq a_2$ , temos  $f(a_1) \neq f(a_2), \forall a_1, a_2 \in A$*

**Definição 4.8** (Função bijetora). *Uma função  $f : A \rightarrow B$  que é simultaneamente injetora e sobrejetora é chamada de bijetora ou bijetiva.*

Exemplos:



1. A função  $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$  dada por  $f(x) = 3x + 1$  é injetora e sobrejetora.

Dados  $x_1, x_2 \in \mathbb{R}$  tais que  $f(x_1) = f(x_2)$ , temos:

$$3x_1 + 1 = 3x_2 + 1$$

$$x_1 = x_2$$

Logo  $f$  é injetora

Para verificar se  $f$  é sobrejetora precisamos verificar se dado  $y \in \mathbb{R}$

$$\exists x \in \mathbb{R} / f(x) = y.$$

Tome  $x = \frac{y-1}{3} \in \mathbb{R}$ . Daí,  $f(x) = y$ . Logo  $f$  é sobrejetora.

2. A função  $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$  dada por  $f(x) = x^2$  é injetora? E sobrejetora?

Não é injetora pois  $f(-1) = f(1) \wedge 1 \neq -1$

Não é sobrejetora pois  $\nexists x \in \mathbb{R} / x^2 = -1$

Dado  $f : A \rightarrow B$  uma função, considere a relação  $f^{-1} \subseteq B \times A$  tal que  $(b, a) \in f^{-1}$  se  $(a, b) \in f$ , ou seja,  $f^{-1}(b) = a$  se  $f(a) = b$ .

Pode ocorrer que  $f^{-1}$  não seja função, mesmo  $f$  sendo uma função. Por exemplo:

$f : \{0, 1, 2, 3\} \rightarrow \{4, 5, 6, 7, 8\}$  dada por:

$$f(0) = 5$$

$$f(1) = 5$$

$$f(2) = 6$$

$$f(3) = 7$$

Neste caso,  $f^{-1}$  é dado por:

$$f^{-1}(5) = 0$$

$$f^{-1}(5) = 1$$

$$f^{-1}(6) = 2$$

$$f^{-1}(7) = 3$$

**Teorema 4.1.** Dada  $f : A \rightarrow B$  função tome  $f^{-1} : B \rightarrow A$ . Definida com o  $f^{-1}(b) = a$  se  $f(a) = b$ . Então  $f^{-1}$  é uma função se, e somente se,  $f$  é bijetora.

**Demonstração:** Suponha  $f^{-1}$  é função. Precisamos provar que  $f$  é injetora e sobrejetora.

Dados  $a_1, a_2 \in A$  tais que  $f(a_1) = b = f(a_2)$ . Como  $f(a_1) = b$  temos  $f^{-1}(b) = a_1$ , além disso,  $f^{-1}(b) = a_2$ . Mas  $f^{-1}$  é função, daí  $a_1 = a_2$ , ou seja,  $f$  é injetora.

Dado  $b \in B$ , como  $f^{-1}$  é uma função,  $\forall b \in B, f^{-1}(b) = a \in A$ , logo  $f(a) = b$  e assim  $f$  é sobrejetora.

Portanto  $f$  é bijetora.

Agora suponha que  $f$  é bijetora.

Primeiramente, dado  $b \in B$ , como  $f$  é sobrejetora, existe  $a \in A$  tal que  $f(a) = b$ , ou seja,  $f^{-1}(b) = a \in A$ .

Suponha que  $f^{-1}(b) = a_1$  e  $f^{-1}(b) = a_2$ . Daí,  $f(a_1) = b \wedge f(a_2) = b$ . Mas  $f$  é injetora, assim  $a_1 = a_2$  e então  $f^{-1}(b) = a_1 = a_2$ .

Portanto  $f^{-1}$  é função. #

## 4.3.2 Composição de funções

### 4.3.2.1 Definição

**Definição 4.9** (Função Composta). Sejam  $f : A \rightarrow B$  e  $g : B \rightarrow C$  funções. Chama-se composta de  $g$  e  $f$  a função de  $A$  em  $C$ , denotada  $g \circ f$ , definida por  $g \circ f : A \rightarrow C$ .

Temos então que  $(g \circ f)(x) = g(f(x)), \forall x \in A$ .

Observação: Se  $f : A \rightarrow B$  e  $g : B \rightarrow A$  então existem  $f \circ g$  e  $g \circ f$ . Porém, em geral,  $f \circ g \neq g \circ f$ .

### 4.3.2.2 Propriedades

**Proposição 4.9.1.** Se  $f : A \rightarrow B$  e  $g : B \rightarrow C$  são funções injetoras, então  $g \circ f$  é injetora.

**Demonstração:** Dados  $x_1, x_2 \in A$  tais que  $(g \circ f)(x_1) = (g \circ f)(x_2)$  temos que  $g(f(x_1)) = g(f(x_2))$ . Como  $g$  é injetora,  $f(x_1) = f(x_2)$ . Mas  $f$  é injetora, daí  $x_1 = x_2$ . Logo  $g \circ f$  é injetora. #

**Proposição 4.9.2.** Se  $f : A \rightarrow B$  e  $g : B \rightarrow C$  são sobrejetoras, então  $g \circ f$  é sobrejetora.

**Demonstração:** Temos que  $g \circ f : A \rightarrow C$ . Dado  $z \in C$ . Como  $g$  é sobrejetora,  $\exists y \in B / g(y) = z$ . Como  $f$  é sobrejetora,  $\exists x \in A / f(x) = y$ . Assim,  $z = g(y) = g(f(x)) = (g \circ f)(x)$ . Logo  $g \circ f$  é sobrejetora. #

### 4.3.3 Função Identidade

#### 4.3.3.1 Definição

**Definição 4.10** (Função Identidade). Dado um conjunto  $A \neq \emptyset$ , a função  $i_A : A \rightarrow A$  dada por  $i_A(x) = (x)$  é chamada de função identidade.

**Proposição 4.10.1.** Se  $f : A \rightarrow B$  é bijetora, então  $f \circ f^{-1} = i_B \wedge f^{-1} \circ f = i_A$ .

**Demonstração:** Temos  $i_F : F \rightarrow F$  e  $i_E : E \rightarrow E$ . Além disso,  $f \circ f^{-1} : F \rightarrow F$  e  $f^{-1} \circ f : E \rightarrow E$ , daí  $D(f \circ f^{-1}) = D(i_F)$ <sup>1</sup> e  $D(f^{-1} \circ f) = D(i_E)$ . Dado  $x \in F$ ,  $(f \circ f^{-1})(x) = f(f^{-1}(x)) = x = i_F(x)$ . Dado  $x \in E$ ,  $(f^{-1} \circ f)(x) = f^{-1}(f(x)) = x = i_E(x)$ . #

#### 4.3.3.2 Propriedades

**Proposição 4.10.2.** Se  $f : A \rightarrow B$  e  $g : B \rightarrow A$  são funções, então:

1.  $f \circ i_A = f, i_B \circ f = f, g \circ i_B = g, i_A \circ g = g$
2. Se  $g \circ f = i_A$ , e  $f \circ g = i_B$ , então  $f$  e  $g$  são bijetoras e  $g = f^{-1}$

**Demonstração:**

1. Provemos que  $f \circ i_A = f$ .

Primeiro temos  $f : A \rightarrow B$  e  $i_A : A \rightarrow A$ . Daí,  $f \circ i_A : A \rightarrow B$ , ou seja,  $D(f \circ i_A) = D(f)$ .

Dado  $x \in A$ , temos  $(f \circ i_A)(x) = f(i_A(x)) = f(x)$ . Portanto,  $f \circ i_A = f$ .

2. Provemos que  $f$  é bijetora.

Dados  $x_1, x_2 \in B$  tais que  $f(x_1) = f(x_2)$ . Como  $f : A \rightarrow B$  e  $g : B \rightarrow A$ , então  $g(f(x_1)) = g(f(x_2))$ , ou seja,  $(g \circ f)(x_1) = (g \circ f)(x_2)$ . Daí,  $i_A(x_1) = i_A(x_2)$ . Logo,  $x_1 = x_2$ , isto é,  $f$  é injetora.

---

<sup>1</sup> $D(f(x))$  é o domínio da função  $f$

Agora, dado  $y \in B$ , segue que  $y = i_B(y)$ . Mas  $i_B = f \circ g$ . Daí,  $y = i_B(y) = (f \circ g)(y) = f(g(y))$ . Assim,  $x = g(y) \in A$  e  $f(x) = y$ .

Logo  $f$  é sobrejetora. Portanto  $f$  é bijetora. Analogamente, prova-se que  $g$  é bijetora. Provemos que  $g = f^{-1}$ . Temos  $f^{-1} : B \rightarrow A$ , daí,  $D(g) = B = D(f^{-1})$ . Agora,  $f \circ g = i_B = f \circ f^{-1}$ . Assim, para todo  $x \in F$ ,  $(f \circ g)(x) = (f \circ f^{-1})(x)$ . Isto é,  $f(g(x)) = f(f^{-1}(x))$ . Portanto,  $g(x) = f^{-1}(x) \forall x \in B$ . Logo,  $g = f^{-1}$ . #

**Definição 4.11.** *Seja  $f : A \rightarrow B$  uma função.*

1. Dado  $P \subseteq A$ , chama-se imagem direta de  $P$ , segundo  $f$  e indica-se por  $f(P)$  o subconjunto de  $F$  dado por

$$f(P) = \{f(x) \mid x \in P\},$$

isto é,  $f(P)$  é o conjunto das imagens por  $f$  dos elementos de  $P$ .

2. Dado  $Q \subseteq B$ , chama-se imagem inversa de  $Q$ , segundo  $f$  e indica-se por  $f^{-1}(Q)$  o subconjunto de  $A$  dado por

$$f^{-1}(Q) = \{x \in E \mid f(x) \in Q\},$$

isto é,  $f^{-1}(Q)$  é o conjunto dos elementos de  $A$  que tem imagem em  $Q$  através de  $f$ .

*Exemplos:*

1. Seja  $A = \{1, 3, 5, 7, 9\}$  e  $B = \{0, 1, 2, 3, \dots, 10\}$  e  $f : A \rightarrow B$  dada por  $f(x) = x + 1$ . Temos que

- $f(\{3, 5, 7\}) = \{f(3), f(5), f(7)\} = \{4, 6, 8\}$
- $f(A) = \{f(1), f(3), f(5), f(7), f(9)\} = \{2, 4, 6, 8, 10\}$
- $f(\emptyset) = \emptyset$
- $f^{-1}(\{2, 4, 10\}) = \{x \in A \mid f(x) \in \{2, 4, 10\}\} = \{1, 3, 9\}$
- $f^{-1}(\{0, 1, 3, 5, 7, 9\}) = \{x \in A \mid f(x) \in \{0, 1, 3, 5, 7, 9\}\} = \emptyset$

2. Sejam  $A = B = \mathbb{R}$  e  $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$  dada por  $f(x) = x^2$ . Temos

- $f(\{1, 2, 3\}) = \{1, 4, 9\}$

- $f([0, 2]) = \{f(x) \in \mathbb{R} \mid 0 \leq x \leq 2\} = \{x^2 \mid 0 \leq x \leq 2\} = [0, 4]$
- $f^{-1}([1, 9]) = \{x \in \mathbb{R} \mid 1 \leq f(x) \leq 9\} = \{x \in \mathbb{R} \mid 1 \leq x^2 \leq 9\} = [-3, -1] \cup [1, 3]$

**Proposição 4.11.1.** *Seja  $f : A \rightarrow B$  uma aplicação (ou função) e sejam  $P, Q \subseteq E, X, Y \subseteq B$ .*

1. *Se  $P \subseteq Q$ , então  $f(P) \subseteq f(Q)$ .*
2.  *$f^{-1}(X \cup Y) = f^{-1}(X) \cup f^{-1}(Y)$ .*

**Demonstração:**

1. Se  $y \in f(P)$ , então existe  $x \in P$  tal que  $f(x) = y$ . Mas como  $P \subseteq Q$ , então  $x \in Q$  e daí  $y \in f(Q)$ . Logo  $f(P) \subseteq f(Q)$ .
2. Seja  $z \in f^{-1}(X \cup Y)$ . Então  $f(z) \in X \cup Y$ . Se  $f(z) \in X$ , então  $z \in f^{-1}(X)$  e daí  $z \in f^{-1}(X) \cup f^{-1}(Y)$ . Se  $f(z) \in Y$ , então  $z \in f^{-1}(Y)$  e assim  $z \in f^{-1}(X) \cup f^{-1}(Y)$ . Logo,  $f^{-1}(X \cup Y) \subseteq f^{-1}(X) \cup f^{-1}(Y)$ .

Agora, seja  $z \in f^{-1}(X) \cup f^{-1}(Y)$ . Se  $z \in f^{-1}(X)$ , então  $f(z) \in X$ , daí  $f(z) \in X \cup Y$ , isto é,  $z \in f^{-1}(X \cup Y)$ . Se  $z \in f^{-1}(Y)$ , então  $f(z) \in Y$  e assim  $f(z) \in X \cup Y$ , isto é,  $z \in f^{-1}(X \cup Y)$ . Logo  $f^{-1}(X) \cup f^{-1}(Y) \subseteq f^{-1}(X \cup Y)$ .

Portanto,  $f^{-1}(X \cup Y) = f^{-1}(X) \cup f^{-1}(Y)$ . #



---

# CAPÍTULO 5

---

## OPERAÇÕES EM $\frac{\mathbb{Z}}{M\mathbb{Z}}$

Durante esse tópico,  $m$  denotará um número inteiro positivo.

---

### 5.1 Relações de congruência

---

#### 5.1.1 Definição

**Definição 5.1** (Congruência). *Sejam  $a, b \in \mathbb{Z}$ , dizemos que  $a$  é congruente com  $b$  módulo  $m$  se  $m|(a - b)$ . Neste caso, escrevemos  $a \equiv_m b$  ou  $a \equiv b(\text{mod } m)$ .*

Exemplos:

1.  $5 \equiv 2(\text{mod } 3)$ , pois  $3|(5 - 2)$
2.  $3 \equiv 1(\text{mod } 2)$ , pois  $2|(3 - 1)$
3.  $3 \equiv 9(\text{mod } 3)$ , pois  $3|(3 - 9)$

#### 5.1.2 Propriedades

**Proposição 5.1.1.** *A congruência módulo  $m$  é uma relação de equivalência em  $\mathbb{Z}$ .*

**Demonstração:**

1.  $\forall a \in \mathbb{Z}, a \equiv a \pmod{m}$  pois  $m|(a - a)$  (Reflexividade)
  2. Se  $a \equiv b \pmod{m}$ , então  $m|(a - b)$ . Daí,  $m|(-(a - b))$ , ou seja,  $m|(b - a)$ . Daí  $b \equiv a \pmod{m}$  (Simetria)
  3. Se  $a \equiv b \pmod{m}$  e  $b \equiv c \pmod{m}$ , então  $m|(a - b)$  e  $m|(b - c)$ . Assim,  $m|[(a - b) + (b - c)]$ . Logo,  $m|(a - c)$ , isto é,  $a \equiv c \pmod{m}$  (Transitividade)
- Portanto é relação de equivalência. #

**Teorema 5.1.** *A relação de congruência módulo  $m$  satisfaz as seguintes propriedades:*

1.  $a_1 \equiv b_1 \pmod{m} \Leftrightarrow a_1 - b_1 \equiv 0 \pmod{m}$
2. Se  $a_1 \equiv b_1 \pmod{m}$  e  $a_2 \equiv b_2 \pmod{m}$ , então  $a_1 + a_2 \equiv b_1 + b_2 \pmod{m}$
3. Se  $a_1 \equiv b_1 \pmod{m}$  e  $a_2 \equiv b_2 \pmod{m}$ , então  $a_1 a_2 \equiv b_1 b_2 \pmod{m}$
4. Se  $a \equiv b \pmod{m}$ , então  $ax \equiv bx \pmod{m}, \forall x \in \mathbb{Z}$
5. Vale a lei do cancelamento: se  $d \in \mathbb{Z}$  e  $\text{mdc}(d, m) = 1$  então  $ad \equiv bd \pmod{m}$  implica  $a \equiv b \pmod{m}$

**Demonstração:** Provemos o item 3

Dizer que  $a \equiv b \pmod{m}$  significa dizer que existe  $t \in \mathbb{Z}$  tal que  $a = b + tm$ .

Assim, existem  $m, l \in \mathbb{Z}$  tais que  $a_1 = b_1 + km, a_2 = b_2 + lm$ . Daí

$$a_1 a_2 = b_1 b_2 + lb_1 m + klm^2$$

$$a_1 a_2 = b_1 b_2 + \underbrace{(lb_1 + kb_2 + klm)}_{\in \mathbb{Z}} m$$

Ou seja,  $a_1 a_2 = b_1 b_2 + pm$ , onde  $p = lb_1 + kb_2 + klm \in \mathbb{Z}$ . Portanto,  $a_1 a_2 \equiv b_1 b_2 \pmod{m}$ .



Para o item 5, se  $ad \equiv bd \pmod{m}$ , então  $m|d(a - b)$ . Mas,  $\text{mdc}(d, m) = 1$ , logo  $m|(a - b)$ , isto é,  $a \equiv b \pmod{m}$ .#

Como a congruência módulo  $m$  é uma relação de equivalência, podemos determinar suas classes de equivalência. Assim, dado  $n \in \mathbb{Z}$ , temos

$$C(n) = \{x \in \mathbb{Z} / x \equiv n \pmod{m}\}$$

Denotaremos  $C(n)$  por  $R_m(n)$  ou  $\bar{n}$ , quando não houver possibilidade de confusão.

Por exemplo, fixando  $m$

$$R_m(0) = \{x \in \mathbb{Z} / x \equiv 0 \pmod{m}\} = \{x \in \mathbb{Z} / x = mk, k \in \mathbb{Z}\} = m\mathbb{Z}$$

$$R_m(1) = \{x \in \mathbb{Z} / x \equiv 1 \pmod{m}\} = \{x \in \mathbb{Z} / x = 1 + km, k \in \mathbb{Z}\}$$

$$R_m(n) = \{x \in \mathbb{Z} / x = n + km, k \in \mathbb{Z}\}$$

### 5.1.3 Classes de equivalência módulo $m$

**Proposição 5.1.2.** *As classes de equivalência definidas pela congruência módulo  $m$  são determinadas pelos restos da divisão euclidiana por  $m$ . Em outras palavras,  $R_m(n)$  é o conjunto dos números inteiros cujo resto na divisão euclidiana por  $m$  é  $n$ .*

**Demonstração:** Dado  $x \in \mathbb{Z}$ , pela divisão de Euclides, podemos escrever  $x = km + r$  onde  $0 \leq r < m$ . Daí,  $x - r = km$ , isto é,  $m|(x - r)$ . Logo  $x \in R_m(r)$ . Portanto, se  $r = n$ , então  $x \in R_m(n)$  e neste caso,  $x = km + n = n + km$ , ou seja, o resto da divisão euclidiana de  $x$  por  $m$  é  $n$ .#

**Corolário 5.1.1.**  $R_m(k) = R_m(l)$  se, e somente se,  $k \equiv l \pmod{m}$ .

Exemplos:

1. Se  $m = 2$ , então os possíveis restos na divisão euclidiana por 2 são 0 e 1. Logo, existem duas classes de equivalência, a saber  $R_2(0)$  e  $R_2(1)$

2. Se  $m = 3$ , então os possíveis restos da divisão euclidiana são 0, 1 e 2. Daí

$$R_3(0) = 3\mathbb{Z}$$

$$R_3(1) = \{x \in \mathbb{Z} / x = 3q + 1, q \in \mathbb{Z}\}$$

$$R_3(2) = \{x \in \mathbb{Z} / x = 3q + 2, q \in \mathbb{Z}\}$$

**Proposição 5.1.3.** *Na relação de equivalência módulo  $m$  existem  $m$  classes de equivalência.*

**Demonstração:** Os possíveis restos na divisão euclidiana por  $m$  são  $0, 1, \dots, (m - 1)$ . Como cada possível resto define uma classe de equivalência diferente, existem exatamente  $m$  classes de equivalência. #

---

## 5.2 Conjunto quociente $\left(\frac{\mathbb{Z}}{m\mathbb{Z}}\right)$

---

**Notação 5.1.1** (Conjunto quociente). *Fixado  $m$  inteiro positivo, denotaremos*

$$R_m(0) = \bar{0}$$

$$R_m(1) = \bar{1}$$

$$\vdots$$

$$R_m(m - 1) = \overline{m - 1}$$

*O conjunto quociente desta relação será denotado por  $\frac{\mathbb{Z}}{m\mathbb{Z}}$  e  $\frac{\mathbb{Z}}{m\mathbb{Z}} = \{\bar{0}, \bar{1}, \dots, \overline{m - 1}\}$*

Queremos definir um meio de somar e multiplicar os elementos de  $\frac{\mathbb{Z}}{m\mathbb{Z}}$ . Por exemplo, em  $\frac{\mathbb{Z}}{2\mathbb{Z}} = \{\bar{0}, \bar{1}\}$  temos que a soma de pares é par, soma de par com ímpar é ímpar e a soma de ímpares é par.

Podemos escrever

$$\bar{0} \oplus \bar{0} = \overline{0 + 0} = \bar{0}$$

$$\bar{0} \oplus \bar{1} = \overline{0 + 1} = \bar{1}$$

$$\bar{1} \oplus \bar{1} = \overline{1 + 1} = \bar{0}$$

Para multiplicação, temos

$$\bar{0} \odot \bar{0} = \overline{0 \cdot 0} = \bar{0}$$

$$\bar{0} \odot \bar{1} = \overline{0 \cdot 1} = \bar{0}$$

$$\bar{1} \odot \bar{1} = \overline{1 \cdot 1} = \bar{1}$$

Em  $\frac{\mathbb{Z}}{m\mathbb{Z}}$  definimos

$$\bar{a} \oplus \bar{b} = \overline{a + b} \quad (5.1)$$

$$\bar{a} \odot \bar{b} = \overline{a \cdot b} \quad (5.2)$$

Para  $\bar{a}, \bar{b} \in \frac{\mathbb{Z}}{m\mathbb{Z}}$

**Proposição 5.1.4.** *As operações de soma e produto definidas em (5.1) e (5.2) são independentes dos representantes das classes.*

**Demonstração:** Dadas duas classes com representantes diferentes,  $\bar{a}_1 = \bar{a}_2, \bar{b}_1 = \bar{b}_2, a_1 \neq a_2, b_1 \neq b_2$ , temos:

$$\overline{a_1 + b_1} = \bar{a}_1 \oplus \bar{b}_1 = \bar{a}_2 \oplus \bar{b}_2 = \overline{a_2 + b_2}$$

$$\overline{a_1 b_1} = \bar{a}_1 \odot \bar{b}_1 = \bar{a}_2 \odot \bar{b}_2 = \overline{a_2 b_2}$$

C.Q.D.#

Exemplo: Determine a soma e multiplicação em:

$$\frac{\mathbb{Z}}{4\mathbb{Z}} = \{\bar{0}, \bar{1}, \bar{2}, \bar{3}\}$$

Tabela 5.1: Soma

$\oplus$	$\bar{0}$	$\bar{1}$	$\bar{2}$	$\bar{3}$
$\bar{0}$	$\bar{0}$	$\bar{1}$	$\bar{2}$	$\bar{3}$
$\bar{1}$	$\bar{1}$	$\bar{2}$	$\bar{3}$	$\bar{0}$
$\bar{2}$	$\bar{2}$	$\bar{3}$	$\bar{0}$	$\bar{1}$
$\bar{3}$	$\bar{3}$	$\bar{0}$	$\bar{1}$	$\bar{2}$

Tabela 5.2: Multiplicação

$\odot$	$\bar{0}$	$\bar{1}$	$\bar{2}$	$\bar{3}$
$\bar{0}$	$\bar{0}$	$\bar{0}$	$\bar{0}$	$\bar{0}$
$\bar{1}$	$\bar{0}$	$\bar{1}$	$\bar{2}$	$\bar{3}$
$\bar{2}$	$\bar{0}$	$\bar{2}$	$\bar{0}$	$\bar{2}$
$\bar{3}$	$\bar{0}$	$\bar{3}$	$\bar{2}$	$\bar{1}$

## 5.2.1 Elementos Inversíveis de $\frac{\mathbb{Z}}{m\mathbb{Z}}$

### 5.2.1.1 Inversibilidade

**Definição 5.2** (Inversibilidade). Um elemento  $\bar{a} \in \frac{\mathbb{Z}}{m\mathbb{Z}}$  é inversível se, e somente se, existem  $\bar{b} \in \frac{\mathbb{Z}}{m\mathbb{Z}}$  tal que  $\bar{a} \odot \bar{b} = \bar{1}$ .

Neste caso,  $\bar{b}$  é chamado inverso de  $\bar{a}$  e denotaremos  $\bar{b} = (\bar{a})^{-1}$ .

Quando  $\bar{b}$  existe, ele é único. De fato, dado  $\bar{a} \in \frac{\mathbb{Z}}{m\mathbb{Z}}$ , se existem  $\bar{b}, \bar{d} \in \frac{\mathbb{Z}}{m\mathbb{Z}}$  tais que  $\bar{a} \odot \bar{b} = \bar{1} = \bar{a} \odot \bar{d}$ , então  $\bar{b} = \bar{b} \odot \bar{1} = \bar{b} \odot (\bar{a} \odot \bar{d}) = (\bar{b} \odot \bar{a}) \odot \bar{d} = \bar{1} \odot \bar{d} = \bar{d}$ .

**Proposição 5.2.1.** Um elemento  $\bar{a} \in \frac{\mathbb{Z}}{m\mathbb{Z}}$  é inversível se, e somente se,

$$\text{mdc}(a, m) = 1$$

**Demonstração:** Suponha que existe  $\bar{b} \in \frac{\mathbb{Z}}{m\mathbb{Z}}$  tal que  $\bar{a} \odot \bar{b} = \bar{1}$ . Assim,  $\overline{ab} = \bar{1}$ , ou seja,  $ab \equiv 1 \pmod{m}$ . Daí,  $ab - 1 = km, k \in \mathbb{Z}$ , logo  $ab + m(-k) = 1$ , e então  $\text{mdc}(a, m) = 1$ .

Agora suponha que  $\text{mdc}(a, m) = 1$ . Logo, existem  $x_0, y_0 \in \mathbb{Z}$  tais que  $ax_0 + my_0 = 1$ , isto é,  $ax_0 - 1 = m(-y_0)$ . Logo  $ax_0 \equiv 1 \pmod{m}$ , ou seja,  $\overline{ax_0} = \bar{1}$ . Portanto,  $\bar{a} \odot \bar{x_0} = \bar{1}$ .#

Exemplos:

1. Em  $\frac{\mathbb{Z}}{4\mathbb{Z}}$  existem dois elementos inversíveis que são  $\bar{1}$ , cujo inverso é  $\bar{1}$ , e o  $\bar{3}$ , cujo inverso é  $\bar{3}$ .
2. Em  $\frac{\mathbb{Z}}{11\mathbb{Z}}$ , todos elementos, exceto  $\bar{0}$ , possuem inverso:

Tabela 5.3: Inversos em  $\frac{\mathbb{Z}}{11\mathbb{Z}}$

Elemento	$\bar{1}$	$\bar{2}$	$\bar{3}$	$\bar{4}$	$\bar{5}$	$\bar{6}$	$\bar{7}$	$\bar{8}$	$\bar{9}$	$\bar{10}$
Inverso	$\bar{1}$	$\bar{6}$	$\bar{4}$	$\bar{3}$	$\bar{9}$	$\bar{2}$	$\bar{8}$	$\bar{7}$	$\bar{5}$	$\bar{10}$

O número de elementos inversíveis de  $\frac{\mathbb{Z}}{m\mathbb{Z}}$  é igual a quantidade de números coprimos com  $m$ . Esse número é denotado por  $\varphi(m)$  e é chamado função  $\varphi$  de Euler. Pode-se demonstrar que

$$\varphi(m) = m \prod_{p|m} \left(1 - \frac{1}{p}\right)$$

Onde o produto varia sobre todos os divisores primos de  $m$ , sem repetição.

Por exemplo, para  $\frac{\mathbb{Z}}{100\mathbb{Z}}$  temos:

$$100 = 2^2 5^2$$

Daí,

$$\varphi(100) = 100 \left(1 - \frac{1}{2}\right) \left(1 - \frac{1}{5}\right) = 40$$

Logo, em  $\frac{\mathbb{Z}}{100\mathbb{Z}}$  existem 40 elementos inversíveis.

**Notação 5.2.1** (Conjunto dos elementos inversíveis). Denotaremos o conjunto de todos os elementos inversíveis de  $\frac{\mathbb{Z}}{m\mathbb{Z}}$  por  $\left(\frac{\mathbb{Z}}{m\mathbb{Z}}\right)^*$ , ou ainda  $U\left(\frac{\mathbb{Z}}{m\mathbb{Z}}\right)$ .

**Proposição 5.2.2.** Sejam  $\bar{a}, \bar{b} \in \left(\frac{\mathbb{Z}}{m\mathbb{Z}}\right)^*$ . Então  $\bar{a} \odot \bar{b} \in \left(\frac{\mathbb{Z}}{m\mathbb{Z}}\right)^*$ .

**Demonstração:** Por uma proposição anterior, basta verificar que  $\text{mdc}(ab, m) = 1$ . Para que  $\bar{a} \odot \bar{b} \in \left(\frac{\mathbb{Z}}{m\mathbb{Z}}\right)^*$ .

Como  $\bar{a}, \bar{b} \in \left(\frac{\mathbb{Z}}{m\mathbb{Z}}\right)^*$ , então  $\text{mdc}(a, m) = 1$  e  $\text{mdc}(b, m) = 1$ .

Assim, existem  $x_0, y_0, x_1, y_1 \in \mathbb{Z}$  tais que

$$ax_0 + my_0 = 1$$

$$bx_1 + my_1 = 1$$

Daí,

$$abx_0x_1 + max_0y_1 + mbx_1y_0 + m^2y_0y_1 = 1$$

$$\underbrace{abx_0x_1}_{\in \mathbb{Z}} + m \underbrace{(ax_0y_1 + bx_1y_0 + my_0y_1)}_{\in \mathbb{Z}} = 1$$

Logo,  $\text{mdc}(ab, m) = 1$ , ou seja,  $\bar{a} \odot \bar{b} \in \left(\frac{\mathbb{Z}}{m\mathbb{Z}}\right)^*$ .#



---

# CAPÍTULO 6

---

## ANÉIS

---

### 6.1 Definições

---

**Definição 6.1.** Um conjunto não vazio  $A$  munido de duas operações “+” e “·”, chamados soma e produto, é chamado de **anel** quando as seguintes condições são verdadeiras:

1. **Elemento Neutro:** Existe em  $A$  um elemento denotado por  $0$  (zero) ou  $0_A$  tal que para todo elemento  $a \in A$  vale

$$a + 0 = 0 + a = a.$$

2. **Elemento Oposto:** Para cada elemento  $a \in A$ , existe  $b \in A$  tal que

$$a + b = b + a = 0_A.$$

3. **Associatividade:** para todos  $a, b, c \in A$  vale que

$$(a + b) + c = a + (b + c).$$

Essa propriedade é chamada **propriedade associativa da soma**.

4. **Comutatividade:** Para todos  $a, b \in A$  vale

$$a + b = b + a.$$

5. **Distributividade:** Para todos  $a, b, c \in A$  vale

$$(a + b) \cdot c = a \cdot c + b \cdot c.$$

Essa propriedade é chamada **distributiva em relação ao produto**.

6. **Distributividade:** Para todos  $a, b, c \in A$  vale

$$a \cdot (b + c) = a \cdot b + a \cdot c.$$

Essa é a propriedade **distributiva do produto em relação à soma**.

Além disso, se  $A$  satisfizer

7. **Comutatividade:** Para todos  $a, b \in A$  vale

$$a \cdot b = b \cdot a.$$

Dizemos que  $A$  é um **anel comutativo**.

8. **Elemento um:** Se existe em  $A$  um elemento denotado por  $1$  ou  $1_A$  tal que

$$a \cdot 1 = 1 \cdot a = a.$$

Para todo  $a \in A$ , então chamamos de **anel com unidade** ou **anel unitário**. O elemento  $1$  é chamado de **unidade** de  $A$  e  $A$  é chamado de **anel com unidade** ou **anel unitário**.

9. **Associatividade:** Se para todos  $a, b, c \in A$ , vale que

$$a \cdot (b \cdot c) = (a \cdot b) \cdot c.$$

Dizemos que  $A$  é um **anel associativo**.

Quando  $A$ , munido de duas operações “+” e “·” é um anel, ele será denotado  $(A, +, \cdot)$ , para indicar claramente as operações binárias em  $A$ .

**Exemplo 6.1.1.** Em

$$M_2(\mathbb{R}) = \left\{ \begin{bmatrix} a & b \\ c & d \end{bmatrix} \mid a, b, c, d \in \mathbb{R} \right\}$$



defina a soma como a soma usual de matrizes e defina o produto do seguinte modo: dados  $A$  e  $B \in M_2(\mathbb{R})$

$$[A, B] = AB - BA,$$

onde  $AB$  denota o produto usual de matrizes. Verifique que  $M_2(\mathbb{R})$  com a soma usual de matrizes e produto  $[,]$  é um anel, mas não é associativo.

**Solução:** De fato,

1.  $A \in M_2(\mathbb{R})$ , existe  $0_2 \in M_2(\mathbb{R})$  tal que  $A + 0_2 = 0_2 + A$ . A saber:

$$0_2 = \begin{bmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 0 \end{bmatrix}$$

2. Para todo  $A \in M_2(\mathbb{R})$  existe  $B \in M_2(\mathbb{R})$  tal que  $A + B = B + A = 0_2$ . A saber:

$$B = \begin{bmatrix} -a & -b \\ -c & -d \end{bmatrix}$$

3.  $(A + B) + C = A + (B + C)$  pois em  $\mathbb{R}$  vale a associatividade

4.  $A + B = B + A$ , pois em  $\mathbb{R}$  a soma é comutativa

5.  $[(A + B), C] = (A + B)C - C(A + B)$   
 $= AC + BC - CA - CB = AC - CA + BC - CB = [A, C] + [B, C]$

6.  $[A, B] = AB - BA, [B, A] = BA - AB \Rightarrow [A, B] = -[B, A]$

$$[[A, B], C] \neq [A, [B, C]]$$

Exemplos:

1.  $(\mathbb{Z}, +, \cdot), (\mathbb{Q}, +, \cdot), (\mathbb{R}, +, \cdot), (\mathbb{C}, +, \cdot), \left(\frac{\mathbb{Z}}{m\mathbb{Z}}\right)$

São anéis associativos, comutativos e com unidade em  $\left(\frac{\mathbb{Z}}{m\mathbb{Z}}\right)$ , o elemento neutro é a classe  $\bar{0}$  e a unidade é a classe  $\bar{1}$ .

2. Seja  $A = \mathbb{Z} = \{f : \mathbb{Z} \rightarrow \mathbb{Z} / f \text{ é função}\}$ . Dadas duas funções quaisquer  $f, g \in \mathbb{Z} \times \mathbb{Z}$ , definimos  $f \oplus g : \mathbb{Z} \rightarrow \mathbb{Z}$  e  $f \odot g : \mathbb{Z} \rightarrow \mathbb{Z}$  como:

$$(f \oplus g)(x) = f(x) + g(x)$$

$$(f \odot g)(x) = f(x)g(x)$$

- (a) Dado  $x \in \mathbb{Z}$

$$(f \oplus g)(x) = f(x) + g(x) = g(x) + f(x) = (g \oplus f)(x), \text{ portanto } f \oplus g = g \oplus f$$

- (b) Dado  $x \in \mathbb{Z}$

$$(f \odot g)(x) = f(x)g(x) = g(x)f(x) = (g \odot f)(x), \text{ portanto } f \odot g = g \odot f$$

- (c) Definida  $0\mathbb{Z} \rightarrow \mathbb{Z}$  como  $0(x) = 0, \forall x \in \mathbb{Z}$ , temos

$$(f(x) \oplus 0)(x) = f(x) \oplus 0(x) = 0(x) \oplus f(x) = f(x)$$

## 6.2 Propriedades de um Anel

1. O elemento neutro é único.

Suponha que exista  $0_1, 0_2 \in A$  tais que

$$a + 0_1 = 0_1 + a = a; \quad b + 0_2 = 0_2 + b = b, \text{ daí } 0_1 = 0_1 + 0_2 = 0_2$$

2. Para cada  $a \in A$  existe um único oposto.

De fato, suponha que existam  $b_1, b_2 \in A$  tais que

$$a + b_1 = 0; \quad a + b_2 = 0. \text{ Daí } b_1 = b_2 + 0 = b_1 + (a + b_2) = (b_1 + a) + b_2 = 0 + b_2 = b_1 = b_2$$

3. Para todo  $a \in A, -(-a) = a$

Dado  $a \in A, -a$  é oposto de  $a$ , isto é,  $a + (-a) = 0$ . Logo o oposto de  $(-a)$  é  $a$ , daí  $-(-a) = a$ .

4. Dados  $a_1, a_2, \dots, a_n \in A, n \leq 2$ , então

$$-(a_1 + a_2 + \dots + a_n) = (-a_1) + (-a_2) + \dots + (-a_n)$$

5. Para todo  $a, x, y \in A$ , se  $a + x = a + y$ , então  $x = y$

6. Para todo  $a \in A$ ,  $a0 = 0a = 0$

Temos  $0 + 0.0 = a0 = a(0 + 0) = a0 + a0$ , daí

$$\underbrace{0.0}_{a0} + 0 = \underbrace{0.0}_{a0} + a0. \text{ Pela propriedade 5 } a0 = 0$$

7. Para todo  $a, b \in A$ , temos  $a(-b) = -ab$

Provemos que  $a(-b) = -ab$

$$a(-b) + ab = a((-b) + b) = a0 = 0, \text{ portanto } -ab = a(-b)$$

8. Para todo  $a, b \in A$ ,  $ab = (-a)(-b)$

## 6.3 Anel de Integridade

### 6.3.0.1 Definição

**Definição 6.2** (Anel de Integridade). *Um anel comutativo  $A$  é um anel de integridade quando para todos  $a, b \in A$ , se  $ab = 0$ , então  $a = 0 \vee b = 0$ . Um anel de integridade também é chamado de domínio de integridade ou simplesmente de domínio.*

Se  $a$  e  $b$  são elementos não nulos de um anel  $A$  tais que  $ab = 0$ , então  $a$  e  $b$  são chamados de divisores próprios de zero.

Exemplos:

1. Os anéis  $\mathbb{Z}, \mathbb{Q}, \mathbb{R}, \mathbb{C}$  são anéis de integridade.

2. Em geral,  $\frac{\mathbb{Z}}{m\mathbb{Z}}$  não é anel de integridade, por exemplo, em  $\frac{\mathbb{Z}}{4\mathbb{Z}}$ ,  $\bar{2} \neq \bar{0}$ , no entanto  $\bar{2} \odot \bar{2} = \bar{4} = \bar{0}$

3.  $M_n(\mathbb{R})$  não é um anel de integridade, por exemplo, em  $M_2(\mathbb{R})$

$$A = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 0 \end{bmatrix} \neq \begin{bmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 0 \end{bmatrix}, B = \begin{bmatrix} 0 & 0 \\ 1 & 0 \end{bmatrix} \neq \begin{bmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 0 \end{bmatrix}$$

$$AB = \begin{bmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 0 \end{bmatrix}$$

Suponha que  $m = nk$ ,  $m > n > 1$  e  $m > k > 1$ . Logo, em  $\frac{\mathbb{Z}}{m\mathbb{Z}}$ ,  $\bar{n} \neq \bar{0}$  e  $\bar{k} \neq \bar{0}$ . Logo, se  $m$  não é primo, então  $\frac{\mathbb{Z}}{m\mathbb{Z}}$  não é um anel de integridade.

Agora, suponha que  $m = p$  primo. Sejam  $\bar{a}, \bar{b} \in \frac{\mathbb{Z}}{m\mathbb{Z}}$  tais que  $\bar{a} \odot \bar{b} = \bar{0}$ , ou seja,  $ab \equiv 0 \pmod{p}$ . Daí  $p|ab$ . Logo  $p|a \vee p|b$ . Portanto,  $\bar{a} = \bar{0} \vee \bar{b} = \bar{0}$ . Assim,  $\frac{\mathbb{Z}}{m\mathbb{Z}}$  é anel de integridade se, e somente se,  $m$  é primo.

**Definição 6.3.** Seja  $(A, +, \cdot)$  um anel. Dizemos que um subconjunto não vazio  $B \subseteq A$  é um **subanel** quando  $(B, +, \cdot)$  é um anel.

Exemplos:

1. Todo anel  $A$  sempre tem dois subanéis:  $\{0_A\}$  e  $A$ , que são chamados de **subanéis triviais**.
2. Em  $(\mathbb{Z}_4, \oplus, \odot)$  o conjunto  $B = \{\bar{0}, \bar{2}\}$  é um subanel.
3. No anel  $\mathbb{Z}$ , o conjunto  $m\mathbb{Z}$ ,  $m > 1$  é um subanel de  $\mathbb{Z}$ .

**Proposição 6.3.1.** Seja  $(A, +, \cdot)$  um anel. Um subconjunto não vazio  $B \subseteq A$  é um subanel de  $A$  se, e somente se,  $x - y \in B$ , e  $x \cdot y \in B$  para todos  $x, y \in B$ .

$(A, +, \cdot), (B, \oplus, \odot)$  Anéis

$$f : A \rightarrow B$$

$$a \rightarrow f(a)$$

$$g : \mathbb{Z} \rightarrow \frac{\mathbb{Z}}{m\mathbb{Z}}$$

$$x \rightarrow \bar{x}$$

$$g(x + y) = \overline{x + y} = \bar{x} \oplus \bar{y} = g(x) \oplus g(y)$$

$$g(xy) = \overline{xy} = \bar{x} \odot \bar{y} = g(x) \odot g(y)$$

$$g(1) = \bar{1}$$

---

## 6.4 Homomorfismo

---

### 6.4.0.1 Definição

**Definição 6.4** (Homomorfismo). *Um homomorfismo do anel  $(A, +, \cdot)$  no anel  $(B, \oplus, \odot)$  é uma função  $f : A \rightarrow B$  que satisfaz:*

1.  $f(x + y) = f(x) + f(y), \forall x, y \in A$
2.  $f(xy) = f(x)f(y), \forall x, y \in A$
3.  $f(1_A) = 1_B$ , onde  $1_A$  é a unidade de  $A$  e  $1_B$  é a unidade de  $B$

Se  $(A, +, \cdot)$  é um anel, então  $f : A \rightarrow A$  dada por  $f(a) = a$  é um homomorfismo de  $A$  em  $A$  pois:

1.  $f(x + y) = x + y = f(x) + f(y)$
2.  $f(xy) = xy = f(x)f(y)$
3.  $f(1_A) = 1_A$

### 6.4.0.2 Propriedades

**Proposição 6.4.1.** *Seja  $f : A \rightarrow B$  homomorfismo do anel  $A$  no anel  $B$ . Então:*

1.  $f(0_A) = 0_B$
2.  $f(-a) = -f(a), \forall a \in A$

**Demonstração:**

1. Da condição 1 da definição de homomorfismo, fazendo  $x = y0_A$ , temos

$$f(0_A + 0_A) = f(0_A) \oplus f(0_A)$$

mas  $0_A + 0_A = 0_A$ . Daí

$$f(0_A) = f(0_A) + f(0_A)$$

Somando  $-f(0_A)$  em ambos os lados

$$f(0_A) \oplus (-f(0_A)) = (f(0_A) + f(0_A)) + (-f(0_A))$$

$$0_B = f(0_A) + 0_B$$

$$f(0_A) = 0_B$$

$$2. \text{ Temos } 0_B = f(0_A) = f(a + (-a)) = f(a) \oplus f(-a)$$

Somando  $-f(a)$  em ambos os lados

$$0_B \oplus (-f(a)) = [f(a) \oplus f(-a)] + (-f(a)) - f(a) = f(-a) \oplus (f(a) \oplus (-f(a)))$$

$$f(-a) = -f(a). \#$$

Seja  $f : \mathbb{Z} \rightarrow \mathbb{Z}$  um homomorfismo. Dado  $n \in \mathbb{Z}, n \geq 0$ . Temos daí,

$$f(n) = f(\underbrace{1 + \dots + 1}_{n \text{ vezes}}) = \underbrace{f(1) + \dots + f(1)}_{n \text{ vezes}} = nf(1) = n1$$

$$f(n) = n, \forall n \in \mathbb{Z}$$

### 6.4.1 Epimorfismo, monomorfismo e isomorfismo

**Definição 6.5** (Epimorfismo, monomorfismo e isomorfismo). *Seja  $f : A \rightarrow B$  um homomorfismo, onde  $A$  e  $B$  são anéis. Dizemos que*

1.  *$f$  é um epimorfismo se  $f$  for sobrejetora*
2.  *$f$  é um monomorfismo se  $f$  for injetora*
3.  *$f$  é um isomorfismo se  $f$  for bijetora*
4. *Quando  $A = B$  e  $f$  é um isomorfismo, então  $f$  é um automorfismo*

---

## 6.5 Ideal de um anel

---

### 6.5.0.1 Definição

**Definição 6.6** (Ideal em um anel). *Seja  $(A, +, \cdot)$  um anel comutativo. Um ideal em  $A$  é um conjunto não vazio  $I$  tal que:*

1. Para todo  $a, b \in I$ , devemos ter  $a - b \in I$ .
2. Para todo  $b \in A$  e todo  $x \in I$ ,  $bx \in I$ .

Quando  $I = A$  ou  $I = \{0_A\}$ ,  $I$  é chamado de anel trivial.

### 6.5.0.2 Propriedades

**Proposição 6.6.1.** *Seja  $A$  um anel comutativo e  $I$  um ideal de  $A$ . Então*

$$0_A \in I$$

**Demonstração:** Temos que da definição de ideal,  $ab \in I$ , para todo  $a, b \in I$ .

Assim, dado  $a \in I$ ,  $a0_A = 0_A \in I$ .#

**Proposição 6.6.2.** *Sejam  $A$  um anel comutativo e unitário e  $I$  um ideal de  $A$ . Se  $1_A \in I$ , então  $I = A$*

**Demonstração:** Como  $I$  é ideal,  $1_A x \in I$ , para todo  $x \in A$ , ou seja,  $x = 1_A x \in I$  para qualquer  $x \in A$ , logo,  $A \subseteq I$ . Como  $I \subseteq A$ , então  $I = A$ .#

ACRESCENTAR PROPRIEDADE  $-a \in I, a - b \in I$ .

Exemplos:

1. Em  $\mathbb{Z}$  todos os ideais não triviais são da forma  $m\mathbb{Z}, m > 1$
2. No anel  $\frac{\mathbb{Z}}{p\mathbb{Z}}$ , onde  $p$  é um número primo, os únicos ideais são os triviais  $\{\bar{0}\}$  e  $\frac{\mathbb{Z}}{p\mathbb{Z}}$ .

**Demonstração:** Seja  $I \subseteq \frac{\mathbb{Z}}{p\mathbb{Z}}$  um ideal,  $I \neq \{\bar{0}\}$ . Provemos que  $I = \frac{\mathbb{Z}}{p\mathbb{Z}}$ . Para isso, vamos provar que  $\bar{1} \in I$ . Seja  $\bar{a} \in I, \bar{a} \neq \bar{0}$ , pois  $I \neq \{\bar{0}\}$ . Mas como  $p$  é primo,  $\text{mdc}(a, p) = 1$ , daí existe  $\bar{b} \in \frac{\mathbb{Z}}{p\mathbb{Z}}, \bar{b} \neq \bar{0}$ , tal que  $\bar{1} = \bar{a}\bar{b}$ . Mas  $I$  é ideal e  $\bar{a} \in I$ , logo  $\bar{1} = \bar{a}\bar{b} \in I$ .

Portanto  $I = \frac{\mathbb{Z}}{p\mathbb{Z}}$ .#

3. Os únicos ideais não triviais de  $\frac{\mathbb{Z}}{8\mathbb{Z}} = \{\bar{0}, \bar{1}, \bar{2}, \bar{3}, \bar{4}, \bar{5}, \bar{6}, \bar{7}\}$  são:

$$I_1 = \{\bar{0}, \bar{2}, \bar{4}, \bar{6}\} \text{ e } I_2 = \{\bar{0}, \bar{4}\}$$

Observação: Num anel  $(A, +, \cdot)$ , a diferença  $a - b$  é definida como

$$a - b = a + (-b), \quad a, b \in A$$

## 6.5.1 Congruência módulo I

### 6.5.1.1 Definição

**Definição 6.7** (Congruência módulo I). *Seja I um ideal de um anel  $(A, +, \cdot)$ . Dizemos que x é congruente a y módulo I quando  $x - y \in I$ . Neste caso, escrevemos  $x \equiv y \pmod{I}$ .*

### 6.5.1.2 Propriedades

**Proposição 6.7.1.** *A congruência Módulo I é uma relação de equivalência em A times A (A anel unitário).*

**Demonstração:** Como  $0 = 0_A \in I$  e para todo  $x \in I$ ,  $x - x = 0 \in I$ , então  $x \equiv x \pmod{I}$ .

Suponha que  $x \equiv y \pmod{I}$ . Então  $x - y \in I$ . Como  $-1 \in A$ ,  $y - x = -(x - y) = -[(x - y)1] = (x - y)(-1) \in I$ , ou seja,  $y \equiv x \pmod{I}$ .

Agora, se  $x \equiv y \pmod{I}$  e  $y \equiv z \pmod{I}$ , então  $x - y \in I$  e  $y - z \in I$ . Daí,  $x - z = (x - y) + (y - z) \in I$ , ou seja,  $x \equiv z \pmod{I}$ .

Logo, é uma relação de equivalência. #

Seja  $y \in A$ . A classe de equivalência módulo I é

$$C(y) = \{x \in A / x \equiv y \pmod{I}\} = \{x \in A / x - y \in I\}$$

Agora,  $x - y \in I$  significa que existe  $t \in I$ , tal que  $x - y = t$ . Logo,  $x = y + t$ , onde  $t \in I$ .

Assim,

$$C(y) = \{y + t, t \in I\} = y + I$$

**Notação 6.7.1** (Congruência Módulo I). *Denotamos por  $y + I$  (ou  $I + y$ ) a classe de equivalência módulo I. Denotamos por  $\frac{A}{I}$  o conjunto de todas as classes de equivalência, tal conjunto é chamado quociente do anel A pelo ideal I.*



Exemplos:

1. A anel e  $I_1 = \{0\}$  e  $I_2 = A$  ideais.

(a)  $\frac{A}{I_1}; a \in A$

$$\bar{C}(a) = a + I_1 = \{a + 0\} = \{a\}$$

$$\frac{A}{I_1} = \{a + I, a \in A\}$$

Tantas classes de equivalência quantos elementos em  $A$

(b)  $\frac{A}{I_2}; a \in A, I_2 = A$

$$\bar{C}(a) = a + I = \{a + t/t \in I_2\}$$

$$\bar{C}(0_A) = 0_A + I = \{0_A + t/t \in I_2\}$$

$$0_A + I = \{t/t \in I_2 = A\}$$

$$\frac{A}{I_2} = \{0_A + I\}$$

Apenas uma classe de equivalência

2. Seja  $A = \mathbb{Z}$ . Sabemos que os ideais de  $\mathbb{Z}$  são da forma  $m\mathbb{Z}, m > 1$ . Seja  $I = m\mathbb{Z}$  um ideal de  $\mathbb{Z}$ . Então

$$x \equiv y \pmod{I} \Leftrightarrow x - y \in I \Leftrightarrow x - y = mk, k \in \mathbb{Z} \Leftrightarrow m|(x - y) \Leftrightarrow x \equiv y \pmod{m}$$

Portanto,  $\frac{\mathbb{Z}}{I} = \frac{\mathbb{Z}}{m\mathbb{Z}}$ .

Agora seja  $I$  ideal e  $A$  anel.

$$\frac{A}{I} \{y + I/y \in A\}$$

$$y + I = \{y + t/t \in I\}$$

Vamos definir uma soma  $\oplus$  e um produto  $\odot$  em  $\frac{A}{I}$  por

$$(x + I) \oplus (y + I) = (x + y) + I$$

$$(x + I) \odot (y + I) = (xy) + I$$

Verifiquemos que a soma e o produto em  $\frac{A}{I}$  não dependem do representante da classe de equivalência. Dados  $x + I, x_1 + I, y + I, y_1 + I \in \frac{A}{I}$  tais que

$$x + I = x_1 + I$$

$$y + I = y_1 + I$$

Então

$$(x + I) \oplus (y + I) = (x + y) + I$$

$$(x_1 + I) \oplus (y_1 + I) = (x_1 + y_1) + I$$

Como  $x + I = x_1 + I$ , então  $x - x_1 \in I$  e como  $y + I = y_1 + I$ , então  $y - y_1 \in I$ . Mas  $I$  é ideal, logo  $(x - x_1) + (y - y_1) = (x + y) - (x_1 + y_1) \in I$ , ou seja

$$(x + I) \oplus (y + I) = (x_1 + I) \oplus (y_1 + I)$$

Agora,

$$(x + I) \odot (y + I) = (xy) + I$$

$$(x_1 + I) \odot (y_1 + I) = (x_1 y_1) + I$$

Como  $(x - x_1)y \in I$  e  $(y - y_1)x_1 \in I$ . Logo,

$$(x - x_1)y + (y - y_1)x_1 \in I$$

$$xy - \underbrace{x_1 y + y x_1}_{=0} - y_1 x_1 \in I$$

$$xy - x_1 y_1 \in I$$

, ou seja,  $xy + I = x_1 y_1 + I$ . Portanto,

$$(x + I) \odot (y + I) = (x_1 + I) \odot (y_1 + I)$$

**Teorema 6.1.** *Seja  $(A, +, \cdot)$  um anel associativo, comutativo e com unidade. Então, se  $I$  é um ideal de  $A$ , o quociente  $\frac{A}{I}$  com as operações  $\oplus$  e  $\odot$  é um anel associativo, comutativo e com unidade. O elemento zero desse anel é a classe  $0_A + I$  e o elemento um de  $\frac{A}{I}$  é  $1_A + I$ .*

---

# CAPÍTULO 7

---

## GRUPOS

---

---

### 7.1 Definição

---

**Definição 7.1.** *Seja  $A$  um conjunto não vazio. Toda função  $f : A \times A \rightarrow A$  é chamada de uma operação binária sobre  $A$ .*

Nas considerações que faremos a seguir uma operação binária  $f$  sobre  $A$  associa a cada par ordenado  $(x, y) \in A \times A$  um elemento  $f(x, y) \in A$  será denotada simplesmente por  $*$ . Assim escreveremos  $f(x, y) = x * y$ . Por exemplo a operação  $*$  :  $\mathbb{N} \times \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N}$  tal que  $x * y = x^y$  está bem definida pois  $x^y \in \mathbb{N}$  sempre que  $x, y \in \mathbb{N}$ . Observe que esta operação não pode ser definida em  $\mathbb{Z}$  pois por exemplo  $2^{-1} \notin \mathbb{Z}$ . Também não pode ser definida em  $\mathbb{Q}$  pois  $2^{1/2} \notin \mathbb{Q}$ .

**Definição 7.2 (Grupo).** *Um grupo  $G$  é um conjunto não vazio munido de uma operação binária  $*$  tal que:*

1. *Para todo  $x, y, z \in G$  temos  $(x * y) * z = x * (y * z)$ . (Associatividade)*
2. *Existe  $e \in G$  tal que  $x * e = e * x = x$  para todo  $x \in G$ . Tal elemento  $e$  é chamado de **elemento neutro** ou **unidade**.*

3. Para cada  $x \in G$ , existe  $x^{-1} \in G$  tal que  $x * x^{-1} = x^{-1} * x = e$ . O elemento  $x^{-1}$  é chamado de *inverso* ou *oposto*<sup>1</sup> de  $x$ .

Denotamos um grupo  $G$ , cuja operação binária é  $*$ , por  $(G, *)$ . Quando  $*$  é a soma, dizemos que  $(G, +)$  é um grupo aditivo. Se  $*$  é a multiplicação, dizemos que  $(G, \cdot)$  é um grupo multiplicativo.

---

## 7.2 Grupo comutativo ou abeliano

---

**Definição 7.3** (Grupo comutativo ou abeliano). Um grupo  $(G, *)$  é chamado de **grupo comutativo** ou **abeliano** quando  $*$  é comutativa, ou seja,

$$x * y = y * x$$

para todo  $x, y \in G$ .

Exemplos:

1.  $(\mathbb{Z}, +)$  é um grupo abeliano.
2.  $(\mathbb{Q}, +)$  é um grupo abeliano.
3.  $(\mathbb{Q}^*, \cdot)$  é um grupo abeliano.
4.  $(\mathbb{R}, +)$  é um grupo abeliano.
5.  $(\mathbb{R}^*, \cdot)$  é um grupo abeliano.
6. Considere o conjunto dos números reais  $\mathbb{R}$  com a operação  $*$  definida por

$$x * y = x + y - 3$$

,  $x, y \in \mathbb{R}$ . Então  $(\mathbb{R}, *)$  é um grupo abeliano.

---

<sup>1</sup> $x^{-1} \neq \frac{1}{x}$

**Solução:** De fato,

$$\begin{aligned}(x * y) * z &= (x + y - 3) * z = (x + y - 3) + z - 3 \\ &= x + (y - 3 + z) - 3 = x + (y + z - 3) - 3 = x * (y + z - 3) \\ &= x * (y * z)\end{aligned}$$

para todo  $x, y, z \in \mathbb{R}$ .

Agora,

$$x * y = x + y - 3 = y + x - 3 = y * x$$

para todo  $x, y \in \mathbb{R}$ . Logo,  $*$  é comutativa.

Para todo  $x \in \mathbb{R}$ , temos  $x * 3 = x + 3 - 3 = x$ . Logo, 3 é o elemento neutro de  $*$ .

Dado  $x \in \mathbb{R}$ , tome  $x^{-1} = 6 - x$ . Assim

$$x * x^{-1} = x + (6 - x) - 3 = 3$$

Logo, para  $x \in \mathbb{R}$  o inverso de  $x$  por  $*$  é  $6 - x$ .

Portanto  $(\mathbb{R}, *)$  é um grupo comutativo.

7.  $\left(\frac{\mathbb{Z}}{m\mathbb{Z}}, \oplus\right)$  é grupo.

8.  $\left(\frac{\mathbb{Z}}{m\mathbb{Z}} - \{\bar{0}\}, \odot\right)$  é grupo?  
 $\frac{\mathbb{Z}}{4\mathbb{Z}} - \{\bar{0}\} = \{\bar{1}, \bar{2}, \bar{3}\} = G$   
 $\bar{2} \in G, \bar{2} \odot \bar{2} = \bar{0} \notin G$

9.  $\left(U\left(\frac{\mathbb{Z}}{m\mathbb{Z}}\right), \odot\right)$  é um grupo.

10. ver [https://en.wikipedia.org/wiki/XOR\\_swap\\_algorithm](https://en.wikipedia.org/wiki/XOR_swap_algorithm)

---

## 7.3 Propriedades Imediatas de um grupo

---

Seja  $(G, *)$  um grupo. É fácil ver que

1. O elemento neutro é único
2. Existe um único inverso para cada  $x \in G$
3. Para todos  $x, y \in G$ ,  $(x * y)^{-1} = y^{-1} * x^{-1}$ . Por indução,  $x_1, x_2, \dots, x_{n-1}, x_n \in G$ ,

$$\begin{aligned} & (x_1 * x_2 * \dots * x_{n-1} * x_n)^{-1} \\ &= x_n^{-1} * x_{n-1}^{-1} * \dots * x_2^{-1} * x_1^{-1} \end{aligned}$$

4. Para todo  $x \in G$ ,  $(x^{-1})^{-1} = x$

---

## 7.4 Ordem de um Grupo

---

**Definição 7.4** (Ordem de um grupo). Quando um grupo  $(G, *)$ ,  $G$  é um conjunto com um número finito de elementos, dizemos que  $G$  é um grupo finito. Denotamos por  $|G|$  o número de elementos de  $G$  que será chamado de ordem de  $G$  ou cardinalidade de  $G$ . Quando  $G$  não é finito, dizemos que  $G$  é um grupo infinito.

Exemplos:

1.  $(\mathbb{Z}_m, +)$  é um grupo finito para todo  $m > 1$ .
2.  $(\mathbb{Z}, +)$  é um grupo infinito.

---

## 7.5 Subgrupo

---

### 7.5.0.1 Definição

**Definição 7.5** (Subgrupo). Seja  $(G, *)$  um grupo. Um subconjunto não vazio  $H \subseteq G$  é um subgrupo se, e somente se,  $(H, *)$  é um grupo.

### 7.5.0.2 Propriedades

**Proposição 7.5.1.** *Um subconjunto não vazio  $H \subseteq G$  é um subgrupo de  $G$  se, e somente se*

1.  $x^{-1} \in H, \forall x \in H$
2.  $x * y \in H, \forall x, y \in H$

**Demonstração:** Se  $H$  é subgrupo, então  $H$  é um grupo. Logo 1 e 2 são satisfeitos.

Agora provemos que se  $H$  satisfaz 1 e 2, então  $H$  é grupo.

Como  $G$  é grupo, então  $*$  é associativo, logo  $*$  é associativo em  $H$ .

De 1,  $\forall x \in H, x^{-1} \in H$ . Mas de 2,  $\forall x, y \in H, x * y \in H$ . Logo, se  $x \in H$ , então  $e = x * x^{-1} \in H$

Novamente por 1, todo elemento de  $H$  possui inverso em  $H$ .

Logo,  $(H, *)$  é um grupo. #

Exemplos:

1. Dado  $(G, *)$  grupo,  $H = \{e\}$  e  $H = G$  são subgrupos de  $G$ , chamados de subgrupos triviais

2.  $(\mathbb{Z}, +)$ ,  $H = m\mathbb{Z}$ ,  $m > 1$

Então  $H$  é subgrupo de  $\mathbb{Z}$

3.  $G = U\left(\frac{\mathbb{Z}}{8\mathbb{Z}}\right) = \{\bar{1}, \bar{3}, \bar{5}, \bar{7}\}$

$(G, \odot)$  é um grupo

$$|G|=4$$

$H_1 = \{\bar{1}, \bar{3}\}$  é subgrupo de  $G$

$H_2 = \{\bar{1}, \bar{5}\}$  é subgrupo de  $G$

$H_3 = \{\bar{1}, \bar{7}\}$  é subgrupo de  $G$

---

## 7.6 Ordem de um subgrupo

---

**Teorema 7.1** (Lagrange). *Seja  $G$  um grupo finito. Se  $H \subseteq G$  é um subgrupo, então  $|H|$  divide  $|G|$ .*

Exemplo: Quais são as possíveis ordens dos subgrupos de um grupo de ordem 48?

Seja  $G$  um grupo tal que  $|G| = 48$ . Se  $H$  é um subgrupo de  $G$ , então  $|H|$  divide  $|G|$   
 $48 = 2^4 \cdot 3$

$$|H| = 2, 3, 2^2, 2^3, 2^4, 2 \cdot 3, 2^2 \cdot 3, 2^3 \cdot 3$$

Observação: O teorema não diz que haverá um subgrupo de ordem  $n$  para todo  $n$  tal que  $n \mid |G|$ . Diz apenas que se  $H$  é subgrupo de  $G$ , então  $|H|$  divide  $|G|$ .

**Corolário 7.1.1.** *Os únicos subgrupos de um grupo de ordem prima são os triviais*

**Demonstração:** Quando  $|G| = p$  primo, temos que os únicos divisores de  $p$  positivos são 1 e  $p$ .

Então, se  $H$  é subgrupo de  $G$ , então  $|H| = 1$  ou  $|H| = p$ .

Portanto,  $H = \{e\}$  ou  $H = G$ .#

## 7.7 Homomorfismos de Grupos

Sejam  $(G, *)$  e  $(H, \Delta)$  grupos quaisquer. Considere uma função  $f : G \rightarrow H$ . Entre todas as possíveis funções entre  $G$  e  $H$  vamos considerar somente aquelas que satisfaçam a condição

$$f(x * y) = f(x) \Delta f(y)$$

para todos  $x, y \in G$ , ou seja, podemos determinar a imagem de  $f(x * y)$  a partir da imagem de  $x$  e de  $y$ ,

**Definição 7.6.** *Dados dois grupos  $(G, *)$  e  $(H, \Delta)$  dizemos que uma função  $f : G \rightarrow H$  é um homomorfismo de grupos se*

$$f(x * y) = f(x) \Delta f(y)$$

para todos  $x, y \in G$ .

**Observação 7.6.1.** *Sejam  $(G, *)$  e  $(H, \Delta)$  grupos e  $f : G \rightarrow H$  um homomorfismo.*

1. Se  $G = H$ , neste caso  $f : G \rightarrow G$  é chamado de um **endomorfismo** de grupos.
2. Se  $f : G \rightarrow H$  é uma função injetora, então dizemos que  $f$  é um **monomorfismo** de grupos.



3. Se  $f : G \rightarrow H$  é uma função sobrejetora, então dizemos que  $f$  é um **epimorfismo** de grupos.
4. Se  $f : G \rightarrow H$  é uma função bijetora, então dizemos que  $f$  é um **isomorfismo** de grupos.
5. Se  $f : G \rightarrow G$  é uma função bijetora, então dizemos que  $f$  é um **automorfismo** de grupos.

**Exemplos 7.6.1.** 1. A função  $f : \mathbb{Z} \rightarrow \mathbb{C}$  dada por  $f(x) = i^x$  é um homomorfismo de  $(\mathbb{Z}, +)$  em  $(\mathbb{C}, \cdot)$ . De fato,

$$f(x + y) = i^{x+y} = i^x \cdot i^y = f(x) \cdot f(y)$$

para todos  $x, y \in \mathbb{Z}$ .

2. A função  $f : \mathbb{R}_+^* \rightarrow \mathbb{R}$  dada por  $f(x) = \ln(x)$  é um homomorfismo de  $(\mathbb{R}_+^*)$  em  $(\mathbb{R}, +)$ . De fato,

$$f(xy) = \ln(xy) = \ln(x) + \ln(y) = f(x) + f(y)$$

para todos  $x, y \in \mathbb{R}_+^*$ . Além disso, como  $\ln(x)$  é uma função bijetora, então  $f$  é um isomorfismo de grupos.

3. Sejam  $m$  um inteiro positivo fixo. A função  $f : \mathbb{Z} \rightarrow \mathbb{Z}_m$  definida por  $f(x) = \bar{x}$  é um homomorfismo de  $(\mathbb{Z}, +)$  em  $(\mathbb{Z}_m, \oplus)$ . De fato,

$$f(x + y) = \overline{x + y} = \bar{x} + \bar{y} = f(x) + f(y).$$

Além disso, esse homomorfismo é sobrejetor.

**Proposição 7.6.1.** Sejam  $(G, *)$  e  $(H, \Delta)$  grupos e  $f : G \rightarrow H$  um homomorfismo. Denote por  $1_G$  e  $1_H$  os elementos neutros de  $G$  e  $H$ , respectivamente.

1.  $f(1_G) = 1_H$
2.  $f(x^{-1}) = (f(x))^{-1}$  para todo  $x \in G$ .

**Proposição 7.6.2.** Sejam  $I$  é um subgrupo de  $G$  e  $f : G \rightarrow H$  um homomorfismo de grupos. Então  $f(I)$  é um subgrupo de  $H$ .

**Prova:** Como  $I$  é um subgrupo de  $G$ , então  $1_G \in G$ . Agora  $f$  é um homomorfismo, logo  $f(1_G) = 1_H \in f(I)$  e assim  $f(I) \neq \emptyset$ .

Agora, dado  $y \in f(I)$  precisamos mostrar que  $y^{-1} \in f(I)$ . Mas se  $y \in f(I)$ , então  $y = f(x)$  com  $x \in I$ . Daí

$$y^{-1} = [f(x)]^{-1} = f(x^{-1})$$

e como  $I$  é um subgrupo de  $G$ ,  $x^{-1} \in I$  e como isso  $y^{-1} \in f(I)$ .

Finalmente, dados  $y, z \in f(I)$  existem  $x_1, x_2 \in I$  tais que  $y = f(x_1)$  e  $z = f(x_2)$ . Mas  $f$  é homomorfismo, daí

$$y \Delta z = f(x_1) \Delta f(x_2) = f(x_1 * x_2)$$

e como  $I$  é subgrupo,  $x_1 * x_2 \in I$ . Logo  $y \Delta z \in f(I)$ .

Portanto  $f(I)$  é um subgrupo de  $H$ . ◇

**Definição 7.7.** Sejam  $(G, *)$  e  $(H, \Delta)$  grupos e  $f : G \rightarrow H$  um homomorfismo de grupos. Chama-se de **núcleo** ou **kernel** de  $f$  e denota-se por  $N(f)$  ou  $\ker(f)$  o seguinte subconjunto de  $G$ :

$$\ker(f) = \{x \in G \mid f(x) = 1_H\}.$$

**Exemplos 7.7.1.** 1. Considere o homomorfismo  $f : \mathbb{Z} \rightarrow \mathbb{C}^*$  dado por  $f(x) = i^x$ . Temos

$$\ker(f) = \{x \in \mathbb{Z} \mid f(x) = 1\} = \{x \in \mathbb{Z} \mid i^x = 1\} = \{0, \pm 4, \pm 8, \dots\} = 4\mathbb{Z}.$$

2. O núcleo do homomorfismo  $f : \mathbb{R}_+^* \rightarrow \mathbb{R}$  dado por  $f(x) = \ln(x)$ . Temos

$$\ker(f) = \{x \in \mathbb{R}_+^* \mid f(x) = 0\} = \{x \in \mathbb{R}_+^* \mid \ln(x) = 0\} = \{1\}.$$

3. O núcleo do homomorfismo  $f : \mathbb{Z} \rightarrow \mathbb{Z}_m$  dado por  $f(x) = \bar{x}$ ,  $m > 0$  fixo. Temos

$$\ker(f) = \{x \in \mathbb{Z} \mid f(x) = \bar{0}\} = \{x \in \mathbb{Z} \mid \bar{x} = \bar{0}\} = \{0, \pm m, \pm 2m, \dots\}.$$

**Proposição 7.7.1.** Sejam  $f : G \rightarrow H$  um homomorfismo de grupos. Então:

1.  $\ker(f)$  é um subgrupo de  $G$ .
2.  $f$  é um monomorfismo se, e somente se,  $\ker(f) = \{1_G\}$ .

**Prova:**

1. Como  $f(1_G) = 1_H$ , então  $1_G \in \ker(f)$  e com isso  $\ker(f) \neq \emptyset$ . Se  $x \in \ker(f)$ , então  $f(x^{-1}) = [f(x)]^{-1} = 1_H^{-1} = 1_H$  e daí  $x^{-1} \in \ker(f)$ . Finalmente se  $x, y \in \ker(f)$ , então  $f(x * y) = f(x) \Delta f(y) = 1_H \Delta 1_H = 1_H$ , ou seja,  $x * y \in \ker(f)$ .

Portanto  $\ker(f)$  é um subgrupo de  $G$ .

2. Suponha que  $f$  é um monomorfismo de grupos. Tome  $x \in \ker(f)$ . Temos  $f(x) = 1_H = f(1_G)$  e como  $f$  é injetora  $x = 1_G$ . Logo  $\ker(f) = \{1_G\}$ .

Agora suponha que  $\ker(f) = \{1_G\}$ . Sejam  $x, y \in G$  tais que

$$f(x) = f(y)$$

$$f(x) \Delta f(y)^{-1} = 1_H$$

$$f(x) \Delta f(y^{-1}) = 1_H$$

$$f(x * y^{-1}) = 1_H$$

e daí  $x * y^{-1} \in \ker(f) = \{1_G\}$ . Logo  $x * y^{-1} = 1_G$ , isto é,  $x = y$ . Portanto  $f$  é injetora.

◇

---

## 7.8 Grupos de Permutação

---

Fazer a parte de  $S_n$ .

---

## 7.9 Grupos Cíclicos

---

Fazer a parte de grupos cíclicos.



---

## BIBLIOGRAFIA

- [1] H.H. Domingues, G.Iezzi: *Álgebra Moderna*, 2ª Ed., Atual, 1982
- [2] S. Shokranian: *Álgebra 1*, Ciência Moderna, 2010
- [3] Adilson Gonçalves: *Introdução à Álgebra*, 5ª Ed., IMPA, 2003
- [4] G. Birkhoff, S. MacLane: *Álgebra Moderna Básica*, 4ª Ed., Guanabara Dois, 1980
- [5] E. A. Filho: *Iniciação à Lógica Matemática*, Nobel, 2002



---

# ÍNDICE REMISSIVO

Ideal, [31](#)

Números inteiros

Conjuntos limitados, [25](#)

Princípio da boa ordenação, [25](#)

Elemento mínimo, [25](#)