

---

# LISTA DE TAREFAS PENDENTES

■ Motivação sobre grupos. . . . .	5
■ Grupos cíclicos . . . . .	20
■ Teorema de Isomorfismos de grupos . . . . .	20
■ Teorema de Cayley . . . . .	20
■ Teorema de Sylow . . . . .	20
■ Grupos livres . . . . .	20
■ Grupos Solúveis . . . . .	21
■ Grupos Nilpotentes . . . . .	21





# ÁLGEBRA

José Antônio O. Freitas

**Curso de Verão  
DMA - UFV 2015**

**Notas de Aula<sup>1</sup>**

---

<sup>1</sup>  Este texto está licenciado sob uma **Licença Creative Commons Atribuição-NãoComercial-CompartilhaIgual 3.0 Brasil** [http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/br/deed.pt\\_BR](http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/br/deed.pt_BR).



Licensed under the Creative Commons Attribution-NonCommercial 3.0 Unported License (the “License”). You may not use this file except in compliance with the License. You may obtain a copy of the License at <http://creativecommons.org/licenses/by-nc/3.0>. Unless required by applicable law or agreed to in writing, software distributed under the License is distributed on an “AS IS” BASIS, WITHOUT WARRANTIES OR CONDITIONS OF ANY KIND, either express or implied. See the License for the specific language governing permissions and limitations under the License.

---

# SUMÁRIO

<b>1 Grupos</b>	<b>5</b>
1.1 Definição e Propriedades . . . . .	5
1.2 Subgrupos . . . . .	9
1.3 Teorema de Lagrange . . . . .	12
1.4 Subgrupos Normais e Grupos Quocientes . . . . .	16
1.5 Homomorfismo de Grupos . . . . .	19
1.6 Exercícios . . . . .	21
<b>Bibliografia</b>	<b>23</b>
<b>Índice Remissivo</b>	<b>25</b>



---

# CAPÍTULO 1

---

## GRUPOS

Texto introdutório

Motivação  
sobre  
grupos.

---

### 1.1 Definição e Propriedades

---

**Definição 1.1.** Um **grupo**  $G$  é um conjunto não vazio munido com uma operação binária  $*$  tal que

- (i) Para todo  $x, y, z \in G$ :  $(x * y) * z = x * (y * z)$ , isto é, a operação  $*$  é associativa.
- (ii) Existe  $e \in G$  tal que  $x * e = e * x = x$  para todo  $x \in G$ . Tal elemento  $e$  é chamado de **elemento neutro** ou **unidade**.
- (iii) Para cada  $x \in G$ , existe  $y \in G$  tal que  $x * y = y * x = e$ . O elemento  $y$  é chamado de **inverso** de  $x$  e é denotado por  $y = x^{-1}$ .

Denotamos um grupo  $G$ , cuja operação binária é  $*$ , por  $(G, *)$ . Quando  $*$  é a soma, dizemos que  $(G, *)$  é um grupo aditivo. Se  $*$  é a multiplicação, dizemos que  $(G, *)$  é um grupo multiplicativo. Caso não haja possibilidade de confusão em relação à operação do grupo, diremos simplesmente que  $G$  é um grupo.

**Observação 1.1.1.** Para simplificar a notação vamos escrever  $x * y = xy$  para  $x$  e  $y$  elementos de um grupo  $(G, *)$ .

**Definição 1.2.** Um grupo  $(G, *)$  é chamado de **grupo comutativo** ou **abeliano** quando a operação  $*$  é comutativa, ou seja,  $x * y = y * x$  para todo  $x, y \in G$ .

**Exemplos 1.1.1.** (1) Grupos aditivos:  $\mathbb{Z}, \mathbb{Q}, \mathbb{R}, \mathbb{C}$ .

(2)  $(M_n(K), +)$  é um grupo abeliano;

(3)  $(GL_n(K), \cdot)$ , onde  $K$  é um corpo e  $GL_n(K)$  denota as matrizes invertíveis com entradas em  $K$ .  $GL_n(K)$  não é um grupo abeliano.

(4) Seja  $X$  um conjunto não vazio. Denote por  $S_X = \{\sigma : X \rightarrow X \mid \sigma \text{ é uma bijeção}\}$ . O conjunto  $S_X$  com a composição de funções é um grupo. No caso em que  $X = \{1, 2, \dots, n\}$ , obtemos  $S_n = \{(1), (12), (13), (23), (123), \dots, (123 \cdots n)\}$  o grupo das permutações em  $n$  elementos. Em geral,  $S_X$  não é abeliano.

(5) Para qualquer inteiro  $n$  seja

$$\mu_n = \{\zeta^k : 0 \leq k \leq n\}$$

onde  $\zeta = e^{2\pi i/n} = \cos(2\pi/n) + i \sin(2\pi/n)$ . Então  $\mu_n$  é um grupo abeliano multiplicativo.

(6) Seja  $X$  um conjunto. Se  $U$  e  $V$  são subconjuntos de  $X$  defina

$$U - V = \{x \in U \mid x \notin V\}.$$

O **grupo Boleano**  $\mathcal{B}(X)$  é a família de todos os subconjuntos de  $X$  munido da **adição simétrica**  $A + B$  onde

$$A + B = (A - B) \cup (B - A).$$

Assim  $\mathcal{B}(X)$  é um grupo comutativo, o elemento neutro é  $\emptyset$  e  $A^{-1} = A$  pois  $A + A = \emptyset$ .

**Lema 1.1.1.** Seja  $(G, *)$  um grupo.

(i) Vale a lei do cancelamento: se  $x * a = x * b$  ou  $a * x = b * x$ , então  $a = b$ .



Figura 1.1: A soma  $A + B$  é representada pela área em azul:



(ii) O elemento neutro é único.

(iii) Existe um único inverso para cada  $x \in G$ .

(iv) Para todos  $x, y \in G$  temos  $(x * y)^{-1} = y^{-1} * x^{-1}$ . Por indução,  $x_1, x_2, \dots, x_{n-1}, x_n \in G$

$$(x_1 * x_2 * \dots * x_{n-1} * x_n)^{-1} = x_n^{-1} * x_{n-1}^{-1} * \dots * x_2^{-1} * x_1^{-1}.$$

(v) Para todo  $x \in G$ ,  $(x^{-1})^{-1} = x$ .

**Definição 1.3.** Se  $G$  é um grupo e se  $a \in G$ , defina as **potências**  $a^n$ , para  $n \geq 1$ , como sendo

$$a^1 = a \quad e \quad a^{n+1} = a^n a.$$

Definimos  $a^0 = 1$  e se  $n$  é um inteiro positivo, definimos

$$a^{-n} = (a^{-1})^n.$$

**Lema 1.1.2.** Se  $G$  é um grupo e  $a, b \in G$ , então  $(ab)^{-1} = b^{-1}a^{-1}$ .

**Lema 1.1.3.** Sejam  $G$  um grupo,  $a, b \in G$  e  $m, n \geq 1$ . Então

$$a^{m+n} = a^m a^n$$

$$(a^m)^n = a^{mn}.$$

Figura 1.2: A associatividade é representada pela área em azul:



**Proposição 1.1.1.** *Sejam  $G$  um grupo,  $a, b \in G$  e  $m, n \in \mathbb{Z}$ .*

- (i) *Se  $a$  e  $b$  comutam, então  $(ab)^n = a^n b^n$ .*
- (ii)  *$(a^m)^n = a^{mn}$*
- (iii)  *$a^m a^n = a^{m+n}$*

**Definição 1.4.** *Seja  $G$  um grupo e  $a \in G$ . Se  $a^k = 1$  para algum  $k \geq 1$ , então o menor expoente  $k \geq 1$  é chamado de **ordem** de  $a$ . Se não existe tal potência, dizemos que  $a$  tem **ordem infinita**.*

**Teorema 1.1.** *Se  $a \in G$  é um elemento de ordem  $n$ , então  $a^m = 1$  se, e somente se,  $n|m$ .*

**Prova:** Suponha que  $a^m = 1$ . Assim pelo Algoritmo da Divisão de Euclides, existem inteiros  $q$  e  $r$  tais que

$$a^m = a^{nq+r}$$

onde  $0 \leq r < n$ . Assim

$$a^r = a^m a^{-nq} = 1.$$

Se  $r > 0$ , obtemos uma contradição com a ordem de  $a$ . Logo  $r = 0$  e portanto  $n|m$ . Agora, se  $n|m$ , então

$$a^m = a^{nq} = 1$$

como queríamos. ◇

**Proposição 1.1.2.** *Se  $G$  é um grupo finito, então todo  $x \in G$  tem ordem finita.*

**Prova:** Seja  $x \in G$ . Considere o conjunto  $\{1, x, x^2, \dots, x^n, \dots\}$ . Como  $G$  é finito, existem inteiros  $m > n$  tais que  $x^m = x^n$ , isto é,  $x^{m-n} = 1$ . Portanto  $x$  tem ordem finita.  $\diamond$

## 1.2 Subgrupos

**Definição 1.5.** *Seja  $(G, \cdot)$ . Um conjunto não vazio  $H$  de  $G$  é um **subgrupo**, que denotaremos por  $H \leq G$ , quando com a operação de  $G$ , o conjunto  $H$  é um grupo, isto é, quando as condições seguintes são satisfeitas:*

- (i)  $h_1 h_2 \in H$  para todos  $h_1, h_2 \in H$ ;
- (ii)  $1 \in H$ ;
- (iii) Se  $x \in H$ , então  $x^{-1} \in H$ .

**Proposição 1.2.1.** *Um subconjunto  $H$  de um grupo  $G$  é um subgrupo se, e somente se,  $H$  é não vazio e para quaisquer  $x, y \in H$  temos  $xy^{-1} \in H$ .*

**Prova:** A ida é imediata. Agora, suponha que  $H$  não é vazio e que  $xy^{-1} \in H$  para todos  $x, y \in H$ . Assim tomando  $x \in H$  temos  $1 = xx^{-1} \in H$ . Se  $y \in H$ , então  $y^{-1} = 1y^{-1} \in H$  e finalmente se  $x$  e  $y \in H$ , então  $xy = x(y^{-1})^{-1} \in H$ . Portanto  $H$  é um subgrupo de  $G$ .  $\diamond$

**Exemplos 1.2.1.** (1) *Se  $G$  é um grupo, então  $\{1\}$  e  $G$  são subgrupos de  $G$  chamados de **trivias**.*

(2)  $(2\mathbb{Z}, +)$  é um subgrupo de  $(\mathbb{Z}, +)$ . De maneira geral, se  $n$  é um inteiro qualquer, então  $(n\mathbb{Z}, +)$  é um subgrupo de  $(\mathbb{Z}, +)$ .

(3) O conjunto  $V = \{(1), (12)(34), (13)(24), (14)(23)\}$  é um subgrupo de  $S_4$ .

(4) *Seja  $G$  um grupo qualquer. Considere o subconjunto*

$$Z(G) = \{x \in G \mid xg = gx \text{ para todo } g \in G\}.$$

*Mostre que  $Z(G) \leq G$ . Este subgrupo  $Z(G)$  é chamado de **centro** de  $G$ . O grupo  $G$  é abeliano se, e só se,  $Z(G) = G$ .*

**Proposição 1.2.2.** *Um conjunto não vazio de um grupo finito  $G$  é um subgrupo de  $G$  se, e somente se,  $H$  é fechado, isto é, se dados  $a$  e  $b \in H$ , então  $ab \in H$ . Em particular, um subconjunto não vazio de  $S_n$  é um subgrupo se, e somente se, é fechado.*

**Prova:** A ida é imediata. Para a volta, como  $G$  é finito todos os seus elementos têm ordem finita. Dado  $x \in H$ , então existe um inteiro  $n$  tal que  $x^n = 1$ . Assim  $1 \in H$ , pois  $H$  é fechado. Além disso,  $x^{-1} = x^{n-1} \in H$ . Finalmente, se  $x$  e  $y \in H$ , então  $xy^{-1} = xy^{m-1} \in H$ , onde  $m$  é um inteiro tal que  $y^m = 1$ . Portanto  $H$  é um subgrupo de  $G$ .  $\diamond$

**Observações 1.2.1.** (1) A Proposição 1.2.2 pode falhar se  $G$  for um grupo infinito. Por exemplo, seja  $G = \mathbb{Z}$  o grupo aditivo dos inteiros. O conjunto  $H = \mathbb{N}$  é fechado, mas não é um subgrupo de  $\mathbb{Z}$ .

(2) Para Galois, 1830, um grupo era simplesmente um conjunto fechado  $H$  de  $S_n$ . Foi A. Cayley, em 1854 o primeiro a definir um grupo abstrato mencionando explicitamente a associatividade, o inverso e elemento neutro.

Vamos fixar algumas notações: se  $H$  e  $K$  são subconjuntos de um grupo  $G$  (em particular, se  $H$  e  $K$  são subgrupos de  $G$ ) definimos

$$HK = \{hk \mid h \in H, k \in K\}$$

$$H^{-1} = \{h^{-1} \mid h \in H\}.$$

Em geral  $HK$  não é um subgrupo de  $G$ , mesmo quando  $H$  e  $K$  o são. (Apresente alguns exemplos!)

Dado um subconjunto não vazio  $S$  de  $G$ , denotamos

$$\langle S \rangle = \{a_1 \dots a_n \mid n \in \mathbb{N}, a_i \in S \text{ ou } a_i \in S^{-1}\}.$$

Quando o conjunto  $S$  for finito, digamos  $S = \{a_1, \dots, a_n\}$  escreveremos

$$\langle \{a_1, \dots, a_n\} \rangle = \langle a_1, \dots, a_n \rangle.$$

Quando  $g \in G$  escrevemos

$$\langle g \rangle = \{\dots, g^{-2}, g^{-1}, 1, g, g^2, \dots\} = \{g^t \mid t \in \mathbb{Z}\}.$$

**Proposição 1.2.3.** *Sejam  $G$  um grupo e  $S$  um subconjunto não vazio de  $G$ . Então o conjunto  $\langle S \rangle$  é um subgrupo de  $G$ .*

**Prova:** Como  $S \neq \emptyset$ , então  $1 \in \langle S \rangle$ . Dados  $x, y \in S$  temos

$$x = a_1 a_2 \dots a_m$$

$$y = b_1 b_2 \dots b_n$$

com  $a_i, b_j \in S$  ou  $a_i, b_j \in S^{-1}$  para todo  $i$  e todo  $j$ . Logo  $y^{-1} = b_n^{-1} \dots b_2^{-1} b_1^{-1}$  para todo  $j$ , daí

$$xy^{-1} = a_1 \dots a_m b_n^{-1} \dots b_2^{-1} b_1^{-1} \in \langle S \rangle.$$

Portanto  $\langle S \rangle$  é um subgrupo de  $G$ . ◇

**Definição 1.6.** *Sejam  $G$  um grupo e  $S$  um subconjunto não vazio de  $G$ . Então  $\langle S \rangle$  é chamado de subgrupo gerado por  $S$ .*

**Definição 1.7.** *Um grupo é **cíclico** quando ele pode ser gerado por um elemento, isto é, quando  $G = \langle g \rangle$  para algum  $g \in G$ .*

**Definição 1.8.** *A **ordem** de um grupo  $G$  é o número de elementos em  $G$ .*

**Proposição 1.2.4.** *Seja  $G$  um grupo finito e seja  $\alpha \in G$ . Então a ordem de  $\alpha$  é igual ao número de elementos em  $\langle \alpha \rangle$ , isto é,*

$$|\alpha| = |\langle \alpha \rangle|.$$

**Prova:** Como  $G$  é finito, existe um menor inteiro  $k \geq 1$  tal que  $1, \alpha, \alpha^2, \dots, \alpha^{k-1}$  são todas as potências distintas de  $\alpha$ , enquanto que em  $1, \alpha, \alpha^2, \dots, \alpha^{k-1}, \alpha^k$  temos repetições de potências. Daí  $\alpha^k = \alpha^i$  para algum  $0 \leq i \leq k-1$ . Se  $i \geq 1$ , então  $\alpha^{k-i} = 1$ , o que contradiz a escolha de  $k$ . Logo  $\alpha^k = \alpha^0 = 1$  e assim  $k$  é a ordem de  $\alpha$ .

Agora seja  $H = \{1, \alpha, \alpha^2, \dots, \alpha^{k-1}\}$ . Então  $|H| = k$ . Seja  $\alpha^i \in \langle \alpha \rangle$ , com  $i \in \mathbb{Z}$ . Pelo Algoritmo da Divisão de Euclides, existem  $q, r \in \mathbb{Z}$  tais que  $i = qk + r$ , com  $0 \leq r < k$ . Assim  $\alpha^i = \alpha^{qk} \alpha^r = \alpha^r \in H$ , isto é,  $\langle \alpha \rangle \subseteq H$ . Como  $H \subseteq \langle \alpha \rangle$  pela definição de  $H$ , então  $H = \langle \alpha \rangle$ . Portanto,

$$|\alpha| = |\langle \alpha \rangle|$$

como queríamos. ◇

**Teorema 1.2.** Se  $G = \langle a \rangle$  é um grupo cíclico de ordem  $n$ , então  $a^k$  é um gerador de  $G$  se, e somente se,  $\text{mdc}(k, n) = 1$ .

**Prova:** Se  $a^k$  é um gerador de  $G$ , então  $a = a^{kt}$  para algum  $t \in \mathbb{Z}$ . Daí  $a^{kt-1} = 1$  e então pelo Teorema 1.1,  $n \mid (kt - 1)$ , isto é,  $nu = kt - 1$  para algum  $u \in \mathbb{Z}$ . Logo,  $\text{mdc}(k, n) = 1$ .

Agora, se  $\text{mdc}(k, n) = 1$ , então existem  $p, q \in \mathbb{Z}$  tais que  $kp + nq = 1$ . Daí

$$a = a^{kp+nq} = a^{nq}(a^k)^p = (a^k)^p$$

e então  $G = \langle a \rangle$ . ◇

**Definição 1.9.** O subgrupo  $\langle \{xyx^{-1}y^{-1} \mid x, y \in G\} \rangle$  é o **subgrupo dos comutadores** do grupo  $G$ . Ele será denotado por  $G'$ . Note que  $G$  é abeliano se, e somente se,  $G' = \{1\}$ .

## 1.3 Teorema de Lagrange

Sejam  $G$  um grupo e  $H$  um subgrupo de  $G$ . Sobre  $G$  defina a relação  $\sim_E$  da seguinte maneira

$$y \sim_E x \text{ se, e somente se, existe } h \in H \text{ tal que } y = xh.$$

É imediato verificar que  $\sim_E$  é uma relação de equivalência. Dado  $x \in G$  a classe de equivalência de  $x$  é o conjunto

$$xH = \{y \in G \mid y \sim_E x\} = \{xh \mid h \in H\}$$

que chamaremos de **classe lateral à esquerda** de  $H$  em  $G$ . Quando não houver chance de confusão, diremos simplesmente classe lateral de  $x$  à esquerda. Observe que  $y \in xH$  se, e só se,  $yH = xH$ .

Analogamente, podemos definir a seguinte relação de equivalência:

$$y \sim_D x \text{ se, e somente se, existe } h \in H \text{ tal que } y = hx.$$

Obtemos assim as **classes laterais à direita** de  $H$  em  $G$ . A classe lateral de  $x$  à direita é dada por

$$Hx = \{y \in G \mid y \sim_D x\} = \{hx \mid h \in H\}.$$

**Definição 1.10.** Dado um grupo  $G$  e  $H$  um subgrupo de  $G$ , o conjunto das classes laterais à esquerda de  $H$  em  $G$  é denotado por

$$\left(\frac{G}{H}\right)_E = \{xH \mid x \in G\}.$$

Analogamente, definimos

$$\left(\frac{G}{H}\right)_D = \{Hy \mid y \in G\}.$$

**Definição 1.11.** A cardinalidade do conjunto das classes laterais à esquerda,  $(G/H)_E$ , é o **índice** de  $H$  em  $G$  e será denotado por  $[G : H]$ .

**Observação 1.3.1.** O índice de  $H$  em  $G$  também é a cardinalidade do conjunto das classes laterais à direita de  $H$  em  $G$ . De fato, é imediato verificar que a aplicação

$$\begin{aligned} \varphi : \left(\frac{G}{H}\right)_E &\rightarrow \left(\frac{G}{H}\right)_D \\ xH &\mapsto Hx^{-1} \end{aligned}$$

está bem definida e é uma bijeção.

**Proposição 1.3.1.** Todas as classes laterais de  $H$  em  $G$  têm a mesma cardinalidade, igual à cardinalidade de  $H$ .

**Prova:** Basta verificar que a aplicação

$$\begin{aligned} \varphi : H &\rightarrow \left(\frac{G}{H}\right)_E \\ x &\mapsto xH \end{aligned}$$

é uma bijeção. ◇

**Teorema 1.3** (Teorema de Lagrange). *Sejam  $G$  um grupo finito e  $H$  um subgrupo de  $G$ . Então*

$$|G| = |H|[G : H],$$

*em particular, a ordem e o índice de  $H$  dividem a ordem de  $G$ .*

**Prova:** Seja  $\{a_1H, a_2H, \dots, a_tH\}$  a família de todas as classes laterais distintas de  $H$  em  $G$ . Então

$$G = a_1H \cup a_2H \cup \dots \cup a_tH$$

e assim

$$|G| = |a_1H| + |a_2H| + \dots + |a_tH|.$$

Mas,  $|H| = |a_iH|$  para todo  $i = 1, \dots, t$ , onde  $t = [G : H]$ . Portanto

$$|G| = |H|[G : H]$$

como queríamos. ◇

**Corolário 1.3.1.** *Sejam  $G$  um grupo finito e  $\alpha \in G$ . Então a ordem de  $\alpha$  divide a ordem de  $G$ .*

**Prova:** Segue da Proposição 1.2.4 pois  $|\alpha| = |\langle \alpha \rangle|$ . ◇

**Corolário 1.3.2.** *Se  $G$  é um grupo finito, então  $a^{|G|} = 1$  para todo  $a \in G$ .*

**Prova:** Se  $a$  possui ordem, então pelo Corolário 1.3.1, devemos ter  $|G| = dm$  para algum  $m \geq 1$ . Logo  $a^{|G|} = a^{dm} = 1$ . ◇

**Corolário 1.3.3.** *Se  $p$  é um número primo, então todo grupo  $G$  de ordem  $p$  é cíclico.*

**Prova:** Se  $a \in G, a \neq 1$ , então  $a$  tem ordem  $d > 1$ , o que é impossível. Logo  $G = \langle a \rangle$ . ◇

**Proposição 1.3.2.** *Seja  $G$  um grupo abeliano.*

(i) *Se  $a, b \in G$  são dois elementos de ordem finita tais que  $\text{mdc}\{|a|, |b|\} = 1$ , então  $|ab| = |a||b|$ .*

(ii) *Se  $r := \sup\{|g| : g \in G\}$  é finito, então  $|x|$  divide  $r$  para cada  $x \in G$ .*

**Prova:**

(i) Sejam  $|a| = m, |b| = n$  e  $z = |ab|$ . Como  $a$  e  $b$  comutam, temos  $(ab)^{mn} = (a^m)^n (b^n)^m = 1$ . Logo  $z$  é um divisor de  $mn$ . Agora,  $(ab)^z = 1$ , daí  $a^z = b^{-z} \in \langle a \rangle \cap \langle b \rangle$ . Mas  $\text{mdc}(m, n) = 1$ , logo  $\langle a \rangle \cap \langle b \rangle = \{1\}$ . Então  $a^z = b^z = 1$  e portanto  $z$  é um múltiplo de  $m$  e de  $n$ . Como  $m$  e  $n$  são relativamente primos,  $z$  é um múltiplo de  $mn$ . Portanto,  $z = mn$  como queríamos.



(ii) Inicialmente vamos provar a seguinte afirmação:

“Se  $a, b \in G$  são dois elementos de ordem finita, então existe  $c \in G$  tal que  $|c| = \text{mmc}\{|a|, |b|\}$ .”

Sejam  $m = |a|$  e  $n = |b|$ . Se  $\text{mdc}(m, n) = 1$ , então pelo item anterior podemos tomar  $c = ab$ . Se  $\text{mdc}(m, n) \neq 1$ , escreva

$$\begin{aligned} m &= p_1^{\alpha_1} \cdots p_k^{\alpha_k} p_{k+1}^{\alpha_{k+1}} \cdots p_t^{\alpha_t} \\ n &= p_1^{\beta_1} \cdots p_k^{\beta_k} p_{k+1}^{\beta_{k+1}} \cdots p_t^{\beta_t} \end{aligned}$$

onde  $0 \leq \alpha_i < \beta_i$  para  $i = 1, \dots, k$ ,  $\alpha_j \geq \beta_j \geq 0$  para  $j = k+1, \dots, t$  e os primos  $p_i$  são todos distintos.

Considere os elementos

$$\begin{aligned} a_1 &= a^{p_1^{\alpha_1} \cdots p_k^{\alpha_k}} \\ b_1 &= b^{p_{k+1}^{\beta_{k+1}} \cdots p_t^{\beta_t}}. \end{aligned}$$

Assim

$$\begin{aligned} |a_1| &= p_{k+1}^{\alpha_{k+1}} \cdots p_t^{\alpha_t} \\ |b_1| &= p_1^{\beta_1} \cdots p_k^{\beta_k}. \end{aligned}$$

e então  $\text{mdc}\{|a_1|, |b_1|\} = 1$  e pelo item anterior basta tomar  $c = a_1 b_1$ . Logo a afirmação está provada.

Para provar o item b), suponha que  $r := \sup\{|g| \mid g \in G\}$  é finito e tome  $y \in G$  tal que  $|y| = r$ . Suponha que existe  $x \in G$  tal que  $|x|$  não divide  $|y|$ . Assim  $s = \text{mdc}\{|x|, |y|\} > r$  e pela afirmação anterior existe  $x \in \langle x, y \rangle \subseteq G$  tal que  $|c| = s > r$ , o que contradiz a definição de  $r$ .

◇

**Proposição 1.3.3.** *Seja  $G$  um grupo e sejam  $K < H < G$ . Então*

$$[G : K] = [G : H][H : K].$$

## 1.4 Subgrupos Normais e Grupos Quocientes

Sejam  $G$  um grupo e  $H$  um subgrupo de  $G$ . Considere o conjunto das classes laterais à esquerda de  $H$  em  $G$ :

$$\left(\frac{G}{H}\right) = \{xH \mid x \in G\}.$$

Queremos definir uma operação em  $G/H$  de modo que este conjunto se torne um grupo. O meio natural de fazer isso é definindo

$$(xH) \cdot (yH) = (xy)H \tag{1.1}$$

onde  $x, y \in G$ . Como uma mesma classe lateral possui vários representantes distintos, precisamos garantir que esta operação está bem definida, isto é, se escolhermos outros representantes das classes  $xH$  e  $yH$  o resultado não se altera. Para isso sejam  $x, y \in G$  e  $h, k \in H$ . Então  $x$  e  $xh$  são representantes da mesma classe  $xH$ ,  $y$  e  $yh$  são representantes da mesma classe  $yH$ . Assim precisamos ter

$$xyH = xhykH,$$

para todos  $x, y \in G$  e para todos  $y, k \in H$ . Isto é, devemos ter

$$\begin{aligned} y^{-1}x^{-1}xyH &= y^{-1}x^{-1}xhykH \\ H &= y^{-1}hyH \end{aligned}$$

para todo  $y \in G$  e  $h \in H$ . Portanto a operação (1.1) está bem definida em  $G/H$  se, e somente se,

$$y^{-1}hy \in H$$

para todo  $y \in G$  e todo  $h \in H$ .

**Proposição 1.4.1.** *Seja  $H$  um subgrupo de um grupo  $G$ . As afirmações seguintes são equivalentes:*

- (i) a operação (1.1) está bem definida;
- (ii)  $g^{-1}Hg \subseteq H$ , para todo  $g \in G$ ;

(iii)  $g^{-1}Hg = H$ , para todo  $g \in G$ ;

(iv)  $gH = Hg$ , para todo  $g \in G$ .

**Prova:** (i)  $\Leftrightarrow$  (ii) Já foi feito.

(iii)  $\Leftrightarrow$  (iv) Imediato.

(iii)  $\Rightarrow$  (ii) Imediato.

(ii)  $\Rightarrow$  (ii) Suponha que  $gHg^{-1} \subseteq H$  para todo  $g \in G$ . Sejam  $h \in H$  e  $g \in G$ . Temos

$$h = g^{-1}(ghg^{-1})g \in g^{-1}(gHg^{-1})g \subseteq g^{-1}Hg,$$

como queríamos. ◇

**Definição 1.12.** Um subgrupo  $H$  é um **subgrupo normal** de  $G$ , e escrevemos  $H \trianglelefteq G$ , se ele satisfaz as afirmações equivalentes da Proposição 1.4.1. Neste caso, como as classes laterais à esquerda de  $H$  são iguais às classes laterais à direita de  $H$ , vamos chamá-las simplesmente de **classes laterais** de  $H$ .

**Exemplos 1.4.1.** (1)  $\{1\}$  e  $G$  são subgrupos normais de  $G$ .

(2)  $Z(G) \trianglelefteq G$ . Mais geralmente, se  $H \leq Z(G)$ , então  $H \trianglelefteq G$ .

(3)  $G' = \{xyx^{-1}y^{-1} \mid x, y \in G\}$  é um subgrupo normal de  $G$ .

(4) Se  $[G : H] = 2$ , então  $H \trianglelefteq G$ .

(5) Se  $G$  é abeliano, então todo subgrupo de  $G$  é normal.

**Teorema 1.4.** Seja  $G$  um grupo e seja  $H$  um subgrupo normal de  $G$ . Então o conjunto das classes laterais, com a operação induzida de  $G$ , é um grupo.

**Definição 1.13.** Sejam  $G$  um grupo e  $H$  um subgrupo normal de  $G$ . O grupo de suas classes laterais, com a operação induzida de  $G$ , é chamado de **grupo quociente** de  $G$  por  $H$  e será denotado por  $\frac{G}{H}$  ou  $G/H$ .

**Proposição 1.4.2.** Se  $G$  é um grupo finito tal que para todo  $g \in G$ ,  $g^2 = 1$ , então  $|G| = 2^k$  para algum  $k \in \mathbb{N}$ .

**Prova:** Como  $g^2 = 1$ , para todo  $g \in G$ , então  $G$  é abeliano e assim todos os seus subgrupos são normais.

Se  $|G| = 1$ , nada há a fazer. Suponha então que o resultado seja válido para todo grupo  $G$  de ordem menor que  $|G| = n > 1$ . Tome  $g \in G$ ,  $g \neq 1$ . Sabemos que  $g^2 = 1$ , assim  $H = \langle g \rangle = \{1, g\}$  e  $H$  é normal em  $G$ . Considere o grupo  $(G/H, \cdot)$ . Um vez que  $x^2 = 1$ , então  $(xH)^2 = x^2H = H$ , isto é, para todo  $xH \in G/H$ , vale que  $(xH)^2 = \bar{1}$ . Além disso,

$$\left| \frac{G}{H} \right| = [G : H] = \frac{n}{2} < n.$$

Logo pela hipótese de indução,  $|G/H| = 2^{k-1} = n/2$ . Portanto,  $|G| = n = (n/2)2 = 2^k$ , como queríamos.  $\diamond$

**Proposição 1.4.3.** *Se  $G$  é um grupo com  $|G| = 2p$ ,  $p$  primo ímpar, então*

$$G = \{1, a, b, b^2, \dots, b^{p-1}, ab, ab^2, \dots, ab^{p-1}\}$$

onde  $|a| = 2$ ,  $|b| = p$  e  $ab = b^i a$  com  $i = 1$  ou  $i = p - 1$ .

**Prova:** Como  $|G| = 2p$ , que é par, existe  $a \in G$ ,  $a \neq 1$  tal que  $a^2 = 1$ , isto é,  $a = a^{-1}$ . Agora, pela Proposição 1.4.2, existe  $c \in G$  tal que  $|c| = p$  ou  $|c| = 2p$ . Se  $|c| = 2p$ , então  $|c^2| = p$ . Logo existe  $b \in G$  tal que  $|b| = p$ . Seja  $H = \langle b \rangle$ . Como  $[G : H] = 2$ , então  $H \trianglelefteq G$ . Assim para  $a \in G$  e  $b \in H$  temos  $aba^{-1} \in H$ . Consequentemente, existe  $1 \leq i \leq p - 1$  tal que  $aba^{-1} = b^i$ . É fácil verificar que  $(aba^{-1})^n = b^{ni}$  para todo  $n$ . Então como  $|a| = 2$

$$b^{i^2} = (aba^{-1})^i = ab^i a^{-1} = b,$$

ou seja,  $b^{i^2} - 1 = 1$ . Mas  $|b| = p$ , daí  $p \mid (i^2 - 1)$ . Logo  $p \mid (i - 1)$  ou  $p \mid (i + 1)$ . Como  $1 \leq i \leq p - 1$ , então  $i = 1$  ou  $i = p - 1$ .

Agora,  $[G : H] = 2$ , então  $G = H \cup aH$  pois  $|a| = 2$ ,  $|b| = p$  e  $p$  é um primo ímpar. Portanto,

$$G = \{1, a, b, b^2, \dots, b^{p-1}, ab, ab^2, \dots, ab^{p-1}\}$$

onde  $ab = b^i a$  com  $i = 1$  ou  $i = p - 1$ .  $\diamond$

**Observação 1.4.1.** *No caso em que  $i = 1$ , obtemos um grupo abeliano cíclico de ordem  $2p$ . E no caso em que  $i = p - 1$ , temos um grupo não abeliano chamado **grupo dihedral** de ordem  $2p$ .*

**Notação 1.13.1.** No caso geral, o grupo  $G$  da Proposição 1.4.3 será denotado por

$$D_{2n} = \langle a, b \mid a^2 = b^n = 1, ab = b^{n-1}a \rangle = \{1, a, b, \dots, b^{n-1}, ab, \dots, ab^{n-1}\}. \quad (1.2)$$

$E$  é chamado de **grupo dihedral** de ordem  $2n$ . Em alguns casos, utiliza-se também a notação  $D_n$  para o grupo (1.2)

**Proposição 1.4.4.** Sejam  $G$  um grupo e  $G'$  seu subgrupo dos comutadores. Então,

- (i)  $G/G'$  é abeliano.
- (ii)  $G'$  é o menor subgrupo normal de  $G$  com esta propriedade, isto é, se  $H \trianglelefteq G$  é tal que  $G/H$  é abeliano, então  $G' \subseteq H$ .

**Proposição 1.4.5.** Sejam  $G$  um grupo e  $Z(G)$  seu centro. Se o quociente  $G/Z(G)$  é cíclico, então  $G = Z(G)$ . Em particular, o índice de  $Z(G)$  em  $G$  nunca é igual a um número primo.

**Prova:** Seja  $\bar{z}$  um gerador de  $G/Z(G)$ . Dado  $g \in G$ , existe  $i \in \mathbb{Z}$  tal que  $\bar{g} = \bar{z}^i$ . Logo  $g = z^i h$  para algum  $h \in Z(G)$ . Sejam  $g_1, g_2 \in G$ , com  $g_1 = z^i h_1$  e  $g_2 = z^j h_2$ , para alguns  $i, j \in \mathbb{Z}$  e  $h_1, h_2 \in H$ . Assim

$$g_1 g_2 = z^i h_1 z^j h_2 = z^{i+j} h_1 h_2 = z^j h_2 z^i h_1 = g_2 g_1.$$

Portanto  $G$  é abeliano, isto é,  $G = Z(G)$  ◇

## 1.5 Homomorfismo de Grupos

**Definição 1.14.** Se  $(G, \cdot)$  e  $(H, *)$  são grupos, então a aplicação  $\phi : G \rightarrow H$  é um **homomorfismo de grupos** se

$$\phi(x \cdot y) = \phi(x) * \phi(y) \quad (1.3)$$

para todos  $x, y \in G$ . Se  $\phi$  também é uma bijeção, então  $\phi$  é chamada de um **isomorfismo**. Os grupos  $G$  e  $H$  são chamados de **isomorfos** e escrevemos  $G \cong H$ , se existe um isomorfismo  $\phi : G \rightarrow H$ .

**Exemplos 1.5.1.** (1)  $Id : G \rightarrow G$  tal que  $Id(g) = g$  é o homomorfismo **identidade**.

- (2)  $e : G \rightarrow H$  tal que  $e(g) = 1_H$  é o homomorfismo **trivial**.
- (3) Seja  $n \in \mathbb{Z}$  fixo. Então  $\phi_n : (\mathbb{Z}, +) \rightarrow (\mathbb{Z}, +)$  tal que  $\phi_n(z) = nz$  é um homomorfismo. De modo geral, se  $G$  é um grupo abeliano, então  $\phi_n : (G, \cdot) \rightarrow (G, \cdot)$  tal que  $\phi_n(g) = g^n$  é um homomorfismo.
- (4) Seja  $H \trianglelefteq G$ , então  $\pi : G \rightarrow G/H$  tal que  $\pi(g) = gH$  é um homomorfismo chamado de **projeção canônica**.
- (5) Seja  $g \in G$  fixo. Então  $\phi_g : G \rightarrow G$  tal que  $\phi_g(x) = gxg^{-1}$  é um isomorfismo.

**Lema 1.5.1.** Seja  $\phi : G \rightarrow H$  um homomorfismo de grupos.

- (i)  $\phi(1_G) = 1_H$
- (ii)  $\phi(g^{-1}) = (\phi(g))^{-1}$
- (iii)  $\phi(g^n) = (\phi(g))^n$  para todo  $n \in \mathbb{Z}$ .

**Prova:** Exercício. ◇

**Lema 1.5.2.** Sejam  $G$  e  $H$  grupos e  $\phi : G \rightarrow H$  um homomorfismo. Então:

- O conjunto  $\ker \phi = \{x \in G \mid \phi(x) = 1_H\}$  é um subgrupo normal de  $G$  chamado de **núcleo** ou **kernel** de  $\phi$ .
- O conjunto  $\text{Im } \phi = \{y \in H \mid y = \phi(x) \text{ para algum } x \in G\}$  é um subgrupo de  $H$  chamado de **imagem** de  $\phi$ .
- Sejam  $\phi : (G, \cdot) \rightarrow (H, *)$  e  $\psi : (H, *) \rightarrow (G, \times)$  dois homomorfismos de grupos. Então a composição  $\psi \circ \phi : (G, \cdot) \rightarrow (G, \times)$  é um homomorfismo.

**Prova:** Exercício. ◇

Grupos cíclicos

Teorema de Isomorfismos de grupos

Teorema de Cayley

Teorema de Sylow

Grupos livres

Grupos Solúveis

Grupos Nilpotentes

---

## 1.6 Exercícios

---

### 1.1 *Testtestsetaestsetse*





---

## BIBLIOGRAFIA

- [1] Garcia, A.; Lequain, Y., *Elementos de Álgebra*, Impa, 2010.
- [2] Gonçalves, A., *Introdução à Álgebra*, Projeto Euclides, Impa, 2006.
- [3] Lang, S., *Algebra*, Boston: Addison-Wesley, 1984.
- [4] Newman, M., *Integral Matrices*, Monographs and Textbooks in Pure and Applied Mathematics, Vol. 45, Academic Press; 1st edition 1972.



---

# ÍNDICE REMISSIVO

Grupos, [5](#)

índice, [13](#)

Abelianos, [6](#)

Associatividade, [5](#)

Centro, [9](#)

classe lateral à direita, [12](#)

classe lateral à esquerda, [12](#)

Cíclicos, [11](#)

Dihedral, [18](#)

Elemento neutro, [5](#)

Inverso, [5](#)

Ordem, [11](#)

Potências de um elemento, [7](#)

Quociente, [17](#)

Triviais, [9](#)

Homomorfismo, [19](#)

Imagem, [20](#)

Isomorfismo, [19](#)

Projeção Canônica, [20](#)

Homomorfismo

Kernel, [20](#)

Ordem

de elemento, [8](#)

Subgrupos, [9](#)

dos comutadores, [12](#)

gerados por um conjunto, [11](#)