

---

# LISTA DE TAREFAS PENDENTES

|                                   |    |
|-----------------------------------|----|
| ■ Motivação sobre grupos. . . . . | 5  |
| ■ Grupos livres . . . . .         | 47 |
| ■ Grupos Solúveis . . . . .       | 47 |
| ■ Grupos Nilpotentes . . . . .    | 47 |





# ÁLGEBRA

José Antônio O. Freitas

**Curso de Verão  
DMA - UFV 2015**

**Notas de Aula<sup>1</sup>**

---

<sup>1</sup>  Este texto está licenciado sob uma **Licença Creative Commons Atribuição-NãoComercial-CompartilhaIgual 3.0 Brasil** [http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/br/deed.pt\\_BR](http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/br/deed.pt_BR).



Licensed under the Creative Commons Attribution-NonCommercial 3.0 Unported License (the “License”). You may not use this file except in compliance with the License. You may obtain a copy of the License at <http://creativecommons.org/licenses/by-nc/3.0>. Unless required by applicable law or agreed to in writing, software distributed under the License is distributed on an “AS IS” BASIS, WITHOUT WARRANTIES OR CONDITIONS OF ANY KIND, either express or implied. See the License for the specific language governing permissions and limitations under the License.

---

# SUMÁRIO

|          |   |           |
|----------|---|-----------|
| <b>1</b> | <b>Grupos</b>                                   | <b>5</b>  |
| 1.1      | Definição e Propriedades . . . . .              | 5         |
| 1.2      | Subgrupos . . . . .                             | 9         |
| 1.3      | Teorema de Lagrange . . . . .                   | 12        |
| 1.4      | Subgrupos Normais e Grupos Quocientes . . . . . | 16        |
| 1.5      | Homomorfismo de Grupos . . . . .                | 19        |
| 1.6      | Classes de Conjugação . . . . .                 | 26        |
| 1.7      | Grupos Cíclicos . . . . .                       | 29        |
| 1.8      | Grupos de Permutações . . . . .                 | 31        |
| 1.9      | Teoremas de Sylow . . . . .                     | 43        |
|          | <b>Bibliografia</b>                             | <b>49</b> |
|          | <b>Índice Remissivo</b>                         | <b>51</b> |



---

# CAPÍTULO 1

---

## GRUPOS

Texto introdutório

Motivação  
sobre  
grupos.

---

### 1.1 Definição e Propriedades

---

**Definição 1.1.** Um **grupo**  $G$  é um conjunto não vazio munido com uma operação binária  $*$  tal que

- (i) Para todo  $x, y, z \in G$ :  $(x * y) * z = x * (y * z)$ , isto é, a operação  $*$  é associativa.
- (ii) Existe  $e \in G$  tal que  $x * e = e * x = x$  para todo  $x \in G$ . Tal elemento  $e$  é chamado de **elemento neutro** ou **unidade**.
- (iii) Para cada  $x \in G$ , existe  $y \in G$  tal que  $x * y = y * x = e$ . O elemento  $y$  é chamado de **inverso** de  $x$  e é denotado por  $y = x^{-1}$ .

Denotamos um grupo  $G$ , cuja operação binária é  $*$ , por  $(G, *)$ . Quando  $*$  é a soma, dizemos que  $(G, *)$  é um grupo aditivo. Se  $*$  é a multiplicação, dizemos que  $(G, *)$  é um grupo multiplicativo. Caso não haja possibilidade de confusão em relação à operação do grupo, diremos simplesmente que  $G$  é um grupo.

**Observação 1.1.1.** Para simplificar a notação vamos escrever  $x * y = xy$  para  $x$  e  $y$  elementos de um grupo  $(G, *)$ .

**Definição 1.2.** Um grupo  $(G, *)$  é chamado de **grupo comutativo** ou **abeliano** quando a operação  $*$  é comutativa, ou seja,  $x * y = y * x$  para todo  $x, y \in G$ .

**Exemplos 1.1.1.** (1) Grupos aditivos:  $\mathbb{Z}, \mathbb{Q}, \mathbb{R}, \mathbb{C}$ .

(2)  $(M_n(K), +)$  é um grupo abeliano;

(3)  $(GL_n(K), \cdot)$ , onde  $K$  é um corpo e  $GL_n(K)$  denota as matrizes invertíveis com entradas em  $K$ .  $GL_n(K)$  não é um grupo abeliano.

(4) Seja  $X$  um conjunto não vazio. Denote por  $S_X = \{\sigma : X \rightarrow X \mid \sigma \text{ é uma bijeção}\}$ . O conjunto  $S_X$  com a composição de funções é um grupo. No caso em que  $X = \{1, 2, \dots, n\}$ , obtemos  $S_n = \{(1), (12), (13), (23), (123), \dots, (123 \cdots n)\}$  o grupo das permutações em  $n$  elementos. Em geral,  $S_X$  não é abeliano.

(5) Para qualquer inteiro  $n$  seja

$$\mu_n = \{\zeta^k : 0 \leq k \leq n\}$$

onde  $\zeta = e^{2\pi i/n} = \cos(2\pi/n) + i \sin(2\pi/n)$ . Então  $\mu_n$  é um grupo abeliano multiplicativo.

(6) Seja  $X$  um conjunto. Se  $U$  e  $V$  são subconjuntos de  $X$  defina

$$U - V = \{x \in U \mid x \notin V\}.$$

O **grupo Boleano**  $\mathcal{B}(X)$  é a família de todos os subconjuntos de  $X$  munido da **adição simétrica**  $A + B$  onde

$$A + B = (A - B) \cup (B - A).$$

Assim  $\mathcal{B}(X)$  é um grupo comutativo, o elemento neutro é  $\emptyset$  e  $A^{-1} = A$  pois  $A + A = \emptyset$ .

**Lema 1.1.1.** Seja  $(G, *)$  um grupo.

(i) Vale a lei do cancelamento: se  $x * a = x * b$  ou  $a * x = b * x$ , então  $a = b$ .



Figura 1.1: A soma  $A + B$  é representada pela área em azul:



(ii) O elemento neutro é único.

(iii) Existe um único inverso para cada  $x \in G$ .

(iv) Para todos  $x, y \in G$  temos  $(x * y)^{-1} = y^{-1} * x^{-1}$ . Por indução,  $x_1, x_2, \dots, x_{n-1}, x_n \in G$

$$(x_1 * x_2 * \dots * x_{n-1} * x_n)^{-1} = x_n^{-1} * x_{n-1}^{-1} * \dots * x_2^{-1} * x_1^{-1}.$$

(v) Para todo  $x \in G$ ,  $(x^{-1})^{-1} = x$ .

**Definição 1.3.** Se  $G$  é um grupo e se  $a \in G$ , defina as **potências**  $a^n$ , para  $n \geq 1$ , como sendo

$$a^1 = a \quad e \quad a^{n+1} = a^n a.$$

Definimos  $a^0 = 1$  e se  $n$  é um inteiro positivo, definimos

$$a^{-n} = (a^{-1})^n.$$


**Lema 1.1.2.** Se  $G$  é um grupo e  $a, b \in G$ , então  $(ab)^{-1} = b^{-1}a^{-1}$ .

**Lema 1.1.3.** Sejam  $G$  um grupo,  $a, b \in G$  e  $m, n \geq 1$ . Então

$$a^{m+n} = a^m a^n$$

$$(a^m)^n = a^{mn}.$$

Figura 1.2: A associatividade é representada pela área em azul:



**Proposição 1.1.1.** *Sejam  $G$  um grupo,  $a, b \in G$  e  $m, n \in \mathbb{Z}$ .*

- (i) *Se  $a$  e  $b$  comutam, então  $(ab)^n = a^n b^n$ .*
- (ii)  *$(a^m)^n = a^{mn}$*
- (iii)  *$a^m a^n = a^{m+n}$*

**Definição 1.4.** *Seja  $G$  um grupo e  $a \in G$ . Se  $a^k = 1$  para algum  $k \geq 1$ , então o menor expoente  $k \geq 1$  é chamado de **ordem** de  $a$ . Se não existe tal potência, dizemos que  $a$  tem **ordem infinita**.*

**Teorema 1.1.** *Se  $a \in G$  é um elemento de ordem  $n$ , então  $a^m = 1$  se, e somente se,  $n|m$ .*

**Prova:** Suponha que  $a^m = 1$ . Assim pelo Algoritmo da Divisão de Euclides, existem inteiros  $q$  e  $r$  tais que

$$a^m = a^{nq+r}$$

onde  $0 \leq r < n$ . Assim

$$a^r = a^m a^{-nq} = 1.$$

Se  $r > 0$ , obtemos uma contradição com a ordem de  $a$ . Logo  $r = 0$  e portanto  $n|m$ . Agora, se  $n|m$ , então

$$a^m = a^{nq} = 1$$

como queríamos. ◇

**Proposição 1.1.2.** *Se  $G$  é um grupo finito, então todo  $x \in G$  tem ordem finita.*

**Prova:** Seja  $x \in G$ . Considere o conjunto  $\{1, x, x^2, \dots, x^n, \dots\}$ . Como  $G$  é finito, existem inteiros  $m > n$  tais que  $x^m = x^n$ , isto é,  $x^{m-n} = 1$ . Portanto  $x$  tem ordem finita.  $\diamond$

## 1.2 Subgrupos

**Definição 1.5.** *Seja  $(G, \cdot)$ . Um conjunto não vazio  $H$  de  $G$  é um **subgrupo**, que denotaremos por  $H \leq G$ , quando com a operação de  $G$ , o conjunto  $H$  é um grupo, isto é, quando as condições seguintes são satisfeitas:*

- (i)  $h_1 h_2 \in H$  para todos  $h_1, h_2 \in H$ ;
- (ii)  $1 \in H$ ;
- (iii) Se  $x \in H$ , então  $x^{-1} \in H$ .

**Proposição 1.2.1.** *Um subconjunto  $H$  de um grupo  $G$  é um subgrupo se, e somente se,  $H$  é não vazio e para quaisquer  $x, y \in H$  temos  $xy^{-1} \in H$ .*

**Prova:** A ida é imediata. Agora, suponha que  $H$  não é vazio e que  $xy^{-1} \in H$  para todos  $x, y \in H$ . Assim tomando  $x \in H$  temos  $1 = xx^{-1} \in H$ . Se  $y \in H$ , então  $y^{-1} = 1y^{-1} \in H$  e finalmente se  $x$  e  $y \in H$ , então  $xy = x(y^{-1})^{-1} \in H$ . Portanto  $H$  é um subgrupo de  $G$ .  $\diamond$

**Exemplos 1.2.1.** (1) *Se  $G$  é um grupo, então  $\{1\}$  e  $G$  são subgrupos de  $G$  chamados de **trivias**.*

(2)  $(2\mathbb{Z}, +)$  é um subgrupo de  $(\mathbb{Z}, +)$ . De maneira geral, se  $n$  é um inteiro qualquer, então  $(n\mathbb{Z}, +)$  é um subgrupo de  $(\mathbb{Z}, +)$ .

(3) O conjunto  $V = \{(1), (12)(34), (13)(24), (14)(23)\}$  é um subgrupo de  $S_4$ .

(4) *Seja  $G$  um grupo qualquer. Considere o subconjunto*

$$Z(G) = \{x \in G \mid xg = gx \text{ para todo } g \in G\}.$$

*Mostre que  $Z(G) \leq G$ . Este subgrupo  $Z(G)$  é chamado de **centro** de  $G$ . O grupo  $G$  é abeliano se, e só se,  $Z(G) = G$ .*

**Proposição 1.2.2.** *Um conjunto não vazio de um grupo finito  $G$  é um subgrupo de  $G$  se, e somente se,  $H$  é fechado, isto é, se dados  $a$  e  $b \in H$ , então  $ab \in H$ . Em particular, um subconjunto não vazio de  $S_n$  é um subgrupo se, e somente se, é fechado.*

**Prova:** A ida é imediata. Para a volta, como  $G$  é finito todos os seus elementos têm ordem finita. Dado  $x \in H$ , então existe um inteiro  $n$  tal que  $x^n = 1$ . Assim  $1 \in H$ , pois  $H$  é fechado. Além disso,  $x^{-1} = x^{n-1} \in H$ . Finalmente, se  $x$  e  $y \in H$ , então  $xy^{-1} = xy^{m-1} \in H$ , onde  $m$  é um inteiro tal que  $y^m = 1$ . Portanto  $H$  é um subgrupo de  $G$ .  $\diamond$

**Observações 1.2.1.** (1) A Proposição 1.2.2 pode falhar se  $G$  for um grupo infinito. Por exemplo, seja  $G = \mathbb{Z}$  o grupo aditivo dos inteiros. O conjunto  $H = \mathbb{N}$  é fechado, mas não é um subgrupo de  $\mathbb{Z}$ .

(2) Para Galois, 1830, um grupo era simplesmente um conjunto fechado  $H$  de  $S_n$ . Foi A. Cayley, em 1854 o primeiro a definir um grupo abstrato mencionando explicitamente a associatividade, o inverso e elemento neutro.

Vamos fixar algumas notações: se  $H$  e  $K$  são subconjuntos de um grupo  $G$  (em particular, se  $H$  e  $K$  são subgrupos de  $G$ ) definimos

$$HK = \{hk \mid h \in H, k \in K\}$$

$$H^{-1} = \{h^{-1} \mid h \in H\}.$$

Em geral  $HK$  não é um subgrupo de  $G$ , mesmo quando  $H$  e  $K$  o são. (Apresente alguns exemplos!)

Dado um subconjunto não vazio  $S$  de  $G$ , denotamos

$$\langle S \rangle = \{a_1 \dots a_n \mid n \in \mathbb{N}, a_i \in S \text{ ou } a_i \in S^{-1}\}.$$

Quando o conjunto  $S$  for finito, digamos  $S = \{a_1, \dots, a_n\}$  escreveremos

$$\langle \{a_1, \dots, a_n\} \rangle = \langle a_1, \dots, a_n \rangle.$$

Quando  $g \in G$  escrevemos

$$\langle g \rangle = \{\dots, g^{-2}, g^{-1}, 1, g, g^2, \dots\} = \{g^t \mid t \in \mathbb{Z}\}.$$

**Proposição 1.2.3.** *Sejam  $G$  um grupo e  $S$  um subconjunto não vazio de  $G$ . Então o conjunto  $\langle S \rangle$  é um subgrupo de  $G$ .*

**Prova:** Como  $S \neq \emptyset$ , então  $1 \in \langle S \rangle$ . Dados  $x, y \in S$  temos

$$x = a_1 a_2 \dots a_m$$

$$y = b_1 b_2 \dots b_n$$

com  $a_i, b_j \in S$  ou  $a_i, b_j \in S^{-1}$  para todo  $i$  e todo  $j$ . Logo  $y^{-1} = b_n^{-1} \dots b_2^{-1} b_1^{-1}$  para todo  $j$ , daí

$$xy^{-1} = a_1 \dots a_m b_n^{-1} \dots b_2^{-1} b_1^{-1} \in \langle S \rangle.$$

Portanto  $\langle S \rangle$  é um subgrupo de  $G$ . ◇

**Definição 1.6.** *Sejam  $G$  um grupo e  $S$  um subconjunto não vazio de  $G$ . Então  $\langle S \rangle$  é chamado de subgrupo gerado por  $S$ .*

**Definição 1.7.** *Um grupo é **cíclico** quando ele pode ser gerado por um elemento, isto é, quando  $G = \langle g \rangle$  para algum  $g \in G$ .*

**Definição 1.8.** *A **ordem** de um grupo  $G$  é o número de elementos em  $G$ .*

**Proposição 1.2.4.** *Seja  $G$  um grupo finito e seja  $\alpha \in G$ . Então a ordem de  $\alpha$  é igual ao número de elementos em  $\langle \alpha \rangle$ , isto é,*

$$|\alpha| = |\langle \alpha \rangle|.$$

**Prova:** Como  $G$  é finito, existe um menor inteiro  $k \geq 1$  tal que  $1, \alpha, \alpha^2, \dots, \alpha^{k-1}$  são todas as potências distintas de  $\alpha$ , enquanto que em  $1, \alpha, \alpha^2, \dots, \alpha^{k-1}, \alpha^k$  temos repetições de potências. Daí  $\alpha^k = \alpha^i$  para algum  $0 \leq i \leq k-1$ . Se  $i \geq 1$ , então  $\alpha^{k-i} = 1$ , o que contradiz a escolha de  $k$ . Logo  $\alpha^k = \alpha^0 = 1$  e assim  $k$  é a ordem de  $\alpha$ .

Agora seja  $H = \{1, \alpha, \alpha^2, \dots, \alpha^{k-1}\}$ . Então  $|H| = k$ . Seja  $\alpha^i \in \langle \alpha \rangle$ , com  $i \in \mathbb{Z}$ . Pelo Algoritmo da Divisão de Euclides, existem  $q, r \in \mathbb{Z}$  tais que  $i = qk + r$ , com  $0 \leq r < k$ . Assim  $\alpha^i = \alpha^{qk} \alpha^r = \alpha^r \in H$ , isto é,  $\langle \alpha \rangle \subseteq H$ . Como  $H \subseteq \langle \alpha \rangle$  pela definição de  $H$ , então  $H = \langle \alpha \rangle$ . Portanto,

$$|\alpha| = |\langle \alpha \rangle|$$

como queríamos. ◇

**Teorema 1.2.** Se  $G = \langle a \rangle$  é um grupo cíclico de ordem  $n$ , então  $a^k$  é um gerador de  $G$  se, e somente se,  $\text{mdc}(k, n) = 1$ .

**Prova:** Se  $a^k$  é um gerador de  $G$ , então  $a = a^{kt}$  para algum  $t \in \mathbb{Z}$ . Daí  $a^{kt-1} = 1$  e então pelo Teorema 1.1,  $n \mid (kt - 1)$ , isto é,  $nu = kt - 1$  para algum  $u \in \mathbb{Z}$ . Logo,  $\text{mdc}(k, n) = 1$ .

Agora, se  $\text{mdc}(k, n) = 1$ , então existem  $p, q \in \mathbb{Z}$  tais que  $kp + nq = 1$ . Daí

$$a = a^{kp+nq} = a^{nq}(a^k)^p = (a^k)^p$$

e então  $G = \langle a \rangle$ . ◇

**Definição 1.9.** O subgrupo  $\langle \{xyx^{-1}y^{-1} \mid x, y \in G\} \rangle$  é o **subgrupo dos comutadores** do grupo  $G$ . Ele será denotado por  $G'$ . Note que  $G$  é abeliano se, e somente se,  $G' = \{1\}$ .

## 1.3 Teorema de Lagrange

Sejam  $G$  um grupo e  $H$  um subgrupo de  $G$ . Sobre  $G$  defina a relação  $\sim_E$  da seguinte maneira

$$y \sim_E x \text{ se, e somente se, existe } h \in H \text{ tal que } y = xh.$$

É imediato verificar que  $\sim_E$  é uma relação de equivalência. Dado  $x \in G$  a classe de equivalência de  $x$  é o conjunto

$$xH = \{y \in G \mid y \sim_E x\} = \{xh \mid h \in H\}$$

que chamaremos de **classe lateral à esquerda** de  $H$  em  $G$ . Quando não houver chance de confusão, diremos simplesmente classe lateral de  $x$  à esquerda. Observe que  $y \in xH$  se, e só se,  $yH = xH$ .

Analogamente, podemos definir a seguinte relação de equivalência:

$$y \sim_D x \text{ se, e somente se, existe } h \in H \text{ tal que } y = hx.$$

Obtemos assim as **classes laterais à direita** de  $H$  em  $G$ . A classe lateral de  $x$  à direita é dada por

$$Hx = \{y \in G \mid y \sim_D x\} = \{hx \mid h \in H\}.$$

**Definição 1.10.** Dado um grupo  $G$  e  $H$  um subgrupo de  $G$ , o conjunto das classes laterais à esquerda de  $H$  em  $G$  é denotado por

$$\left(\frac{G}{H}\right)_E = \{xH \mid x \in G\}.$$

Analogamente, definimos

$$\left(\frac{G}{H}\right)_D = \{Hy \mid y \in G\}.$$

**Definição 1.11.** A cardinalidade do conjunto das classes laterais à esquerda,  $(G/H)_E$ , é o **índice** de  $H$  em  $G$  e será denotado por  $[G : H]$ .

**Observação 1.3.1.** O índice de  $H$  em  $G$  também é a cardinalidade do conjunto das classes laterais à direita de  $H$  em  $G$ . De fato, é imediato verificar que a aplicação

$$\begin{aligned} \varphi : \left(\frac{G}{H}\right)_E &\rightarrow \left(\frac{G}{H}\right)_D \\ xH &\mapsto Hx^{-1} \end{aligned}$$

está bem definida e é uma bijeção.

**Proposição 1.3.1.** Todas as classes laterais de  $H$  em  $G$  têm a mesma cardinalidade, igual à cardinalidade de  $H$ .

**Prova:** Basta verificar que a aplicação

$$\begin{aligned} \varphi : H &\rightarrow \left(\frac{G}{H}\right)_E \\ x &\mapsto xH \end{aligned}$$

é uma bijeção. ◇

**Teorema 1.3** (Teorema de Lagrange). Sejam  $G$  um grupo finito e  $H$  um subgrupo de  $G$ . Então

$$|G| = |H|[G : H],$$

em particular, a ordem e o índice de  $H$  dividem a ordem de  $G$ .

**Prova:** Seja  $\{a_1H, a_2H, \dots, a_tH\}$  a família de todas as classes laterais distintas de  $H$  em  $G$ . Então

$$G = a_1H \cup a_2H \cup \dots \cup a_tH$$

e assim

$$|G| = |a_1H| + |a_2H| + \dots + |a_tH|.$$

Mas,  $|H| = |a_iH|$  para todo  $i = 1, \dots, t$ , onde  $t = [G : H]$ . Portanto

$$|G| = |H|[G : H]$$

como queríamos. ◇

**Corolário 1.3.1.** *Sejam  $G$  um grupo finito e  $\alpha \in G$ . Então a ordem de  $\alpha$  divide a ordem de  $G$ .*

**Prova:** Segue da Proposição 1.2.4 pois  $|\alpha| = |\langle \alpha \rangle|$ . ◇

**Corolário 1.3.2.** *Seja  $G$  um grupo. Se  $K \leq H \leq G$  com  $K \trianglelefteq G$  e  $H \trianglelefteq G$ , então*

$$\frac{G/K}{H/K} \cong \frac{G}{H}.$$

**Prova:** A prova é deixada para o leitor. ◇

**Corolário 1.3.3.** *Se  $G$  é um grupo finito, então  $a^{|G|} = 1$  para todo  $a \in G$ .*

**Prova:** Se  $a$  possui ordem, então pelo Corolário 1.3.1, devemos ter  $|G| = dm$  para algum  $m \geq 1$ . Logo  $a^{|G|} = a^{dm} = 1$ . ◇

**Corolário 1.3.4.** *Se  $p$  é um número primo, então todo grupo  $G$  de ordem  $p$  é cíclico.*

**Prova:** Se  $a \in G$ ,  $a \neq 1$ , então  $a$  tem ordem  $d > 1$ , o que é impossível. Logo  $G = \langle a \rangle$ . ◇

**Proposição 1.3.2.** *Seja  $G$  um grupo abeliano.*

(i) *Se  $a, b \in G$  são dois elementos de ordem finita tais que  $\text{mdc}\{|a|, |b|\} = 1$ , então  $|ab| = |a||b|$ .*

(ii) *Se  $r := \sup\{|g| : g \in G\}$  é finito, então  $|x|$  divide  $r$  para cada  $x \in G$ .*

**Prova:**



(i) Sejam  $|a| = m$ ,  $|b| = n$  e  $z = |ab|$ . Como  $a$  e  $b$  comutam, temos  $(ab)^{mn} = (a^m)^n(b^n)^m = 1$ . Logo  $z$  é um divisor de  $mn$ . Agora,  $(ab)^z = 1$ , daí  $a^z = b^{-z} \in \langle a \rangle \cap \langle b \rangle$ . Mas  $\text{mdc}(m, n) = 1$ , logo  $\langle a \rangle \cap \langle b \rangle = \{1\}$ . Então  $a^z = b^z = 1$  e portanto  $z$  é um múltiplo de  $m$  e de  $n$ . Como  $m$  e  $n$  são relativamente primos,  $z$  é um múltiplo de  $mn$ . Portanto,  $z = mn$  como queríamos.

(ii) Inicialmente vamos provar a seguinte afirmação:

“Se  $a, b \in G$  são dois elementos de ordem finita, então existe  $c \in G$  tal que  $|c| = \text{mmc}\{|a|, |b|\}$ .”

Sejam  $m = |a|$  e  $n = |b|$ . Se  $\text{mdc}(m, n) = 1$ , então pelo item anterior podemos tomar  $c = ab$ . Se  $\text{mdc}(m, n) \neq 1$ , escreva

$$\begin{aligned} m &= p_1^{\alpha_1} \cdots p_k^{\alpha_k} p_{k+1}^{\alpha_{k+1}} \cdots p_t^{\alpha_t} \\ n &= p_1^{\beta_1} \cdots p_k^{\beta_k} p_{k+1}^{\beta_{k+1}} \cdots p_t^{\beta_t} \end{aligned}$$

onde  $0 \leq \alpha_i < \beta_i$  para  $i = 1, \dots, k$ ,  $\alpha_j \geq \beta_j \geq 0$  para  $j = k+1, \dots, t$  e os primos  $p_i$  são todos distintos.

Considere os elementos

$$\begin{aligned} a_1 &= a^{p_1^{\alpha_1} \cdots p_k^{\alpha_k}} \\ b_1 &= b^{p_{k+1}^{\beta_{k+1}} \cdots p_t^{\beta_t}}. \end{aligned}$$

Assim

$$\begin{aligned} |a_1| &= p_{k+1}^{\alpha_{k+1}} \cdots p_t^{\alpha_t} \\ |b_1| &= p_1^{\beta_1} \cdots p_k^{\beta_k}. \end{aligned}$$

e então  $\text{mdc}\{|a_1|, |b_1|\} = 1$  e pelo item anterior basta tomar  $c = a_1 b_1$ . Logo a afirmação está provada.

Para provar o item b), suponha que  $r := \sup\{|g| \mid g \in G\}$  é finito e tome  $y \in G$  tal que  $|y| = r$ . Suponha que existe  $x \in G$  tal que  $|x|$  não divide  $|y|$ . Assim  $s = \text{mdc}\{|x|, |y|\} > r$  e pela afirmação anterior existe  $x \in \langle x, y \rangle \subseteq G$  tal que  $|c| = s > r$ , o que contradiz a definição de  $r$ .

◇

**Proposição 1.3.3.** *Seja  $G$  um grupo e sejam  $K < H < G$ . Então*

$$[G : K] = [G : H][H : K].$$

---

## 1.4 Subgrupos Normais e Grupos Quocientes

---

Sejam  $G$  um grupo e  $H$  um subgrupo de  $G$ . Considere o conjunto das classes laterais à esquerda de  $H$  em  $G$ :

$$\left(\frac{G}{H}\right) = \{xH \mid x \in G\}.$$

Queremos definir uma operação em  $G/H$  de modo que este conjunto se torne um grupo. O meio natural de fazer isso é definindo

$$(xH) \cdot (yH) = (xy)H \tag{1.1}$$

onde  $x, y \in G$ . Como uma mesma classe lateral possui vários representantes distintos, precisamos garantir que esta operação está bem definida, isto é, se escolhermos outros representantes das classes  $xH$  e  $yH$  o resultado não se altera. Para isso sejam  $x, y \in G$  e  $h, k \in H$ . Então  $x$  e  $xh$  são representantes da mesma classe  $xH$ ,  $y$  e  $yh$  são representantes da mesma classe  $yH$ . Assim precisamos ter

$$xyH = xhykH,$$

para todos  $x, y \in G$  e para todos  $h, k \in H$ . Isto é, devemos ter

$$y^{-1}x^{-1}xyH = y^{-1}x^{-1}xhykH$$

$$H = y^{-1}hyH$$

para todo  $y \in G$  e  $h \in H$ . Portanto a operação (1.1) está bem definida em  $G/H$  se, e somente se,

$$y^{-1}hy \in H$$

para todo  $y \in G$  e todo  $h \in H$ .

**Proposição 1.4.1.** *Seja  $H$  um subgrupo de um grupo  $G$ . As afirmações seguintes são equivalentes:*

- (i) a operação (1.1) está bem definida;
- (ii)  $g^{-1}Hg \subseteq H$ , para todo  $g \in G$ ;
- (iii)  $g^{-1}Hg = H$ , para todo  $g \in G$ ;
- (iv)  $gH = Hg$ , para todo  $g \in G$ .

**Prova:** (i)  $\Leftrightarrow$  (ii) Já foi feito.

(iii)  $\Leftrightarrow$  (iv) Imediato.

(iii)  $\Rightarrow$  (ii) Imediato.

(ii)  $\Rightarrow$  (iv) Suponha que  $gHg^{-1} \subseteq H$  para todo  $g \in G$ . Sejam  $h \in H$  e  $g \in G$ . Temos

$$h = g^{-1}(ghg^{-1})g \in g^{-1}(gHg^{-1})g \subseteq g^{-1}Hg,$$

como queríamos. ◇

**Definição 1.12.** Um subgrupo  $H$  é um **subgrupo normal** de  $G$ , e escrevemos  $H \trianglelefteq G$ , se ele satisfaz as afirmações equivalentes da Proposição 1.4.1. Neste caso, como as classes laterais à esquerda de  $H$  são iguais às classes laterais à direita de  $H$ , vamos chamá-las simplesmente de **classes laterais** de  $H$ .

**Exemplos 1.4.1.** (1)  $\{1\}$  e  $G$  são subgrupos normais de  $G$ .

(2)  $Z(G) \trianglelefteq G$ . Mais geralmente, se  $H \leq Z(G)$ , então  $H \trianglelefteq G$ .

(3)  $G' = \{xyx^{-1}y^{-1} \mid x, y \in G\}$  é um subgrupo normal de  $G$ .

(4) Se  $[G : H] = 2$ , então  $H \trianglelefteq G$ .

(5) Se  $G$  é abeliano, então todo subgrupo de  $G$  é normal.

**Teorema 1.4.** *Seja  $G$  um grupo e seja  $H$  um subgrupo normal de  $G$ . Então o conjunto das classes laterais, com a operação induzida de  $G$ , é um grupo.*

**Definição 1.13.** Sejam  $G$  um grupo e  $H$  um subgrupo normal de  $G$ . O grupo de suas classes laterais, com a operação induzida de  $G$ , é chamado de **grupo quociente** de  $G$  por  $H$  e será denotado por  $\frac{G}{H}$  ou  $G/H$ .

**Proposição 1.4.2.** Se  $G$  é um grupo finito tal que para todo  $g \in G$ ,  $g^2 = 1$ , então  $|G| = 2^k$  para algum  $k \in \mathbb{N}$ .

**Prova:** Como  $g^2 = 1$ , para todo  $g \in G$ , então  $G$  é abeliano e assim todos os seus subgrupos são normais.

Se  $|G| = 1$ , nada há a fazer. Suponha então que o resultado seja válido para todo grupo  $G$  de ordem menor que  $|G| = n > 1$ . Tome  $g \in G$ ,  $g \neq 1$ . Sabemos que  $g^2 = 1$ , assim  $H = \langle g \rangle = \{1, g\}$  e  $H$  é normal em  $G$ . Considere o grupo  $(G/H, \cdot)$ . Um vez que  $x^2 = 1$ , então  $(xH)^2 = x^2H = H$ , isto é, para todo  $xH \in G/H$ , vale que  $(xH)^2 = \bar{1}$ . Além disso,

$$\left| \frac{G}{H} \right| = [G : H] = \frac{n}{2} < n.$$

Logo pela hipótese de indução,  $|G/H| = 2^{k-1} = n/2$ . Portanto,  $|G| = n = (n/2)2 = 2^k$ , como queríamos.  $\diamond$

**Proposição 1.4.3.** Se  $G$  é um grupo com  $|G| = 2p$ ,  $p$  primo ímpar, então

$$G = \{1, a, b, b^2, \dots, b^{p-1}, ab, ab^2, \dots, ab^{p-1}\}$$

onde  $|a| = 2$ ,  $|b| = p$  e  $ab = b^i a$  com  $i = 1$  ou  $i = p - 1$ .

**Prova:** Como  $|G| = 2p$ , que é par, existe  $a \in G$ ,  $a \neq 1$  tal que  $a^2 = 1$ , isto é,  $a = a^{-1}$ . Agora, pela Proposição 1.4.2, existe  $c \in G$  tal que  $|c| = p$  ou  $|c| = 2p$ . Se  $|c| = 2p$ , então  $|c^2| = p$ . Logo existe  $b \in G$  tal que  $|b| = p$ . Seja  $H = \langle b \rangle$ . Como  $[G : H] = 2$ , então  $H \trianglelefteq G$ . Assim para  $a \in G$  e  $b \in H$  temos  $aba^{-1} \in H$ . Consequentemente, existe  $1 \leq i \leq p - 1$  tal que  $aba^{-1} = b^i$ . É fácil verificar que  $(aba^{-1})^n = b^{ni}$  para todo  $n$ . Então como  $|a| = 2$

$$b^{i^2} = (aba^{-1})^i = ab^i a^{-1} = b,$$

ou seja,  $b^{i^2} - 1 = 1$ . Mas  $|b| = p$ , daí  $p|(i^2 - 1)$ . Logo  $p|(i - 1)$  ou  $p|(i + 1)$ . Como  $1 \leq i \leq p - 1$ , então  $i = 1$  ou  $i = p - 1$ .

Agora,  $[G : H] = 2$ , então  $G = H \cup aH$  pois  $|a| = 2$ ,  $|b| = p$  e  $p$  é um primo ímpar. Portanto,

$$G = \{1, a, b, b^2, \dots, b^{p-1}, ab, ab^2, \dots, ab^{p-1}\}$$

onde  $ab = b^i a$  com  $i = 1$  ou  $i = p - 1$ .  $\diamond$

**Observação 1.4.1.** No caso em que  $i = 1$ , obtemos um grupo abeliano cíclico de ordem  $2p$ . E no caso em que  $i = p - 1$ , temos um grupo não abeliano chamado **grupo dihedral** de ordem  $2p$ .

**Notação 1.13.1.** No caso geral, o grupo  $G$  da Proposição 1.4.3 será denotado por

$$D_{2n} = \langle a, b \mid a^2 = b^n = 1, ab = b^{n-1}a \rangle = \{1, a, b, \dots, b^{n-1}, ab, \dots, ab^{n-1}\}. \quad (1.2)$$

$E$  é chamado de **grupo dihedral** de ordem  $2n$ . Em alguns casos, utiliza-se também a notação  $D_n$  para o grupo (1.2)

**Proposição 1.4.4.** Sejam  $G$  um grupo e  $G'$  seu subgrupo dos comutadores. Então,

- (i)  $G/G'$  é abeliano.
- (ii)  $G'$  é o menor subgrupo normal de  $G$  com esta propriedade, isto é, se  $H \trianglelefteq G$  é tal que  $G/H$  é abeliano, então  $G' \subseteq H$ .

**Proposição 1.4.5.** Sejam  $G$  um grupo e  $Z(G)$  seu centro. Se o quociente  $G/Z(G)$  é cíclico, então  $G = Z(G)$ . Em particular, o índice de  $Z(G)$  em  $G$  nunca é igual a um número primo.

**Prova:** Seja  $\bar{z}$  um gerador de  $G/Z(G)$ . Dado  $g \in G$ , existe  $i \in \mathbb{Z}$  tal que  $\bar{g} = \bar{z}^i$ . Logo  $g = z^i h$  para algum  $h \in Z(G)$ . Sejam  $g_1, g_2 \in G$ , com  $g_1 = z^i h_1$  e  $g_2 = z^j h_2$ , para alguns  $i, j \in \mathbb{Z}$  e  $h_1, h_2 \in H$ . Assim

$$g_1 g_2 = z^i h_1 z^j h_2 = z^{i+j} h_1 h_2 = z^j h_2 z^i h_1 = g_2 g_1.$$

Portanto  $G$  é abeliano, isto é,  $G = Z(G)$   $\diamond$

## 1.5 Homomorfismo de Grupos

**Definição 1.14.** Se  $(G, \cdot)$  e  $(H, *)$  são grupos, então a aplicação  $\phi : G \rightarrow H$  é um **homomorfismo de grupos** se

$$\phi(x \cdot y) = \phi(x) * \phi(y) \quad (1.3)$$

para todos  $x, y \in G$ . Se  $\phi$  também é uma bijeção, então  $\phi$  é chamada de um **isomorfismo**. Os grupos  $G$  e  $H$  são chamados de **isomorfos** e escrevemos  $G \cong H$ , se existe um isomorfismo  $\phi : G \rightarrow H$ .

**Exemplos 1.5.1.** (1)  $\text{Id} : G \rightarrow G$  tal que  $\text{Id}(g) = g$  é o homomorfismo **identidade**.

(2)  $e : G \rightarrow H$  tal que  $e(g) = 1_H$  é o homomorfismo **trivial**.

(3) Seja  $n \in \mathbb{Z}$  fixo. Então  $\phi_n : (\mathbb{Z}, +) \rightarrow (\mathbb{Z}, +)$  tal que  $\phi_n(z) = nz$  é um homomorfismo. De modo geral, se  $G$  é um grupo abeliano, então  $\phi_n : (G, \cdot) \rightarrow (G, \cdot)$  tal que  $\phi_n(g) = g^n$  é um homomorfismo.

(4) Seja  $H \trianglelefteq G$ , então  $\pi : G \rightarrow G/H$  tal que  $\pi(g) = gH$  é um homomorfismo chamado de **projeção canônica**.

(5) Seja  $g \in G$  fixo. Então  $\phi_g : G \rightarrow G$  tal que  $\phi_g(x) = gxg^{-1}$  é um isomorfismo.

**Lema 1.5.1.** Seja  $\phi : G \rightarrow H$  um homomorfismo de grupos.

(i)  $\phi(1_G) = 1_H$

(ii)  $\phi(g^{-1}) = (\phi(g))^{-1}$

(iii)  $\phi(g^n) = (\phi(g))^n$  para todo  $n \in \mathbb{Z}$ .

**Prova:** Exercício. ◇

**Lema 1.5.2.** Sejam  $G$  e  $H$  grupos e  $\phi : G \rightarrow H$  um homomorfismo. Então:

(i) O conjunto  $\ker \phi = \{x \in G \mid \phi(x) = 1_H\}$  é um subgrupo normal de  $G$  chamado de **núcleo** ou **kernel** de  $\phi$ .

(ii) O conjunto  $\text{Im } \phi = \{y \in H \mid y = \phi(x) \text{ para algum } x \in G\}$  é um subgrupo de  $H$  chamado de **imagem** de  $\phi$ .

(iii) Sejam  $\phi : (G, \cdot) \rightarrow (H, *)$  e  $\psi : (H, *) \rightarrow (G, \times)$  dois homomorfismos de grupos. Então a composição  $\psi \circ \phi : (G, \cdot) \rightarrow (G, \times)$  é um homomorfismo.

**Prova:** Exercício. ◇

**Lema 1.5.3.** *Seja  $\phi : G \rightarrow H$  um homomorfismo de grupos.*

(i) *Se  $P \leq G$ , então  $\phi(P) \leq H$  e  $\phi^{-1}(\phi(P)) = P \ker \phi$ .*

(ii) *Se  $R \leq H$ , então  $\phi^{-1}(R)$  é um subgrupo de  $G$  contendo  $\ker \phi$  e  $\phi(\phi^{-1}(R)) = R \cap \text{Im } \phi$ .*

**Prova:**

(i) A prova de que  $\phi(P)$  é um subgrupo de  $H$  é deixada para o leitor. Provemos que  $\phi^{-1}(\phi(P)) = P \ker \phi$ . Seja  $xk \in P$ . Temos

$$\phi(xk) = \phi(x)\phi(k) = \phi(x) \in \phi(P)$$

daí  $P \ker \phi \subseteq \phi^{-1}(\phi(P))$ . Agora, seja  $y \in \phi^{-1}(\phi(P))$ . Por definição,  $\phi(y) \in \phi(P)$  e assim existe  $x \in P$  tal que  $\phi(x) = \phi(y)$ . Isto é,  $\phi(x^{-1}y) = 1_H$ , donde  $x^{-1}y \in \ker \phi$ . Logo  $y = x(x^{-1}y) \in P \ker \phi$ . Portanto,  $\phi^{-1}(\phi(P)) = P \ker \phi$ .

(ii) Como  $R \leq H$ , então  $1_H \in R$  e como  $\phi(x) = 1_H$  para todo  $x \in \ker \phi$ , então  $\ker \phi \subseteq \phi^{-1}(R)$ . Fica a cargo do leitor provar que  $\phi^{-1}(R)$  é um subgrupo de  $G$ . Provemos que  $\phi(\phi^{-1}(R)) = R \cap \text{Im } \phi$ .

A inclusão  $\phi(\phi^{-1}(R)) \subseteq R \cap \text{Im } \phi$  é imediata. Agora, seja  $y \in R \cap \text{Im } \phi$ . Assim existe  $x \in G$  tal que  $\phi(x) = y$ . Mas  $y \in R$ , daí  $x \in \phi^{-1}(R)$  e então  $y = \phi(x) \in \phi(\phi^{-1}(R))$ . Portanto,  $\phi(\phi^{-1}(R)) = R \cap \text{Im } \phi$ .

◇

**Exemplos 1.5.2.** (1) O grupo dihedral  $D_6$  é dado por

$$D_6 = \langle a, b \mid a^2 = b^3 = 1, ab = b^2a \rangle.$$

Agora,  $S_3 = \{id, \alpha, \beta, \beta^2, \alpha\beta, \alpha\beta^2\}$  onde

$$\alpha = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 2 & 1 & 3 \end{pmatrix}, \quad \beta = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 2 & 3 & 1 \end{pmatrix}, \quad id = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 1 & 2 & 3 \end{pmatrix}.$$

A aplicação  $\phi : S_3 \rightarrow D_6$  tal que

$$\phi(id) = 1$$

$$\phi(\alpha) = a$$

$$\phi(\beta) = b$$

$$\phi(\alpha\beta) = ab$$

$$\phi(\alpha\beta^2) = ab^2$$

é um homomorfismo bijetor. Portanto  $S_3 \cong D_6$ .

(2) Seja  $G = \langle a \rangle = \{\dots, a^{-1}, 1, a, a^2, \dots\}$  um grupo cíclico infinito. É fácil verificar que  $\phi : (\mathbb{Z}, +) \rightarrow (G, \cdot)$  dada por  $\phi(t) = a^t$  é um isomorfismo. Portanto  $\mathbb{Z} \cong G$ .

**Teorema 1.5** (Teorema do Isomorfismo). *Seja  $\phi : (G, \cdot) \rightarrow (H, *)$  um homomorfismo de grupos.*

(i) A função

$$\bar{\phi} : \frac{G}{\ker \phi} \rightarrow \phi(G)$$

$$a \ker \phi \mapsto \phi(a)$$

é um isomorfismo.

(ii) As seguintes funções

$$\{\text{subgrupos de } G \text{ que contêm } \ker \phi\} \longleftrightarrow \{\text{subgrupos de } \phi(G)\}$$

$$P \xrightarrow{\psi} \phi(P)$$

$$\phi^{-1}(R) \xleftarrow{\sigma} R$$

são bijeções, inversas uma da outra. Além disso, estas bijeções levam subgrupos normais em subgrupos normais, isto é,

(a) Se  $P \trianglelefteq G$ , então  $\phi(P) \trianglelefteq \phi(G)$ .

(b) Se  $R \trianglelefteq \phi(G)$ , então  $\phi^{-1}(R) \trianglelefteq G$ .

**Prova:**



- (i) Inicialmente precisamos verificar que  $\bar{\phi}$  está bem definida. Para isso sejam  $a_1 \ker \phi = a_2 \ker \phi$ . Assim  $a_1 = a_2 k$ , onde  $k \in \ker \phi$ . Então

$$\phi(a_1) = \phi(a_2 k) = \phi(a_2),$$

logo  $\bar{\phi}(a_1 \ker \phi) = \bar{\phi}(a_2 \ker \phi)$  e então  $\bar{\phi}$  está bem definida. Além disso, da definição de  $\bar{\phi}$  vemos que esta aplicação é sobrejetora.

Agora, sejam  $a_1 \ker \phi, a_2 \ker \phi \in \ker \phi$ . Então

$$\bar{\phi}((a_1 \ker \phi)(a_2 \ker \phi)) = \bar{\phi}((a_1 a_2) \ker \phi) = \phi(a_1 a_2) = \phi(a_1)\phi(a_2) = \bar{\phi}(a_1 \ker \phi)\bar{\phi}(a_2 \ker \phi)$$

e daí  $\bar{\phi}$  é um homomorfismo. Finalmente, se  $a \ker \phi \in \ker \bar{\phi}$  então

$$\bar{\phi}(a \ker \phi) = \bar{\phi}(1_G \ker \phi)$$

daí  $\phi(g) = \phi(1_G) = 1_H$ , ou seja,  $g \in \ker \phi$ . Portanto  $\ker \bar{\phi} = \{\ker \phi\}$  e então  $\bar{\phi}$  é injetora. Portanto  $\bar{\phi}$  é um isomorfismo de grupos. Logo

$$\frac{G}{\ker \phi} \cong \phi(G).$$

- (ii) Pelo Lema 1.5.3 sabemos que  $\phi^{-1}(\phi(P)) = P \ker \phi$  para todo  $P \leq G$  e que  $\phi(\phi^{-1}(R)) = R \cap \phi(G)$  para todo  $R \leq H$ . Assim se  $\ker \phi \subseteq P$ , então  $\phi^{-1}(\phi(P)) = P$  e se  $R \leq \phi(G)$ , então  $\phi(\phi^{-1}(R)) = R$ . Logo as funções  $\psi$  e  $\sigma$  são inversas uma da outra, isto é, são bijeções.

Agora falta provar os demais itens:

- (a) Sejam  $a \in \phi(P)$  e  $b \in \phi(G)$ . Então existem  $x \in P$  e  $y \in G$  tais que  $\phi(x) = a$  e  $\phi(y) = b$ . Queremos mostrar que  $b^{-1}ab \in \phi(P)$ . De fato,

$$b^{-1}ab = \phi(y^{-1})\phi(x)\phi(y) = \phi(y^{-1}xy) \in \phi(P)$$

pois  $P \trianglelefteq G$ . Portanto,  $\phi(P) \trianglelefteq \phi(G)$ .

- (b) Dados  $a \in G$  e  $x \in \phi^{-1}(R)$ , queremos mostrar que  $a^{-1}xa \in \phi^{-1}(R)$ . Temos

$$\phi(a^{-1}xa) = \phi(a)^{-1}\phi(x)\phi(a) \in R$$

pois  $R \trianglelefteq \phi(G)$ . Logo  $a^{-1}xa \in \phi^{-1}(R)$ , isto é,  $\phi^{-1}(R) \trianglelefteq G$ , como queríamos.

◇

**Corolário 1.5.1.** *Seja  $\phi : G \rightarrow H$  um homomorfismo de grupos e seja  $K \leq G$ . Então a função*

$$\begin{aligned} \psi : \frac{K}{K \cap \ker \phi} &\rightarrow \phi(K) \\ a(K \cap \ker \phi) &\mapsto \phi(a) \end{aligned}$$

*é um isomorfismo.*

**Prova:** Considere o homomorfismo  $\phi$  restrito a  $K$ ;

$$\begin{aligned} \psi &:= \phi|_K : K \rightarrow H \\ h &\mapsto \phi(h). \end{aligned}$$

É imediato verificar que  $\psi(K) = \phi(K)$  e que  $\ker \psi = \ker \phi$ . Logo pelo Teorema do Isomorfismo, Teorema 1.5, temos  $K/\ker \psi \cong \psi(K)$ , isto é,

$$\frac{K}{K \cap \ker \phi} \cong \phi(K).$$

◇

**Corolário 1.5.2.** *Seja  $H$  um subgrupo normal de  $G$ . Então a função*

$$\{\text{subgrupos (normais) de } G \text{ que contêm } H\} \longleftrightarrow \{\text{subgrupos (normais) de } G/H\}.$$

*é uma bijeção.*

**Prova:** É fácil verificar que  $\phi : G \rightarrow G/H$  dada por  $\phi(a) = aH$  é um homomorfismo sobrejetivo. Aplicando a segunda parte do Teorema do Isomorfismo, Teorema 1.5, obtemos o resultado. ◇

**Teorema 1.6** (Teorema da Representação). *Seja  $G$  um grupo e  $H$  um subgrupo de  $G$  tal que  $[G : H] = n$ . Então existe  $N \subseteq H$ , com  $N \trianglelefteq G$  tal que  $G/N$  é um grupo isomorfo a um subgrupo de  $S_n$ . Mais ainda,  $N$  é o “maior” subgrupo normal de  $G$  que está contido em  $H$ .*

**Prova:** Seja  $S = G/H = \{Hx_1, \dots, Hx_n\}$  e  $\mathcal{P}(S)$  o grupo das permutações do conjunto  $S$ . É claro que  $\mathcal{P}(S) \cong S_n$ .

Considere a seguinte aplicação

$$\begin{aligned}\psi : G &\rightarrow \mathcal{P}(S) \\ a &\mapsto \psi_a\end{aligned}$$

onde  $\psi_a : S \rightarrow S$  é tal que  $\psi_a(Hx_i) = Hx_ia^{-1}$ .

Inicialmente para  $a \in G$  temos  $\psi_a(Hx_i) = \psi_a(Hx_j)$  se, e só se,  $Hx_ia^{-1} = Hx_ja^{-1}$ . Isto é,  $Hx_i = Hx_j$ , logo  $\psi_a$  é injetora. Como  $|S| = n$ , então  $\psi_a$  é sobrejetiva e daí  $\psi_a \in \mathcal{P}(S)$ . Logo  $\psi_a \in \mathcal{P}(S)$  para todo  $a \in G$ .

Verifiquemos agora que  $\psi$  é um homomorfismo de grupos. Dados  $a, b \in G$  queremos mostrar que  $\psi(ab) = \psi(a)\psi(b)$ . Mas  $\psi(ab) = \psi_{ab}$ . Seja  $Hx_i \in S$ . Temos

$$\psi_{ab}(Hx_i) = Hx_i(ab)^{-1} = (Hx_ib^{-1})a^{-1} = \psi_a(\psi_b(Hx_i)) = (\psi_a \circ \psi_b)(Hx_i).$$

Portanto  $\psi$  é um homomorfismo de grupos.

Agora,

$$\ker \psi = \{a \in G \mid \psi(a) = Id_S\} = \{a \in G \mid Hx_ia^{-1} = Hx_i, i = 1, \dots, n\}.$$

Daí  $a \in \ker \psi$  se, e só se,  $Hx_ia^{-1} = Hx_i$  para todo  $i = 1, \dots, n$ . Mas isso ocorre se, e só se,  $Hx_i = Hx_ia$  para todo  $i = 1, \dots, n$ . Logo  $a \in \ker \psi$  se, e só se,  $H = Hx_iax_i^{-1}$  para todo  $i = 1, \dots, n$ . Daí  $a \in \ker \psi$  se, e só se,  $x_iax_i^{-1} \in H$  para todo  $i = 1, \dots, n$  e então  $a \in \ker \psi$  se, e só se,  $a \in x_i^{-1}Hx_i$  para todo  $i = 1, \dots, n$ . Mas  $G = Hx_1 \cup \dots \cup Hx_n$ , uma união disjunta e como  $(hx_i)^{-1}H(hx_i) = x_i^{-1}Hx_i$  para todo  $h \in H$ , então  $a \in \ker \psi$  se, e só se,  $a \in x^{-1}Hx$  para todo  $x \in G$ . Ou seja,  $a \in \ker \psi$  se, e somente se,  $a \in \bigcap_{x \in G} (x^{-1}Hx)$ . Portanto  $\ker \psi = \bigcap_{x \in G} (x^{-1}Hx)$ .

Seja  $N = \ker \psi$ . Então  $N \trianglelefteq G$  e  $N \subseteq H$ . Agora, seja  $L \trianglelefteq G$  tal que  $L \subseteq H$ . Então  $x^{-1}Lx = L \subseteq x^{-1}Hx$  para todo  $x \in G$ . Assim,  $L \subseteq N = \bigcap_{x \in G} (x^{-1}Hx)$ . Portanto  $N$  é o “maior” subgrupo normal de  $G$  contido em  $H$ .

Finalmente pelo Teorema do Isomorfismo, Teorema 1.5, temos

$$\frac{G}{\ker \psi} = \frac{G}{N} \cong \psi(G) \leq \mathcal{P}(S) \cong S_n,$$

como queríamos. ◇

**Corolário 1.5.3** (Teorema de Cayley). *Se  $G$  é um grupo de ordem  $n$ , então  $G$  é isomorfo a um subgrupo de  $S_n$ .*

**Prova:** Basta tomar  $H = \{1\}$  no Teorema da Representação, Teorema 1.6.  $\diamond$

## 1.6 Classes de Conjugação

Seja  $G$  um grupo. Dados  $x, y \in G$  defina

$$x \sim_G y \text{ se, e somente se, existe } a \in G \text{ tal que } y = a^{-1}xa.$$

**Proposição 1.6.1.** *Seja  $G$  um grupo. A relação  $\sim_G$  define uma relação de equivalência em  $G$ .*

**Prova:** A prova é deixada para o leitor.  $\diamond$

**Definição 1.15.** *Se  $x \sim_G y$ , dizemos que  $x$  e  $y$  são elementos **conjugados** em  $G$ .*

Denote  $a^{-1}xa = x^a$ , onde  $x$  e  $a \in G$ . As seguintes propriedades são válidas:

- (1)  $x^{1_G} = x$  para todo  $x \in G$ .
- (2) Se  $y = x^a$ , então  $x = y^{a^{-1}}$  para todos  $x, y$  e  $a \in G$ .
- (3)  $(x^a)^b = x^{ab}$  para todos  $x, a$  e  $b \in G$ .

A classe de equivalência de  $x$  é dada por

$$C_x = \{y \in G \mid x \sim_G y\} = \{x^a \mid a \in G\}$$

e é chamada de **classe de conjugação** de  $x$  em  $G$ .

Se  $G$  é um grupo finito e existem  $n$  classes de conjugação com representantes  $x_1, x_2, \dots, x_n$  então

$$G = C_{x_1} \cup C_{x_2} \cup \dots \cup C_{x_n}$$

uma união disjunta. Assim

$$|G| = |C_{x_1}| + |C_{x_2}| + \dots + |C_{x_n}|.$$

Observe que  $C_x = \{x\}$  se, e somente se,  $x \in Z(G)$  e daí a equação anterior pode ser escrita como

$$|G| = |Z(G)| + \sum_{x \notin Z(G)} |C_x|. \quad (1.4)$$

A equação (1.4) é chamada de **equação de classes**.

**Proposição 1.6.2.** *Seja  $G$  um grupo e  $x \in G$ . Então o conjunto  $C_G(x) = \{a \in G \mid ax = xa\}$  é um subgrupo de  $G$ .*

**Prova:** A cargo do leitor. ◇

**Proposição 1.6.3.** *Seja  $G$  um grupo finito e  $x \in G$ . Então*

$$[G : C_G(x)] = |C_x|.$$

*Em particular,  $|C_x|$  é um divisor de  $|G|$  para todo  $x \in G$ .*

**Prova:** Sejam  $H = C_G(x)$  e  $G/H = \{Ha \mid a \in G\}$  o conjunto de todas as classes laterais à direita de  $H$  em  $G$ . Pelo Teorema de Lagrange, Teorema 1.3,  $|G| = [G : H]|H|$ . Agora, considere a aplicação

$$\begin{aligned} \phi : \frac{G}{H} &\rightarrow C_x \\ Ha &\mapsto x^a. \end{aligned}$$

Claramente  $\phi$  é sobrejetora. Sejam  $Ha, Hb \in G/H$  tais que  $\phi(Ha) = \phi(Hb)$ . Daí  $x^a = x^b$  e então  $x^{ab^{-1}} = 1$ , isto é,  $ab^{-1} \in C_G(x) = H$  e portanto  $Ha = Hb$ . Logo  $\phi$  é injetiva. Assim

$$|C_x| = [G : C_G(x)]$$

como queríamos. ◇

**Definição 1.16.** *Seja  $p$  um número primo e  $G$  um grupo. Se  $|G| = p^n$ ,  $n \in \mathbb{N}$ , dizemos que  $G$  é um  $p$ -grupo.*

**Exemplos 1.6.1.** (1) Os grupos  $D_8, \mathbb{Z}_8, \mathbb{Z}_4 \times \mathbb{Z}_2$  e  $\mathbb{Z}_2 \times \mathbb{Z}_2 \times \mathbb{Z}_2$  são 2-grupos de ordem  $2^3$ .

(2) O grupo  $(\mathbb{Z}_{p^n}, \otimes)$  é um  $p$ -grupo de ordem  $p^n$ .

(3)  $\mathbb{Z}_2 \times \mathbb{Z}_2 \times \mathbb{Z}_2 \times \cdots$  é um 2-grupo infinito.

**Observação 1.6.1.** Pelo Teorema de Lagrange, Teorema 1.3, todo subgrupo de um  $p$ -grupo também é um  $p$ -grupo.

**Teorema 1.7.** Se  $G$  é um  $p$ -grupo e  $|G| = p^n > 1$ , então  $|Z(G)| = p^m > 1$ .

**Prova:** Pela Equação de classes, (1.4), obtemos

$$|Z(G)| = |G| - \sum_{x \notin Z(G)} |C_x|.$$

Mas para todo  $x \notin Z(G)$ , temos  $|C_x| > 1$  e como  $|C_x|$  divide  $|G|$ , então  $|C_x| = p^{\alpha_x}$  para todo  $x \notin Z(G)$ . Como  $|G| = p^n > 1$ , então devemos ter  $|Z(G)| = p^m > 1$ .  $\diamond$

**Corolário 1.6.1.** Se  $p$  é um número primo e  $|G| = p^2$ , então  $G$  é um grupo abeliano.

**Teorema 1.8** (Teorema de Cauchy). Seja  $p$  um divisor primo da ordem de um grupo finito  $G$ . Então existe  $a \in G$  tal que  $|a| = p$ .

**Prova:** Vamos usar indução sobre a ordem de  $G$ . Se  $|G| = 1$ , nada há a fazer. Vamos supor que o teorema é válido para todo grupo  $H$  tal que  $1 \leq |H| < |G|$ . Temos três casos para analisar.

*Caso 1:*  $G$  é cíclico.

Seja  $G = \langle x \rangle$  e seja  $p$  um divisor primo de  $|G|$ . Neste caso  $|x| = p^{\alpha k}$ , onde  $\alpha \geq 1$ . Tome  $a = x^{p^{\alpha-1}k}$ . Então  $a^p = 1$  e nenhuma outra potência  $r$  de  $a$  menor que  $p$  é tal que  $a^r = 1$ . Portanto  $|a| = p$  como queríamos.

*Caso 2:*  $G$  é abeliano e não cíclico.

Seja  $p$  um divisor primo de  $|G|$  e seja  $x \in G$ ,  $x \neq 1$ . Se  $p$  divide  $|x|$  então pelo *Caso 1*, existe  $a \in \langle x \rangle$  tal que  $|a| = p$  e assim o teorema está provado.

Suponha então que  $p$  não divide  $|x|$ . Seja  $N = \langle x \rangle$ . Como  $G$  é abeliano, então  $L = G/N$  é um grupo tal que  $p$  divide  $|L| = [G : N]$ . Mas  $1 \leq |L| < |G|$ , assim pela hipótese de indução existe  $\bar{b} \in L$  tal que  $\bar{b} \neq \bar{1}$  e  $|\bar{b}| = p$ . Assim  $b \notin N$  e  $b^p \in N$ . Seja  $|N| = r$ , então  $(b^p)^r = 1$  e portanto  $p$  divide  $|b|$ . Logo pelo *Caso 1*, existe  $a \in \langle b \rangle$  tal que  $|a| = p$  e então o teorema está provado.

*Caso 3:*  $G$  não abeliano

Neste caso  $Z(G) \neq G$ . Se  $p$  divide  $|Z(G)|$ , então basta usar o *Caso 2*. Assim suponha que  $p$  não divide  $|Z(G)|$ . Temos

$$|G| = |Z(G)| + \sum_{x \notin Z(G)} [G : C_G(x)].$$

Como  $p$  divide  $|G|$  então existe  $x \notin Z(G)$  tal que  $p$  não divide  $[G : C_G(x)]$ . Portanto  $p$  divide  $|H|$  onde  $H = C_G(x) \neq G$ . Como  $1 \leq |H| < |G|$ , então pela hipótese de indução, existe  $a \in H$  tal que  $|a| = p$ .

Portanto o teorema está provado.  $\diamond$

## 1.7 Grupos Cíclicos

**Proposição 1.7.1.** (i) Se  $H \subseteq \mathbb{Z}$ , então  $H$  é um subgrupo de  $(\mathbb{Z}, +)$  se, e somente se,  $H = n\mathbb{Z}$  para algum  $n \in \mathbb{N}$ .

(ii)  $n\mathbb{Z} \subseteq m\mathbb{Z}$  se, e somente se,  $m|n$ . Neste caso temos  $[m\mathbb{Z} : n\mathbb{Z}] = \frac{n}{m}$ .

**Prova:**

(i) Se  $H = n\mathbb{Z}$ , com  $n \in \mathbb{N}$ , então é fácil verificar que  $H \leq \mathbb{Z}$ .

Agora seja  $H \leq \mathbb{Z}$ ,  $H \neq \{0\}$ . Tome  $n = \min\{x \in H \mid x > 0\}$ . Como  $n \in H$  e como  $H \leq \mathbb{Z}$ , então  $n\mathbb{Z} \subseteq H$ . Dado  $a \in H$ , existem  $q$  e  $r \in \mathbb{Z}$  tais que  $a = qn + r$  com  $0 \leq r < n$ . Mas  $a, n \in H$  daí  $r \in H$  e então pela minimalidade de  $n$  devemos ter  $r = 0$ . Logo  $a \in n\mathbb{Z}$  e portanto  $H = n\mathbb{Z}$ .

(ii) É imediato verificar que  $n\mathbb{Z} \subseteq m\mathbb{Z}$  se, e somente se,  $m|n$ . Suponha que  $n\mathbb{Z} \leq m\mathbb{Z} \leq \mathbb{Z}$ . Assim pelo Corolário 1.3.2 temos

$$\frac{\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}}{m\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}} \cong \frac{\mathbb{Z}}{m\mathbb{Z}},$$

daí

$$\left| \frac{\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}}{m\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}} \right| = \left| \frac{\mathbb{Z}}{m\mathbb{Z}} \right|.$$

Então

$$\frac{n}{[m\mathbb{Z} : n\mathbb{Z}]} = m$$

e portanto  $[m\mathbb{Z} : n\mathbb{Z}] = \frac{n}{m}$ , como queríamos.

◇

**Proposição 1.7.2.** *Seja  $G = \langle a \rangle = \{\dots, a^{-1}, 1, a, a^2, \dots\}$  um grupo cíclico de ordem infinita. Então:*

(i) *A função  $\phi : (\mathbb{Z}, +) \rightarrow (G, \cdot)$  dada por  $\phi(t) = a^t$  é um isomorfismo.*

(ii) *O elemento  $a^r$  gera  $G$  se, e somente se,  $r = -1$  ou  $r = 1$ .*

**Prova: Prova:**

(i) É fácil verificar que  $\phi$  definida desse jeito é um isomorfismo.

(ii) Como  $\phi$  é um isomorfismo, então  $a^r$  gera  $G$  se, e somente se,  $r$  gera  $\mathbb{Z}$ . Mas os únicos geradores de  $\mathbb{Z}$  são  $r = -1$  ou  $r = 1$ .

◇

◇

**Proposição 1.7.3.** *Seja  $G = \langle a \rangle = \{1, a, \dots, a^{n-1}\}$  um grupo cíclico de ordem finita igual a  $n$ . Então:*

(i) *A função  $\bar{\phi} : (\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}, +) \rightarrow (G, \cdot)$  dada por  $\bar{\phi}(\bar{t}) = a^t$  é um isomorfismo.*

(ii) *O elemento  $a^r$  gera  $G$  se, e somente se,  $\text{mdc}(m, n) = 1$ .*

**Prova:**

(i) Da Proposição 1.7.3 obtemos que  $\phi$  de  $\mathbb{Z}$  em  $G$  dada por  $\phi(r) = a^r$  é sobrejetora. Além disso,  $\ker \phi = n\mathbb{Z}$ . Logo

$$\frac{\mathbb{Z}}{\ker \phi} = \frac{\mathbb{Z}}{n\mathbb{Z}} \cong G.$$

(ii) Como  $\bar{\phi}$  é um isomorfismo, então  $a^m$  gera  $G$  se, e somente se,  $m$  gera  $\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$ . O que ocorre se, e somente se,  $\text{mdc}(m, n) = 1$ .



◇

**Proposição 1.7.4.**  $G = \langle a \rangle = \{1, a, \dots, a^{n-1}\}$  um grupo cíclico de ordem finita igual a  $n$ . Então:

- (i) Se  $H \leq G$ , então  $H$  é cíclico. Mais ainda,  $H = \langle a^m \rangle$  onde  $m$  é o menor inteiro positivo tal que  $a^m \in H$ . O subgrupo  $H$  tem ordem igual a  $\frac{n}{m}$ .
- (ii) Se  $d$  é um divisor de  $n$ , então existe um único subgrupo  $H$  de  $G$  com ordem igual a  $d$ . Mais ainda,  $H = \langle a^{\frac{n}{d}} \rangle$ .

**Prova:**

- (i) Seja  $m$  o menor inteiro positivo  $a^m \in H$ . Daí  $\langle a^m \rangle \subseteq H$ . Agora, seja  $a^\alpha \in H$ . Então existem  $q, r \in \mathbb{Z}$  tais que  $\alpha = mq + r$  com  $0 \leq r < m$ . Daí  $a^\alpha = a^{mq}a^r$ . Como  $a^\alpha, a^m \in H$  e  $H \leq G$ , então  $a^r \in H$ . Logo  $r = 0$ , devido à minimalidade de  $m$ . Portanto  $H = \langle a^m \rangle$ .  
Agora,  $(a^m)^{n/m} = 1$ . Seja  $k < n/m$  tal que  $(a^m)^k = 1$ . Logo  $n|mk$ , mas  $mk < n$ , logo  $k = 0$ . Portanto  $|a^m| = \frac{n}{m}$ .
- (ii) Seja  $d$  um divisor de  $n$ . Pelo item anterior, o grupo  $H = \langle a^{n/d} \rangle$  tem ordem  $d$ . Vamos provar que  $H$  é único. Seja  $K$  um subgrupo de  $G$  de ordem  $d$ . Novamente pelo item anterior,  $K = \langle a^m \rangle$  tal que  $|K| = \frac{n}{m} = d$ . Assim  $m = \frac{n}{d}$  e daí  $K = \langle a^{n/d} \rangle = H$ , como queríamos.

◇

---

## 1.8 Grupos de Permutações

---

**Definição 1.17.** Um permutação  $\alpha \in S_n$  é denominada um *r-ciclo* se existem elementos distintos  $a_1, \dots, a_r \in \{1, \dots, n\}$  tais que

$$\alpha(a_1) = a_2$$

$$\alpha(a_2) = a_3$$

$$\vdots$$

$$\alpha(a_{r-1}) = a_r$$

$$\alpha(a_r) = a_1$$

e tais que  $\alpha(j) = j$  para todo  $j \in \{1, \dots, n\} \setminus \{a_1, \dots, a_r\}$ . Tal  $r$ -ciclo será denotado por  $(a_1 a_2 \cdots a_r)$ . O número  $r$  é chamado o **comprimento** do ciclo. Se  $r = 2$ , então chamamos os 2-ciclos de **transposições**. O único 1-ciclo é a identidade, que denotaremos por  $(1)$ .

**Exemplos 1.8.1.** Em  $S_5$ :

- A permutação  $\alpha = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 & 5 \\ 2 & 3 & 4 & 5 & 1 \end{pmatrix}$  é um 5-ciclo denotado por  $\alpha = (12345)$ . Também podemos escrever  $\alpha = (23451)$  ou  $\alpha = (34512)$  ou  $\alpha = (45123)$ .
- A permutação  $\alpha = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 & 5 \\ 4 & 2 & 1 & 3 & 5 \end{pmatrix}$  é um 3-ciclo denotado por  $\alpha = (143)$ . Também podemos escrever  $\alpha = (431)$  ou  $\alpha = (314)$ .
- A permutação  $\alpha = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 & 5 \\ 1 & 4 & 3 & 2 & 5 \end{pmatrix}$  é um 2-ciclo denotado por  $\alpha = (24)$  ou  $\alpha = (42)$ .
- A permutação  $\alpha = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 & 5 \\ 3 & 4 & 5 & 2 & 1 \end{pmatrix}$  não é um  $r$ -ciclo qualquer que seja  $r$ . Mas podemos escrever  $\alpha = (135)(24)$  ou  $\alpha = (24)(135)$ .

**Definição 1.18.** Seja  $\alpha \in S_n$  um  $r$ -ciclo e seja  $\beta \in S_n$  um  $s$ -ciclo. As permutações  $\alpha$  e  $\beta$  são **disjuntas** se nenhum elemento de  $\{1, \dots, n\}$  é movido por ambas, isto é, para todo  $a \in \{1, \dots, n\}$  temos  $\alpha(a) = a$  ou  $\beta(a) = a$ .

**Exemplos 1.8.2.** Em  $S_5$  os ciclos  $(134)$  e  $(25)$  são disjuntos, enquanto que  $(135)$  e  $(25)$  não são disjuntas.

**Lema 1.8.1.** Sejam  $\alpha, \beta \in S_n$ . Se  $\alpha$  e  $\beta$  são permutações disjuntas então  $\alpha\beta = \beta\alpha$ .

**Prova:** É suficiente mostrar que  $(\alpha\beta)(i) = (\beta\alpha)(i)$  para todo  $i = 1, \dots, n$ . Se  $\beta$  move  $i$ , digamos  $\beta(i) = j \neq i$ , então  $\beta$  também move  $j$ . Caso contrário teríamos  $\beta(i) = j = \beta(j)$ , o que contradiz o fato de que  $\beta$  é injetora. Como  $\alpha$  e  $\beta$  são disjuntas, então  $\alpha(i) = i$  e  $\alpha(j) = j$ . Daí  $(\alpha\beta)(i) = \alpha(j) = j = \beta(i) = (\beta\alpha)(i)$ . De modo análogo, mostra-se que se  $\alpha$  move  $i$ , então  $(\alpha\beta)(i) = (\beta\alpha)(i)$ . Se  $\alpha$  e  $\beta$  fixam  $i$ , então  $(\alpha\beta)(i) = \alpha(i) = i = \beta(i) = (\beta\alpha)(i)$ . Portanto  $\alpha\beta = \beta\alpha$ .

◇

**Lema 1.8.2.** Se  $\alpha \in S_n$  é um  $r$ -ciclo, então  $|\alpha| = r$ .

**Prova:** Seja  $\alpha = (a_1 a_2 \dots a_r)$ . Mostra-se, por indução em  $k$ , que  $\alpha^k(a_j) = a_{j+k}$ , onde  $j + k \equiv l \pmod{r}$  se  $j + k > r$ . Assim

$$\alpha^r(a_k) = a_{k+r} = a_k$$

para todo  $k = 1, \dots, r$ . Portanto  $|\alpha|$  divide  $r$ . Agora, se  $|\alpha| = l < r$ , então  $\alpha^l = (1)$  e daí  $\alpha^l(i_k) = i_k$  para todo  $k = 1, \dots, r$ . Mas,

$$\alpha^l(a_1) = a_{l+1} \neq a_1$$

pois  $\alpha$  é um  $r$ -ciclo. Portanto  $|\alpha| = r$ . ◇

**Proposição 1.8.1.** Seja  $\alpha \in S_n$ ,  $\alpha \neq (1)$ . Então a permutação  $\alpha$  é igual a um produto de ciclos disjuntos de comprimento  $\geq 2$ . Mais ainda, tal decomposição é única a menos da ordem dos fatores.

**Prova:** Como  $\alpha \neq (1)$ , então existe  $i_1 \in \{1, \dots, n\}$  tal que  $\alpha(i_1) \neq i_1$ . Considere a sequência  $i_1, \alpha(i_1), \alpha^2(i_1), \dots$ . Então existe um menor inteiro positivo  $r_1$ ,  $2 \leq r_1 \leq n$  tal que  $i_1, \alpha(i_1), \dots, \alpha^{r_1-1}(i_1)$  são elementos distintos e  $\alpha^{r_1}(i_1) \in \{i_1, \alpha(i_1), \dots, \alpha^{r_1-1}(i_1)\}$ . Se  $\alpha^{r_1}(i_1) = \alpha^j(i_1)$ , com  $j \neq 0$  então  $\alpha^{r_1-j}(i_1) = i_1$ , o que contradiz a escolha de  $r_1$ . Daí  $\alpha^{r_1}(i_1) = i_1$ . Assim a restrição de  $\alpha$  ao conjunto  $\{i_1, \alpha(i_1), \dots, \alpha^{r_1-1}(i_1)\}$  é tal que

$$\alpha|_{\{i_1, \alpha(i_1), \dots, \alpha^{r_1-1}(i_1)\}} = (i_1 \alpha(i_1) \dots \alpha^{r_1-1}(i_1)).$$

Denote este  $r_1$ -ciclo por  $\sigma_1 = (i_1 \alpha(i_1) \dots \alpha^{r_1-1}(i_1))$ .

Se a restrição de  $\alpha$  ao complementar de  $\{i_1, \alpha(i_1), \dots, \alpha^{r_1-1}(i_1)\}$  é a identidade, então  $\alpha = \sigma_1$ . Caso contrário, tome  $i_2 \in \{1, 2, \dots, n\} \setminus \{i_1, \alpha(i_1), \dots, \alpha^{r_1-1}(i_1)\}$  tal que  $\alpha(i_2) \neq i_2$ . De modo análogo ao caso anterior, existe  $r_2 \geq 2$  tal que

$$\alpha|_{\{i_2, \alpha(i_2), \dots, \alpha^{r_2-1}(i_2)\}} = (i_2 \alpha(i_2) \dots \alpha^{r_2-1}(i_2)).$$

Denote este  $r_2$ -ciclo por  $\sigma_2 = (i_2 \alpha(i_2) \dots \alpha^{r_2-1}(i_2))$ . Note que  $\sigma_1$  e  $\sigma_2$  são disjuntas.

Se a restrição de  $\alpha$  ao complementar de  $\{i_1, \alpha(i_1), \dots, \alpha^{r_1-1}(i_1), i_2, \alpha(i_2), \dots, \alpha^{r_2-1}(i_2)\}$  é a identidade, então  $\alpha = \sigma_1 \sigma_2$ . Caso contrário, tome  $i_3 \in \{1, 2, \dots, n\} \setminus \{i_1, \alpha(i_1), \dots, \alpha^{r_1-1}(i_1), i_2, \alpha(i_2), \dots, \alpha^{r_2-1}(i_2)\}$  tal que  $\alpha(i_3) \neq i_3$  e repita o processo anterior. Claramente depois de um

número finito de etapas este processo irá terminar e obteremos que  $\alpha = \sigma_1 \sigma_2 \cdots \sigma_t$ , onde  $\sigma_1, \dots, \sigma_t$  são ciclos disjuntos de comprimento  $\geq 2$ .

Suponha agora que também temos  $\alpha = \tau_1 \tau_2 \cdots \tau_l$  com  $\tau_1, \tau_2, \dots, \tau_l$  ciclos disjuntos de comprimento  $\geq 2$ . Temos  $\tau_1 \cdots \tau_l(i_1) = \alpha(i_1) \neq i_1$  e como os  $\tau_i$ 's são disjuntos, então existe um único  $\tau_j$  tal que  $\tau_j(i_1) = \alpha(i_1)$ . Mas os ciclos  $\tau_i$ 's comutam, assim podemos supor que  $j = 1$  e então  $\tau_1(i_1) = \alpha(i_1)$ . Mostremos que  $\tau_1 = \sigma_1$ . O ciclo  $\tau_1$  não pode fixar  $\alpha(i_1)$ , isto é,  $\tau_1(\alpha(i_1)) \neq \alpha(i_1)$  pois  $\tau_1(i_1) = \alpha(i_1) \neq i_1$ . Como os  $\tau_j$ 's são ciclos disjuntos, então  $\tau_j(\alpha(i_1)) = \alpha(i_1)$  para  $j \geq 2$ . Assim  $\tau_1(\alpha(i_1)) = \alpha^2(i_1)$  e daí  $\tau_1(\alpha^k(i_1)) = \alpha^{k+1}(i_1)$  para todo  $k \geq 0$ . Logo  $\tau_1 = \sigma_1$ . Aplicando o mesmo raciocínio com  $i_2$  obtemos que  $\tau_2 = \sigma_2$ . Continuando com o procedimento obtemos que  $t = l$  e que a menos da ordem  $\sigma_j = \tau_j$  para cada  $j = 1, \dots, t$ .  $\diamond$

**Proposição 1.8.2.** (i) *Todo elemento de  $S_n$  pode ser escrito como um produto de transposições, isto é,  $S_n = \langle \text{transposições} \rangle$ .*

(ii)  $S_n = \langle (12), (13), \dots, (1n) \rangle$ .

(iii)  $S_n = \langle (12), (23), \dots, (n-1n) \rangle$ .

**Prova:**

(i) Inicialmente temos  $(1) = (12)(12) \in \langle \text{transposições} \rangle$ . Agora, pela Proposição 1.8.1, dada uma permutação  $\alpha \in S_n$ , é suficiente mostrar que cada  $r$ -ciclo de  $\alpha$  pode ser escrito como um produto de transposições. Assim se  $(a_1 a_2 \cdots a_r)$  é um  $r$ -ciclo de  $\alpha$ , então podemos escrever

$$(a_1 a_2 \cdots a_r) = (a_1 a_r)(a_1 a_{r-1}) \cdots (a_1 a_3)(a_1 a_2).$$

Donde obtemos o resultado desejado.

(ii) Pela parte (a), basta mostrar que toda transposição  $(ij)$  pertence a  $\langle (12), (13), \dots, (1n) \rangle$ . De fato

$$(ij) = (1i)(1j)(1i)$$

para  $i \neq j$ , como queríamos.

(iii) Para todo inteiro  $r \geq 2$ , temos

$$(1i + 1) = (1i)(ii + 1)(1i),$$

assim o subgrupo  $\langle (12), (23), \dots, (n-1n) \rangle$  contém  $(1i)$ , para cada  $i = 2, \dots, n$ . Logo pelo item (b),  $S_n = \langle (12), (23), \dots, (n-1n) \rangle$ , como queríamos.

◇

**Observações 1.8.1.** (1) Um elemento  $\alpha \in S_n$  pode ser escrito como um produto de transposições disjuntas se, e somente se, sua ordem for igual a 2.

(2) A decomposição de  $\alpha \in S_n$  em um produto de transposições não é única. Por exemplo:

(a) para  $\alpha = (123) \in S_4$  temos:  $\alpha = (13)(12) = (23)(13) = (13)(42)(12)(14)$ ,

(b) para  $\alpha = (24) \in S_4$  temos:  $\alpha = (24) = (13)(12)(13)(34)(23)$ .

Apesar da decomposição não ser única, existe um invariante nessa decomposição que é a paridade do número de transposições que aparecem em  $\alpha$ .

**Teorema 1.9.** Seja  $\alpha \in S_n$ . Se  $\alpha = \sigma_1 \cdots \sigma_r = \tau_1 \cdots \tau_l$ , onde  $\sigma_i$  e  $\tau_i$  são transposições para todo  $i = 1, \dots, r$  e  $j = 1, \dots, l$  então  $r \equiv l \pmod{2}$ .

**Prova:** Inicialmente note que toda transposição tem ordem 2, daí podemos escrever

$$(1) = \alpha \alpha^{-1} = \sigma_1 \cdots \sigma_r \tau_l \cdots \tau_1.$$

Assim é suficiente mostrar que a identidade só pode ser escrita como um número par de transposições. Assim  $r + l$  é par e então teremos  $r \equiv l \pmod{2}$ .

Suponha então que

$$(1) = (a_k b_k) \cdots (a_2 b_2)(a_1 b_1) \tag{1.5}$$

onde  $k \geq 1$  e suponha que  $a_i \neq b_i$  para todo  $i$ . Provemos que  $k$  é par. Como  $a_i \neq b_i$ , então  $k > 1$ . Assim  $k \geq 2$  e faremos a prova por indução em  $k$ . Suponha então que em qualquer produto de transposições que seja a identidade e que contenha menos do que  $k$  transposições, ocorra uma quantidade par de transposições.

Considere um produto da forma (1.5). Alguma transposição  $(a_i b_i)$  para  $i = 2, \dots, k$  deve mover  $a_1$ , caso contrário não obteríamos a identidade. Assim podemos supor que  $a_1 = a_j$  para algum  $j > 1$ . Agora,

$$(ab)(cd) = (cd)(ab)$$

$$(ac)(bc) = (bc)(ab).$$

Assim podemos mudar a ordem das transposições  $(a_i b_i)$  em (1.5), sem mudar sua quantidade, e supor que  $a_2 = a_1$ . Se  $b_1 = b_2$ , então  $(a_1 b_1)(a_2 b_2) = (1)$  em (1.5) e obtemos um produto de  $k - 2$  transposições dando a identidade. Daí pela hipótese de indução  $k - 2$  é par e logo  $k$  é par.

Se  $b_1 \neq b_2$ , então  $(a_1 b_1)(a_1 b_2) = (a_1 b_2)(b_1 b_2)$  e daí podemos reescrever (1.5) como

$$(1) = (a_k b_k) \cdots (a_3 b_3)(a_1 b_1)(b_1 b_2) \quad (1.6)$$

onde somente os dois primeiros fatores de (1.5) foram alterados. Note que o número de transposições que podem mover  $a_1$  foi reduzida em 1. Repita o argumento com (1.6). Assim existe  $a_j$ , com  $j \geq 3$ , tal que  $a_j = a_1$ . Com isso ou reduzimos o número de transposições em (1.6) e aí usamos a hipótese de indução ou então reescrevemos (1.6) sem mudar o número total de transposições, mas reduzindo em 1 o número de transposições que movem  $a_1$ . Continuando com este processo, chegaremos na situação em que as duas primeiras transposições se cancelam, caso contrário somente a primeira transposição de (1.5) moveria  $a_1$  e portanto não seria a identidade. Chegando nesse instante a hipótese de indução garante que  $k$  é par.  $\diamond$

**Definição 1.19.** Seja  $\alpha \in S_n$ . Escreva  $\alpha = \tau_1 \cdots \tau_r$  onde  $\tau_i$  é uma transposição para cada  $i = 1, \dots, r$ . Então o número  $(-1)^r$  é chamado de **senal** de  $\alpha$  e denotamos

$$\text{sgn}(\alpha) = (-1)^\alpha = (-1)^r. \quad (1.7)$$

Permutações com sinal 1 são chamadas de **pares** e aquelas com sinal -1 são chamadas de **ímpares**.

**Exemplos 1.8.3.** (1) Seja  $\alpha, \beta \in S_n$  onde  $\alpha = (123)$  e  $\beta = (24)$ . Então

$$\text{sgn}(\alpha) = 1$$

$$\text{sgn}(\beta) = -1.$$

(2) Qualquer transposição em  $S_n$  tem sinal  $-1$ .

(3)  $\text{sgn}(1) = 1$

(4) Se  $\alpha$  é um  $r$ -ciclo, então  $\text{sgn}(\alpha) = (-1)^{r-1}$ . (Exercício!)

**Proposição 1.8.3.** Para  $\alpha, \beta \in S_n$  temos

$$\text{sgn}(\alpha\beta) = \text{sgn}(\alpha)\text{sgn}(\beta).$$

**Prova:** Se  $\alpha$  é um produto de  $k$  transposições e  $\beta$  é um produto de  $l$  transposições, então  $\alpha\beta$  pode ser escrita como um produto de  $k + l$  transposições. Logo

$$\text{sgn}(\alpha\beta) = (-1)^{r+l} = (-1)^r(-1)^l = \text{sgn}(\alpha)\text{sgn}(\beta),$$

como queríamos.  $\diamond$

**Corolário 1.8.1.** Inversão e conjugação de uma permutação não altera seu sinal.

**Prova:** Seja  $\alpha \in S_n$ . Assim  $\alpha\alpha^{-1} = (1)$  e daí  $\text{sgn}(\alpha\alpha^{-1}) = \text{sgn}(1) = 1$ . Por outro lado,  $\text{sgn}(\alpha\alpha^{-1}) = \text{sgn}(\alpha)\text{sgn}(\alpha^{-1})$ . Portanto  $\text{sgn}(\alpha) = \text{sgn}(\alpha^{-1})$ , como queríamos.

Agora, se  $\beta = \pi^{-1}\alpha\pi$  para algum  $\pi \in S_n$ , então

$$\text{sgn}(\beta) = \text{sgn}(\pi^{-1}\alpha\pi) = \text{sgn}(\pi^{-1})\text{sgn}(\alpha)\text{sgn}(\pi) = \text{sgn}(\alpha).$$

$\diamond$

**Corolário 1.8.2.** O conjunto

$$A_n = \{\alpha \in S_n \mid \text{sgn}(\alpha) = 1\}$$

é um subgrupo de  $S_n$  chamado de **grupo alternado**.

**Prova:** Como  $\text{sgn}(1) = 1$ , então  $(1) \in A_n$ . Agora, dados  $\alpha, \beta \in A_n$ , então  $\text{sgn}(\alpha\beta) = \text{sgn}(\alpha)\text{sgn}(\beta) = 1$ . Logo  $\alpha, \beta \in A_n$ . Como  $\text{sgn}(\alpha) = \text{sgn}(\alpha^{-1})$ , então  $\alpha^{-1} \in A_n$  para todo  $\alpha \in A_n$ . Portanto  $A_n$  é um subgrupo de  $S_n$ .  $\diamond$

**Exemplos 1.8.4.** (1) Em  $S_2$  temos  $A_2 = \{(1)\}$ .

(2) Em  $S_3 = \{(1), (12), (13), (23), (123), (132)\}$  temos  $A_3 = \{(1), (123), (132)\}$ .

(3) Em  $S_n$  temos  $A_4 = \{(1), (123), (132), (124), (142), (134), (143), (234), (243), (12)(34), (13)(24), (14)(23)\}$ .

(4) Para  $n \geq 4$   $(123), (124) \in A_n$ . Assim  $A_n$  não é abeliano.

**Proposição 1.8.4.** Para  $n \geq 2$ ,  $|A_n| = \frac{n!}{2}$ .

**Prova:** A aplicação  $\text{sgn} : S_n \rightarrow C_2 = \{-1, 1\}$ , onde  $C_2$  é um grupo multiplicativo, é um homomorfismo. É fácil ver que  $\ker \text{sgn} = A_n$  e daí  $|A_n| = \frac{n!}{2}$ .  $\diamond$

**Definição 1.20.** Seja  $n \geq 2$ . Se  $\alpha \in S_n$  e se  $\alpha = (a_{11} \dots a_{1r_1}) \cdots (a_{t1} \dots a_{tr_t})$  é a sua decomposição em ciclos disjuntos com  $r_1 \leq r_2 \leq \dots \leq r_t$ , dizemos que  $r_1, \dots, r_t$  é o **tipo de decomposição** de  $\alpha$ .

**Exemplo 1.8.1.** As permutações  $\alpha = (45)(67)(123)$  e  $\beta = (15)(36)(247)$  têm o mesmo tipo de decomposição, a saber 2, 2, 3.

**Lema 1.8.3.** Seja  $n \geq 2$ . Dada uma permutação  $\rho \in S_n$ , seja  $\rho = (a_{11} \dots a_{1r_1}) \cdots (a_{t1} \dots a_{tr_t})$  sua decomposição em ciclos disjuntos.

(i) Se  $\sigma \in S_n$ , então a permutação  $\sigma\rho\sigma^{-1}$  tem a seguinte decomposição em ciclos disjuntos

$$\sigma\rho\sigma^{-1} = (\sigma(a_{11}) \dots \sigma(a_{1r_1})) \cdots (\sigma(a_{t1}) \dots \sigma(a_{tr_t})).$$

Em particular, as permutações  $\rho$  e  $\sigma\rho\sigma^{-1}$  têm o mesmo tipo de decomposição.

(ii) Reciprocamente, se  $\rho, \beta \in S_n$  são permutações com o mesmo tipo de decomposição, então existe  $\sigma \in S_n$  tal que  $\beta = \sigma\rho\sigma^{-1}$ .

(iii) Se as permutações  $\rho, \beta \in S_n$  têm o mesmo tipo de decomposição e se a permutação  $\rho$  deixa pelo menos duas letras fixas, então existe  $\mu \in A_n$  tal que  $\beta = \mu\rho\mu^{-1}$ .

**Prova:**

(i) Seja  $\tau = (a_1 \dots a_r)$  um  $r$ -ciclo qualquer. Queremos mostrar que  $\sigma\tau\sigma^{-1} = (\sigma(a_1) \dots \sigma(a_r))$ .

Para isso, vamos mostrar que

$$\sigma\tau\sigma^{-1}|_{\{\sigma(a_1), \dots, \sigma(a_r)\}} = (\sigma(a_1) \dots \sigma(a_r)).$$

De fato, para  $j \in \{1, \dots, r-1\}$  temos

$$\sigma\tau\sigma^{-1}(\sigma(a_j)) = \sigma\tau(\sigma^{-1}(\sigma(a_j))) = \sigma\tau(a_j) = \sigma(a_{j+1})$$



e para  $j = r$

$$\sigma\tau\sigma^{-1}(\sigma(a_r)) = \sigma\tau(\sigma^{-1}(\sigma(a_r))) = \sigma\tau(a_r) = \sigma(a_1).$$

Além disso, se  $b \notin \{\sigma(a_1), \dots, \sigma(a_r)\}$ , então  $\sigma^{-1}(b) \notin \{a_1, \dots, a_r\}$ . Daí  $\tau\sigma^{-1}(b) = \sigma^{-1}(b)$  e assim

$$\sigma\tau\sigma^{-1}(b) = \sigma(\tau(\sigma^{-1}(b))) = \sigma\sigma^{-1}(b) = b.$$

Portanto,  $\sigma\tau\sigma^{-1} = (\sigma(a_1) \dots \sigma(a_r))$ .

Agora, se  $\rho = (a_{11} \dots a_{1r_1}) \dots (a_{t1} \dots a_{tr_t})$ , então

$$\begin{aligned} \sigma\rho\sigma^{-1} &= \sigma(a_{11} \dots a_{1r_1})\sigma^{-1}\sigma(a_{21} \dots a_{2r_2})\sigma^{-1} \dots \sigma(a_{t1} \dots a_{tr_t})\sigma^{-1} \\ &= (\sigma(a_{11}) \dots \sigma(a_{1r_1}))(\sigma(a_{21}) \dots \sigma(a_{2r_2})) \dots (\sigma(a_{t1}) \dots \sigma(a_{tr_t})). \end{aligned}$$

Mais ainda, para todo  $i, j \in \{1, \dots, t\}$  com  $i \neq j$ , como  $\{a_{i1}, \dots, a_{ir_i}\} \cap \{a_{j1}, \dots, a_{jr_j}\} = \emptyset$  então  $\{\sigma(a_{i1}), \dots, \sigma(a_{ir_i})\} \cap \{\sigma(a_{j1}), \dots, \sigma(a_{jr_j})\} = \emptyset$ . Portanto os ciclos obtidos em  $\sigma\rho\sigma^{-1}$  são disjuntos.

(ii) Seja  $\beta = (b_{11} \dots b_{1r_1}) \dots (b_{t1} \dots b_{tr_t})$  a decomposição em ciclos disjuntos de  $\beta$ . Tome

$$\begin{aligned} \{c_1, \dots, c_k\} &= \{1, \dots, n\} \setminus \bigcup_{i=1}^t \{a_{i1}, \dots, a_{ir_i}\} \\ \{d_1, \dots, d_k\} &= \{1, \dots, n\} \setminus \bigcup_{i=1}^t \{b_{i1}, \dots, b_{ir_i}\}. \end{aligned}$$

Tome  $\sigma \in S_n$  dada por

$$\sigma := \begin{pmatrix} a_{11} & \dots & a_{1r_1} & \dots & a_{t1} & \dots & a_{tr_t} & c_1 & \dots & c_k \\ b_{11} & \dots & b_{1r_1} & \dots & b_{t1} & \dots & b_{tr_t} & d_1 & \dots & d_k \end{pmatrix}.$$

Aplicando a parte (a), é imediato verificar que  $\sigma\rho\sigma^{-1} = \beta$ . Observe que para cada ordenação do conjunto  $c_1, \dots, c_k$  obtemos uma permutação diferente que funciona.

(iii) Pela parte (b), existe  $\sigma \in S_n$  tal que  $\beta = \sigma\rho\sigma^{-1}$ . Usando as mesmas notações de (b), como  $\rho$  fixa pelo menos duas letras, então  $k \geq 2$ . Tomando

$$\mu := \begin{cases} \sigma, & \text{se } \sigma \in A_n \\ \sigma(c_1c_2), & \text{se } \sigma \notin A_n \end{cases}.$$

o resultado segue.

◇

**Proposição 1.8.5.** *Seja  $n \geq 3$ . Então  $A_n = \langle \{3\text{-ciclos}\} \rangle$ .*

**Prova:** Se  $(ijk)$  é um 3-ciclo qualquer, então como  $(ijk) = (ik)(ij)$  temos  $(ijk) \in A_n$ . Logo  $\langle \{3\text{-ciclos}\} \rangle \subseteq A_n$ . Agora, seja  $\tau \in A_n$ . Assim  $\tau = \sigma_1 \sigma_2 \cdots \sigma_m$  com  $\sigma_i$  transposição para  $i = 1, \dots, m$  e  $m$  par. Logo se mostrarmos que  $\sigma_i \sigma_j$  é um 3-ciclo, então  $\tau$  será um produto de 3-ciclos. Para simplificar a notação, sejam  $\alpha$  e  $\beta$  duas transposições. Se  $\alpha$  e  $\beta$  são disjuntas, digamos  $\alpha = (ij)$  e  $\beta = (kl)$ , então

$$\alpha\beta = (ij)(kl) = [(ij)(ki)][(ki)(kl)] = (ikj)(ikl)$$

e assim  $\alpha\beta$  é um produto de dois 3-ciclos. Se  $\alpha$  e  $\beta$  não são disjuntas, digamos  $\alpha = (ij)$  e  $\beta = (jk)$ , então  $\alpha\beta = (ij)(jk) = (ijk)$  é um 3-ciclo. Logo  $\alpha\beta$  é sempre um produto de 3-ciclos se  $\alpha$  e  $\beta$  são transposições. Logo o mesmo ocorre com  $\tau$  e daí  $\tau \in \langle \{3\text{-ciclos}\} \rangle$ . Portanto,  $A_n = \langle \{3\text{-ciclos}\} \rangle$ . ◇

**Definição 1.21.** *Um grupo  $G$  é chamado de **simples** se  $\{1\}$  e  $G$  são seus únicos subgrupos normais.*

**Teorema 1.10.** *Seja  $n = 3$  ou  $n \geq 5$ . Então o grupo alternado  $A_n$  é um grupo simples.*

**Prova:** O grupo  $A_3$  tem ordem 3 e portanto é simples.

Sejam  $n \geq 5$  e  $H \neq \{1\}$  um subgrupo normal de  $A_n$ . Queremos mostrar que  $H = A_n$ . Pela Proposição 1.8.5 é suficiente mostrar que  $H$  contém todos os 3-ciclos.

Suponha que  $H$  contenha um 3-ciclo  $(abc)$ . Como  $n \geq 5$ , então  $\rho = (abc)$  fixa pelo menos duas letras e daí pelo Lema 1.8.3 para todo 3-ciclo  $(ijk)$ , existe  $\sigma \in A_n$  tal que  $(ijk) = \sigma(abc)\sigma^{-1}$ . Mas  $H \trianglelefteq A_n$ , logo  $(ijk) \in H$ . Portanto  $H = A_n$ .

Vamos mostrar agora que  $H$  sempre contém um 3-ciclo. Como  $H \neq \{1\}$ , então existe  $\sigma \in H$ ,  $\sigma \neq (1)$ . Denote  $m = |\sigma| > 1$ . Seja  $p$  um divisor primo de  $m$ . Assim  $\tau = \sigma^{m/p} \in H$  é tal que  $|\tau| = p$ . Escreva  $\tau = \rho_1 \cdots \rho_l$ , onde  $\rho_i \cap \rho_j = \emptyset$  para todo  $i \neq j$ . Sabemos que  $p = |\sigma| = \text{m.m.c}\{|\rho_1|, \dots, |\rho_l|\}$ . Portanto,  $\rho_i$  é um  $p$ -ciclo para  $i = 1, \dots, l$ .

1º Caso:  $p = 2$

Neste caso todos os  $\rho_i$ 's são transposições e  $l$  é um inteiro par pois  $\tau \in H \subseteq A_n$ . Assim  $l \geq 2$  e denotando  $\rho_1 = (ab)$ ,  $\rho_2 = (cd)$ , temos  $\tau = (ab)(cd)\rho_3 \cdots \rho_l$ . Agora como um 3-ciclo é

um produto de duas transposições com um elemento em comum, precisamos encontrar em  $H$  um produto da forma  $(ik)(ij)$ . Para fazer isso, primeiro vamos mostrar que se  $(ab)$  e  $(cd)$  forem transposições disjuntas, então  $(ac)(bd) \in H$ . Como  $(ab)$  e  $(cd)$  são disjuntos, sabemos que para  $\sigma = (abc)$  temos  $\sigma(ab)(cd)\sigma^{-1} = (\sigma(a)\sigma(b))(\sigma(c)\sigma(d))$ . Assim

$$\sigma(ab)(cd)\sigma^{-1} = (bc)(ad).$$

Como  $\sigma = (abc)$  e  $\rho_i$ , com  $i \geq 3$ , são disjuntos (pois caso contrário teríamos em  $\tau$  um  $r$ -ciclo com  $r \geq 2$ ), eles comutam. Logo

$$\sigma\tau\sigma^{-1} = (abc)(ab)(cd)\rho_3 \dots \rho_l(abc)^{-1} = (ad)(bc)\rho_l(abc)^{-1} = (ad)(bc)\rho_3 \dots \rho_l \in H$$

pois  $\tau \in H \trianglelefteq A_n$  e  $(abc) \in A_n$ . Mas  $\tau^{-1} \in H$ , daí

$$\sigma\tau\sigma^{-1}\tau^{-1} = (ad)(bc)\rho_3 \dots \rho_l\rho_l^{-1} \dots \rho_3^{-1}(bc)(ad) = (ad)(bc)(cd)(ab) = (ac)(bd) \in H,$$

como queríamos.

Agora tomando  $K \neq a, b, c, d$ , o que é possível pois  $n \geq 5$ , temos

$$(akc)(ac)(bd)(akc)^{-1} = (ak)(bd) \in H,$$

pois  $(ac)(bd) \in H \trianglelefteq A_n$  e  $(akc) \in A_n$ . Portanto  $(ac)(bd)(ak)(bd) = (ac)(ak)(bd)(bd) = (akc) \in H$  e com isso  $H = A_n$ .

2º Caso:  $p = 3$

Se  $l = 1$ , então  $\tau = \rho_1$  é um 3-ciclo em  $H$  e acabou.

Se  $l \geq 1$ , denote  $\rho_1 = (abc)$  e  $\rho_2 = (def)$ . Então  $\tau = (abc)(def)\rho_3 \dots \rho_l$ . Como por hipótese todos os  $\rho_i$ 's são disjuntos, então  $a, b, c, d, e$  e  $f$  não aparecem nos outros 3-ciclos  $\rho_3, \dots, \rho_l$ . Assim o 3-ciclo  $(bcd)$  é disjunto de  $\rho_3, \dots, \rho_l$  e com isso comuta com todos eles. Logo

$$(bcd)\tau(bcd)^{-1} = (bcd)(abc)(def)\rho_3 \dots \rho_l(bcd)^{-1} = (acd)(bef)\rho_3 \dots \rho_l \in H$$

e como  $\tau^{-1} \in H$  então

$$(bcd)\tau(bcd)^{-1}\tau^{-1} = (bcd)(abc)(def)\rho_3 \dots \rho_l(bcd)^{-1} = (acd)(bef)\rho_3 \dots \rho_l\rho_l^{-1} \dots \rho_3^{-1}(dfe)(acb) = (acd)(bef)(dfe)(acb)$$

Logo  $H$  contém um 5-ciclo e assim em particular um elemento de ordem 5. Daí basta provar o caso  $p > 3$ .

3º Caso:  $p > 3$

Seja  $\rho_1 = (a_1 a_2 a_3 a_4 \dots a_p)$  e  $\tau = (a_1 a_2 a_3 a_4 \dots a_p) \rho_2 \dots \rho_l$ . Novamente, por hipótese, todos os  $\rho_i$ 's são disjuntos e assim  $a_1, a_2, a_3, a_4, \dots, a_p$  não aparecem em  $\rho_2, \dots, \rho_l$ . Logo o 3-ciclo  $(a_1 a_2 a_3)$  é disjunto de  $\rho_2, \dots, \rho_l$  e então comuta com eles. Daí

$$(a_1 a_2 a_3) \tau (a_1 a_2 a_3)^{-1} = (a_2 a_3 a_1 a_4 \dots a_p) \rho_2 \dots \rho_l \in H$$

e com isso

$$(a_1 a_2 a_3) \tau (a_1 a_2 a_3)^{-1} \tau^{-1} = (a_2 a_3 a_1 a_4 \dots a_p) (a_1 a_2 a_3 a_4 \dots a_p)^{-1} \in H.$$

Mas  $(a_1 a_2 a_3 a_4 \dots a_p)^{-1} = (a_1 a_p a_{p-1} \dots a_4 a_3 a_2)$  e com isso

$$(a_2 a_3 a_1 a_4 \dots a_p) (a_1 a_p a_{p-1} \dots a_4 a_3 a_2) = (a_1 a_2 a_4) \in H.$$

Logo  $H = A_n$ , provando assim que  $A_n$  é simples se  $n = 3$  ou  $n \geq 5$ . ◇

**Teorema 1.11.** *Seja  $K = \{(1), (12)(34), (13)(24), (14)(23)\}$ . Então  $K \leq S_n$ , chamado de grupo de Klein pois todos os seus elementos têm ordem 2. Mais ainda,  $\{(1)\}$ ,  $K$  e  $A_4$  são os únicos subgrupos normais de  $A_4$ .*

**Prova:** É imediato verificar que  $K \leq S_4$ . Provemos então que  $K \trianglelefteq S_4$ . Como os elementos de  $S_4$  podem ser escritos como produtos de ciclos disjuntos, então  $A_4 = \{3\text{-ciclos}\} \cup K$ . Daí o único sugrupo de ordem 4 em  $A_4$  é  $K$ . Logo  $K \trianglelefteq S_4$ .

Agora seja  $H \neq \{(1)\}$  um subgrupo normal em  $A_4$ . Se  $H$  contém um 3-ciclo, digamos  $(123)$ , então  $(132) = (123)^{-1} \in H$ . ASSIM  $(124) = (324)(132)(324)^{-1} \in H$  pois  $H \trianglelefteq A_4$ . Mas  $A_4 = \langle (123), (124) \rangle$  e com isso  $H = A_4$ .

Se  $H$  não contém nenhum 3-ciclo, então ele deve conter um elemento diferente de  $(1)$ , digamos  $(12)(34)$ . Assim  $(13)(24) = (234)(12)(34)(234)^{-1} \in H$  e  $(14)(23) = (12)(34)(13)(24) \in H$ . Portanto  $H = K$  e o resultado está provado. ◇

**Corolário 1.8.3.** (i) *Seja  $n = 3$  ou  $n \geq 5$ . Então os grupos  $\{(1)\}$ ,  $A_n$  e  $S_n$  são os únicos subgrupos normais de  $S_n$ . Em particular, o grupo alternado  $A_n$  é o único subgrupo normal de  $S_n$  de índice 2.*

- (ii) Sejam  $n = 4$  e  $K$  o grupo de Klein. Então  $\{(1)\}$ ,  $K$ ,  $A_4$  e  $S_4$  são os únicos subgrupos normais de  $S_4$ . Em particular, o grupo alternado  $A_4$  é o único subgrupo de  $S_4$  de índice 2.

**Corolário 1.8.4.** *Seja  $n \geq 5$ . Então*

- (i)  $(S_n)' = A_n$ ,  $(A_n)' = A_n$ ;  
(ii)  $Z(S_n) = \{(1)\}$ ,  $Z(A_n) = \{(1)\}$ ;  
(iii)  $I(S_n) \cong S_n$ ,  $I(A_n) \cong A_n$ .

---

## 1.9 Teoremas de Sylow

---

**Teorema 1.12** ( $1^\circ$  Teorema de Sylow). *Seja  $G$  um grupo finito tal que  $|G| = p^m b$ , onde  $p$  é primo e  $\text{m.d.c}\{p, b\} = 1$ . Então, para cada  $i$ ,  $0 \leq i \leq m$ , existe um subgrupo  $H$  de  $G$  tal que  $|H| = p^i$ .*

**Prova:** A demonstração será por indução sobre a ordem de  $G$ .

Se  $|G| = 1$ , então nada há a fazer. Assim, suponha que  $|G| > 1$  e que o teorema seja válido para todo grupo de ordem menor que a ordem de  $G$ . Seja  $p$  o primo que aparece no enunciado do teorema. Considere o centro,  $Z(G)$ , de  $G$ . Temos duas possibilidades para o primo  $p$ .

$1^\circ$  Caso:  $p \mid |Z(G)|$

Neste caso, Pelo Teorema de Cauchy, existe  $g \in Z(G)$ ,  $g \neq 1$  tal que  $|g| = p$ . Seja  $N = \langle g \rangle$ , assim como  $N \trianglelefteq Z(G)$  e  $Z(G)$  é característico em  $G$ , segue que  $N \trianglelefteq G$ . Logo  $G/N$  é um grupo e  $|G/N| = p^{m-1}b < |G|$  e daí pela hipótese de indução, para cada  $t$ ,  $0 \leq t \leq m-1$ , existe  $\bar{S}$  subgrupo de  $G/N$  tal que  $|\bar{S}| = p^t$ . Agora, considere o homomorfismo

$$\begin{aligned} f : G &\rightarrow G/N \\ g &\mapsto Ng \end{aligned}$$

Temos que  $f^{-1}(\bar{S})$  é um subgrupo de  $G$  tal que  $\ker(f) \subset f^{-1}(\bar{S})$ . Inicialmente temos  $\ker(f) = N$  pois como  $f(g) = Ng$ , se tomarmos  $g \in N$  teremos  $Ng = N$ . Agora dado

$g \in \ker(f)$ ,  $f(g) = Ng = N$  e como  $\bar{S}$  é um subgrupo de  $G/N$  temos que  $N \in \bar{S}$  e assim  $f(g) \in \bar{S}$  e conseqüentemente  $g \in f^{-1}(\bar{S})$ , ou seja,  $\ker(f) \subset f^{-1}(\bar{S})$ . Daí

$$|f^{-1}(\bar{S})| = |N||\bar{S}| = p^{t+1},$$

e assim para cada  $n$ ,  $0 < n < m$ , existe  $H$  subgrupo de  $G$  tal que  $|H| = p^n$ .

2º Caso:  $p \nmid |Z(G)|$

Neste caso, sejam  $G^* = G - Z(G)$  e  $S_{G^*}$  o conjunto de todas as bijeções de  $G^*$  em  $G^*$  ( $S_{G^*}$  é um grupo com a operação de composição de funções). Considere a aplicação

$$\begin{aligned}\phi : G &\rightarrow S_{G^*} \\ g &\mapsto \phi_g : G^* \rightarrow G^* \\ x &\mapsto x^g = gxg^{-1}\end{aligned}$$

Inicialmente temos que  $\phi$  está bem definida. De fato, seja  $y \notin Z(G)$ , então  $y^x \notin Z(G)$ , pois caso contrário teríamos

$$y^x \in Z(G) \Rightarrow (y^x)^{x^{-1}} \in Z(G) \quad \text{e} \quad (y^x)^{x^{-1}} = x^{-1}(xyx^{-1})x = y \notin Z(G).$$

Mais ainda,  $\phi$  é um homomorfismo de grupos, pois se  $g, h \in G$ , então

$$\begin{aligned}\phi_{gh}(x) &= x^{gh} = (gh)x(gh)^{-1} = (gh)x(h^{-1}g^{-1}) = g(hxh^{-1})g^{-1} \\ &= g(\phi_h(x))g^{-1} = \phi_g(\phi_h(x)) = (\phi_g\phi_h)(x).\end{aligned}$$

Logo  $\phi_{gh} = \phi_g\phi_h$  e assim  $\phi$  é uma representação de  $G$  em  $S_{G^*}$ .

Agora, observando que  $\phi_g(x) = gxg^{-1} = y \in G^*$ , podemos definir em  $G^*$  uma relação de equivalência da seguinte forma

$$y \sim x \text{ se, e somente se, existe } g \in G \text{ tal que } \phi_g(x) = y, \text{ ou seja, } gxg^{-1} = y.$$

Como  $\sim$  é uma relação de equivalência em  $G^*$ , segue que  $G^*$  é a união disjunta de suas classes de equivalência. Denotamos por  $orb_\phi(x)$  a classe de equivalência de  $x$  em  $G^*$ , que também são chamadas de **órbitas** (de  $x$  segundo  $\phi$ ), temos

$$orb_\phi(x) = \{y \in G^* : y \sim x\} = \{y \in G^* : \phi_g(x) = y, \text{ para algum } g \in G\}$$

e assim

$$G^* = \bigcup \text{orb}_\phi(x)$$

e segue também que  $|G^*| = \sum |\text{orb}_\phi(x)|$ .

Pela Proposição 1.6.3, temos que

$$|\text{orb}_\phi(x)| = |G : C_x|,$$

onde

$$\begin{aligned} C_x &= \{g \in G : \phi_g(x) = x\} = \{g \in G : gxg^{-1} = x\} \\ &= \{g \in G : gx = xg\} = C_G(x) \end{aligned}$$

e daí  $|\text{orb}_\phi(x)| = |G : C_G(x)|$ .

Como  $G^* = G - Z(G)$  temos que  $|G^*| = |G| - |Z(G)|$  e como  $p \mid |G|$  e  $p \nmid |Z(G)|$ , então  $p \nmid |G^*|$ . Por outro lado,  $|G^*| = \sum |G : C_G(x)|$  e assim existe  $x \in G^*$  tal que  $p \nmid |G : C_G(x)|$ . Como  $x \in G^*$ , então  $x \notin Z(G)$  e assim  $C_G(x)$  é um subgrupo próprio de  $G$ , ou seja,  $|C_G(x)| < |G|$  e daí pela hipótese de indução  $C_G(x)$  possui um subgrupo de ordem  $p^n$  para cada  $p^n \mid |C_G(x)|$  e consequentemente o mesmo ocorre em  $G$ .  $\diamond$

**Corolário 1.9.1** (Generalização do Lema de Cauchy). . *Sejam  $G$  um grupo finito e  $p$  um número primo que divide  $|G|$ . Então existe um elemento  $x \in G$  de ordem  $p$ .*

**Corolário 1.9.2.** *Seja  $G$  um grupo finito e seja  $p$  um número primo. Seja  $p^m$  a maior potência de  $p$  que divide  $|G|$ . Então existe um subgrupo de  $G$  de ordem  $p^m$ .*

**Definição 1.22.** *Sejam  $G$  um grupo finito tal que  $|G| = p^m b$ , onde  $p$  é primo e  $\text{m.d.c}\{p, b\} = 1$ . Os subgrupos de  $G$  que têm ordem  $p^m$  são chamados de  **$p$ -subgrupos de Sylow** de  $G$ .*

**Definição 1.23.** *Dado um subgrupo  $H$  de um grupo  $G$ , o conjunto*

$$N_G(H) = \{a \in G \mid aHa^{-1} = H\}$$

*é chamado de **normalizador de  $H$  em  $G$** .*

**Proposição 1.9.1.** *Seja  $H$  um subgrupo de um grupo  $G$ . Então  $N_G(H)$  é um subgrupo de  $G$  e  $H \trianglelefteq N_G(H)$ . Mais ainda,  $H \trianglelefteq G$  se, e somente se,  $N_G(H) = G$ .*

**Lema 1.9.1.** *Sejam  $G$  um grupo finito e  $p$  um número primo. Sejam  $H$  um  $p$ -subgrupo de Sylow de  $G$  e  $K$  um  $p$ -subgrupo qualquer de  $G$ . Então  $K \cap N_G(H) = K \cap H$ .*

**Prova:** Suponhamos que  $K \cap H \subsetneq K \cap N_G(H)$  e seja  $x \in K \cap N_G(H) \setminus H$ . O elemento  $x$  tem ordem igual a uma potência de  $p$  pois  $x \in K$  e por hipótese  $K$  é um  $p$ -grupo de  $G$ . Como  $x \in N_G(H)$ , então  $\langle x \rangle$  é um subgrupo de  $N_G(H)$ . Mas  $H \trianglelefteq N_G(H)$  e daí  $\langle x \rangle H$  é um subgrupo de  $N_G(H)$  e portanto um subgrupo de  $G$ . Além disso, sabemos que

$$|\langle x \rangle H| = \frac{|\langle x \rangle| |H|}{|\langle x \rangle \cap H|},$$

onde  $|\langle x \rangle|$  e  $|H|$  são potências de  $p$  e  $|\langle x \rangle \cap H| < |\langle x \rangle|$  pois  $x \notin H$ . Logo,  $\langle x \rangle H$  é um  $p$ -subgrupo de  $G$  de ordem maior que  $|H|$ , o que é um absurdo pois  $H$  é um  $p$ -subgrupo de Sylow de  $G$ .  $\diamond$

**Teorema 1.13** (2º Teorema de Sylow). *Seja  $G$  um grupo finito,  $p$  um número primo e seja  $n_p$  o número de  $p$ -subgrupos de Sylow de  $G$ . Então:*

- (i) *Todos os  $p$ -subgrupos de Sylow de  $G$  são conjugados entre si. Em particular, um  $p$ -subgrupo de Sylow  $S$  de  $G$  é normal em  $G$  se, e somente se,  $S$  é o único  $p$ -subgrupo de Sylow de  $G$ .*
- (ii) *Se  $K$  é um  $p$ -subgrupo de  $G$ , então existe um  $p$ -subgrupo de Sylow  $S$  de  $G$  tal que  $K \subseteq S$ .*
- (iii) *Se  $S$  é um  $p$ -subgrupo de Sylow de  $G$ , então  $n_p = [G : N_G(S)]$ .*

**Teorema 1.14** (3º Teorema de Sylow). *Sejam  $p$  um número primo e  $G$  um grupo finito de ordem  $|G| = p^m b$ , com  $\text{m.d.c}\{p, b\} = 1$ . Seja  $n_p$  o número de  $p$ -subgrupos de Sylow de  $G$ . Então*

$$\begin{cases} n_p \mid b \\ n_p \equiv 1 \pmod{p} \end{cases}.$$

**Proposição 1.9.2.** *Sejam  $H$  um  $p$ -subgrupo de Sylow de um grupo finito  $G$  e  $K \leq G$ . Se  $H \subseteq K$ , então  $K = N_G(K)$ .*

**Prova:** Seja  $x \in N_G(K)$ . Como  $H \subseteq K \trianglelefteq N_G(K)$ , segue que  $xHx^{-1} \subseteq K$ . Mas  $H$  e  $xHx^{-1}$  são  $p$ -subgrupos de Sylow de  $K$ , daí existe  $y \in H$  tal que  $xHx^{-1} = yHy^{-1}$ . Assim  $y^{-1}x \in N_G(H) \subseteq K$ . Ou seja,  $x \in K$  e portanto  $N_G(H) = H$ .  $\diamond$



**Corolário 1.9.3.** *Seja  $H$  um  $p$ -subgrupo de Sylow de um grupo finito  $G$ . Então  $N_G(N_G(H)) = N_G(H)$ .*

**Prova:** Basta tomar  $K = N_G(H)$  na proposição anterior. ◇

Grupos livres

Grupos Solúveis

Grupos Nilpotentes



---

## BIBLIOGRAFIA

- [1] Garcia, A.; Lequain, Y., *Elementos de Álgebra*, Impa, 2010.
- [2] Gonçalves, A., *Introdução à Álgebra*, Projeto Euclides, Impa, 2006.
- [3] Lang, S., *Algebra*, Boston: Addison-Wesley, 1984.
- [4] Newman, M., *Integral Matrices*, Monographs and Textbooks in Pure and Applied Mathematics, Vol. 45, Academic Press; 1st edition 1972.



---

# ÍNDICE REMISSIVO

Classe de Conjugação, [26](#)

Elementos

Conjugados, [26](#)

Equação de Classes, [27](#)

Grupo Alternado, [37](#)

Grupos, [5](#)

$p$ -grupos, [27](#)

índice, [13](#)

Abelianos, [6](#)

Associatividade, [5](#)

Centro, [9](#)

classe lateral à direita, [12](#)

classe lateral à esquerda, [12](#)

Cíclicos, [11](#)

Dihedral, [19](#)

Elemento neutro, [5](#)

Inverso, [5](#)

Ordem, [11](#)

Potências de um elemento, [7](#)

Quociente, [18](#)

Simples, [40](#)

Triviais, [9](#)

Homomorfismo, [19](#)

Imagem, [20](#)

Isomorfismo, [20](#)

Projeção Canônica, [20](#)

Homomorfismo

Kernel, [20](#)

Ordem

de elemento, [8](#)

Permutações

$r$ -ciclo, [32](#)

Ímpares, [36](#)

disjuntas, [32](#)

Pares, [36](#)

Sinal, [36](#)

Tipo de decomposição, [38](#)

transposições, [32](#)

Subgrupos, [9](#)

dos comutadores, [12](#)

gerados por um conjunto, [11](#)