

Matrizes

José Antônio O. Freitas

Definição

Uma matriz A , $m \times n$ é uma tabela contendo mn números organizados em m linhas e n colunas sendo escrita como

$$A = \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \cdots & a_{2n} \\ \vdots & \vdots & \cdots & \vdots \\ a_{m1} & a_{m2} & \cdots & a_{mn} \end{pmatrix}$$

ou

$$A = \begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \cdots & a_{2n} \\ \vdots & \vdots & \cdots & \vdots \\ a_{m1} & a_{m2} & \cdots & a_{mn} \end{bmatrix}.$$

A i -ésima linha de A é

$$\begin{bmatrix} a_{i1} & a_{i2} & \cdots & a_{in} \end{bmatrix}$$

para $i = 1, \dots, m$.

Agora a j -ésima coluna de A é

$$\begin{bmatrix} a_{1j} \\ a_{2j} \\ \vdots \\ a_{mj} \end{bmatrix}$$

para $j = 1, \dots, n$.

Usaremos também a notação

$$A = (a_{ij})_{m \times n}$$

para denotar uma matriz A de m linhas por n colunas.

Nesse caso diremos que a_{ij} ou $[A]_{ij}$ é o **elemento** ou a **entrada** na posição i, j da matriz A .

Quando $m = n$, diremos que A é uma **matriz quadrada de ordem n** e que os elementos $a_{11}, a_{22}, \dots, a_{nn}$ formam a **diagonal principal** de A .

Exemplos

Considere as seguintes matrizes:

$$A = \begin{bmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 4 \end{bmatrix}, B = \begin{bmatrix} -3 & 0 \\ 0 & 0 \end{bmatrix}, C = \begin{bmatrix} 1 & 2 & -\sqrt{2} \\ 1/3 & 4\pi & -3/2 \end{bmatrix},$$

$$D = \begin{bmatrix} 1 & 2 & 0 & -3 & 8 \end{bmatrix}, E = \begin{bmatrix} 12 \\ 3 \\ 0,3 \\ 2,5 \end{bmatrix}, F = \begin{bmatrix} 1 \end{bmatrix}$$

Definição

Uma matriz que possui uma única linha é chamada de **matriz linha**, e uma matriz que possui uma única coluna é chamada de **matriz coluna**.

Definição

Dadas duas matrizes $A = (a_{ij})_{m \times n}$ e $B = (b_{ij})_{p \times q}$, dizemos que A e B são **iguais** e escrevemos $A = B$ se:

- 1) $m = p$ e $n = q$,
- 2) $a_{ij} = b_{ij}$ para $i = 1, \dots, m$ e $j = 1, \dots, n$.

se:

- 1) $m = p$ e $n = q$,
- 2) $a_{ij} = b_{ij}$ para $i = 1, \dots, m$ e $j = 1, \dots, n$.

se:

- 1) $m = p$ e $n = q$,
- 2) $a_{ij} = b_{ij}$ para $i = 1, \dots, m$ e $j = 1, \dots, n$.

Definição

Dadas duas matrizes de mesmo tamanho, $A = (a_{ij})_{m \times n}$ e $B = (b_{ij})_{m \times n}$ definimos a soma de A com B como sendo a matriz

$$C = A + B = (c_{ij})_{m \times n}$$

onde

$$c_{ij} = a_{ij} + b_{ij}$$

para $i = 1, \dots, m$ e $j = 1, \dots, n$.

Exemplos

Considere as matrizes:

$$A = \begin{bmatrix} 1 & 3 \\ 2 & 4 \\ -3 & 0 \end{bmatrix}, B = \begin{bmatrix} -2 & 0 \\ 1 & 3 \\ 5 & -4 \end{bmatrix}.$$

Denotando por C a soma de A e B , então

$$C = A + B = \begin{bmatrix} 1 + (-2) & 3 + 0 \\ 2 + 1 & 4 + 3 \\ -3 + 5 & 0 + (-4) \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -1 & 3 \\ 3 & 7 \\ 2 & -4 \end{bmatrix}$$

Definição

Dada uma matriz $A = (a_{ij})_{m \times n}$. A **multiplicação de A por um escalar(número)** α é definida como sendo a matriz

$$B = \alpha A$$

obtida multiplicando cada entrada da matriz A pelo número α , ou seja,

$$b_{ij} = \alpha a_{ij}$$

para $i = 1, \dots, m$ e $j = 1, \dots, n$. Nesse caso dizemos que a matriz B é um **múltiplo escalar** da matriz A.

Exemplo

O produto da matriz

$$A = \begin{bmatrix} -1 & 3 \\ 3 & 7 \\ 2 & -4 \end{bmatrix}$$

pelo escalar -2 é dada por

$$-2A = \begin{bmatrix} (-2)(-1) & (-2)(3) \\ (-2)3 & (-2)7 \\ (-2)2 & (-2)(-4) \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 2 & 6 \\ -6 & -14 \\ -4 & 8 \end{bmatrix}.$$

Definição

*Dadas duas matrizes A e B tais que $A = (a_{ij})_{m \times p}$ e $B = (b_{ij})_{p \times n}$, isto é, o **número de colunas de A é igual ao número de linhas de B** podemos definir o **produto de A por B** denotado por*

$$C = AB.$$

A matriz C será uma matriz $m \times n$ obtida da seguinte forma

$$c_{ij} = a_{i1}b_{1j} + a_{i2}b_{2j} + \cdots + a_{ip}b_{pj} \quad (1)$$

para $i = 1, \dots, m$ e $j = 1, \dots, n$.

A equação (1) está dizendo que para obtermos o elemento na posição i, j da matriz C precisamos realizar a soma dos produtos dos elementos da i -ésima linha de A pelos elementos correspondentes da j -ésima coluna de B :

$$\begin{bmatrix} c_{11} & \cdots & c_{1n} \\ \vdots & c_{ij} & \vdots \\ c_{m1} & \cdots & c_{mn} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n} \\ \vdots & \vdots & \vdots & \vdots \\ a_{i1} & a_{i2} & \cdots & a_{in} \\ \vdots & \vdots & \vdots & \vdots \\ a_{m1} & \cdots & \cdots & a_{mn} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} b_{11} & \cdots & b_{1j} & \cdots & b_{1n} \\ b_{21} & \cdots & b_{2j} & \cdots & b_{2n} \\ \vdots & \cdots & \vdots & \cdots & \vdots \\ b_{p1} & \cdots & b_{pj} & \cdots & b_{pn} \end{bmatrix}$$

Exemplo

Considere as seguintes matrizes:

$$A = \begin{bmatrix} 1 & 3 \\ 2 & 4 \\ -3 & 0 \end{bmatrix}, \quad B = \begin{bmatrix} -2 & 1 & 0 \\ 0 & 3 & 1 \\ 1 & 2 & 0 \end{bmatrix}$$

Nesse caso não podemos fazer o produto de A por B pois A é uma matriz 3×2 e B é uma matriz 3×3 . Mas podemos realizar o produto BA . Nesse caso fazendo $C = BA$ obtemos

$$\begin{aligned} C = BA &= \begin{bmatrix} -2 & 1 & 0 \\ 0 & 3 & 1 \\ 1 & 2 & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 & 3 \\ 2 & 4 \\ -3 & 0 \end{bmatrix} \\ &= \begin{bmatrix} (-2)1 + 1 \cdot 1 + 0(-3) & (-2)3 + 1 \cdot 3 + 0 \cdot 3 \\ 0 \cdot 1 + 3 \cdot 2 + 1(-3) & 0 \cdot 3 + 3 \cdot 4 + 1 \cdot 0 \\ 1 \cdot 1 + 2 \cdot 2 + 0(-3) & 1 \cdot 3 + 2 \cdot 4 + 0 \cdot 0 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -1 & -3 \\ 3 & 12 \\ 5 & 11 \end{bmatrix} \end{aligned}$$

Definição

A **transposta** de uma matriz $A = (a_{ij})_{m \times n}$ é definida como sendo a matriz $n \times m$

$$B = A^t$$

obtida trocando-se as linhas com as colunas de A , ou seja,

$$b_{ij} = a_{ji}$$

para $i = 1, \dots, n$ e $j = 1, \dots, m$.

Exemplos

As transpostas das matrizes

$$A = \begin{bmatrix} -3 & 1 \\ 0 & 0 \end{bmatrix}, B = \begin{bmatrix} 1 & 2 & -\sqrt{2} \\ 1/3 & 4\pi & -3/2 \end{bmatrix}, C = [1 \quad 2 \quad 0 \quad -3 \quad 8],$$

$$D = \begin{bmatrix} 12 \\ 3 \\ 0,3 \\ 2,5 \end{bmatrix}, E = [1]$$

são as matrizes

$$A^t = \begin{bmatrix} -3 & 0 \\ 1 & 0 \end{bmatrix}, B^t = \begin{bmatrix} 1 & 1/3 \\ 2 & 4\pi \\ -\sqrt{2} & -3/2 \end{bmatrix}, C^t = \begin{bmatrix} 1 \\ 2 \\ 0 \\ -3 \\ 8 \end{bmatrix},$$

$$D^t = [12 \quad 3 \quad 0,3 \quad 2,5], E^t = [1].$$

Teorema

Sejam A , B e C matrizes com tamanhos apropriados, α e β escalares. Então as seguintes propriedades são válidas:

- 1) (Comutatividade) $A + B = B + A$
- 2) (Associatividade) $(A + B) + C = A + (B + C)$
- 3) (Elemento Neutro) A matriz denotada por $\bar{0}$, $m \times n$, definida por $\bar{0} = (0)_{m \times n}$, para todo $i = 1, \dots, m$ e todo $j = 1, \dots, n$ é tal que

$$A + \bar{0} = A$$

para toda matriz A , $m \times n$. Tal matriz é chamada de **matriz nula** $m \times n$.

Teorema

4) (*Elemento simétrico ou oposto*) Para cada matriz $A = (a_{ih})$, existe uma única matriz $-A$, definida por

$$-A = (-a_{ij})$$

tal que

$$A + (-A) = \bar{0}.$$

5) (*Associatividade*) $(\alpha\beta)A = \alpha(\beta A)$

6) (*Distributividade*) $(\alpha + \beta)A = \alpha A + \beta A$

7) (*Distributividade*) $\alpha(A + B) = \alpha A + \alpha B$

8) (*Associatividade*) $(AB)C = A(BC)$

Teorema

9) (*Elemento Neutro*) Para cada inteiro positivo p a matriz $p \times p$ dada por

$$I_p = \begin{bmatrix} 1 & 0 & \cdots & 0 \\ 0 & 1 & \cdots & 0 \\ \vdots & & \ddots & \vdots \\ 0 & 0 & \cdots & 1 \end{bmatrix}$$

chamada de **matriz identidade** e tal que

$$AI_n = I_m A = A$$

para toda matriz $A = (a_{ij})_{m \times n}$.

Teorema

10) (*Distributividade*) $A(B + C) = AB + AC$ e $(B + C)A = BA + CA$

11) $\alpha(AB) = (\alpha A)B = A(\alpha B)$

12) $(A^t)^t = A$

13) $(A + B)^t = A^t + B^t$

14) $(\alpha A)^t = \alpha A^t$

15) $(AB)^t = B^t A^t$