

Funções - Imagem Direta e Inversa

José Antônio O. Freitas

MAT-UnB

Definição

Seja $f: A \rightarrow B$

Definição

Seja $f: A \rightarrow B$ uma função.

Definição

Seja $f: A \rightarrow B$ uma função.

i) Dado $P \subseteq A$,

Definição

Seja $f: A \rightarrow B$ uma função.

i) Dado $P \subseteq A$, chama-se **imagem direta**

Definição

Seja $f: A \rightarrow B$ uma função.

i) Dado $P \subseteq A$, chama-se **imagem direta** de P

Definição

Seja $f: A \rightarrow B$ uma função.

i) Dado $P \subseteq A$, chama-se **imagem direta** de P **segundo** f

Definição

Seja $f: A \rightarrow B$ uma função.

- i) Dado $P \subseteq A$, chama-se **imagem direta** de P **segundo** f e indica-se por $f(P)$

Definição

Seja $f: A \rightarrow B$ uma função.

- i) Dado $P \subseteq A$, chama-se **imagem direta** de P **segundo** f e indica-se por $f(P)$ o subconjunto de B

Definição

Seja $f: A \rightarrow B$ uma função.

- i) Dado $P \subseteq A$, chama-se **imagem direta** de P **segundo** f e indica-se por $f(P)$ o subconjunto de B dado por

Definição

Seja $f: A \rightarrow B$ uma função.

- i) Dado $P \subseteq A$, chama-se **imagem direta** de P **segundo** f e indica-se por $f(P)$ o subconjunto de B dado por

$$f(P) =$$

Definição

Seja $f: A \rightarrow B$ uma função.

- i) Dado $P \subseteq A$, chama-se **imagem direta** de P **segundo** f e indica-se por $f(P)$ o subconjunto de B dado por

$$f(P) = \{f(x)$$

Definição

Seja $f: A \rightarrow B$ uma função.

- i) Dado $P \subseteq A$, chama-se **imagem direta** de P **segundo** f e indica-se por $f(P)$ o subconjunto de B dado por

$$f(P) = \{f(x) \mid x \in P\},$$

Definição

Seja $f: A \rightarrow B$ uma função.

- i) Dado $P \subseteq A$, chama-se **imagem direta** de P **segundo** f e indica-se por $f(P)$ o subconjunto de B dado por

$$f(P) = \{f(x) \mid x \in P\},$$

isto é,

Definição

Seja $f: A \rightarrow B$ uma função.

- i) Dado $P \subseteq A$, chama-se **imagem direta** de P **segundo** f e indica-se por $f(P)$ o subconjunto de B dado por

$$f(P) = \{f(x) \mid x \in P\},$$

isto é, $f(P)$

Definição

Seja $f: A \rightarrow B$ uma função.

- i) Dado $P \subseteq A$, chama-se **imagem direta** de P **segundo** f e indica-se por $f(P)$ o subconjunto de B dado por

$$f(P) = \{f(x) \mid x \in P\},$$

isto é, $f(P)$ é o conjunto das imagens por f

Definição

Seja $f: A \rightarrow B$ uma função.

- i) Dado $P \subseteq A$, chama-se **imagem direta** de P **segundo** f e indica-se por $f(P)$ o subconjunto de B dado por

$$f(P) = \{f(x) \mid x \in P\},$$

isto é, $f(P)$ é o conjunto das imagens por f dos elementos de P .

Definição

Seja $f: A \rightarrow B$ uma função.

- i) Dado $P \subseteq A$, chama-se **imagem direta** de P **segundo** f e indica-se por $f(P)$ o subconjunto de B dado por

$$f(P) = \{f(x) \mid x \in P\},$$

isto é, $f(P)$ é o conjunto das imagens por f dos elementos de P .

- ii) Dado $Q \subseteq B$,

Definição

Seja $f: A \rightarrow B$ uma função.

- i) Dado $P \subseteq A$, chama-se **imagem direta** de P **segundo** f e indica-se por $f(P)$ o subconjunto de B dado por

$$f(P) = \{f(x) \mid x \in P\},$$

isto é, $f(P)$ é o conjunto das imagens por f dos elementos de P .

- ii) Dado $Q \subseteq B$, chama-se **imagem inversa**

Definição

Seja $f: A \rightarrow B$ uma função.

- i) Dado $P \subseteq A$, chama-se **imagem direta** de P **segundo** f e indica-se por $f(P)$ o subconjunto de B dado por

$$f(P) = \{f(x) \mid x \in P\},$$

isto é, $f(P)$ é o conjunto das imagens por f dos elementos de P .

- ii) Dado $Q \subseteq B$, chama-se **imagem inversa** de Q **segundo** f

Definição

Seja $f: A \rightarrow B$ uma função.

- i) Dado $P \subseteq A$, chama-se **imagem direta** de P **segundo** f e indica-se por $f(P)$ o subconjunto de B dado por

$$f(P) = \{f(x) \mid x \in P\},$$

isto é, $f(P)$ é o conjunto das imagens por f dos elementos de P .

- ii) Dado $Q \subseteq B$, chama-se **imagem inversa** de Q **segundo** f e indica-se por

Definição

Seja $f: A \rightarrow B$ uma função.

- i) Dado $P \subseteq A$, chama-se **imagem direta** de P **segundo** f e indica-se por $f(P)$ o subconjunto de B dado por

$$f(P) = \{f(x) \mid x \in P\},$$

isto é, $f(P)$ é o conjunto das imagens por f dos elementos de P .

- ii) Dado $Q \subseteq B$, chama-se **imagem inversa** de Q **segundo** f e indica-se por $f^{-1}(Q)$

Definição

Seja $f: A \rightarrow B$ uma função.

- i) Dado $P \subseteq A$, chama-se **imagem direta** de P **segundo** f e indica-se por $f(P)$ o subconjunto de B dado por

$$f(P) = \{f(x) \mid x \in P\},$$

isto é, $f(P)$ é o conjunto das imagens por f dos elementos de P .

- ii) Dado $Q \subseteq B$, chama-se **imagem inversa** de Q **segundo** f e indica-se por $f^{-1}(Q)$ o subconjunto de A

Definição

Seja $f: A \rightarrow B$ uma função.

- i) Dado $P \subseteq A$, chama-se **imagem direta** de P **segundo** f e indica-se por $f(P)$ o subconjunto de B dado por

$$f(P) = \{f(x) \mid x \in P\},$$

isto é, $f(P)$ é o conjunto das imagens por f dos elementos de P .

- ii) Dado $Q \subseteq B$, chama-se **imagem inversa** de Q **segundo** f e indica-se por $f^{-1}(Q)$ o subconjunto de A dado por

Definição

Seja $f: A \rightarrow B$ uma função.

- i) Dado $P \subseteq A$, chama-se **imagem direta** de P **segundo** f e indica-se por $f(P)$ o subconjunto de B dado por

$$f(P) = \{f(x) \mid x \in P\},$$

isto é, $f(P)$ é o conjunto das imagens por f dos elementos de P .

- ii) Dado $Q \subseteq B$, chama-se **imagem inversa** de Q **segundo** f e indica-se por $f^{-1}(Q)$ o subconjunto de A dado por

$$f^{-1}(Q)$$

Definição

Seja $f: A \rightarrow B$ uma função.

- i) Dado $P \subseteq A$, chama-se **imagem direta** de P **segundo** f e indica-se por $f(P)$ o subconjunto de B dado por

$$f(P) = \{f(x) \mid x \in P\},$$

isto é, $f(P)$ é o conjunto das imagens por f dos elementos de P .

- ii) Dado $Q \subseteq B$, chama-se **imagem inversa** de Q **segundo** f e indica-se por $f^{-1}(Q)$ o subconjunto de A dado por

$$f^{-1}(Q) = \{x \in A$$

Definição

Seja $f: A \rightarrow B$ uma função.

- i) Dado $P \subseteq A$, chama-se **imagem direta** de P **segundo** f e indica-se por $f(P)$ o subconjunto de B dado por

$$f(P) = \{f(x) \mid x \in P\},$$

isto é, $f(P)$ é o conjunto das imagens por f dos elementos de P .

- ii) Dado $Q \subseteq B$, chama-se **imagem inversa** de Q **segundo** f e indica-se por $f^{-1}(Q)$ o subconjunto de A dado por

$$f^{-1}(Q) = \{x \in A \mid f(x) \in Q\},$$

Definição

Seja $f: A \rightarrow B$ uma função.

- i) Dado $P \subseteq A$, chama-se **imagem direta** de P **segundo** f e indica-se por $f(P)$ o subconjunto de B dado por

$$f(P) = \{f(x) \mid x \in P\},$$

isto é, $f(P)$ é o conjunto das imagens por f dos elementos de P .

- ii) Dado $Q \subseteq B$, chama-se **imagem inversa** de Q **segundo** f e indica-se por $f^{-1}(Q)$ o subconjunto de A dado por

$$f^{-1}(Q) = \{x \in A \mid f(x) \in Q\},$$

isto é,

Definição

Seja $f: A \rightarrow B$ uma função.

- i) Dado $P \subseteq A$, chama-se **imagem direta** de P **segundo** f e indica-se por $f(P)$ o subconjunto de B dado por

$$f(P) = \{f(x) \mid x \in P\},$$

isto é, $f(P)$ é o conjunto das imagens por f dos elementos de P .

- ii) Dado $Q \subseteq B$, chama-se **imagem inversa** de Q **segundo** f e indica-se por $f^{-1}(Q)$ o subconjunto de A dado por

$$f^{-1}(Q) = \{x \in A \mid f(x) \in Q\},$$

isto é, $f^{-1}(Q)$

Definição

Seja $f: A \rightarrow B$ uma função.

- i) Dado $P \subseteq A$, chama-se **imagem direta** de P **segundo** f e indica-se por $f(P)$ o subconjunto de B dado por

$$f(P) = \{f(x) \mid x \in P\},$$

isto é, $f(P)$ é o conjunto das imagens por f dos elementos de P .

- ii) Dado $Q \subseteq B$, chama-se **imagem inversa** de Q **segundo** f e indica-se por $f^{-1}(Q)$ o subconjunto de A dado por

$$f^{-1}(Q) = \{x \in A \mid f(x) \in Q\},$$

isto é, $f^{-1}(Q)$ é o conjunto dos elementos de A

Definição

Seja $f: A \rightarrow B$ uma função.

- i) Dado $P \subseteq A$, chama-se **imagem direta** de P **segundo** f e indica-se por $f(P)$ o subconjunto de B dado por

$$f(P) = \{f(x) \mid x \in P\},$$

isto é, $f(P)$ é o conjunto das imagens por f dos elementos de P .

- ii) Dado $Q \subseteq B$, chama-se **imagem inversa** de Q **segundo** f e indica-se por $f^{-1}(Q)$ o subconjunto de A dado por

$$f^{-1}(Q) = \{x \in A \mid f(x) \in Q\},$$

isto é, $f^{-1}(Q)$ é o conjunto dos elementos de A que tem imagem em Q

Definição

Seja $f: A \rightarrow B$ uma função.

- i) Dado $P \subseteq A$, chama-se **imagem direta** de P **segundo** f e indica-se por $f(P)$ o subconjunto de B dado por

$$f(P) = \{f(x) \mid x \in P\},$$

isto é, $f(P)$ é o conjunto das imagens por f dos elementos de P .

- ii) Dado $Q \subseteq B$, chama-se **imagem inversa** de Q **segundo** f e indica-se por $f^{-1}(Q)$ o subconjunto de A dado por

$$f^{-1}(Q) = \{x \in A \mid f(x) \in Q\},$$

isto é, $f^{-1}(Q)$ é o conjunto dos elementos de A que tem imagem em Q através de f .

Definição

Seja $f: A \rightarrow B$ uma função.

- i) Dado $P \subseteq A$, chama-se **imagem direta** de P **segundo** f e indica-se por $f(P)$ o subconjunto de B dado por


$$f(P) = \{f(x) \mid x \in P\},$$

isto é, $f(P)$ é o conjunto das imagens por f dos elementos de P .


- ii) Dado $Q \subseteq B$, chama-se **imagem inversa** de Q **segundo** f e indica-se por $f^{-1}(Q)$ o subconjunto de A dado por

$$f^{-1}(Q) = \{x \in A \mid f(x) \in Q\},$$


isto é, $f^{-1}(Q)$ é o conjunto dos elementos de A que tem imagem em Q através de f .




$$f(x) = \tan(x)$$



$$f(x) = \tan(x)$$



$$g(x) = 3 \sin(x)$$



$$g(x) = 3 \sin(x)$$

Exemplos

1) Seja $A = \{1, 3, 5, 7, 9\}$

Exemplos

1) Seja $A = \{1, 3, 5, 7, 9\}$ e $B = \{0, 1, 2, 3, \dots, 10\}$

Exemplos

1) Seja $A = \{1, 3, 5, 7, 9\}$ e $B = \{0, 1, 2, 3, \dots, 10\}$ e $f: A \rightarrow B$

Exemplos

1) Seja $A = \{1, 3, 5, 7, 9\}$ e $B = \{0, 1, 2, 3, \dots, 10\}$ e $f: A \rightarrow B$ dada por $f(x) = x + 1$.

Exemplos

1) Seja $A = \{1, 3, 5, 7, 9\}$ e $B = \{0, 1, 2, 3, \dots, 10\}$ e $f: A \rightarrow B$ dada por $f(x) = x + 1$. Temos:

Exemplos

1) Seja $A = \{1, 3, 5, 7, 9\}$ e $B = \{0, 1, 2, 3, \dots, 10\}$ e $f: A \rightarrow B$ dada por $f(x) = x + 1$. Temos:

$$f(\{1\}) =$$

Exemplos

1) Seja $A = \{1, 3, 5, 7, 9\}$ e $B = \{0, 1, 2, 3, \dots, 10\}$ e $f: A \rightarrow B$ dada por $f(x) = x + 1$. Temos:

$$f(\{1\}) = \{f(1)\}$$

Exemplos

1) Seja $A = \{1, 3, 5, 7, 9\}$ e $B = \{0, 1, 2, 3, \dots, 10\}$ e $f: A \rightarrow B$ dada por $f(x) = x + 1$. Temos:

$$f(\{1\}) = \{f(1)\} = \{2\}$$

Exemplos

1) Seja $A = \{1, 3, 5, 7, 9\}$ e $B = \{0, 1, 2, 3, \dots, 10\}$ e $f: A \rightarrow B$ dada por $f(x) = x + 1$. Temos:

$$f(\{1\}) = \{f(1)\} = \{2\}$$

$$f(\{3, 5, 7\})$$

Exemplos

1) Seja $A = \{1, 3, 5, 7, 9\}$ e $B = \{0, 1, 2, 3, \dots, 10\}$ e $f: A \rightarrow B$ dada por $f(x) = x + 1$. Temos:

$$f(\{1\}) = \{f(1)\} = \{2\}$$

$$f(\{3, 5, 7\}) = \{f(3),$$

Exemplos

1) Seja $A = \{1, 3, 5, 7, 9\}$ e $B = \{0, 1, 2, 3, \dots, 10\}$ e $f: A \rightarrow B$ dada por $f(x) = x + 1$. Temos:

$$f(\{1\}) = \{f(1)\} = \{2\}$$

$$f(\{3, 5, 7\}) = \{f(3), f(5),$$

Exemplos

1) Seja $A = \{1, 3, 5, 7, 9\}$ e $B = \{0, 1, 2, 3, \dots, 10\}$ e $f: A \rightarrow B$ dada por $f(x) = x + 1$. Temos:

$$f(\{1\}) = \{f(1)\} = \{2\}$$

$$f(\{3, 5, 7\}) = \{f(3), f(5), f(7)\}$$

Exemplos

1) Seja $A = \{1, 3, 5, 7, 9\}$ e $B = \{0, 1, 2, 3, \dots, 10\}$ e $f: A \rightarrow B$ dada por $f(x) = x + 1$. Temos:

$$f(\{1\}) = \{f(1)\} = \{2\}$$

$$f(\{3, 5, 7\}) = \{f(3), f(5), f(7)\} = \{4, 6, 8\}$$

Exemplos

1) Seja $A = \{1, 3, 5, 7, 9\}$ e $B = \{0, 1, 2, 3, \dots, 10\}$ e $f: A \rightarrow B$ dada por $f(x) = x + 1$. Temos:

$$f(\{1\}) = \{f(1)\} = \{2\}$$

$$f(\{3, 5, 7\}) = \{f(3), f(5), f(7)\} = \{4, 6, 8\}$$

$$f(A)$$

Exemplos

1) Seja $A = \{1, 3, 5, 7, 9\}$ e $B = \{0, 1, 2, 3, \dots, 10\}$ e $f: A \rightarrow B$ dada por $f(x) = x + 1$. Temos:

$$f(\{1\}) = \{f(1)\} = \{2\}$$

$$f(\{3, 5, 7\}) = \{f(3), f(5), f(7)\} = \{4, 6, 8\}$$

$$f(A) = \{f(1),$$

Exemplos

1) Seja $A = \{1, 3, 5, 7, 9\}$ e $B = \{0, 1, 2, 3, \dots, 10\}$ e $f: A \rightarrow B$ dada por $f(x) = x + 1$. Temos:

$$f(\{1\}) = \{f(1)\} = \{2\}$$

$$f(\{3, 5, 7\}) = \{f(3), f(5), f(7)\} = \{4, 6, 8\}$$

$$f(A) = \{f(1), f(3),$$

Exemplos

1) Seja $A = \{1, 3, 5, 7, 9\}$ e $B = \{0, 1, 2, 3, \dots, 10\}$ e $f: A \rightarrow B$ dada por $f(x) = x + 1$. Temos:

$$f(\{1\}) = \{f(1)\} = \{2\}$$

$$f(\{3, 5, 7\}) = \{f(3), f(5), f(7)\} = \{4, 6, 8\}$$

$$f(A) = \{f(1), f(3), f(5), f(7), f(9)\} = \{2, 4, 6, 8, 10\}$$

Exemplos

1) Seja $A = \{1, 3, 5, 7, 9\}$ e $B = \{0, 1, 2, 3, \dots, 10\}$ e $f: A \rightarrow B$ dada por $f(x) = x + 1$. Temos:

$$f(\{1\}) = \{f(1)\} = \{2\}$$

$$f(\{3, 5, 7\}) = \{f(3), f(5), f(7)\} = \{4, 6, 8\}$$

$$f(A) = \{f(1), f(3), f(5), f(7),$$

Exemplos

1) Seja $A = \{1, 3, 5, 7, 9\}$ e $B = \{0, 1, 2, 3, \dots, 10\}$ e $f: A \rightarrow B$ dada por $f(x) = x + 1$. Temos:

$$f(\{1\}) = \{f(1)\} = \{2\}$$

$$f(\{3, 5, 7\}) = \{f(3), f(5), f(7)\} = \{4, 6, 8\}$$

$$f(A) = \{f(1), f(3), f(5), f(7), f(9)\} =$$

Exemplos

1) Seja $A = \{1, 3, 5, 7, 9\}$ e $B = \{0, 1, 2, 3, \dots, 10\}$ e $f: A \rightarrow B$ dada por $f(x) = x + 1$. Temos:

$$f(\{1\}) = \{f(1)\} = \{2\}$$

$$f(\{3, 5, 7\}) = \{f(3), f(5), f(7)\} = \{4, 6, 8\}$$

$$f(A) = \{f(1), f(3), f(5), f(7), f(9)\} = \{2, 4, 6, 8, 10\}$$

Exemplos

1) Seja $A = \{1, 3, 5, 7, 9\}$ e $B = \{0, 1, 2, 3, \dots, 10\}$ e $f: A \rightarrow B$ dada por $f(x) = x + 1$. Temos:

$$f(\{1\}) = \{f(1)\} = \{2\}$$

$$f(\{3, 5, 7\}) = \{f(3), f(5), f(7)\} = \{4, 6, 8\}$$

$$f(A) = \{f(1), f(3), f(5), f(7), f(9)\} = \{2, 4, 6, 8, 10\}$$

$$f(\emptyset)$$

Exemplos

1) Seja $A = \{1, 3, 5, 7, 9\}$ e $B = \{0, 1, 2, 3, \dots, 10\}$ e $f: A \rightarrow B$ dada por $f(x) = x + 1$. Temos:

$$f(\{1\}) = \{f(1)\} = \{2\}$$

$$f(\{3, 5, 7\}) = \{f(3), f(5), f(7)\} = \{4, 6, 8\}$$

$$f(A) = \{f(1), f(3), f(5), f(7), f(9)\} = \{2, 4, 6, 8, 10\}$$

$$f(\emptyset) = \emptyset$$

Exemplos

1) Seja $A = \{1, 3, 5, 7, 9\}$ e $B = \{0, 1, 2, 3, \dots, 10\}$ e $f: A \rightarrow B$ dada por $f(x) = x + 1$. Temos:

$$f(\{1\}) = \{f(1)\} = \{2\}$$

$$f(\{3, 5, 7\}) = \{f(3), f(5), f(7)\} = \{4, 6, 8\}$$

$$f(A) = \{f(1), f(3), f(5), f(7), f(9)\} = \{2, 4, 6, 8, 10\}$$

$$f(\emptyset) = \emptyset$$

$$f^{-1}(\{2, 4, 10\}) =$$

Exemplos

1) Seja $A = \{1, 3, 5, 7, 9\}$ e $B = \{0, 1, 2, 3, \dots, 10\}$ e $f: A \rightarrow B$ dada por $f(x) = x + 1$. Temos:

$$f(\{1\}) = \{f(1)\} = \{2\}$$

$$f(\{3, 5, 7\}) = \{f(3), f(5), f(7)\} = \{4, 6, 8\}$$

$$f(A) = \{f(1), f(3), f(5), f(7), f(9)\} = \{2, 4, 6, 8, 10\}$$

$$f(\emptyset) = \emptyset$$

$$f^{-1}(\{2, 4, 10\}) = \{x \in A$$

Exemplos

1) Seja $A = \{1, 3, 5, 7, 9\}$ e $B = \{0, 1, 2, 3, \dots, 10\}$ e $f: A \rightarrow B$ dada por $f(x) = x + 1$. Temos:

$$f(\{1\}) = \{f(1)\} = \{2\}$$

$$f(\{3, 5, 7\}) = \{f(3), f(5), f(7)\} = \{4, 6, 8\}$$

$$f(A) = \{f(1), f(3), f(5), f(7), f(9)\} = \{2, 4, 6, 8, 10\}$$

$$f(\emptyset) = \emptyset$$

$$f^{-1}(\{2, 4, 10\}) = \{x \in A \mid f(x)$$

Exemplos

1) Seja $A = \{1, 3, 5, 7, 9\}$ e $B = \{0, 1, 2, 3, \dots, 10\}$ e $f: A \rightarrow B$ dada por $f(x) = x + 1$. Temos:

$$f(\{1\}) = \{f(1)\} = \{2\}$$

$$f(\{3, 5, 7\}) = \{f(3), f(5), f(7)\} = \{4, 6, 8\}$$

$$f(A) = \{f(1), f(3), f(5), f(7), f(9)\} = \{2, 4, 6, 8, 10\}$$

$$f(\emptyset) = \emptyset$$

$$f^{-1}(\{2, 4, 10\}) = \{x \in A \mid f(x) \in \{2, 4, 10\}\}$$

Exemplos

1) Seja $A = \{1, 3, 5, 7, 9\}$ e $B = \{0, 1, 2, 3, \dots, 10\}$ e $f: A \rightarrow B$ dada por $f(x) = x + 1$. Temos:

$$f(\{1\}) = \{f(1)\} = \{2\}$$

$$f(\{3, 5, 7\}) = \{f(3), f(5), f(7)\} = \{4, 6, 8\}$$

$$f(A) = \{f(1), f(3), f(5), f(7), f(9)\} = \{2, 4, 6, 8, 10\}$$

$$f(\emptyset) = \emptyset$$

$$f^{-1}(\{2, 4, 10\}) = \{x \in A \mid f(x) \in \{2, 4, 10\}\} = \{1, 3, 9\}$$

Exemplos

1) Seja $A = \{1, 3, 5, 7, 9\}$ e $B = \{0, 1, 2, 3, \dots, 10\}$ e $f: A \rightarrow B$ dada por $f(x) = x + 1$. Temos:

$$f(\{1\}) = \{f(1)\} = \{2\}$$

$$f(\{3, 5, 7\}) = \{f(3), f(5), f(7)\} = \{4, 6, 8\}$$

$$f(A) = \{f(1), f(3), f(5), f(7), f(9)\} = \{2, 4, 6, 8, 10\}$$

$$f(\emptyset) = \emptyset$$

$$f^{-1}(\{2, 4, 10\}) = \{x \in A \mid f(x) \in \{2, 4, 10\}\} = \{1, 3, 9\}$$

$$f^{-1}(\{0, 1, 3, 5, 7, 9\})$$

Exemplos

1) Seja $A = \{1, 3, 5, 7, 9\}$ e $B = \{0, 1, 2, 3, \dots, 10\}$ e $f: A \rightarrow B$ dada por $f(x) = x + 1$. Temos:

$$f(\{1\}) = \{f(1)\} = \{2\}$$

$$f(\{3, 5, 7\}) = \{f(3), f(5), f(7)\} = \{4, 6, 8\}$$

$$f(A) = \{f(1), f(3), f(5), f(7), f(9)\} = \{2, 4, 6, 8, 10\}$$

$$f(\emptyset) = \emptyset$$

$$f^{-1}(\{2, 4, 10\}) = \{x \in A \mid f(x) \in \{2, 4, 10\}\} = \{1, 3, 9\}$$

$$f^{-1}(\{0, 1, 3, 5, 7, 9\}) = \{x \in A$$

Exemplos

1) Seja $A = \{1, 3, 5, 7, 9\}$ e $B = \{0, 1, 2, 3, \dots, 10\}$ e $f: A \rightarrow B$ dada por $f(x) = x + 1$. Temos:

$$f(\{1\}) = \{f(1)\} = \{2\}$$

$$f(\{3, 5, 7\}) = \{f(3), f(5), f(7)\} = \{4, 6, 8\}$$

$$f(A) = \{f(1), f(3), f(5), f(7), f(9)\} = \{2, 4, 6, 8, 10\}$$

$$f(\emptyset) = \emptyset$$

$$f^{-1}(\{2, 4, 10\}) = \{x \in A \mid f(x) \in \{2, 4, 10\}\} = \{1, 3, 9\}$$

$$f^{-1}(\{0, 1, 3, 5, 7, 9\}) = \{x \in A \mid f(x)$$

Exemplos

1) Seja $A = \{1, 3, 5, 7, 9\}$ e $B = \{0, 1, 2, 3, \dots, 10\}$ e $f: A \rightarrow B$ dada por $f(x) = x + 1$. Temos:

$$f(\{1\}) = \{f(1)\} = \{2\}$$

$$f(\{3, 5, 7\}) = \{f(3), f(5), f(7)\} = \{4, 6, 8\}$$

$$f(A) = \{f(1), f(3), f(5), f(7), f(9)\} = \{2, 4, 6, 8, 10\}$$

$$f(\emptyset) = \emptyset$$

$$f^{-1}(\{2, 4, 10\}) = \{x \in A \mid f(x) \in \{2, 4, 10\}\} = \{1, 3, 9\}$$

$$f^{-1}(\{0, 1, 3, 5, 7, 9\}) = \{x \in A \mid f(x) \in \{0, 1, 3, 5, 7, 9\}\}$$

Exemplos

1) Seja $A = \{1, 3, 5, 7, 9\}$ e $B = \{0, 1, 2, 3, \dots, 10\}$ e $f: A \rightarrow B$ dada por $f(x) = x + 1$. Temos:

$$f(\{1\}) = \{f(1)\} = \{2\}$$

$$f(\{3, 5, 7\}) = \{f(3), f(5), f(7)\} = \{4, 6, 8\}$$

$$f(A) = \{f(1), f(3), f(5), f(7), f(9)\} = \{2, 4, 6, 8, 10\}$$

$$f(\emptyset) = \emptyset$$

$$f^{-1}(\{2, 4, 10\}) = \{x \in A \mid f(x) \in \{2, 4, 10\}\} = \{1, 3, 9\}$$

$$f^{-1}(\{0, 1, 3, 5, 7, 9\}) = \{x \in A \mid f(x) \in \{0, 1, 3, 5, 7, 9\}\} = \emptyset$$

Exemplos

1) Seja $A = \{1, 3, 5, 7, 9\}$ e $B = \{0, 1, 2, 3, \dots, 10\}$ e $f: A \rightarrow B$ dada por $f(x) = x + 1$. Temos:

$$f(\{1\}) = \{f(1)\} = \{2\}$$

$$f(\{3, 5, 7\}) = \{f(3), f(5), f(7)\} = \{4, 6, 8\}$$

$$f(A) = \{f(1), f(3), f(5), f(7), f(9)\} = \{2, 4, 6, 8, 10\}$$

$$f(\emptyset) = \emptyset$$

$$f^{-1}(\{2, 4, 10\}) = \{x \in A \mid f(x) \in \{2, 4, 10\}\} = \{1, 3, 9\}$$

$$f^{-1}(\{0, 1, 3, 5, 7, 9\}) = \{x \in A \mid f(x) \in \{0, 1, 3, 5, 7, 9\}\} = \emptyset$$

Exemplos

2) *Sejam* $A = B = \mathbb{R}$

Exemplos

2) *Sejam* $A = B = \mathbb{R}$ e $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$

Exemplos

2) *Sejam $A = B = \mathbb{R}$ e $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ dada por $f(x) = x^2$.*

Exemplos

2) Sejam $A = B = \mathbb{R}$ e $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ dada por $f(x) = x^2$. Temos:

Exemplos

2) Sejam $A = B = \mathbb{R}$ e $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ dada por $f(x) = x^2$. Temos:

$$f(\{1, 2, 3\})$$

Exemplos

2) Sejam $A = B = \mathbb{R}$ e $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ dada por $f(x) = x^2$. Temos:

$$f(\{1, 2, 3\}) = \{1, 4, 9\}$$

Exemplos

2) Sejam $A = B = \mathbb{R}$ e $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ dada por $f(x) = x^2$. Temos:

$$f(\{1, 2, 3\}) = \{1, 4, 9\}$$

$$f([0, 2])$$

Exemplos

2) Sejam $A = B = \mathbb{R}$ e $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ dada por $f(x) = x^2$. Temos:

$$f(\{1, 2, 3\}) = \{1, 4, 9\}$$

$$f([0, 2]) = \{f(x)$$

Exemplos

2) Sejam $A = B = \mathbb{R}$ e $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ dada por $f(x) = x^2$. Temos:

$$f(\{1, 2, 3\}) = \{1, 4, 9\}$$

$$f([0, 2]) = \{f(x) \in \mathbb{R}\}$$

Exemplos

2) Sejam $A = B = \mathbb{R}$ e $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ dada por $f(x) = x^2$. Temos:

$$f(\{1, 2, 3\}) = \{1, 4, 9\}$$

$$f([0, 2]) = \{f(x) \in \mathbb{R} \mid 0 \leq x\}$$

Exemplos

2) Sejam $A = B = \mathbb{R}$ e $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ dada por $f(x) = x^2$. Temos:

$$f(\{1, 2, 3\}) = \{1, 4, 9\}$$

$$f([0, 2]) = \{f(x) \in \mathbb{R} \mid 0 \leq x \leq 2\}$$

Exemplos

2) Sejam $A = B = \mathbb{R}$ e $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ dada por $f(x) = x^2$. Temos:

$$f(\{1, 2, 3\}) = \{1, 4, 9\}$$

$$f([0, 2]) = \{f(x) \in \mathbb{R} \mid 0 \leq x \leq 2\} = \{x^2$$

Exemplos

2) Sejam $A = B = \mathbb{R}$ e $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ dada por $f(x) = x^2$. Temos:

$$f(\{1, 2, 3\}) = \{1, 4, 9\}$$

$$f([0, 2]) = \{f(x) \in \mathbb{R} \mid 0 \leq x \leq 2\} = \{x^2 \mid 0 \leq x \leq 2\}$$

Exemplos

2) Sejam $A = B = \mathbb{R}$ e $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ dada por $f(x) = x^2$. Temos:

$$f(\{1, 2, 3\}) = \{1, 4, 9\}$$

$$f([0, 2]) = \{f(x) \in \mathbb{R} \mid 0 \leq x \leq 2\} = \{x^2 \mid 0 \leq x \leq 2\} = [0, 4]$$

Exemplos

2) Sejam $A = B = \mathbb{R}$ e $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ dada por $f(x) = x^2$. Temos:

$$f(\{1, 2, 3\}) = \{1, 4, 9\}$$

$$f([0, 2]) = \{f(x) \in \mathbb{R} \mid 0 \leq x \leq 2\} = \{x^2 \mid 0 \leq x \leq 2\} = [0, 4]$$

$$f^{-1}([1, 9])$$

Exemplos

2) Sejam $A = B = \mathbb{R}$ e $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ dada por $f(x) = x^2$. Temos:

$$f(\{1, 2, 3\}) = \{1, 4, 9\}$$

$$f([0, 2]) = \{f(x) \in \mathbb{R} \mid 0 \leq x \leq 2\} = \{x^2 \mid 0 \leq x \leq 2\} = [0, 4]$$

$$f^{-1}([1, 9]) = \{x \in \mathbb{R}$$

Exemplos

2) Sejam $A = B = \mathbb{R}$ e $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ dada por $f(x) = x^2$. Temos:

$$f(\{1, 2, 3\}) = \{1, 4, 9\}$$

$$f([0, 2]) = \{f(x) \in \mathbb{R} \mid 0 \leq x \leq 2\} = \{x^2 \mid 0 \leq x \leq 2\} = [0, 4]$$

$$f^{-1}([1, 9]) = \{x \in \mathbb{R} \mid f(x) \in [1, 9]\}$$

Exemplos

2) Sejam $A = B = \mathbb{R}$ e $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ dada por $f(x) = x^2$. Temos:

$$f(\{1, 2, 3\}) = \{1, 4, 9\}$$

$$f([0, 2]) = \{f(x) \in \mathbb{R} \mid 0 \leq x \leq 2\} = \{x^2 \mid 0 \leq x \leq 2\} = [0, 4]$$

$$f^{-1}([1, 9]) = \{x \in \mathbb{R} \mid f(x) \in [1, 9]\} = \{x \in \mathbb{R}$$

Exemplos

2) Sejam $A = B = \mathbb{R}$ e $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ dada por $f(x) = x^2$. Temos:

$$f(\{1, 2, 3\}) = \{1, 4, 9\}$$

$$f([0, 2]) = \{f(x) \in \mathbb{R} \mid 0 \leq x \leq 2\} = \{x^2 \mid 0 \leq x \leq 2\} = [0, 4]$$

$$f^{-1}([1, 9]) = \{x \in \mathbb{R} \mid f(x) \in [1, 9]\} = \{x \in \mathbb{R} \mid 1 \leq f(x) \leq 9\}$$

Exemplos

2) Sejam $A = B = \mathbb{R}$ e $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ dada por $f(x) = x^2$. Temos:

$$f(\{1, 2, 3\}) = \{1, 4, 9\}$$

$$f([0, 2]) = \{f(x) \in \mathbb{R} \mid 0 \leq x \leq 2\} = \{x^2 \mid 0 \leq x \leq 2\} = [0, 4]$$

$$f^{-1}([1, 9]) = \{x \in \mathbb{R} \mid f(x) \in [1, 9]\} = \{x \in \mathbb{R} \mid 1 \leq f(x) \leq 9\} = \{x \in \mathbb{R} \mid 1 \leq x^2 \leq 9\} = \{x \in \mathbb{R} \mid -3 \leq x \leq -1 \text{ ou } 1 \leq x \leq 3\}$$

Exemplos

2) Sejam $A = B = \mathbb{R}$ e $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ dada por $f(x) = x^2$. Temos:

$$f(\{1, 2, 3\}) = \{1, 4, 9\}$$

$$f([0, 2]) = \{f(x) \in \mathbb{R} \mid 0 \leq x \leq 2\} = \{x^2 \mid 0 \leq x \leq 2\} = [0, 4]$$

$$f^{-1}([1, 9]) = \{x \in \mathbb{R} \mid f(x) \in [1, 9]\} = \{x \in \mathbb{R} \mid 1 \leq f(x) \leq 9\} = \{x \in \mathbb{R} \mid 1 \leq x^2\}$$

Exemplos

2) Sejam $A = B = \mathbb{R}$ e $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ dada por $f(x) = x^2$. Temos:

$$f(\{1, 2, 3\}) = \{1, 4, 9\}$$

$$f([0, 2]) = \{f(x) \in \mathbb{R} \mid 0 \leq x \leq 2\} = \{x^2 \mid 0 \leq x \leq 2\} = [0, 4]$$

$$f^{-1}([1, 9]) = \{x \in \mathbb{R} \mid f(x) \in [1, 9]\} = \{x \in \mathbb{R} \mid 1 \leq f(x) \leq 9\} = \{x \in \mathbb{R} \mid 1 \leq x^2 \leq 9\}$$

Exemplos

2) Sejam $A = B = \mathbb{R}$ e $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ dada por $f(x) = x^2$. Temos:

$$f(\{1, 2, 3\}) = \{1, 4, 9\}$$

$$f([0, 2]) = \{f(x) \in \mathbb{R} \mid 0 \leq x \leq 2\} = \{x^2 \mid 0 \leq x \leq 2\} = [0, 4]$$

$$f^{-1}([1, 9]) = \{x \in \mathbb{R} \mid f(x) \in [1, 9]\} = \{x \in \mathbb{R} \mid 1 \leq f(x) \leq 9\} = \{x \in \mathbb{R} \mid 1 \leq x^2 \leq 9\} = [-3, -1] \cup [1, 3]$$

Exemplos

2) Sejam $A = B = \mathbb{R}$ e $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ dada por $f(x) = x^2$. Temos:

$$f(\{1, 2, 3\}) = \{1, 4, 9\}$$

$$f([0, 2]) = \{f(x) \in \mathbb{R} \mid 0 \leq x \leq 2\} = \{x^2 \mid 0 \leq x \leq 2\} = [0, 4]$$

$$f^{-1}([1, 9]) = \{x \in \mathbb{R} \mid f(x) \in [1, 9]\} = \{x \in \mathbb{R} \mid 1 \leq f(x) \leq 9\} = \{x \in \mathbb{R} \mid 1 \leq x^2 \leq 9\} = [-3, -1] \cup [1, 3]$$

Exemplos

2) Sejam $A = B = \mathbb{R}$ e $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ dada por $f(x) = x^2$. Temos:

$$f(\{1, 2, 3\}) = \{1, 4, 9\}$$

$$f([0, 2]) = \{f(x) \in \mathbb{R} \mid 0 \leq x \leq 2\} = \{x^2 \mid 0 \leq x \leq 2\} = [0, 4]$$

$$f^{-1}([1, 9]) = \{x \in \mathbb{R} \mid f(x) \in [1, 9]\} = \{x \in \mathbb{R} \mid 1 \leq f(x) \leq 9\} = \{x \in \mathbb{R} \mid 1 \leq x^2 \leq 9\} = [-3, -1] \cup [1, 3]$$

Proposição

Seja $f: A \rightarrow B$ uma função

Proposição

Seja $f: A \rightarrow B$ uma função e sejam P ,

Proposição

Seja $f: A \rightarrow B$ uma função e sejam $P, Q \subseteq A$,

Proposição

Seja $f: A \rightarrow B$ uma função e sejam $P, Q \subseteq A, R,$

Proposição

Seja $f: A \rightarrow B$ uma função e sejam $P, Q \subseteq A, R, S \subseteq B$.

Proposição

Seja $f: A \rightarrow B$ uma função e sejam $P, Q \subseteq A, R, S \subseteq B$.

i) Se $P \subseteq Q$,

Proposição

Seja $f: A \rightarrow B$ uma função e sejam $P, Q \subseteq A, R, S \subseteq B$.

i) Se $P \subseteq Q$, então $f(P) \subseteq f(Q)$.

Proposição

Seja $f: A \rightarrow B$ uma função e sejam $P, Q \subseteq A, R, S \subseteq B$.

i) Se $P \subseteq Q$, então $f(P) \subseteq f(Q)$.

ii) $f^{-1}(R \cup S)$

Proposição

Seja $f: A \rightarrow B$ uma função e sejam $P, Q \subseteq A, R, S \subseteq B$.

i) Se $P \subseteq Q$, então $f(P) \subseteq f(Q)$.

ii) $f^{-1}(R \cup S) = f^{-1}(R) \cup f^{-1}(S)$

Proposição

Seja $f: A \rightarrow B$ uma função e sejam $P, Q \subseteq A, R, S \subseteq B$.

i) Se $P \subseteq Q$, então $f(P) \subseteq f(Q)$.

ii) $f^{-1}(R \cup S) = f^{-1}(R) \cup f^{-1}(S)$.

Proposição

Seja $f: A \rightarrow B$ uma função e sejam $P, Q \subseteq A, R, S \subseteq B$.

i) Se $P \subseteq Q$, então $f(P) \subseteq f(Q)$.

ii) $f^{-1}(R \cup S) = f^{-1}(R) \cup f^{-1}(S)$.