

Subgrupos

José Antônio O. Freitas

MAT-UnB

24 de outubro de 2020

Definição

*Seja $(G, *)$ um grupo.*

Definição

*Seja $(G, *)$ um grupo. Se G é um conjunto com uma quantidade finita de elementos,*

Definição

*Seja $(G, *)$ um grupo. Se G é um conjunto com uma quantidade finita de elementos, dizemos que G é um **grupo finito**.*

Definição

*Seja $(G, *)$ um grupo. Se G é um conjunto com uma quantidade finita de elementos, dizemos que G é um **grupo finito**. Denotamos por $|G|$*

Definição

Seja $(G, *)$ um grupo. Se G é um conjunto com uma quantidade finita de elementos, dizemos que G é um **grupo finito**. Denotamos por $|G|$ o número de elementos de G

Definição

Seja $(G, *)$ um grupo. Se G é um conjunto com uma quantidade finita de elementos, dizemos que G é um **grupo finito**. Denotamos por $|G|$ o número de elementos de G e que será chamado de **ordem** de G

Definição

Seja $(G, *)$ um grupo. Se G é um conjunto com uma quantidade finita de elementos, dizemos que G é um **grupo finito**. Denotamos por $|G|$ o número de elementos de G e que será chamado de **ordem** de G ou **cardinalidade** de G .

Definição

Seja $(G, *)$ um grupo. Se G é um conjunto com uma quantidade finita de elementos, dizemos que G é um **grupo finito**. Denotamos por $|G|$ o número de elementos de G e que será chamado de **ordem** de G ou **cardinalidade** de G . Quando o conjunto G não é finito,

Definição

Seja $(G, *)$ um grupo. Se G é um conjunto com uma quantidade finita de elementos, dizemos que G é um **grupo finito**. Denotamos por $|G|$ o número de elementos de G e que será chamado de **ordem** de G ou **cardinalidade** de G . Quando o conjunto G não é finito, dizemos que G é um **grupo infinito**.

Definição

Seja $(G, *)$ um grupo. Se G é um conjunto com uma quantidade finita de elementos, dizemos que G é um **grupo finito**. Denotamos por $|G|$ o número de elementos de G e que será chamado de **ordem** de G ou **cardinalidade** de G . Quando o conjunto G não é finito, dizemos que G é um **grupo infinito**.

Exemplos

1) $(\mathbb{Z}_m, +)$ é um grupo finito para todo $m > 1$

Definição

Seja $(G, *)$ um grupo. Se G é um conjunto com uma quantidade finita de elementos, dizemos que G é um **grupo finito**. Denotamos por $|G|$ o número de elementos de G e que será chamado de **ordem** de G ou **cardinalidade** de G . Quando o conjunto G não é finito, dizemos que G é um **grupo infinito**.

Exemplos

1) $(\mathbb{Z}_m, +)$ é um grupo finito para todo $m > 1$ e $|G| = m$.

Definição

Seja $(G, *)$ um grupo. Se G é um conjunto com uma quantidade finita de elementos, dizemos que G é um **grupo finito**. Denotamos por $|G|$ o número de elementos de G e que será chamado de **ordem** de G ou **cardinalidade** de G . Quando o conjunto G não é finito, dizemos que G é um **grupo infinito**.

Exemplos

- 1) $(\mathbb{Z}_m, +)$ é um grupo finito para todo $m > 1$ e $|G| = m$.
- 2) (S_n, \circ) é um grupo finito

Definição

Seja $(G, *)$ um grupo. Se G é um conjunto com uma quantidade finita de elementos, dizemos que G é um **grupo finito**. Denotamos por $|G|$ o número de elementos de G e que será chamado de **ordem** de G ou **cardinalidade** de G . Quando o conjunto G não é finito, dizemos que G é um **grupo infinito**.

Exemplos

- 1) $(\mathbb{Z}_m, +)$ é um grupo finito para todo $m > 1$ e $|G| = m$.
- 2) (S_n, \circ) é um grupo finito e $|G| = n!$ elementos.

Definição

Seja $(G, *)$ um grupo. Se G é um conjunto com uma quantidade finita de elementos, dizemos que G é um **grupo finito**. Denotamos por $|G|$ o número de elementos de G e que será chamado de **ordem** de G ou **cardinalidade** de G . Quando o conjunto G não é finito, dizemos que G é um **grupo infinito**.

Exemplos

- 1) $(\mathbb{Z}_m, +)$ é um grupo finito para todo $m > 1$ e $|G| = m$.
- 2) (S_n, \circ) é um grupo finito e $|G| = n!$ elementos.
- 3) $(\mathbb{Z}, +)$ é um grupo infinito.

Definição

*Seja $(G, *)$ um grupo.*

Definição

*Seja $(G, *)$ um grupo. Um subconjunto não vazio*

Definição

*Seja $(G, *)$ um grupo. Um subconjunto não vazio $H \subseteq G$*

Definição

Seja $(G, *)$ um grupo. Um subconjunto não vazio $H \subseteq G$ é chamado de **subgrupo** de G

Definição

Seja $(G, *)$ um grupo. Um subconjunto não vazio $H \subseteq G$ é chamado de **subgrupo** de G se, e somente se, $(H, *)$

Definição

Seja $(G, *)$ um grupo. Um subconjunto não vazio $H \subseteq G$ é chamado de **subgrupo** de G se, e somente se, $(H, *)$ é um grupo.

Definição

Seja $(G, *)$ um grupo. Um subconjunto não vazio $H \subseteq G$ é chamado de **subgrupo** de G se, e somente se, $(H, *)$ é um grupo.

Proposição

Seja G um grupo.

Definição

Seja $(G, *)$ um grupo. Um subconjunto não vazio $H \subseteq G$ é chamado de **subgrupo** de G se, e somente se, $(H, *)$ é um grupo.

Proposição

Seja G um grupo. Um subconjunto não vazio

Definição

Seja $(G, *)$ um grupo. Um subconjunto não vazio $H \subseteq G$ é chamado de **subgrupo** de G se, e somente se, $(H, *)$ é um grupo.

Proposição

Seja G um grupo. Um subconjunto não vazio $H \subseteq G$ é um subgrupo de G

Definição

Seja $(G, *)$ um grupo. Um subconjunto não vazio $H \subseteq G$ é chamado de **subgrupo** de G se, e somente se, $(H, *)$ é um grupo.

Proposição

Seja G um grupo. Um subconjunto não vazio $H \subseteq G$ é um subgrupo de G se, e somente se

Definição

Seja $(G, *)$ um grupo. Um subconjunto não vazio $H \subseteq G$ é chamado de **subgrupo** de G se, e somente se, $(H, *)$ é um grupo.

Proposição

Seja G um grupo. Um subconjunto não vazio $H \subseteq G$ é um subgrupo de G se, e somente se

i) $x^{-1} \in H$,

Definição

Seja $(G, *)$ um grupo. Um subconjunto não vazio $H \subseteq G$ é chamado de **subgrupo** de G se, e somente se, $(H, *)$ é um grupo.

Proposição

Seja G um grupo. Um subconjunto não vazio $H \subseteq G$ é um subgrupo de G se, e somente se

- i) $x^{-1} \in H$, para todo $x \in H$;
- ii) $x * y \in H$,

Definição

Seja $(G, *)$ um grupo. Um subconjunto não vazio $H \subseteq G$ é chamado de **subgrupo** de G se, e somente se, $(H, *)$ é um grupo.

Proposição

Seja G um grupo. Um subconjunto não vazio $H \subseteq G$ é um subgrupo de G se, e somente se

- i) $x^{-1} \in H$, para todo $x \in H$;
- ii) $x * y \in H$, para todos $x, y \in H$.

Definição

Seja $(G, *)$ um grupo. Um subconjunto não vazio $H \subseteq G$ é chamado de **subgrupo** de G se, e somente se, $(H, *)$ é um grupo.

Proposição

Seja G um grupo. Um subconjunto não vazio $H \subseteq G$ é um subgrupo de G se, e somente se

- i) $x^{-1} \in H$, para todo $x \in H$;
- ii) $x * y \in H$, para todos $x, y \in H$.

Prova:

Exemplos

1) Dado $(G, *)$ grupo,

Exemplos

1) Dado $(G, *)$ grupo, $H = \{e\}$

Exemplos

1) Dado $(G, *)$ grupo, $H = \{e\}$ e $H = G$

Exemplos

1) Dado $(G, *)$ grupo, $H = \{e\}$ e $H = G$ são subgrupos de G ,

Exemplos

1) Dado $(G, *)$ grupo, $H = \{e\}$ e $H = G$ são subgrupos de G , chamados de **subgrupos triviais**.

Exemplos

- 1) Dado $(G, *)$ grupo, $H = \{e\}$ e $H = G$ são subgrupos de G , chamados de **subgrupos triviais**.
- 2) Seja $(\mathbb{Z}, +)$ um grupo.

Exemplos

- 1) Dado $(G, *)$ grupo, $H = \{e\}$ e $H = G$ são subgrupos de G , chamados de **subgrupos triviais**.
- 2) Seja $(\mathbb{Z}, +)$ um grupo. Tomando $H = m\mathbb{Z}$,

Exemplos

- 1) Dado $(G, *)$ grupo, $H = \{e\}$ e $H = G$ são subgrupos de G , chamados de **subgrupos triviais**.
- 2) Seja $(\mathbb{Z}, +)$ um grupo. Tomando $H = m\mathbb{Z}$, onde $m > 1$, então H é subgrupo de \mathbb{Z} .

Exemplos

- 1) Dado $(G, *)$ grupo, $H = \{e\}$ e $H = G$ são subgrupos de G , chamados de **subgrupos triviais**.
- 2) Seja $(\mathbb{Z}, +)$ um grupo. Tomando $H = m\mathbb{Z}$, onde $m > 1$, então H é subgrupo de \mathbb{Z} .
- 3) $G = U(\mathbb{Z}_8) = \{\bar{1}, \bar{3}, \bar{5}, \bar{7}\}$.

Exemplos

- 1) Dado $(G, *)$ grupo, $H = \{e\}$ e $H = G$ são subgrupos de G , chamados de **subgrupos triviais**.
- 2) Seja $(\mathbb{Z}, +)$ um grupo. Tomando $H = m\mathbb{Z}$, onde $m > 1$, então H é subgrupo de \mathbb{Z} .
- 3) $G = U(\mathbb{Z}_8) = \{\bar{1}, \bar{3}, \bar{5}, \bar{7}\}$. Então (G, \odot) é um grupo

Exemplos

- 1) Dado $(G, *)$ grupo, $H = \{e\}$ e $H = G$ são subgrupos de G , chamados de **subgrupos triviais**.
- 2) Seja $(\mathbb{Z}, +)$ um grupo. Tomando $H = m\mathbb{Z}$, onde $m > 1$, então H é subgrupo de \mathbb{Z} .
- 3) $G = U(\mathbb{Z}_8) = \{\bar{1}, \bar{3}, \bar{5}, \bar{7}\}$. Então (G, \odot) é um grupo com $|G| = 4$.

Exemplos

- 1) Dado $(G, *)$ grupo, $H = \{e\}$ e $H = G$ são subgrupos de G , chamados de **subgrupos triviais**.
- 2) Seja $(\mathbb{Z}, +)$ um grupo. Tomando $H = m\mathbb{Z}$, onde $m > 1$, então H é subgrupo de \mathbb{Z} .
- 3) $G = U(\mathbb{Z}_8) = \{\bar{1}, \bar{3}, \bar{5}, \bar{7}\}$. Então (G, \odot) é um grupo com $|G| = 4$. Além disso,

Exemplos

- 1) Dado $(G, *)$ grupo, $H = \{e\}$ e $H = G$ são subgrupos de G , chamados de **subgrupos triviais**.
- 2) Seja $(\mathbb{Z}, +)$ um grupo. Tomando $H = m\mathbb{Z}$, onde $m > 1$, então H é subgrupo de \mathbb{Z} .
- 3) $G = U(\mathbb{Z}_8) = \{\bar{1}, \bar{3}, \bar{5}, \bar{7}\}$. Então (G, \odot) é um grupo com $|G| = 4$. Além disso,

$$H_1 = \{\bar{1}, \bar{3}\}$$

Exemplos

- 1) Dado $(G, *)$ grupo, $H = \{e\}$ e $H = G$ são subgrupos de G , chamados de **subgrupos triviais**.
- 2) Seja $(\mathbb{Z}, +)$ um grupo. Tomando $H = m\mathbb{Z}$, onde $m > 1$, então H é subgrupo de \mathbb{Z} .
- 3) $G = U(\mathbb{Z}_8) = \{\bar{1}, \bar{3}, \bar{5}, \bar{7}\}$. Então (G, \odot) é um grupo com $|G| = 4$. Além disso,

$$H_1 = \{\bar{1}, \bar{3}\}$$

$$H_2 = \{\bar{1}, \bar{5}\}$$

Exemplos

- 1) Dado $(G, *)$ grupo, $H = \{e\}$ e $H = G$ são subgrupos de G , chamados de **subgrupos triviais**.
- 2) Seja $(\mathbb{Z}, +)$ um grupo. Tomando $H = m\mathbb{Z}$, onde $m > 1$, então H é subgrupo de \mathbb{Z} .
- 3) $G = U(\mathbb{Z}_8) = \{\bar{1}, \bar{3}, \bar{5}, \bar{7}\}$. Então (G, \odot) é um grupo com $|G| = 4$. Além disso,

$$H_1 = \{\bar{1}, \bar{3}\}$$

$$H_2 = \{\bar{1}, \bar{5}\}$$

$$H_3 = \{\bar{1}, \bar{7}\}$$

Exemplos

- 1) Dado $(G, *)$ grupo, $H = \{e\}$ e $H = G$ são subgrupos de G , chamados de **subgrupos triviais**.
- 2) Seja $(\mathbb{Z}, +)$ um grupo. Tomando $H = m\mathbb{Z}$, onde $m > 1$, então H é subgrupo de \mathbb{Z} .
- 3) $G = U(\mathbb{Z}_8) = \{\bar{1}, \bar{3}, \bar{5}, \bar{7}\}$. Então (G, \odot) é um grupo com $|G| = 4$. Além disso,

$$H_1 = \{\bar{1}, \bar{3}\}$$

$$H_2 = \{\bar{1}, \bar{5}\}$$

$$H_3 = \{\bar{1}, \bar{7}\}$$

São subgrupos de G .