

## **Lagartas Desfolhadoras na Cultura da Soja e do Algodão**

As lagartas desfolhadoras estão entre as principais pragas que podem causar prejuízos nas culturas da soja e do algodão. Esses insetos se alimentam principalmente das folhas das plantas, reduzindo a área foliar disponível para a realização da fotossíntese. Quando o ataque ocorre de forma intensa, a planta pode perder grande parte de suas folhas, comprometendo seu crescimento, desenvolvimento e capacidade de produzir.

Na cultura da soja, diferentes espécies de lagartas podem atacar as folhas durante várias fases do desenvolvimento da planta. Entre elas estão a lagarta-da-soja e a lagarta-falsa-medideira. Ao se alimentarem, essas pragas provocam furos e cortes nas folhas, podendo causar desfolha significativa. A redução da área foliar diminui a capacidade da soja de produzir energia por meio da fotossíntese e pode afetar a formação e o enchimento dos grãos.

No algodão, as lagartas também representam um problema importante, principalmente quando suas populações aumentam rapidamente. Além das folhas, algumas espécies podem atacar estruturas importantes da planta, como botões florais e maçãs do algodoeiro. Dessa maneira, o ataque pode prejudicar tanto o desenvolvimento vegetativo quanto a formação das estruturas responsáveis pela produção.

Os prejuízos causados pelas lagartas dependem da espécie da praga, da quantidade de insetos presentes, da fase de desenvolvimento da cultura e da intensidade da desfolha. Plantas submetidas a ataques severos podem apresentar redução da produtividade, tornando necessário o monitoramento constante das lavouras.

Para reduzir esses danos, é importante realizar o Manejo Integrado de Pragas (MIP), que combina diferentes estratégias de controle. O monitoramento da lavoura permite identificar a presença das lagartas e acompanhar o tamanho da população. Quando os níveis de infestação atingem valores que podem causar prejuízos econômicos, podem ser adotadas medidas de controle, como o uso de controle biológico e, quando necessário, inseticidas adequados.

Portanto, o controle das lagartas desfolhadoras é fundamental para proteger a produtividade da soja e do algodão. O acompanhamento frequente das plantas e a adoção de estratégias de manejo adequadas permitem reduzir os prejuízos e promover uma produção agrícola mais eficiente e sustentável.

Além das medidas de controle, a prevenção também é fundamental para diminuir os prejuízos causados pelas lagartas desfolhadoras. O uso de variedades mais resistentes, a preservação de inimigos naturais e o acompanhamento frequente da lavoura ajudam a manter a população dessas pragas em níveis baixos. Dessa

forma, o produtor consegue agir no momento adequado, evitando aplicações desnecessárias de produtos químicos e reduzindo os custos de produção. O manejo correto também contribui para preservar o equilíbrio do ambiente agrícola e evitar que as pragas desenvolvam resistência aos inseticidas.