Matemáticas Aplicadas a las Ciencias Sociales II

Banco modular de Selectividad

L034: archivo titular_septiembre_1, curso 2015-2016, opciones A/B

Modo: sólo enunciados.

Los identificadores permiten localizar cada fuente en datos/ejercicios.csv. Los avisos de contenido pendiente son controles de preparación; no constituyen enunciados ni soluciones.

Contexto del examen original

UNIVERSIDADES DE ANDALUCÍA

PRUEBA DE ACCESO A LA UNIVERSIDAD

CURSO 2015-2016

MATEMÁTICAS APLICADAS A LAS CIENCIAS SOCIALES II

Instrucciones:

a) Duración: 1 hora y 30 minutos.

b) Elija una de las dos opciones propuestas y conteste los ejercicios de la opción elegida.

c) En cada ejercicio, parte o apartado se indica la puntuación máxima que le corresponde.

d) Se permitirá el uso de calculadoras que no sean programables, gráficas ni con capacidad para almacenar o transmitir datos.

e) Si obtiene resultados directamente con la calculadora, explique con detalle los pasos necesarios para su obtención sin su ayuda. Justifique las respuestas.

Nota de la colección: Se reúnen las dos opciones para consulta. La regla anterior corresponde al examen original. Curso 2015-2016 impreso; titular y septiembre sólo del nombre. Convocatoria, reserva y modelo no acreditados; 1 no acredita modelo. Criterios concordantes; sin tabla específicamente asociada.

Ejercicio SEL-D0034-OA-E01

SEL-D0034-OA-E01: Ecuación matricial y dimensiones de productos cuadrados

Sean las matrices $A = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ -1 & -3 \end{pmatrix}$, $B = \begin{pmatrix} 2 & -1 & 3 \\ 4 & 0 & 1 \end{pmatrix}$ y $C = \begin{pmatrix} -1 & 1 & 0 \\ 2 & 3 & -2 \end{pmatrix}$.

a) **(1.7 puntos)** Resuelva la ecuación matricial $A^2 \cdot X + C = 2B$.

b) **(0.8 puntos)** ¿Qué dimensiones deben tener las matrices P y Q para que las matrices $(B + C) \cdot P$ y $B \cdot Q \cdot C^t$ sean cuadradas?

Ejercicio SEL-D0034-OA-E02

SEL-D0034-OA-E02: Monotonía y tangente a partir de la gráfica de la derivada

De una función continua y derivable, f, se sabe que la gráfica de la función derivada, f', es una parábola que pasa por los puntos $(-1, 0)$ y $(3, 0)$, y que tiene su vértice en el punto $(1, -2)$.

a) **(1.5 puntos)** Determine los intervalos de crecimiento y decrecimiento de la función f, así como la existencia de extremos.

b) **(1 punto)** Si $f(1) = 2$, encuentre la ecuación de la recta tangente a la gráfica de la función f en el punto de abscisa $x = 1$.

Ejercicio SEL-D0034-OA-E03

SEL-D0034-OA-E03: Sucesos: intersección, condicionada e independencia

Sean A y B dos sucesos aleatorios tales que

$$P(A) = 0.3, \qquad P(B) = 0.6, \qquad P(A^C \cap B^C) = 0.28.$$

a) **(1 punto)** Halle la probabilidad de que ocurran ambos sucesos a la vez.

b) **(1 punto)** Calcule la probabilidad de que ocurra A sabiendo que no ha ocurrido B.

c) **(0.5 puntos)** ¿Son A y B independientes?

Ejercicio SEL-D0034-OA-E04

SEL-D0034-OA-E04: Defectos de envoltorios: intervalo y tamaño de muestra

Una cadena de hipermercados decide estudiar la proporción de artículos de un determinado tipo que tienen defectos en su envoltorio. Para ello, selecciona aleatoriamente 2000 artículos de este tipo entre sus hipermercados y encuentra que 19 de ellos tienen defectos en su envoltorio.

a) **(1.5 puntos)** Determine un intervalo, al 95 % de confianza, para la proporción real de artículos con este tipo de defecto e interprete el resultado obtenido.

b) **(1 punto)** ¿Cuántos artículos, como mínimo, deberá seleccionar para que, con un nivel de confianza del 99 %, la proporción muestral difiera de la proporción real a lo sumo en un 1 %?

Ejercicio SEL-D0034-OB-E01

SEL-D0034-OB-E01: Región factible y extremos de una función lineal

a) **(1.5 puntos)** Represente la región definida por las siguientes inecuaciones y determine sus vértices:

$$2x - y \leq -2 \qquad 4x - 2y \geq -10 \qquad 5x - y \leq 4 \qquad x \geq 0$$

b) **(1 punto)** Calcule los valores extremos de la función $F(x, y) = 6x - 3y$, en la región anterior y determine los puntos en los que se alcanzan.

Ejercicio SEL-D0034-OB-E02

SEL-D0034-OB-E02: Parámetro de continuidad, derivabilidad, monotonía y asíntotas

Sea la función

$$f(x) = \begin{cases} x^2 - 4x + a & \text{si } x < 2 \\ \dfrac{1}{x-1} & \text{si } x \geq 2 \end{cases}$$

a) **(1.3 puntos)** Calcule el valor de a para que la función sea continua en $x = 2$. Para ese valor de a obtenido, ¿es derivable la función en $x = 2$?

b) **(1.2 puntos)** Para $a = 4$, estudie la monotonía y calcule las ecuaciones de las asíntotas, si existen.

Ejercicio SEL-D0034-OB-E03

SEL-D0034-OB-E03: Aparcamiento y conciertos: probabilidad total y Bayes

El aparcamiento de una sala de conciertos está completo el 85 % de los días. El 90 % de los días que el aparcamiento está completo, la sala de conciertos está llena, y el 22 % de los días que el aparcamiento no está completo, la sala de conciertos no está llena.

Elegido un día al azar,

a) **(1.5 puntos)** ¿cuál es la probabilidad de que la sala de conciertos esté llena?

b) **(1 punto)** Si se sabe que la sala de conciertos está llena, ¿cuál es la probabilidad de que el aparcamiento esté completo?

Ejercicio SEL-D0034-OB-E04

SEL-D0034-OB-E04: Afijación proporcional y varianza de medias muestrales

a) **(1.25 puntos)** Se desea tomar una muestra aleatoria estratificada de las personas mayores de edad de un municipio, cuyos estratos son los siguientes intervalos de edades, en años: de 18 a 30, de 31 a 45, de 46 a 60 y mayores de 60. En el primer intervalo hay 7500 personas, en el segundo hay 8400, en el tercero 5700 y en el cuarto 3000. Calcule el tamaño de la muestra total y su composición, sabiendo que el muestreo se hace con afijación proporcional y se han elegido al azar 375 personas del primer estrato.

b) **(1.25 puntos)** Dada la población $\{2, 4, 6\}$ construya todas las muestras posibles de tamaño 2, que se puedan formar mediante muestreo aleatorio simple, y halle la varianza de las medias muestrales de todas las muestras.