Matemáticas Aplicadas a las Ciencias Sociales II

Banco modular de Selectividad

L064: archivo EXAMEN-ANDALUCÍA-3, curso 2009-2010, opciones A/B

Modo: sólo enunciados.

Los identificadores permiten localizar cada fuente en datos/ejercicios.csv. Los avisos de contenido pendiente son controles de preparación; no constituyen enunciados ni soluciones.

Contexto del examen original

UNIVERSIDADES DE ANDALUCÍA
PRUEBA DE ACCESO A LA UNIVERSIDAD
CURSO 2009-2010
MATEMÁTICAS APLICADAS A LAS CIENCIAS SOCIALES II
Instrucciones:

a) Duración: 1 hora y 30 minutos.

b) Elija una de las dos opciones propuestas y conteste los ejercicios de la opción elegida.

c) En cada ejercicio, parte o apartado se indica la puntuación máxima que le corresponde.

d) Se permitirá el uso de calculadoras que no sean programables, gráficas ni con capacidad para almacenar o transmitir datos.

e) Si obtiene resultados directamente con la calculadora, explique con detalle los pasos necesarios para su obtención sin su ayuda. Justifique las respuestas.

Nota de la colección: Se reúnen ambas opciones para consulta. La regla anterior pertenece al examen original. Curso 2009-2010 impreso. Septiembre sólo por carpeta,no confirmado en cabecera;tipo,reserva y modelo no acreditados. El3del nombre no acredita modelo. Examen y criterios sin alias exactos;tabla con doce procedencias exactas. Tabla acumulada N(0,1),fuente SRC-059F0E145F1E,asociada por carpeta,sin cita expresa en el examen;no incorporada al cuerpo.

Ejercicio SEL-D0064-OA-E01

SEL-D0064-OA-E01: Recinto con cota doble y extremos de una función objetivo

Sea el recinto del plano definido por el siguiente sistema de inecuaciones:

$$3x + y \geq 4; \quad x + y \leq 6; \quad 0 \leq y \leq 5.$$

a) **(1 punto)** Represéntelo gráficamente.

b) **(1 punto)** Calcule los vértices de dicho recinto.

c) **(0.5 puntos)** En el recinto anterior, halle los valores máximo y mínimo de la función $F(x, y) = 5x + 3y$. ¿En qué puntos se alcanzan dichos valores?

Ejercicio SEL-D0064-OA-E02

SEL-D0064-OA-E02: Pacientes de un consultorio: máximo, cierre y gráfica

Un consultorio médico abre a las 5 de la tarde y cierra cuando no hay pacientes.

La expresión que representa el número medio de pacientes en función del tiempo en horas, t, que lleva abierto el consultorio es $N(t) = 4t - t^2$

a) **(1 punto)** ¿A qué hora el número medio de pacientes es máximo? ¿Cuál es ese máximo?

b) **(1 punto)** Sabiendo que el consultorio cierra cuando no hay pacientes, ¿a qué hora cerrará?

c) **(0.5 puntos)** Represente gráficamente $N(t) = 4t - t^2$, con $N(t) \geq 0$.

Ejercicio SEL-D0064-OA-E03

SEL-D0064-OA-E03: Lectura de periódicos: unión, complemento y condicional

En una capital se editan dos periódicos, *CIUDAD* y *LA MAÑANA*. Se sabe que el 85 % de la población lee alguno de ellos, que el 18 % lee los dos y que el 70 % lee *CIUDAD*.

Si elegimos al azar un habitante de esa capital, halle la probabilidad de que:

a) **(0.75 puntos)** No lea ninguno de los dos.

b) **(0.75 puntos)** Lea sólo *LA MAÑANA*.

c) **(1 punto)** Lea *CIUDAD*, sabiendo que no lee *LA MAÑANA*.

Ejercicio SEL-D0064-OA-E04

SEL-D0064-OA-E04: Mortalidad y fármaco: contraste unilateral de proporción

(2.5 puntos) En una determinada especie animal el porcentaje de mortalidad debida a una enfermedad vírica es de al menos un 40 %.

Se está realizando un estudio para probar la eficacia de un fármaco que permite tratar esa enfermedad y, consecuentemente, reducir el porcentaje de mortalidad en esa especie. Para ello, se suministró el fármaco a 50 sujetos enfermos, elegidos al azar, de los que murieron 14.

A la vista de estos datos, y tomando como nivel de significación 0.015, ¿se puede afirmar que existe evidencia estadística suficiente para rechazar la hipótesis $H_0 : p \geq 0.4$, donde p es la proporción, y por lo tanto aceptar la eficacia del fármaco?

Ejercicio SEL-D0064-OB-E01

SEL-D0064-OB-E01: Productos rectangulares y parámetros en una ecuación matricial

Sean las matrices:

$$P = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ a & 0 \end{pmatrix}, \quad Q = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 5 \\ 8 & 4 & b \end{pmatrix} \quad \text{y} \quad R = \begin{pmatrix} c & d & 6 \\ 10 & 10 & 50 \end{pmatrix}.$$

a) **(1 punto)** Calcule, si es posible, $P \cdot Q$ y $Q \cdot P$, razonando la respuesta.

b) **(1.5 puntos)** ¿Cuánto deben valer las constantes a, b, c y d para que $P \cdot 2Q = R$?

Ejercicio SEL-D0064-OB-E02

SEL-D0064-OB-E02: Parámetro en función a trozos y estudio gráfico

Sea la función

$$f(x) = \begin{cases} -x^2 - 2ax + 3 & \text{si } x \leq 1 \\ ax^2 - 6x + 5 & \text{si } x > 1 \end{cases}.$$

a) **(0.5 puntos)** Calcule el valor de a para que f sea continua en $x = 1$.

b) **(2 puntos)** Para $a = 1$, represente su gráfica y, a la vista de ella, indique su monotonía y las coordenadas de sus extremos locales.

Ejercicio SEL-D0064-OB-E03

SEL-D0064-OB-E03: Tres lanzamientos de un dado con caras repetidas

Un dado tiene seis caras, tres de ellas marcadas con un 1, dos marcadas con una X y la otra marcada con un 2. Se lanza tres veces ese dado.

a) **(0.5 puntos)** ¿Cuál es la probabilidad de obtener tres veces el 1?

b) **(1 punto)** ¿Cuál es la probabilidad de obtener dos X y un 2 en cualquier orden?

c) **(1 punto)** ¿Cuál es la probabilidad de obtener tres resultados diferentes?

Ejercicio SEL-D0064-OB-E04

SEL-D0064-OB-E04: Tamaño muestral para altura y distribución de medias en población finita

a) **(1.25 puntos)** La altura de los alumnos de una Universidad sigue una distribución Normal de media desconocida y desviación típica 11 cm. Calcule el tamaño mínimo que ha de tener una muestra aleatoria de esos alumnos para que el error cometido al estimar la altura media sea inferior a 1 cm, con un nivel de confianza del 98 %.

b) **(1.25 puntos)** Dada la población $\{10, 12, 17\}$, escriba todas las muestras de tamaño 2 mediante muestreo aleatorio simple y calcule la media y la desviación típica de las medias muestrales.