Matemáticas Aplicadas a las Ciencias Sociales II

Banco modular de Selectividad

L018: archivo P_F, curso 2019-2020, bloques A-D

Modo: sólo enunciados.

Los identificadores permiten localizar cada fuente en datos/ejercicios.csv. Los avisos de contenido pendiente son controles de preparación; no constituyen enunciados ni soluciones.

Contexto del examen original

PRUEBA DE ACCESO Y ADMISIÓN A LA UNIVERSIDAD

ANDALUCÍA, CEUTA, MELILLA y CENTROS en MARRUECOS

CURSO 2019-2020

MATEMÁTICAS APLICADAS A LAS CIENCIAS SOCIALES II

Instrucciones:

a) Duración: 1 hora y 30 minutos.

b) Elija cuatro de los ocho ejercicios propuestos de al menos tres bloques distintos. Se corregirán los cuatro primeros ejercicios que aparezcan en el examen y que cumplan el requisito anterior.

c) En cada ejercicio, parte o apartado se indica la puntuación máxima asignada.

d) Todos los resultados deben estar suficientemente justificados.

e) Se permitirá el uso de calculadoras que no sean programables, gráficas ni con capacidad para almacenar o transmitir datos. Si obtiene resultados directamente con la calculadora, explique con detalle los pasos necesarios para su obtención sin el uso de la misma.

Este examen consta de 4 Bloques (A, B, C y D)

Deberá responder a cuatro ejercicios de entre los ocho propuestos con la condición de que pertenezcan al menos a 3 bloques distintos. En caso de responder a más ejercicios de los requeridos, serán tenidos en cuenta los respondidos en primer lugar.

Nota de la colección: Se reúnen los ocho ejercicios para consulta. La regla anterior corresponde al examen original. El curso 2019-2020 está impreso; convocatoria, tipo, reserva y modelo no están indicados. El sufijo F del nombre del archivo no acredita modelo ni opción.

Ejercicio SEL-D0018-BA-E01

SEL-D0018-BA-E01: Inversa con parámetro y ecuación matricial por la derecha

Dada la matriz $A = \begin{pmatrix} 2 & 0 & m \\ 1 & 1 & 1 \\ m & 3 & 5 \end{pmatrix}$, con m un parámetro real, se pide:

a) **(0.8 puntos)** ¿Para qué valores del parámetro m tiene inversa la matriz A?

b) **(1.7 puntos)** Para $m = 0$, resuelva la ecuación matricial $X \cdot A = A \cdot A^t$.

Ejercicio SEL-D0018-BA-E02

SEL-D0018-BA-E02: Región factible: vértices, pertenencia y extremos

Se considera la región del plano definida por las siguientes inecuaciones:

$$x + y \leq 4 \qquad x - y \geq -2 \qquad x + 3y \geq 2 \qquad y \leq 2$$

a) **(1.5 puntos)** Represéntela gráficamente y determine sus vértices.

b) **(0.25 puntos)** Indique razonadamente si el punto $(4, -0.75)$ pertenece a dicha región.

c) **(0.75 puntos)** ¿En qué puntos de la región anterior la función $F(x, y) = x + y$ alcanza los valores máximo y mínimo y cuáles son estos valores?

Ejercicio SEL-D0018-BB-E03

SEL-D0018-BB-E03: Derivada y punto: tangente, monotonía y recuperación de función

De una función f sabemos que su gráfica pasa por el punto $(1, 3)$ y que su derivada es $f'(x) = 2x - 6$.

a) **(0.75 puntos)** Determine la ecuación de la recta tangente a la gráfica de f en el punto de abscisa $x = 1$.

b) **(1 punto)** Estudie la monotonía y la existencia de extremos de la función f.

c) **(0.75 puntos)** Determine la función f y represéntela gráficamente.

Ejercicio SEL-D0018-BB-E04

SEL-D0018-BB-E04: Función por tramos: continuidad, tangente y área

Se considera la función

$$f(x) = \begin{cases} \dfrac{2}{x+1} & \text{si } x < -2 \\ x^2 + a & \text{si } x \geq -2 \end{cases}$$

a) **(1 punto)** Calcule el valor de a para que f sea continua en todo su dominio. Para ese valor de a, ¿es derivable la función f?

b) **(0.5 puntos)** Para $a = -6$, halle la ecuación de la recta tangente a la gráfica de f en el punto de abscisa $x = 3$.

c) **(1 punto)** Para $a = -6$, esboce la gráfica de f y calcule el área de la región limitada por la gráfica de la función f, el eje de abscisas y las rectas $x = 3$ y $x = 5$.

Ejercicio SEL-D0018-BC-E05

SEL-D0018-BC-E05: Erasmus+ y mejora en lengua extranjera

Se sabe que el 65 % de los estudiantes de bachillerato de Andalucía ha participado en programas Erasmus+ y que de ellos, el 80 % ha mejorado su calificación en lengua extranjera. De los estudiantes que no han participado en programas Erasmus+, mejoran su calificación en lengua extranjera el 30 %. Se elige al azar un estudiante de bachillerato de Andalucía.

a) **(1.5 puntos)** ¿Cuál es la probabilidad de que haya mejorado su calificación en lengua extranjera?

b) **(1 punto)** Si se sabe que ha mejorado su calificación en lengua extranjera, ¿cuál es la probabilidad de que haya participado en un programa Erasmus+?

Ejercicio SEL-D0018-BC-E06

SEL-D0018-BC-E06: Sedentarismo y obesidad: intersección, total y Bayes

El 47 % de los jóvenes andaluces tienen una vida sedentaria. De ellos, el 72 % presentan obesidad, mientras que solamente la presentan el 22 % de los jóvenes no sedentarios. Se elige al azar un joven andaluz.

a) **(1 punto)** Calcule la probabilidad de que sea sedentario y no presente obesidad.

b) **(0.75 puntos)** Calcule la probabilidad de que presente obesidad.

c) **(0.75 puntos)** Calcule la probabilidad de que sea sedentario, sabiendo que presenta obesidad.

Ejercicio SEL-D0018-BD-E07

SEL-D0018-BD-E07: Fluidez en inglés: intervalo, admisibilidad y muestra mínima

Tomada al azar una muestra de 600 alumnos de una universidad española, se encontró que 2/3 de los mismos podían expresarse en inglés con fluidez.

a) **(1.5 puntos)** Calcule un intervalo de confianza al 98 % para estimar la proporción de alumnos de esa universidad que pueden expresarse en inglés con fluidez. ¿Se podría admitir a ese nivel de confianza que la proporción de alumnos de esa universidad que pueden expresarse en inglés con fluidez es 13/20?

b) **(0.25 puntos)** Teniendo en cuenta el intervalo anterior, ¿qué error máximo se cometería en dicha estimación?

c) **(0.75 puntos)** Si se mantienen la misma proporción muestral y la misma confianza, ¿cuántos alumnos como mínimo habría de tener una muestra para que el error de estimación sea inferior al 2 %?

Ejercicio SEL-D0018-BD-E08

SEL-D0018-BD-E08: Café por taza: estimador, intervalo y tamaño muestral

La cantidad de café por taza que suministra una máquina de café sigue una distribución Normal con media desconocida y desviación típica 0.8 cm^3. En una muestra de 45 tazas suministradas por esa máquina, se ha medido un total de 5 400 cm^3 de café.

a) **(0.5 puntos)** Calcule el estimador puntual para la cantidad media de café por taza que suministra la máquina.

b) **(1 punto)** Calcule un intervalo de confianza al 97 % para estimar la cantidad media de café por taza que suministra la máquina.

c) **(1 punto)** Calcule, con el mismo nivel de confianza, el tamaño muestral mínimo que se ha de tomar para que, al estimar la cantidad media de café por taza, el error cometido sea inferior a 0.2 cm^3.