

Medidas descriptivas multivariadas

Transcripción de las univariadas

Jimmy A Corzo S^{1 2}

¹Profesor Titular
Departamento de Estadística

²Facultad de ciencias
Universidad Nacional de colombia

Métodos multivariados aplicados LyX cap 3

- 1 Observaciones multivariadas
- 2 Datos
- 3 Vector de medias o centroide, matriz de covarianzas y matriz de correlación
- 4 combinaciones lineales
- 5 Componentes principales: una combinación lineal específica

Observaciones multivariadas

Para la construcción de los análogos multivariados de las medidas descriptivas univariadas primero se requiere definir las observaciones multivariadas.

En el contexto multivariado en lugar de una se observan p variables $X_1, \dots, X_p$ simultáneamente sobre mismo un objeto i (que puede ser una ciudad, una universidad, una planta, una persona), y por tanto una observación para el objeto i es un vector de p componentes

$$x_i = (x_{i1}, \dots, x_{ij}, \dots, x_{ip})',$$

donde x_{ij} es la observación de la variable j sobre el objeto i .

Tabla de datos

Para n objetos las observaciones se arreglan en una tabla de datos como la siguiente:

Objeto	Variables			
	X_1	$\cdots X_j$	$\cdots$	X_p
1	x_{11}	$\cdots x_{1j}$	$\cdots$	x_{1p}
$\vdots$	$\vdots$	$\cdots \vdots$	$\vdots$	$\vdots$
$\vdots$	$\vdots$	$\cdots x_{ij}$	$\cdots$	$\vdots$
$\vdots$	$\vdots$	$\cdots \vdots$	$\vdots$	$\vdots$
n	x_{n1}	$\cdots x_{nj}$	$\cdots$	x_{np}

Media, Varianza, Covarianza y Coeficiente de correlación:

$$\bar{x}_j = med(X_j) = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n x_{ij} \quad \text{media de la variable } X_j$$

$$s_j^2 = var(X_j) = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n (x_{ij} - \bar{x}_j)^2 \quad \text{varianza de la variable } X_j$$

$$s_{jk} = cov(X_j, X_k) = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n (x_{ij} - \bar{x}_j)(x_{ik} - \bar{x}_k), \quad s_{jj} = s_j^2$$

$$r_{jk} = corr(X_j, X_k) = \frac{s_{jk}}{s_j s_k}, \quad s_j = \sqrt{s_j^2} \quad (1)$$

Nótese que para el cálculo de la varianza se utilizó como denominador n debido a que en datos multivariados se considera suficientemente grande como para que s^2 siga siendo un estimador insesgado de la varianza poblacional¹.

¹En R se utiliza $n - 1$ y por tanto para los cálculos debe hacerse la modificación en la salida del comando `var()`.

Media, Varianza, Covarianza y Coeficiente de correlación:

Nótese que para el cálculo de la varianza y la covarianza se utilizó como denominador n debido a que en datos multivariados se considera suficientemente grande como para que s^2 siga siendo un estimador insesgado de la varianza poblacional.

Los comandos `var()` y `cov()` de *R* utilizan $n - 1$ y por tanto para los cálculos debe hacerse la modificación correspondiente.

Tabla de datos

tabla para referirse a los datos con nombres en las filas y columnas
matriz cuando se van a utilizar las propiedades algebraicas de la tabla

$$X = \{x_{ij}\} = \begin{bmatrix} x_{11} & \cdots x_{1j} & \cdots & x_{1p} \\ \vdots & \vdots & \vdots & \vdots \\ x_{i1} & \cdots x_{ij} & \cdots & x_{ip} \\ \vdots & \vdots & \vdots & \vdots \\ x_{n1} & \cdots x_{nJ} & \cdots & x_{np} \end{bmatrix}$$

Columna de la tabla de datos

En esta matriz la columna j , o el punto variable j , representa las observaciones de la variable X_j sobre los n objetos y se denota como un vector columna:

$$X_{.j} = \begin{bmatrix} x_{1j} \\ x_{2j} \\ \vdots \\ x_{nj} \end{bmatrix}, j = 1, \dots, p$$

Fila de la tabla de datos

Análogamente, la fila i , o el punto objeto i , representa las observaciones de las p variables sobre el objeto i que se denota como un vector columna;

$$x_{i.} = (x_{i1}, \dots, x_{ip})' = \begin{bmatrix} x_{i1} \\ x_{i2} \\ \vdots \\ x_{ip} \end{bmatrix}, i = 1, \dots, n.$$

Ejemplo Ciudades Colombianas

Table: Tabla de datos multivariados de ciudades colombianas

	Num.Hab	Analfabetismo	Cobertura.pria.y.secdaria	Cobertura.ed.sup	Rel.al.prof
Armenia	284120	0.09	1.09	0.27	22.4
Barranquilla	1163007	0.09	1.08	0.31	22.5
Bogota	7050228	0.10	1.00	0.54	22.6
Bucaramanga	520080	0.08	1.19	0.33	22.2
Cali	2169801	0.08	1.02	0.22	22.0
Cartagena	912674	0.12	1.21	0.15	24.4
Cucuta	600049	0.11	1.15	0.22	22.4
Ibague	509796	0.11	0.98	0.18	23.4
Manizales	383483	0.08	1.14	0.23	22.2
Medellin	2264776	0.13	1.22	0.30	26.3
Monteria	390996	0.16	1.11	0.15	26.1
Neiva	322098	0.11	1.10	0.18	23.3
Pasto	394074	0.11	1.05	0.13	21.8
Pereira	448971	0.10	1.12	0.28	22.6
Popayan	261694	0.09	1.14	0.16	21.5
Riohacha	184847	0.27	1.00	0.15	26.1
San Andres	66675	0.08	0.80	0.11	20.4
Santa Marta	428374	0.12	1.00	0.12	22.9
Sinceleio	245180	0.16	1.23	0.11	24.9

Fila de la tabla de datos

La fila 5 de la Tabla 1 es la observación de las cinco variables para la ciudad de Cali (objeto 5):

$$x_5 = (2169801, 0.08, 1.02, 0.22, 22)' = \begin{bmatrix} 2168901 \\ 0.08 \\ 1.02 \\ 0.22 \\ 22 \end{bmatrix}$$

Columna de la tabla de datos

la variable X_4 Cobertura en educación superior es la columna

$$X_4 = \begin{bmatrix} 0.27 \\ 0.31 \\ \vdots \\ 0.15 \\ 0.17 \end{bmatrix}$$

Vector de medias o centroide

$$med(X) = \bar{x} = \frac{1}{n} \mathbf{1}_n' X = \begin{bmatrix} \bar{x}_1 \\ \bar{x}_2 \\ \vdots \\ \bar{x}_p \end{bmatrix}, \quad \text{donde} \quad \mathbf{1}_n = \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \\ \vdots \\ 1_n \end{bmatrix} \quad (2)$$

Ejemplo vector de medias

El vector de medias de las variables de la tabla de ciudades expresado como un vector es: $\bar{x}' = (888021.77, 0.12, 1.09, 0.21, 23.27)'$, el cual, en formato de tabla se muestra en la tabla2 :

Table: Vector de medias para variables de educación de la tabla de ciudades

	Media
Num.Hab	888021.77
Analfabetismo	0.12
Cobertura.pria.y.secdaria	1.09
Cobertura.ed.sup	0.21
Rel.al.prof	23.27

Matriz de datos centrados

$$\tilde{X} = X - \mathbf{1}_n \bar{x}' = \begin{bmatrix} x_{11} - \bar{x}_1 & x_{12} - \bar{x}_2 & \cdots & x_{1p} - \bar{x}_p \\ x_{21} - \bar{x}_1 & x_{22} - \bar{x}_2 & \cdots & x_{2p} - \bar{x}_p \\ \vdots & \vdots & \vdots & \vdots \\ x_{n1} - \bar{x}_1 & x_{n2} - \bar{x}_2 & \cdots & x_{np} - \bar{x}_p \end{bmatrix}, \{\tilde{x}_{ij}\} = \{x_{ij} - \bar{x}_j\} \quad (3)$$

Observe que

$$med(\tilde{X}) = \frac{1}{n} \tilde{X}' \mathbf{1}_n = \left(\frac{1}{n} X' \mathbf{1}_n - \frac{1}{n} \bar{x}' \mathbf{1}_n' \mathbf{1}_n \right) = 0 \quad (4)$$

Matriz de datos centrados

Se puede comprobar fácilmente que todas las variables tienen media cero.

Table: Matriz de datos centrados

	Num.Hab	Analfabetismo	Cobertura.pria.y.secdaria	Cobertura.ed.sup	Rel.al.prof
Armenia	-603901.77	-0.028	0.009	0.053	-0.873
Barranquilla	274985.23	-0.024	-0.003	0.093	-0.773
Bogota	6162206.23	-0.019	-0.087	0.325	-0.673
Bucaramanga	-367941.77	-0.040	0.106	0.113	-1.073
Cali	1281779.23	-0.033	-0.067	0.010	-1.273
Cartagena	24652.23	0.005	0.121	-0.066	1.127
Cucuta	-287972.77	-0.003	0.061	0.004	-0.873
Ibague	-378225.77	-0.009	-0.103	-0.032	0.127
Manizales	-504538.77	-0.039	0.057	0.017	-1.073
Medellin	1376754.23	0.010	0.133	0.087	3.027
Monteria	-497025.77	0.043	0.023	-0.062	2.827
Neiva	-565923.77	-0.003	0.014	-0.034	0.027
Pasto	-493947.77	-0.005	-0.034	-0.085	-1.473

Matriz de covarianzas

$$S = \frac{1}{n} \tilde{X}' \tilde{X} = \begin{bmatrix} s_1^2 & s_{12} & \cdots & s_{1p} \\ s_{21} & s_2^2 & \cdots & s_{2p} \\ \vdots & \vdots & \vdots & \vdots \\ s_{p1} & s_{p2} & \cdots & s_p^2 \end{bmatrix}, \quad s_j^2 = s_{jj}$$

Nótese que comunmente se utiliza el estimador insesgado para la varianza $s_j = \frac{1}{(n-1)} \sum_{i=1}^n (x_{ij} - \bar{x}_j)^2, j = 1, \dots, p$.

Sin embargo, cuando se trata de datos poblacionales como es el caso de los datos de las ciudades colombianas, o cuando n es suficientemente grande, se puede utilizar como denominador n debido a que por ejemplo para $n > 100$, la diferencia entre dividir por n y por $n - 1$ resulta despreciable.

Matriz de datos centrados estandarizados

La matriz de datos centrados estandarizados se obtiene al estandarizar la matriz de datos centrados $\tilde{X}$:

$$\tilde{Y} = \tilde{X}D^{-1/2}, \quad D = \text{diag}\{s_j^2\}, \quad D^{-1/2} = \text{diag}\left\{\frac{1}{s_j}\right\}. \quad (5)$$

Explícitamente,

$$\tilde{Y} = \begin{bmatrix} \frac{x_{11} - \bar{x}_1}{s_1} & \frac{x_{12} - \bar{x}_2}{s_2} & \dots & \frac{x_{1p} - \bar{x}_p}{s_p} \\ \frac{x_{21} - \bar{x}_1}{s_1} & \frac{x_{22} - \bar{x}_2}{s_2} & \dots & \frac{x_{2p} - \bar{x}_p}{s_p} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ \frac{x_{n1} - \bar{x}_1}{s_1} & \frac{x_{n2} - \bar{x}_2}{s_2} & \dots & \frac{x_{np} - \bar{x}_p}{s_p} \end{bmatrix}$$

Utilizando (3) se obtiene que el vector de medias de $\tilde{Y}$ es nulo:

$$\text{med}(\tilde{Y}) = \tilde{Y}'\mathbf{1}_n = D^{-1/2}\tilde{X}'\mathbf{1}_n = D^{-1/2} \cdot 0 = 0$$

Matriz de correlación

Es una matriz simétrica que contiene unos en la diagonal que son las correlaciones de las variables consigo mismas y por fuera de la diagonal las correlaciones r_{ij} entre pares de variables. Se define por

$$R = D^{-1/2}SD^{-1/2} \quad (6)$$

y también se obtiene a partir de la matriz de datos centrados estandarizados así:

$$R = \frac{1}{n} \tilde{Y}'\tilde{Y} = \begin{bmatrix} 1 & r_{12} & \cdots & r_{1p} \\ r_{21} & 1 & \cdots & r_{2p} \\ \vdots & \vdots & \vdots & \vdots \\ r_{p1} & r_{p2} & \cdots & 1 \end{bmatrix}, \quad r_{ij} = \frac{s_{ij}}{s_i s_j} \quad (7)$$

Nótese que la matriz de covarianzas de $\tilde{Y}$ es también R puesto que

$$S_{\tilde{Y}} = \frac{1}{n} \tilde{Y}' \tilde{Y} = \frac{1}{n} D^{-1/2} \tilde{X}' \tilde{X} D^{-1/2} = D^{-1/2} S D^{-1/2} = R \quad (8)$$

Matriz de datos centrados, estandarizados y normados

A partir de la matriz de datos centrados estandarizados $\tilde{Y}$ se define la **matriz de datos centrados, estandarizados y normados**

$$Y = \frac{1}{\sqrt{n}} \tilde{Y} = \frac{1}{\sqrt{n}} \tilde{X} D^{-1/2}. \quad (9)$$

Esta matriz también está centrada puesto que

$$\text{med}(Y) = \frac{1}{\sqrt{n}} \text{med}(\tilde{Y}) = 0.$$

Además, al estar autoponderada por $\frac{1}{\sqrt{n}}$, el producto de la matriz consigo misma produce su matriz de covarianzas, que coincide con la matriz de correlaciones:

$$S_Y = Y'Y = \frac{1}{n} \tilde{Y}'\tilde{Y} = R. \quad (10)$$

Varianza total

La **varianza total** es un indicador de la variabilidad global de una matriz de datos. Se define como la suma de las varianzas de las variables:

$$V_T = \sum_{j=1}^p s_j^2 \quad (11)$$

donde s_j^2 es la varianza de la variable X_j .

En particular, para las matrices de datos centrados y estandarizados se tiene

$$S_{\tilde{Y}} = S_Y = R$$

donde R es la matriz de correlaciones.

Como la diagonal de R está compuesta por unos, se obtiene

$$V_T(\tilde{Y}) = V_T(Y) = \text{tr}(R) = p. \quad (12)$$

Ejemplo

Matriz de covarianzas entre las variables del archivo de ciudades.

Table: Matriz de covarianzas de las variables del archivo de ciudades

	Num.Hab	Analfabetismo	Cobertura.pria.y.secdaria	Cobertura.ed.sup	Rel.al.prof
Num.Hab	2.228013e+12	-9797.725	-13331.063	116811.812	-34962.921
Analfabetismo	-9.797725e+03	0.002	0.000	-0.001	0.050
Cobertura.pria.y.secdaria	-1.333106e+04	0.000	0.010	0.001	0.070
Cobertura.ed.sup	1.168118e+05	-0.001	0.001	0.010	-0.025
Rel.al.prof	-3.496292e+04	0.050	0.070	-0.025	2.721

Ejemplo

Matriz correlación entre las variables de la tabla de ciudades.

Table: Matriz de correlación de las variables del archivo de ciudades

	Num.Hab	Analfabetismo	Cobertura.pria.y.secdaria	Cobertura.ed.sup	Rel.al.prof
Num.Hab	1.00	-0.15	-0.09	0.79	-0.01
Analfabetismo	-0.15	1.00	-0.01	-0.34	0.71
Cobertura.pria.y.secdaria	-0.09	-0.01	1.00	0.09	0.42
Cobertura.ed.sup	0.79	-0.34	0.09	1.00	-0.15
Rel.al.prof	-0.01	0.71	0.42	-0.15	1.00

Combinaciones lineales

Una combinación lineal es una suma ponderada de los valores de una variable observada en varios objetos, como lo es la media por ser la suma de los valores de la variable ponderados por $1/n$, o como la varianza que es la suma de los desvíos de los valores de la variable respecto a la media $(x_i - \bar{x})^2$ ponderados por $1/n$.

Combinaciones lineales

También es combinación lineal la una suma ponderada de los valores de varias variables observadas en un mismo objeto. Por ejemplo:

Los rankings de universidades

El índice de pobreza multidimensional es una combinación lineal de indicadores de vivienda, servicios básicos, estándar de vida, educación y empleo, y protección social;

El índice de desarrollo humano que podera indicadores de dimensiones como la esperanza de vida, educación y riqueza.

La mayoría de los índices o indicadores utilizados en economía y finanzas para describir y comparar cantidades de diferente naturaleza.

Combinaciones lineales

Las combinaciones lineales son útiles en muchos contextos estadísticos y especialmente en el caso de datos multivariados, donde por ejemplo, **las componentes principales son combinaciones lineales de los valores de las variables cuyas ponderaciones se construyen para que contengan la mayor cantidad posible de la varianza de las variables.**

Combinación lineal de los valores de una variable observada en n objetos

Sea X_j la j -ésima columna de la matriz de datos. Se define la combinación de los n valores de la variable j con constantes de ponderación $a' = (a_1, \dots, a_n)'$ por:

$$X_j^* = a'X_j = \sum_{i=1}^n a_i x_{ij} \quad j = 1, \dots, p. \quad (13)$$

Ejemplo

El promedio de la variable j es una combinación lineal con constantes de ponderación $p' = (\frac{1}{n}, \dots, \frac{1}{n})$:

$$\bar{x}_j = p'X_j = \sum_{i=1}^n \frac{1}{n} x_{ij} \quad (14)$$

Combinación lineal de valores de p variables observadas sobre un mismo objeto

Para el objeto i cuyas observaciones están en la fila $x_{i.}$ de la matriz de datos, se define la combinación lineal de los valores de las p variables con ponderaciones $b' = (b_1, \dots, b_p)$ por:

$$z_i = b'x_{i.} = \sum_{j=1}^p b_j x_{ij} \quad i = 1, \dots, n \quad (15)$$

donde x_{ij} es como en (??). Conviene aclarar que este tipo de combinaciones lineales solo tienen sentido si las variables están estandarizadas, o cuando todas vienen medidas en las mismas escalas.

Ejemplo. El Academic Rank of World Universities

Uno de los más exigentes rankings del mundo es el Academic Rank of World Universities (ARWU) que utiliza los siguientes seis criterios (en paréntesis las ponderaciones de cada criterio)

- Premios Nobel de exalumnos (Score on Alumni: X_1) (10%)
- Premios Nobel de docentes de la universidad (Score on Award: X_2) (20%)
- Artículos altamente citados en 21 categorías temáticas (Score on HiCi: X_3) (20%)
- Artículos publicados en las reconocidas revistas Nature y Science (Score on N&S: X_4) (20%)
- Artículos indexados en alguno de los índices de citación como el Science Citation Index-expanded o en el Social Science Citation Index (Score on PUB: X_5) (20%)
- Productividad per cápita de los docentes de la universidad (Score on PCP: X_6) (10%)

Ejemplo. El Academic Rank of World Universities

Los valores de los rankings para las primeras 10 universidades en el año 2013

Table: Puntajes de las diez primeras universidades del ARWU

	Alumni	Award	HiCi	N.S	PUB	PCP	Total.Score
Harvard	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	69.2	100.0
California, Berkeley	67.6	79.3	69.0	70.9	70.6	54.2	72.4
Stanford	40.2	78.4	87.6	68.4	69.7	50.1	72.1
MIT	70.5	80.3	66.8	70.1	61.4	64.5	71.4
Cambridge	88.5	92.6	53.9	54.3	65.7	53.1	69.6
California I of Tech	50.3	68.8	56.7	64.8	46.9	100.0	64.4
Princeton	56.4	84.8	61.1	43.3	44.3	65.5	60.8
Columbia	70.7	67.4	56.2	47.6	69.9	32.1	60.4
Chicago	65.5	83.9	50.9	39.8	50.5	40.0	57.3
Oxford	56.2	57.6	48.8	49.8	68.5	41.1	56.4

Teorema de la descomposición espectral (TDE)

Este teorema garantiza que una matriz simétrica $B_{p \times p}$, como la matriz de covarianzas o de correlación (ambas semidefinidas positivas), se puede reconstruir (o factorizar) a partir de sus **valores** y **vectores propios** como sigue:

$$B = U \Lambda U' \quad (16)$$

donde:

- $U_{p \times p}$ es una **matriz ortogonal**, cuyas columnas son los **vectores propios estandarizados de B** , es decir,

$$U'U = UU' = I_p.$$

- $\Lambda = \text{diag}(\lambda_1, \dots, \lambda_p)$ es una matriz diagonal cuyos elementos son los **valores propios de B** , tales que

$$\lambda_\alpha \geq 0, \quad \lambda_1 \geq \lambda_2 \geq \dots \geq \lambda_p.$$

Ejemplo. El Academic Rank of World Universities

Esto significa que para obtener los valores de la tabla hay que ajustar los valores que produce la combinación lineal. Por ejemplo, para la universidad de Cambridge:

$$\begin{aligned}x_5 &= 0.1 \times 88.5 + 0.2 \times 92.6 + 0.2 \times 53.9 + 0.2 \times 54.3 + 0.2 \times 65.7 \\ &\quad + 0.1 \times 53.1 = 0.6746\end{aligned}$$

y por tanto después de ajustado $67.46/0.9692 = 69.6$.

Combinación lineal que produce las componentes principales

Las componentes principales son combinaciones lineales de los valores de las variables para cuya construcción se utilizan unas ponderaciones $v'_1 = (v_{11}, \dots, v_{p1})$ tales que por ejemplo, la primera componente para el objeto i cuyas observaciones para las p variables están la i ésima fila de Y la matriz de datos centrados estandarizados y_i tiene la forma:

$$z_{i1} = y'_i v_1 = \sum_{j=1}^p v_{j1} y_{ij}, i = 1, \dots, n \quad (17)$$

z_{i1} es un promedio ponderado de los valores de las variables observadas en el objeto i .

La primera componente para el objeto i es la proyección de los valores de las variables sobre el vector de ponderaciones v_1 .

En el siguiente capítulo se hace la construcción formal de las componentes y las ponderaciones.

Combinación lineal que produce las componentes principales

Como se verá en el siguiente capítulo, estas componentes tienen, entre otras, dos importantes propiedades:

van en direcciones que acumulan la mayor cantidad posible de varianza de la tabla de datos X , útil para reducir la dimensionalidad del problema en el sentido de que basta con unas cuantas de ellas para interpretar y descubrir asociaciones e información intrínseca en los datos.

que **todas las componentes son ortogonales entre sí**, que facilita representaciones gráficas de los datos.

Teorema de la descomposición espectral (TDE)

Este teorema garantiza que una matriz simétrica $B_{p \times p}$, como la matriz de covarianzas o de correlación (ambas semidefinidas positivas), se puede reconstruir (o factorizar) a partir de sus **valores** y **vectores propios** como sigue:

$$B = U \Lambda U' \quad (18)$$

donde:

- $U_{p \times p}$ es una **matriz ortogonal**, cuyas columnas son los **vectores propios estandarizados de B** , es decir,

$$U'U = UU' = I_p.$$

- $\Lambda = \text{diag}(\lambda_1, \dots, \lambda_p)$ es una matriz diagonal cuyos elementos son los **valores propios de B** , tales que

$$\lambda_\alpha \geq 0, \quad \lambda_1 \geq \lambda_2 \geq \dots \geq \lambda_p.$$

Teorema de la descomposición en valores singulares (TDVS)

La descomposición en valores singulares es más general que el TDE, pues no requiere que la matriz a descomponer sea simétrica, lo cual garantiza que también la matriz de datos puede ser descompuesta.

El **TDVS** garantiza que una matriz $C_{n \times p}$, con $n \geq p$ y rango r , equivalentemente con r columnas linealmente independientes (por ejemplo la matriz de datos X o la estandarizada Y definida en (??)), se puede factorizar como (ver por ejemplo Sudipto & Anindya2014) Mardia et al.1992):

$$C = ULV' \quad (19)$$

donde:

- U y V son matrices con columnas ortonormales, es decir,

$$U'U = V'V = I_r.$$

- $L_{r \times r} = \text{diag}(\sqrt{\lambda_1}, \dots, \sqrt{\lambda_r})$, con

$$\sqrt{\lambda_1} \geq \sqrt{\lambda_2} \geq \dots \geq \sqrt{\lambda_r} > 0.$$

- $\sqrt{\lambda_j}$ son los **valores singulares** de C .
- $V_{p \times r} = (v_1, \dots, v_r)$ contiene en sus columnas los vectores propios de $C'C$.
- $U_{n \times r} = (u_1, \dots, u_r)$ contiene en sus columnas los vectores propios de CC' .

La equivalencia con los valores propios no nulos de CC' se establece tomando

$$L = \text{diag}(\sqrt{\mu_1}, \dots, \sqrt{\mu_r}),$$

donde μ_α es el α -ésimo valor propio no nulo de CC' .

Reconstrucción de la matriz de datos a partir del TDVS

Reconstrucción de la matriz de puntajes en los criterios del ranking ARWU a partir del TDVS

El ejercicio implica los siguientes pasos:

1 **Lectura de los datos** y construcción de la matriz $C \in \mathbb{R}^{n \times p}$.

2 **Cálculo de las matrices**

$$C'C \quad \text{y} \quad CC'.$$

3 **Cálculo de**

- los valores propios de $C'C$,
- la matriz V de vectores propios de $C'C$.

4 **Selección de los valores propios estrictamente positivos** y construcción de la submatriz V_r con los vectores propios asociados.

5 **Cálculo de los valores singulares de C :**

$$\sigma_{\alpha} = \sqrt{\lambda_{\alpha}}.$$

Laboratorio (1/4)

Utilizar los datos del archivo `original-filtrado-con-etiquetas` y los mismos grupos de variables asignados en el ejercicio ?? del Laboratorio ??, junto con la subtabla de indicadores de Recursos Humanos del mismo archivo de ciudades, para conformar una nueva tabla que contenga los dos conjuntos de variables.

- 1 Calcular el vector de medias de todas las variables del conjunto que le correspondió al grupo.
- 2 Calcular la matriz de datos centrados.
- 3 Calcular la matriz de covarianzas a partir de la matriz de datos centrados.

Laboratorio (2/4)

- 4 Calcular la matriz de covarianzas con el comando `cov` de R. ¿Coincide con la obtenida a partir de la matriz de datos centrados? ¿Sí? ¿No? ¿Por qué?
- 5 Calcular la matriz $\tilde{Y}$ de datos centrados estandarizados a partir del punto 1.
- 6 Calcular la matriz de correlación a partir de la matriz de datos centrados estandarizados. Calcular también la matriz de correlación con el comando `cor` de R. ¿Coincide con $\frac{1}{n}\tilde{Y}'\tilde{Y}$? ¿Sí? ¿No? ¿Por qué?

Laboratorio (3/4)

- 7 Calcular la matriz de covarianzas S e identificar las dos variables con mayor covarianza y las dos con menor covarianza.
- 8 Calcular la matriz de correlación R e identificar las dos variables con mayor correlación y las dos con menor correlación. ¿Son las mismas que las que tienen mayor y menor covarianza identificadas en el punto 7?
- 9 Calcular el producto $\frac{1}{n} Y'Y$ y verificar que es exactamente la matriz R obtenida en el punto 8. ¿Por qué?

Laboratorio (4/4)

- 10 Comprobar que la matriz de covarianzas se puede obtener con el producto

$$\frac{1}{n} \tilde{X}' \tilde{X}.$$

- 11 Comprobar que la matriz de correlación se puede obtener con el producto

$$\frac{1}{n} Y' Y.$$

- 12 Construir una matriz de datos con los puntajes en los seis criterios del ranking ARWU para las universidades asignadas al grupo y comprobar que con el TDVS se puede reconstruir.

- **Grupo 1:** universidades en puestos 91 a 100 inclusive.
- **Grupo 2:** universidades en puestos 81 a 90 inclusive.
- **Grupo 3:** universidades en puestos 71 a 80 inclusive.
- **Grupo 4:** universidades en puestos 61 a 70 inclusive.
- **Grupo 5:** universidades en puestos 51 a 60 inclusive.
- **Grupo 6:** universidades en puestos 41 a 50 inclusive.

Referencias de interés

Mardia, K., Kent, J. & BibbY, J. (1992), *Multivariate Analysis*, eighth printing edn, Academic Press, San Diego, CA 92101.

Sudipto, B. & Anindya, R. (2014), Linear algebra and matrix analysis for statistics, *in* 'Texts in Statistical Science', Chapman and Hall/CRC.

Fin Capitulo