

Paciente Pediátrico.

Antecedentes:

- Edad del paciente: 12345
- Diagnóstico de ingreso del paciente:
- Escolaridad:
- Edad del tutor cuidador:
- Escolaridad del tutor cuidador:
- Parentesco o relación del tutor cuidador:
- fDomicilio:
- Motivo de consulta:

- Antecedentes mórbidos: .

Valoración del paciente:

Valoración General

Control de signos vitales:

Temperatura: . Frecuencia cardiaca: . Frecuencia respiratoria: . Presión Arterial: . Presión arterial media: . Saturación Oxígeno: . Peso diario: .

Estado general:

- Condición: .
- Glasgow: .
- Tratamiento asociado: .
- Color de piel: .
- Higiene del paciente: .
- Movilidad: .

- Evaluación del dolor: LOCALIZACION:

- FLACC: EVA: ENA:

Tratamiento dolor:

- Sedación: .

- Actualmente con infección: Exámenes: Tratamiento asociado:

- Observaciones:

Puntaje escala de prevención de caídas:

Puntaje escale de prevención de Lesión por presión:

- **Valoración segmentaria:**

Cabeza:

- Ojos: Pupilas: Secreción:
- Implantación Auricular:
- Fosas nasales: Permeables:
- Boca: Labios:

Paladar: Dientes:

- Observaciones:

Cuello:

- Movilidad: Adenopatías:

Tórax:

- Respiración:

- Forma: . Ruidos: . Secreciones:
- Retracción:
- Oxigenoterapia (dispositivo): . Fio2:
- Observaciones:

- Tratamiento Asociado: .

Extremidades Superiores:

- Movilidad: . Pulsos: . Integridad: . COLORACIÓN: .

Abdomen:

- Observación: .
- Auscultación: Ruidos hidroaéreos: .
- Percusión:
- Palpación:
- Técnica de Alimentación: .
- REGIMEN:
- Deposiciones: Residuo gástrico:
- Vómitos:
- Observaciones:

- Tratamiento asociado: .

Dorso:

○ Observación:

○ Integridad:

Genitales:

○ Masculino: . testes en escroto: .

Fimosis: .

○ Femenino: . labios menores: .

labios mayores: .

○ Integridad: Higiene:

○ Diuresis: . BALANCE HIDRICO:

○ Observaciones:

○ Tratamiento asociado: .

Extremidades Inferiores:

○ Movilidad: . Pulsos: .

Integridad: .

Coloración:

Medidas Invasivas:

Acceso Vascular:

○ Tipo: . Tamaño: . Ubicación: .

Días: . Uso: .

○ Sitio de Inserción .

Dispositivo de alimentación: .

Dispositivo de eliminación:

○ Catéter urinario: . Tamaño: .

Días: .

Valoración diaria clínica del paciente:

AGENCIA DE ENFERMERIA:

- Totalmente compensadores: .
- Parcialmente compensadores: .
- De apoyo-educación: .

Describir los Requisitos de Autocuidado que se encuentran alterados:

RAC	SATISFECHO	INSATISFECHO
Mantenimiento de un ingreso suficiente de aire.		
Mantenimiento de una ingesta suficiente de agua.		
Mantenimiento de una ingesta suficiente de alimentos.		
Provisión de cuidados asociados con procesos de eliminación urinaria e intestinal.		
Equilibrio entre actividades y descanso.		
Equilibrio entre soledad y la comunicación social.		
Prevención de peligros para la vida, funcionamiento y bienestar humano.		
Promoción del funcionamiento humano y el desarrollo dentro de los grupos sociales de acuerdo con el potencial humano.		

Formule proceso enfermero atingente para los problemas PRIORITARIOS del paciente:

- Diagnóstico:

Etiqueta NANDA ----- RELACIONADO CON -----
MANIFESTADO POR -----

Objetivo de enfermería:

--

Intervenciones y actividades de enfermería:

--

Evaluación del proceso enfermero:

--