

* DURACIÓN DEL EXAMEN: DOS HORAS *

* NO SE PERMITE EL USO DE NINGÚN TIPO DE MATERIAL *

EJERCICIO 1) **(2 puntos)** Probar que si f es una función de clase C^1 en \mathbb{R}^2 tal que

$$(y+1)\frac{\partial f}{\partial y} + x\frac{\partial f}{\partial x} = 0, \quad \text{para todo } (x, y) \in \mathbb{R}^2,$$

entonces f es constante.



EJERCICIO 2) **(4 puntos)** utilizando el método de variables separadas, hallar la solución del siguiente problema

$$\begin{cases} u_t - u_{xx} + 2tu = 0, & x \in (0, \frac{1}{2}), \quad t > 0 \\ u(x, 0) = 1 - 2x \\ u_x(0, t) = u(\frac{1}{2}, t) = 0 \end{cases}$$



EJERCICIO 3) **(4 puntos)** Sea $f : [0, \pi] \rightarrow \mathbb{R}$ la función

$$f(x) = \begin{cases} 1 & \text{si } 0 \leq x \leq \frac{\pi}{2} \\ -1 & \text{si } \frac{\pi}{2} < x \leq \pi \end{cases}$$

- a) Hallar el desarrollo en cosenos de la función f en el intervalo $[0, \pi]$.
- b) ¿En qué puntos del intervalo $[0, \pi]$ la serie en cosenos converge a $f(x)$?
- c) Según los valores de $\lambda \in [0, 1]$ hallar las soluciones del siguiente problema

$$\begin{cases} y'' + \lambda y = f(x), & x \in (0, \pi) \setminus \{\frac{\pi}{2}\} \\ y'(0) = y'(\pi) = 0. \end{cases}$$