

* DURACIÓN DEL EXAMEN: DOS HORAS *

* NO SE PERMITE EL USO DE NINGÚN TIPO DE MATERIAL *

EJERCICIO 1) (2 puntos) Consideremos el siguiente problema de Cauchy

$$(P) \quad \begin{cases} 2yu_y + xu_x = 4yx^2u \\ u(-2, y) = 1. \end{cases}$$

- a) Demostrar que (P) tiene solución única.
- b) Encontrar la solución de (P) .

~ * ~

EJERCICIO 2) (4 puntos) Utilizando el método de variables separadas, hallar la solución del siguiente problema

$$\begin{cases} u_{xx} + u_{yy} + 2u_y = 0, & (x, y) \in (0, \pi) \times (0, \pi) \\ u_x(0, y) = u_x(\pi, y) = 0 \\ u_y(x, 0) = 0, & u(x, \pi) = 2 \cos^2 x \end{cases}$$

~ * ~

EJERCICIO 3) (4 puntos)

- a) Calcular la serie de Fourier en cosenos

$$S(x) := \sum_{n=0}^{\infty} a_n \cos(n\pi x)$$

de la función x^2 en el intervalo $[0, 1]$.

- b) Recordemos que

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^2} = \frac{\pi^2}{6}, \quad \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^{n+1}}{n^2} = \frac{\pi^2}{12}.$$

¿En qué puntos x del intervalo cerrado $[0, 1]$ la serie $S(x)$ converge a x^2 ? (Justificar la respuesta)

- c) Hallar el conjunto C de los $x \in \mathbb{R}$ para los que la serie $S(x)$ converge.
- d) ¿En qué subconjuntos de \mathbb{R} la serie $S(x)$ converge uniformemente? (Justificar la respuesta)
- e) Calcular $S(x)$ para $x \in C$.