

Cálculo simbólico

May 25, 2020

1 Cálculo simbólico em Python

Jorge Gustavo Rocha Departamento de Informática, Universidade do Minho 25 de maio de 2020 O módulo [SymPy](#) suporta o cálculo simbólico. Em vez de lidar apenas com números e operações sobre os mesmos, como acontece no cálculo numérico, o SymPy permite-nos lidar com símbolos e realizar operações que manipulam esses símbolos. Isto permite-nos, entre outras coisas, trabalhar com representações exactas e não com aproximações.

O módulo é bastante abrangente e inerentemente **complexo**, até porque liga com algumas questões da matemática que já não são triviais. Contudo, como vamos tentar ilustrar, embora seja um módulo complexo, consegue-se usar com alguma facilidade.

Antes de mais, instale o módulo `sympy`. Se usa o Anaconda, acrescente o SymPy. Se usa a linha de comandos, faça: `pip3 install sympy`.

1.0.1 Limitações do cálculo numérico

Vejamos o primeiro exemplo: a operação `math.sqrt()` permite-nos calcular a raiz quadrada de um número. A raiz quadrada de 2, por exemplo, é um [número irracional](#) que não conseguimos representar com toda a precisão em computador. Usa-se sempre uma aproximação.

```
[1]: import math
#
print(math.sqrt(2))
print(math.sqrt(2)**2)
```

```
1.4142135623730951
2.0000000000000004
```

O exemplo anterior exemplifica a limitação do cálculo numérico: o quadrado da raiz quadrada não é (exatamente) igual a 2.

1.0.2 Símbolos em vez de números

O cálculo simbólico permite-nos representar o número irracional $\sqrt{2}$ por `sympy.sqrt(2)`. Assim sendo, o quadrado `sympy.sqrt(2)` dá como resultado 2.

```
[2]: import sympy
sympy.sqrt(2)**2
```

```
[2]: 2
```

```
[3]: sympy.sqrt(2)
```

```
[3]:  $\sqrt{2}$ 
```

Verificam-se o mesmo tipo de limitações do cálculo numérico com os números racionais. Repare que o resultado da soma seguinte não está correta.

```
[4]: i = 1/10
     j = 1/10
     k = 1/10
     i+j+k
```

```
[4]: 0.30000000000000004
```

Usando o suporte do SymPy à representação de números racionais, pode-se representar com exatidão o valor $1/10$.

Depois de feitos os cálculos e obtidos os resultados usando a representação simbólica, pode-se obter o valor real aproximado, usando o método `evalf()` para transformar a expressão num valor numérico (um float).

```
[5]: i = j = k = sympy.Rational(1,10)
     i+j+k
```

```
[5]:  $\frac{3}{10}$ 
```

```
[6]: (i+j+k).evalf()
```

```
[6]: 0.3
```

A noção matemática do π ou do infinito, entre muitas, estão disponíveis SymPy.

```
[7]: sympy.oo
```

```
[7]:  $\infty$ 
```

```
[8]: sympy.pi
```

```
[8]:  $\pi$ 
```

1.0.3 Operações com símbolos

Ao contrário das expressões numéricas, em que uma variável representa um número, no cálculo simbólico é preciso declarar explicitamente os símbolos que vamos usar.

```
[9]: x = sympy.Symbol('x')
     y = sympy.Symbol('y')
     # alternativamente, pode-se fazer:
     # x, y = sympy.symbols('x y')
```

Depois de declarados os símbolos, as operações sobre os mesmos são simbólicas.

```
[10]: x+2*y+x-y
```

```
[10]: 2x + y
```

As expressões simbólicas podem ser expandidas `expand()`, simplificadas `simplify()`, resolvidas `solve()` ou até representadas graficamente.

Vamos ver as operações básicas sobre expressões simbólicas.

`simplify()` Considere a expressão

$$\frac{1}{x} + \frac{(x \cdot \sin(x) - 1)}{x}$$

Simplifique a expressão manualmente e veja de seguida como a mesma é simplificada pelo SymPy.

```
[11]: x = sympy.Symbol('x')
      c = 1/x + (x*sympy.sin(x) - 1)/x
      sympy.simplify(c)
```

```
[11]: sin(x)
```

Já agora, repare que os resultados das expressões do SymPy são apresentadas com uma forma bem mais simpática, utilizando os símbolos matemáticos mais adequados.

Neste notebook, em vez de se usar o `print()` para se apresentar as expressões, usa-se apenas a expressão, que é o mesmo que fazer `display()`.

Veja as diferenças:

```
[12]: # visualização pouco simpática
      print(c)
```

$(x \cdot \sin(x) - 1)/x + 1/x$

```
[13]: # visualização simpática
      # display(c)
      # ou simplesmente:
      c
```

```
[13]: 
$$\frac{x \sin(x) - 1}{x} + \frac{1}{x}$$

```

`expand()` Considere a seguinte expressão e veja como a mesma pode ser expandida.

```
[14]: x, y = sympy.symbols('x y')
      d = 3*(x+y)**2+2*y+x**2+1
      d
```

```
[14]: 
$$x^2 + 2y + 3(x + y)^2 + 1$$

```

```
[15]: sympy.expand(d)
```

```
[15]:  $4x^2 + 6xy + 3y^2 + 2y + 1$ 
```

`solve()` Considere estas duas expressões diferentes:

$$2 \cdot x + 4 = 0$$

e

$$x^2 - 2y - 6 = 0$$

Podemos pedir para resolver a equação, sendo que para a segunda, o valor dependerá de y .

Nota: usa-se o método `sympy.Eq()` para criar uma igualdade simbólica. Não se usa o operador `==` nativo do Python.

```
[16]: e = sympy.Eq(2*x+4, 0)
      i = sympy.Eq(x**2-2*y-6, 0)
```

```
[17]: sympy.solve(e)
```


```
[17]: [-2]
```

```
[18]: sympy.solve(i)
```

```
[18]: [{y: x**2/2 - 3}]
```


`plot()` As expressões anteriores podem ser visualizadas de uma forma bastante imediata, usando o método `sympy.plot_implicit()`. Os gráficos do SymPy não são tão flexíveis como os da biblioteca `matplotlib`, mas são bastante práticos.

```
[19]: sympy.plot_implicit(e)
```



[19]: <sympy.plotting.plot.Plot at 0x7f1def815810>

[20]: `sympy.plot_implicit(i)`



[20]: <sympy.plotting.plot.Plot at 0x7f1dec5f9ad0>

1.0.4 Exercícios

1. Diga qual é a solução da equação

$$x^2 - 1$$

[]:

2. Simplifique a expressão

$$\frac{\sin^4(x) - \cos^4(x)}{\sin^2(x) - \cos^2(x)}$$

[]:

1.0.5 Igualdade de duas expressões

É preciso ter algum cuidado com a igualdade no SymPy. Considere as duas expressões, matematicamente iguais:

[21]: `a = (x + 1)**2`
`a`

[21]: $(x + 1)^2$

```
[22]: b = x**2 + 2*x + 1
      b
```

[22]: $x^2 + 2x + 1$

Embora iguais matematicamente, se usar a igualdade do Python == para as comparar, o resultado dá False.

```
[23]: a == b
```

[23]: False

O resultado dá negativo porque este operador igual não atende ao significado das expressões, mas apenas à forma. Em termos de forma, elas são diferentes.

Matematicamente falando, se $a = b$, então $a - b = 0$. Usando esta lógica, podemos usar o SymPy para realmente ver se as expressões são matematicamente equivalentes, fazendo:

```
[24]: sympy.simplify(a-b)
```

[24]: 0

O resultado dá 0, provando que as expressões são iguais.

O mesmo não acontece, por exemplo, com expressões ligeiramente diferentes:

```
[25]: m = 2*x-2*y+1
      n = 2*x-3*y+1
      sympy.simplify(m-n)
```

[25]: y

1.0.6 Exercício

3. Verifique se as seguintes expressões são equivalentes:

$$\cos(\pi/2) + 1$$

$$\sin(\pi/2)$$

```
[ ]:
```

1.0.7 Exercício

4. Verifique se as seguintes expressões são equivalentes:

$$x^a \cdot x^b$$

$$x^{a+b}$$

```
[ ]:
```

1.0.8 Álgebra linear

Nesta ficha introdutória ao SymPy vamos também ver como são representadas e manipuladas as [matrizes](#).

```
[26]: A = sympy.Matrix( [[ 2,-3,-8, 7],[-2,-1, 2,-7],[ 1, 0,-3, 6]] )  
A
```

```
[26]: 
$$\begin{bmatrix} 2 & -3 & -8 & 7 \\ -2 & -1 & 2 & -7 \\ 1 & 0 & -3 & 6 \end{bmatrix}$$

```

Selecionar partes da matriz:

```
[27]: # linha 0, coluna 0  
# A[0,0]  
# primeira linha, terceira coluna  
# A[0,2]  
# toda a segunda coluna  
A[:,1]
```

```
[27]: 
$$\begin{bmatrix} -3 \\ -1 \\ 0 \end{bmatrix}$$

```

Selecionar uma parte da matriz:

Note: repare que os índices sequeem a lógica do Python para listas: do limite inferior até ao limite superior **exclusive**.

```
[28]: A[1:3,1:4]
```

```
[28]: 
$$\begin{bmatrix} -1 & 2 & -7 \\ 0 & -3 & 6 \end{bmatrix}$$

```

Outras operações básicas

```
[29]: sympy.eye(3)
```

```
[29]: 
$$\begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

```

```
[30]: sympy.ones(2)
```

```
[30]: 
$$\begin{bmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 1 \end{bmatrix}$$

```

```
[31]: sympy.zeros(4)
```

```
[31]:
```


$$\begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$$

```
[32]: # A.transpose()
      # ou também se pode fazer
      A.T
```

```
[32]:
```

$$\begin{bmatrix} 2 & -2 & 1 \\ -3 & -1 & 0 \\ -8 & 2 & -3 \\ 7 & -7 & 6 \end{bmatrix}$$

1.0.9 Exercício

5. Represente no SymPy a seguinte matriz:

$$B = \begin{bmatrix} 0 & \frac{1}{2} & 2^2 \\ 1 & \sqrt{3} & \frac{\sqrt{3}}{3} \end{bmatrix}$$

```
[ ]:
```

Aritmética de matrizes Considere as seguintes matrizes:

```
[33]: A = sympy.Matrix( [ [1, 2], [3, 4] ] ); A
```

```
[33]:
```

$$\begin{bmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 4 \end{bmatrix}$$

```
[34]: B = sympy.Matrix( [ [1, -2], [-1, 0] ] ); B
```

```
[34]:
```

$$\begin{bmatrix} 1 & -2 \\ -1 & 0 \end{bmatrix}$$

```
[35]: C = sympy.Matrix( [ [2, -2], [-2, 2] ] ); C
```

```
[35]:
```

$$\begin{bmatrix} 2 & -2 \\ -2 & 2 \end{bmatrix}$$

1.0.10 Exercício

6. Calcule $A + B$

7. Calcule $A \cdot B \cdot C$

```
[ ]:
```

```
[ ]:
```

1.0.11 Exercício

8. Se determinante de B for diferente de 0, calcule a inversa de B.

[]:

9. Se B é invertível, mostre que $B^{-1} \cdot B = I$.

[]:

1.0.12 Resolução de uma equação

As equações da forma $Ax=B$ podem ser resolvidas através do método `sympy.LUsolve()`.

1.0.13 Exercício

10. Resolva o sistema de equações lineares:

$$\begin{aligned}x + y + z &= 6 \\ 2y + 5z &= -4 \\ 2x + 5y - z &= 27\end{aligned}$$

Comece por reescrever o sistema de forma a ser mais fácil extrair a matriz A e B:

$$\begin{array}{rrcrcl}x & + & y & + & z & = & 6 \\ & & 2y & + & 5z & = & -4 \\ 2x & + & 5y & - & z & = & 27\end{array}$$

Extraindo as matrizes, o que queremos resolver é:

$$\begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 0 & 2 & 5 \\ 2 & 5 & -1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 6 \\ -4 \\ 27 \end{bmatrix}$$

[]:

Podemos comprovar o resultado, ora usando o método $x = A^{-1} \cdot B$ ou confirmando que $A \cdot x = B$.

[]:

[]: