
Predicted structure formed
on-hull structure
above-hull polymorph
Solid solution formed
disordered parent of on-hull
other solid solution
On-hull structure not formed
multiphase
unresolved
$\Delta H_f - C(x)$ in OQMD (meV/atom)
$P_{disorder}$
20
0
−20
−40
−60
−80
0.0
0.2
0.4
0.6
0.8
1.0
$NbNi_2B_2$
$LaRuC_2$
$GdFeGe_2$
$GdSn_6Co_4$
Ti_2Pt_8Si
Ti_2Pt_8Ge
$Gd_2Fe_3Ge_5$
$ScCrC_2$*
YAl_3Cu_2‡
$TiPt_5Si$
$YCoSi_3$†
$GdFeGe_3$
$TiPt_5Ge$
$ScPdCu_4$
$LaNiSi_3$
Gd_3Sn_6Co*
$GdPt_2Ge$
$YCoSi$*
$ZrPt_5Si$
$YSnCu$*
$ScPd_2Cu$
La_2PdAu_2
$ScPd_5Au_2$
Sc_2PdCu
$ScPd_2Au$
Al_2MnAu_6
$La_5Al_3Co_2$
Sc_3Pd_2Cu
Al_8FeCo_7
$PtNiGe_2$
Al_4FeCo_3
Sc_2Pd_5Au
Hf_2MoIr
Pd_6Cu_5Ge
split: the data cannot distinguish the two categories
X: every below-hull structure dynamically unstable
* structure previously reported at the target composition
† composition previously reported without a structure
‡ ordered member of a previously reported, partly disordered series