

1. FRÉJOL COMÚN (*Phaseolus vulgaris* L.)

ORIGEN

Originario de Mesoamérica y la región andina de América del Sur, con más de 7,000 años de domesticación histórica paralela.

HÁBITAT

Climas templados y cálidos, óptimamente entre 15 y 27°C. Prefiere suelos franco-arenosos con excelente drenaje interno.

USOS

- Consumo humano directo (grano seco y verde).
- Fijación biológica de nitrógeno en el suelo.
- Modelo en estudios de fitomejoramiento.

DISPONIBILIDAD ESTACIONAL


Todo el año bajo riego en la costa peruana; siembras de campaña de seca en la sierra al inicio de lluvias.

TAXONOMÍA

- Reino: Plantae
- División: Magnoliophyta
- Clase: Magnoliopsida
- Orden: Fabales
- Familia: Fabaceae
- Género: *Phaseolus*
- Especie: *Phaseolus vulgaris* L.

MORFOLOGÍA

- Raíz: Pivotante con nódulos.
- Tallo: Herbáceo voluble o erecto.
- Hojas: Trifoliadas y alternas.
- Fruto: Legumbre con hilo visible.



DESCRIPCIÓN

Leguminosa anual herbácea. Presenta semillas oblongas o arriñonadas de testa lisa y coloración muy diversa con germinación epígea.

DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA

- Cajamarca
- La Libertad
- Amazonas
- Áncash

VARIEDADES

- Canario
- Caballero
- Panamito
- Bayo Moche

MAPA DE DISTRIBUCIÓN EN PERÚ



Aslam Narváez Parra