

Relatório do Projeto 2

Link do GitHub:

<https://github.com/jhapreis/7600017-introducao-fisica-computacional/tree/main/projeto1>

Sumário

1	Tarefa 1 - Números aleatórios, integrais e amostragem	1
1.1	Gerador de sequências pseudo-aleatórias	1
1.2	Histogramas dos valores médio e desvio padrão	3
1.3	Estimativa do valor de π com integração por Monte Carlo	5
1.3.1	Motivação do problema	5
1.3.2	Ajuste dos intervalos da função <i>rand</i>	6
1.3.3	Estimativa de N_{total}	6
1.3.4	Programa com sequências pseudo-aleatórias e resultados	7
1.4	Cálculo de integrais por Monte Carlo	8
1.4.1	Motivação com o Teorema do Valor Médio	8
1.4.2	Estimativa de N_{total}	8
1.4.3	Cálculo das integrais	8
2	Tarefa 2 (Opcional) - Decaimento Radioativo	10
3	Tarefa 3 - Passeio Aleatório	11

1 Tarefa 1 - Números aleatórios, integrais e amostragem

1.1 Gerador de sequências pseudo-aleatórias

Na figura 1 podemos observar o código utilizado para gerar as sequências pseudo-aleatórias.

A saída do programa são arquivos de dados contendo, respectivamente:

- O identificador da sequência
- O tamanho da sequência
- A média $\langle r \rangle$ dos valores da sequência
- O desvio padrão σ_r dos valores da sequência

```
character file_number

integer iseed, m, n_size, k_seq

double precision r, r2, sum_r, sum_r2
double precision mean_r, mean_r2, std

iseed = 50

call srand(iseed)

do m=1,9 ! com m=1, 2, 3, ..., 9

    file_number = char(m+48) ! Transforma o número em caracter pela tabela ASCII ("0" = 48)

    print *, file_number

    open(unit=10, file="arquivo-saida-//file_number//".dat")

    do k_seq=1,100 ! gere 100 sequências

        sum_r = 0.0d0
        sum_r2 = 0.0d0

        do n_size=1,3**m - 1 ! de tamanho 3**m
            r = rand()
            r2 = r**2
            sum_r = sum_r + r
            sum_r2 = sum_r2 + r2
        end do

        mean_r = sum_r / real(n_size, 8)
        mean_r2 = sum_r2 / real(n_size, 8)
        std = sqrt(mean_r2 - mean_r**2)

        write(10, *) k_seq, n_size, mean_r, std

    end do

    close(10)

end do

stop
end
```

Figura 1: Código para geração das $k = 10^2$ sequências pseudo-aleatórias, com tamanhos $N = 3^m$, onde $m = 1, 2, 3, \dots, 9$

Graficando os valores das médias $\langle r \rangle$ e dos desvios-padrão σ_r para cada sequência, em função do tamanho N , podemos notar que conforme N aumenta os valores se dispersam menos e se aproximam cada vez mais dos valores esperados:

$$\langle r \rangle = \frac{1}{2} \quad (1)$$

$$\sigma_r = \frac{1}{2\sqrt{3}} \approx 0,288675 \quad (2)$$

As figuras 2 e 3 mostram os resultados.




Figura 2: Gráfico das médias $\langle r \rangle$ das sequências em função da quantidade de sequências N .




Figura 3: Gráfico dos desvios-padrão σ_r das sequências em função da quantidade de sequências N .

1.2 Histogramas dos valores médio e desvio padrão

Pelo Teorema do Limite Central, as gaussianas esperadas são dadas por

$$P(x) = \frac{1}{\sqrt{2\pi\sigma_{\langle r \rangle}^2}} \cdot \exp\left(-\frac{(x - \mu)^2}{2\sigma_{\langle r \rangle}^2}\right) \quad (3)$$

Como visto anteriormente, conhecemos os valores teóricos de

$$\langle r \rangle = \frac{1}{2}$$

e de

$$\sigma_{\langle r \rangle} = \frac{\sigma_r}{\sqrt{N}} = \frac{1}{2\sqrt{3N}}$$

Considerando $N = 3^2, 3^3, 3^4$, obtemos que

$$P_{N=9}(x) = \sqrt{\frac{54}{\pi}} \exp(-54(x - 0,5)^2)$$

$$P_{N=27}(x) = \sqrt{\frac{162}{\pi}} \exp(-162(x - 0,5)^2)$$

$$P_{N=81}(x) = \sqrt{\frac{486}{\pi}} \exp(-486(x - 0,5)^2)$$

Nas figuras 4 e 5 podemos observar o comportamento das distribuições ao redor do valor esperado e também a dependência de $\sigma \sim \frac{1}{\sqrt{N}}$




Figura 4: Gráfico dos histogramas normalizados dos valores médios das k sequências para $N = 3^2, 3^3, 3^4$, comparando com as suas respectivas gaussianas e com o valor teórico de $\langle r \rangle = \frac{1}{2}$




Figura 5: Gráfico log-log para o desvio padrão em função do tamanho da amostra, comparando com o valor teórico de $\sigma_{\langle r \rangle} = \frac{1}{2\sqrt{3N}}$

```

! Programa para calcular o desvio padrão das médias em cada arquivo do problema 1a
! Nesse contexto, agora r representa a média da sequência (não mais o valor em cada elemento da sequência)

implicit none

character(100) filename

integer k_seq, n, k, i
double precision r, std_r ! Variáveis para leitura do arquivo
double precision sum_r, sum_r2, mean_r, mean_r2, std

open(unit=10, file="arquivo-saida-mean-std.dat")

do i=1,9

    filename = "../tarefa-1a/arquivo-saida-//"char(i+48)//".dat"

    open(unit=20, file=filename)

    sum_r = 0.0d0
    sum_r2 = 0.0d0

    do k=1,100
        read(20, *) k_seq, n, r, std_r
        sum_r = sum_r + r
        sum_r2 = sum_r2 + r**2
    end do

    close(20)

    mean_r = sum_r / real(k_seq, 8)
    mean_r2 = sum_r2 / real(k_seq, 8)
    std = sqrt(mean_r2 - mean_r**2)

    write(10, *) n, std

end do

close(10)

stop
end

```

Figura 6: Código principal da tarefa 1b, para cálculo do desvio padrão das médias.

1.3 Estimativa do valor de π com integração por Monte Carlo

1.3.1 Motivação do problema

Dada uma função de probabilidade com distribuição uniforme, podemos considerar que, para N grande, a razão entre a quantidade de pontos dentro da curva e quantidade de pontos totais se aproxima da razão da área da curva com a área total.

Ou seja,

$$\frac{A_{circ}}{A_{total}} \approx \frac{N_{dentro}}{N_{total}}$$

sendo uma aproximação cada vez melhor conforme N_{total} é cada vez maior (considerando o Teorema do Limite Central).

No nosso caso, como

$$\frac{A_{circ}}{A_{total}} = \frac{\pi \cdot 1^2}{2 \cdot 2} = \frac{\pi}{4}$$

isso significa que

$$\frac{N_{dentro}}{N_{total}} \approx \frac{\pi}{4} \Rightarrow \pi \approx 4 \cdot \frac{N_{dentro}}{N_{total}}$$

Em resumo, obter o valor de π ao rodar um programa que nos dará N_{dentro} e N_{total} . Para cada ponto $P_i = (x_i, y_i)$ gerado, podemos saber se ele está dentro do círculo verificando se $x_i^2 + y_i^2 \leq 1$. A quantidade de pontos que obedecerem essa relação nos dará N_{dentro} , enquanto a contagem total nos dará N_{total} .

1.3.2 Ajuste dos intervalos da função *rand*

Considerando que o FORTRAN nos dá a função *rand()* no intervalo $[0, 1]$, podemos ajustar os valores conforme nossa necessidade para gerar números aleatórios no intervalo $[a, b]$ (com $a < b$):

$$f(x) = (b - a) \cdot x + a \quad (4)$$

Como $f(x)$ é uma transformação linear da variável x , e como a função de probabilidade associada a x é uniforme (a mesma probabilidade para todos os valores), segue que $f(x)$ também tem probabilidade uniforme, porém agora no intervalo $[a, b]$.

Para o nosso problema, precisamos gerar números aleatórios dentro do quadrado definido pelas coordenadas (x, y) onde $-1 \leq x, y \leq 1$. De onde segue que

$$f(x) = 2x - 1$$

1.3.3 Estimativa de N_{total}

Para estimar N_{total} de modo a obtermos π com 4 casas decimais de precisão, podemos considerar que $\sigma < 0,00005 = 5 \times 10^{-5}$.

Como

$$\sigma \sim \frac{1}{\sqrt{N_{total}}} \Rightarrow N_{total} > \frac{1}{(5 \times 10^{-5})^2} = 4 \times 10^8$$

Ou seja, $N_{total} > 4 \times 10^8$ para obtermos π com 4 casas decimais de precisão.

1.3.4 Programa com sequências pseudo-aleatórias e resultados

Representação da contagem de pontos dentro da circunferência




Figura 7: Resultado gráfico de 10.000 pontos gerados pela distribuição uniforme. Podemos observar que, conforme N_{total} cresce, o gráfico fica cada vez mais preenchido (aproximando-se da área exata).

No programa principal foram adicionados duas variáveis para servir como *flag*: uma para acompanhar a evolução do loop (para debug) e outra para salvar os dados num arquivo de destino (usado para gerar o plot da figura 7). Os resultados podem ser vistos na Tabela 1.

N_{total}	π	Erro
4×10^6	3,142418	$8,25 \cdot 10^{-4}$
4×10^8	3,141594	$1,16 \cdot 10^{-6}$
4×10^{10}	3,141593	$3,72 \cdot 10^{-7}$

Tabela 1: Tabela dos resultados variando o N_{total} , comparando com o valor conhecido de $\pi \approx 3,14159265359$.

Os resultados mostram uma grande problemática do método, que acaba também sendo uma de suas maiores virtudes: para melhorar a aproximação do resultado, nós precisamos saltar para ordens de N_{total} cada vez mais altas – porém esta é a única imposição necessária.

```

1  implicit none
2
3  ! Gerador de pares x,y para calcular o valor de pi
4  ! O intervalo é ajustado de [0,1] -> [-1,1] fazendo f(x) = 2x - 1
5
6  integer is_on_the_circle
7  double precision get_random_coordinate
8
9  integer iseed
10 double precision n_total, n_dentro, i
11 double precision x, y, pi
12
13 integer fl_debug, fl_save_to_file
14
15 fl_debug = 1
16 fl_save_to_file = 0
17
18 iseed = 50
19
20 open(unit=40, file="tarefa-1c-saida.dat")
21
22 n_total = 4.0d0
23
24 n_dentro = 0.0d0
25
26 i = 1.0d0
27
28 call srand(iseed)
29
30
31 do while(.le.n_total)
32   x = get_random_coordinate()
33   y = get_random_coordinate()
34
35   if(is_on_the_circle(x, y).eq.1) then
36     n_dentro = n_dentro + 1.0d0
37   end if
38
39   i = i + 1.0d0
40
41   ! Se for requisitado, exibe logs de debug
42   if(fl_debug.eq.1) then
43     if(mod(i, 1.0d0).eq.0) then
44       print *, "[DEBUG] Processando...", 1.0d2 * i / n_total, "%"
45     end if
46   end if
47
48   ! Se for requisitado, salva os dados para plot posterior
49   if(fl_save_to_file.eq.1) then
50     write(40, *) x, y
51   end if
52
53 end do
54
55 pi = 4.0d0 * n_dentro / n_total
56
57 print *, 'pi=', pi
58
59 close(40)
60
61 stop
62 end
63
64
65 double precision function get_random_coordinate()
66   get_random_coordinate = 2.0d0*rand() - 1.0d0
67 return
68 end
69
70 integer function is_on_the_circle(x, y)
71   double precision x, y
72
73   if((x**2 + y**2).le.1.0d0) then
74     is_on_the_circle = 1
75   else
76     is_on_the_circle = 0
77   end if
78 return
79 end

```

Figura 8: Código principal da tarefa 1c, para cálculo do valor de π .

1.4 Cálculo de integrais por Monte Carlo

1.4.1 Motivação com o Teorema do Valor Médio

O Teorema do Valor Médio relaciona o valor de uma integral ao valor médio $\langle f \rangle$ dentro de um intervalo $[a, b]$:

$$\int_a^b f(x)dx = (b - a)\langle f \rangle$$

onde

$$\langle f \rangle \approx \frac{1}{N} \sum_{i=1}^N f(x_i) \quad , \text{ converge para } N \rightarrow \infty$$

Ou seja, para nosso uso:

$$\int_a^b f(x)dx = \frac{(b - a)}{N} \sum_{i=1}^N f(x_i) \quad (5)$$

1.4.2 Estimativa de N_{total}

Semelhante ao que fizemos anteriormente: para 3 casas decimais de precisão, $\sigma < 0,0005 = 5 \times 10^{-4}$

$$\sigma \sim \frac{1}{\sqrt{N_{total}}} \Rightarrow N_{total} > \frac{1}{(5 \times 10^{-4})^2} = 4 \times 10^6$$

Ou seja, precisamos de $N_{total} > 4 \times 10^6$ para garantir 3 casas decimais de precisão.

1.4.3 Cálculo das integrais

$$I_i = \int_0^1 \frac{4}{1+x^2} dx = 4 \cdot [\arctan(x)]_0^1 = \pi \approx 3,141593$$

$$I_{ii} = \int_1^{10} \frac{1}{x} dx = [\ln(x)]_1^{10} = \ln(10) \approx 2,302585$$

Para $N_{total} = 4 \times 10^6$, o resultado é apresentado na Tabela 2. Os valores estão muito próximos ao valor da integral, mostrando a eficiência do método.

	Integral	Erro
I_i	3,141	$5,418 \cdot 10^{-4}$
I_{ii}	2,302	$8,020 \cdot 10^{-4}$

Tabela 2: Tabela dos resultados dos cálculos das integrais dos itens i e ii usando o Teorema do Valor Médio, com $N_{total} = 4 \times 10^6$

```

implicit none

integer iseed
double precision n_total, a1, b1, a2, b2
double precision f1, f2, integral, random
double precision i, x1, x2, sum_f1, sum_f2
double precision integral_f1, integral_f2

iseed = 50

call srand(iseed)

n_total = 4.0d6

a1 = 0.0d0
b1 = 1.0d0

a2 = 1.0d0
b2 = 10.0d0

i = 1.0d0
sum_f1 = 0.0d0
sum_f2 = 0.0d0

do while(i.le.n_total)
    x1 = random(a1, b1)
    sum_f1 = sum_f1 + f1(x1)

    x2 = random(a2, b2)
    sum_f2 = sum_f2 + f2(x2)

    i = i + 1.0d0
end do

integral_f1 = integral(sum_f1, a1, b1, n_total)
integral_f2 = integral(sum_f2, a2, b2, n_total)

print *, "integral_f1=", integral_f1
print *, "integral_f2=", integral_f2

stop
end

```

```

! Função para gerar valores aleatórios de f(x) = 4 / (1 + x^2), 0 <= x <= 1
double precision function f1(x)
    double precision x
    f1 = 4.0d0 / (1.0d0 + x**2)
return
end

! Função para gerar valores aleatórios de f(x) = 1 / x, 1 <= x <= 10
double precision function f2(x)
    double precision x
    f2 = 1.0d0 / x
return
end

! Função para gerar valores aleatórios com probabilidade uniforme entre [a,b]
double precision function random(a, b)
    double precision a, b
    random = (b - a) * rand() + a
return
end

! Função para o cálculo da integral pelo Teorema do Valor Médio
double precision function integral(sum_fx, a, b, n_total)
    double precision sum_fx, a, b, n_total
    integral = (b - a) / n_total * sum_fx
return
end

```

Figura 9: Código principal da tarefa 1d, para cálculo das integrais usando o método de Monte Carlo.

2 Tarefa 2 (Opcional) - Decaimento Radioativo

3 Tarefa 3 - Passeio Aleatório